



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





12
215



LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY







③

HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

PRÉSENTANT

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX,
LEUR DISTRIBUTION, LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS
GENRES, ET LA CITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y
RAPPORTENT ;

PRÉCÉDÉE

D'UNE INTRODUCTION

Offrant la Détermination des caractères essentiels de l'Animal, sa Distinction du végétal et des
autres corps naturels; enfin, l'Exposition des principes fondamentaux de la Zoologie.

PAR J. B. P. A. DE LAMARCK,

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE, PROFESSEUR AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

Nihil extra naturam observatione notum.

DEUXIÈME ÉDITION.

REVUE ET AUGMENTÉE DE NOTES PRÉSENTANT LES FAITS NOUVEAUX
DONT LA SCIENCE S'EST ENRICHIE JUSQU'A CE JOUR ;

Par MM.

G. P. DESHAYES ET H. MILNE EDWARDS.

TOME CINQUIÈME.

ARACHNIDES, CRUSTACÉS, ANNÉLIDES, CHARTREUXES.

PARIS.

J. B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE,

RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, N° 13 BIS.

A LONDRES, MÊME MAISON, 219, REGENT STREET.

1838.

193688

YRABOL

ROMIL. OROHATO ONA. LU

YTIKIVIMU

HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

CLASSE SEPTIÈME.

LES ARACHNIDES. (Arachnidæ.)

Animaux ovipares, ayant en tout temps des pattes articulées, ne subissant point de métamorphose, et n'acquérant jamais de nouvelles sortes de parties.

Respiration trachéale ou branchiale : les ouvertures, pour l'entrée de l'air, stigmatiformes. Un cœur et la circulation ébauchés dans plusieurs. La plupart exécutent plusieurs accouplemens dans le cours de la vie.

Animalia ovipara, pedibus articulatis in omni tempore instructa, ad metamorphoses non subjecta, nec nova partium genera acquirunt.

Respiratio trachealis aut branchialis : orificiis pro æris intromissione stigmatiformibus. Cor circulatioque in pluribus inchoata. Copulationes plures per vitam in plurimis. (1)

(1) La plupart des naturalistes, tout en adoptant la classe des Arachnides établie par Lamarck, n'admettent pas les limites que cet auteur y assigne, et la restreignent aux animaux articu-



9
-215



LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY





A cette première considération, qu'il importe de ne pas perdre de vue pour juger les diverses familles des Arachnides, je joins la suivante, comme étant celle qui caractérise principalement la classe de ces différens animaux.

Parmi les animaux articulés qui ne possèdent point un système d'organes pour la circulation, il n'y a absolument que les insectes qui acquièrent, soit de nouvelles formes, soit de nouvelles sortes de parties, qu'ils n'avaient pas en naissant ; et aucune Arachnide n'est nullement dans ce cas (1). Or, comme toutes les Arachnides sont essentiellement distinctes des Crustacés, et qu'elles diffèrent des insectes par la considération que je viens de citer, il en résulte qu'elles constituent un ensemble d'êtres qu'on ne doit pas désunir, quoique ces êtres soient des animaux fort diversifiés en organisation.

Sans doute ces animaux sont singuliers en ce que, parmi eux les uns jouissent d'une circulation évidente, tandis que les autres n'en offrent pas encore l'ébauche ; en ce que les premiers respirent par des poches branchiales, tandis que les seconds ne respirent que par des trachées ; enfin, en ce qu'il y en a qui ont des antennes ; et que beaucoup d'autres n'en ont jamais. Mais il paraît que ces singularités tiennent à ce que, dans l'étendue de leur classe, l'organisation de ces animaux subit des changemens rapides. (2)

(1) Cette observation est exacte en ce qui concerne les Arachnides proprement dites, mais ne l'est peut-être pas relativement à quelques-uns des insectes aptères que notre auteur range dans cette classe ; certains myriapodes paraissent subir en effet de véritables métamorphoses ; car, suivant M. Savigny, ils sont dépourvus de pieds en naissant, et, par la suite, acquièrent un nombre considérable de ces organes. (Voyez *Memorie Scientifica di Paolo Savi, decade prima.*) E.

(2) Cette diversité dans l'organisation d'animaux appartenant évidemment au même groupe naturel est un des faits les plus importants à signaler pour la théorie des classifications, car elle montre qu'en attachant trop d'importance aux raisonnemens faits *à priori*, on pourrait facilement, tout en paraissant suivre

Après eux, l'on connaît encore beaucoup d'animaux articulés, à peau cornée ou crustacée; mais ils sont tous de nature ou d'origine aquatique; aucun d'eux ne respire par des organes trachéaux; et c'est avec ces animaux aquatiques que la nature termine le mode si remarquable des articulations, à l'égard d'un grand nombre d'animaux qui n'ont point de squelette.

Ainsi, ce mode si particulier parmi les animaux sans vertèbres a commencé avec des animaux qui ne peuvent respirer que l'air libre, tels que tous les insectes, s'est étendu aux Arachnides, qui, toutes, le respirent encore nécessairement, et ne s'est ensuite montré que dans des animaux aquatiques, avec lesquels il s'anéantit et disparaît entièrement.

Au lieu de borner son attention à ne considérer que des différences de parties, tant extérieures qu'internes, si l'on eût ici étudié la nature, dans l'ordre de ses productions, l'on eût saisi cette marche, qui est la sienne, et l'on eût pressenti la cause qui a amené, dans les Arachnides, une succession si rapide de grands changemens d'organisation, même dans des animaux véritablement liés entre eux par un grand ensemble de rapports; enfin, l'on n'eût pas regardé comme nécessaire de reporter dans une autre classe celles des Arachnides qui sont antennifères, parce que l'on eût senti alors qu'il était impossible de leur y assigner un rang convenable.

La classe des Arachnides, telle que je l'ai établie dans mes

le *principe de la subordination des caractères*, si bien développé par l'illustre Cuvier, se laisser conduire à des résultats inexacts. Une découverte toute récente est venue montrer combien est graduel le passage entre les Arachnides pulmonaires et les vraies Arachnides (exantennées) à respiration trachéenne comme celle des insectes. M. Dugès a constaté que chez certaines Aranéides il existe en même temps des trachées et des poumons ou branchies intérieures, et que, malgré la présence de ces trachées, le système circulatoire est tout aussi développé que chez les Arachnides privées de canaux aérifères. (Voyez les *Annales des Sciences naturelles*, 2^e série, t. 6, p. 183, et la 3^e édit. du *Règne animal* de Cuvier, Atlas, Crust. pl. 4, fig. 4. E.

cours , embrasse cinq ou six petites familles qui semblent très particulières , et cependant dont on ne saurait séparer aucune du cadre commun que je leur ai assigné , sans un grand inconvénient pour celles des classes avoisinantes où on la reporterait.

Si , par exemple , l'on reporte les Arachnides antennifères parmi les insectes , on détruit alors la seule définition simple et raisonnable que l'on puisse donner de ces derniers , et l'on se trouve forcé d'assigner aux animaux que l'on y réunit , un rang tout-à-fait inconvenable : il serait facile de le prouver et de montrer l'impossibilité de placer , dans le voisinage des coléoptères , des parasites suceurs tels que les poux et les ricins , etc. (1)

Si , de même , l'on reportait les Arachnides trachéales parmi les Insectes , afin de caractériser la classe de ceux-ci par cette particularité exclusive de ne respirer que par des trachées , tous les insectes ne seraient plus munis d'antennes , et les Faucheurs , ainsi probablement que les Galéodes , etc. , seraient séparés classiquement des Araignées. L'inconvenance du rang à assigner à ces singuliers insectes resterait d'ailleurs la même. Le cadre qui embrasse nos Arachnides , soit antennifères , soit exantennées , doit donc conserver son intégrité , si l'on ne veut tomber dans l'inconvénient d'associer aux insectes

(1) Les Myriapodes , qui diffèrent plus des Arachnides que des Insectes hexapodes , ne peuvent évidemment rester dans la même classe que les premiers , et il est vrai qu'en les réunissant aux derniers , on détruit , en grande patrie , l'homogénéité si remarquable du groupe naturel formé par ces animaux ; aussi , un zoologiste habile , Leach , a-t-il proposé d'en former une classe distincte , qui serait intermédiaire aux Insectes et aux Arachnides , et cette marche a été également suivie par Latreille dans son ouvrage intitulé : *Familles naturelles du règne animal* , et dans son cours d'Entomologie , publié peu de temps avant la mort de ce savant entomologiste. Quant aux parasites suceurs dont Lamarck parle ici , il est vrai qu'on les rapproche à tort des Coléoptères ; mais si on les place à la suite des Diptères , on ne violera aucune analogie. E.

des animaux que la nature en a distingués, et auxquels il n'est pas possible d'assigner un rang dans leur classe, que les rapports ne désavouent.

Une classe peut être très naturelle, convenablement limitée, et offrir, néanmoins, dans les animaux des diverses coupes ou familles qu'elle embrasse, des formes et des parties très différentes. Dans tous les temps de sa vie, un papillon est fort différent d'un scarabé ; l'un et l'autre cependant ne sont-ils pas de véritables insectes ?

Lorsqu'il y a de grandes analogies d'ensemble, les diverses particularités d'organisation que l'on observe quelquefois, ne permettent cependant pas de séparer classiquement les objets qui les offrent. Qu'y a-t-il, en effet, de plus voisin des Araignées que les Faucheurs, les Galéodes, etc. ? Cependant les premières respirent par des poches évidemment branchiales, tandis que les autres ne respirent que par des trachées.

On sait que les Arachnides non antennifères ont, en général, huit pattes ; on sait aussi que les Acarides et les Pycnogonides (1) conduisent naturellement aux Phalangides, c'est-à-dire aux Faucheurs, etc. Or, si ces Acarides sont essentiellement des Arachnides, reportera-t-on dans une autre classe les parasites suceurs, tels que les Poux et les Ricins, qui y conduisent d'une manière évidente, quoiqu'ils aient des antennes ? La transition, à cet égard, est tellement préparée, que les Acarides, munies la plupart de huit pattes, comme les autres Arachnides exantennées, offrent cependant plusieurs genres dont les espèces n'ont toujours que six pattes [astomes, leptes et caris. (2)]

(1) Les Pycnogonides nous paraissent devoir être rapportées à la série des Crustacés plutôt qu'à celle des Arachnides, dont ils n'ont pas les caractères. En effet, leur respiration, au lieu d'être aérienne, est aquatique, et au lieu de s'effectuer à l'aide de branchies intérieures ou de trachées, a lieu par la surface du corps seulement. E.

(2) Il paraîtrait que les petites Arachnides dont il est ici question ne sont que de jeunes individus, dont la quatrième paire de pattes n'était pas encore développée, et qu'à l'état parfait ils sont pourvus du nombre normal de ces organes. E.

Je persiste donc à penser qu'il est nécessaire de conserver la classe des Arachnides telle que je l'ai établie , parce que sa conservation débarrasse celle des insectes d'animaux qu'on n'y pourrait réunir sans de grands inconvéniens, et qui véritablement n'y appartiennent point.

Sans citer de nouveau l'impossibilité d'assigner un rang convenable, parmi les insectes, à des animaux tels que les Parasites, les Thysanoures et les Myriapodes, le plus grand des inconvéniens que je trouve à la réunion de ces animaux aux insectes, est qu'ils en altéreraient le caractère général et vraiment naturel, savoir :

D'offrir, après la naissance, un état de larve très particulier, lequel est singulièrement varié, selon les ordres, dans les formes et les parties de l'animal; et de présenter, en dernier lieu, un état parfait, toujours très distinct de celui de larve, et dans lequel les insectes, si diversifiés dans leur premier état, ont tous généralement six pattes articulées, deux yeux à réseau ou à facettes, et deux antennes.

Bien différentes, à cet égard, de tous les insectes, les Arachnides, même celles qui ont des antennes, éprouvent, comme tout être vivant, des développemens successifs après leur naissance; mais aucune d'elles n'offre un état de larve clairement distinct d'un état parfait; elles conservent, toute leur vie, non les dimensions, mais la forme et les parties qu'elles avaient en naissant; et si certaines d'entre elles acquièrent des parties de plus dans leurs développemens, ce n'en sont pas de nouvelles sortes, ce sont des pattes et quelquefois aussi des anneaux en tout semblables aux autres. (1)

Certes, ce n'est pas là le mode que nous offrent les Insectes dans la succession de leurs développemens. Tous, après leur naissance, acquièrent, soit une forme, soit de nouvelles sortes de parties, qu'ils ne possédaient point après leur sortie de l'œuf, et leur état de larve, clairement distinct de leur état parfait, n'est jamais équivoque, sauf les avortemens.

(1) Voyez ce qui a déjà été dit touchant les métamorphoses des Myriapodes, page 4 E.

Ainsi, les Arachnides, généralement distinguées des Insectes par leur défaut de métamorphoses, et cependant toutes respirant uniquement l'air libre, même celles en petit nombre qui vivent dans les eaux, sont remarquables par les changemens singuliers et rapides que leur organisation nous offre dans leurs différentes familles. En effet, ces animaux présentent, dans leur ensemble, différens groupes qui offrent entre eux de si grandes dissemblances d'organisation, qu'on pourrait en former autant de classes particulières, ce qui nuirait à la simplicité de la méthode, et serait d'autant plus inconvenable que ces groupes peuvent être liés ensemble par des caractères propres à les embrasser généralement, tels que ceux que j'ai assignés à cette classe.

Quoiqu'il y ait des Arachnides qui possèdent un système d'organes pour la circulation, aucune d'elles ne saurait appartenir à la classe des Crustacés. Bien des motifs s'y opposent, parmi lesquels on doit compter celui-ci, savoir : que les organes respiratoires, trachées ou branchies, sont toujours à l'intérieur du corps dans les Arachnides, tandis qu'ils sont au dehors dans les Crustacés (1). Dans les premières, l'ouverture qui donne entrée au fluide à respirer est stigmatiforme, et elle ne l'est pas dans les seconds.

La seule considération des yeux offre déjà l'indice d'un ordre de choses très particulier dans les Arachnides. En effet, tous les insectes ont des yeux à facettes planes, offrant un réseau très délicat ; dans les Arachnides, au contraire, les yeux sont lisses, soit isolés, comme dans le plus grand nombre, soit groupés plusieurs ensemble, formant des amas dont la surface est granuleuse ou subgranuleuse, et non à facettes planes.

J'ai dû placer les Arachnides après les Insectes, parce que celles de leurs races qui sont plus avancées en organisation exigent ce rang, et qu'elles avoisinent plus les Crustacés que ne le font les insectes. Mais il ne s'ensuit pas que toutes les Arachnides

(1) Dans les Crustacés décapodes, les branchies sont renfermées dans des cavités intérieures, mais dont les ouvertures, il est vrai, ne sont pas stigmatiformes. E.

soient supérieures en organisation aux Insectes les plus perfectionnés ; et surtout qu'elles aient reçu leur existence par une transition de ces derniers aux nouveaux animaux produits, c'est-à-dire, par une continuité des progrès de l'organisation dans son perfectionnement : ce serait nous attribuer une erreur que de croire que nous le supposions ainsi.

Dans l'échelle animale, les Arachnides commencent presque en même temps que les Insectes ; et, dès leur commencement, elles offrent deux branches séparées, qui néanmoins leur appartiennent. Ces deux branches sont presque en niveau avec celle qui amène tous les insectes. Il y a donc, en ce point de l'échelle animale, après les Epizoaires, trois branches distinctes. savoir :

- 1^o Celle des insectes aptères [les puces] : elle amène successivement tous les autres insectes ;
- 2^o Celle des Arachnides antennées parasites [les poux, les ricins] : elle amène les Acarides et toutes les autres Arachnides exantennées ;
- 3^o Celle des Arachnides antennées vagabondes [les Thyssanoures, les Myriapodes] : elle fournit la source où les Crustacés ont pris leur existence.

Ainsi, de ces trois branches, qui paraissent partir presque d'un même point, la première est formée d'une suite immense d'animaux qui offrent tous un état de larve très distinct de l'état parfait de l'animal. Les deux autres branches appartiennent aux Arachnides, et embrassent des animaux qui n'offrent nullement cette distinction constante d'un état de larve et d'un état parfait pour chaque animal.

Or, si tout insecte acquiert, soit des formes qu'il n'avait point à sa naissance, soit de nouvelles sortes de parties, qui sont au moins des ailes, on peut assurer que ce n'est jamais par suite d'avortemens que les Arachnides sont toujours sans ailes, et conservent la même forme. En effet, aucune congénère n'offre d'exception à cet égard ; et il est évident que cet ordre de choses, constant et général dans les Arachnides, résulte d'un état particulier de l'organisation de ces animaux, qui n'a point lieu dans les insectes.

Dans les Arachnides les plus perfectionnées, telles que les Araignées et les Scorpions, Cuvier a récemment découvert un cœur musculaire et dorsal, qui éprouve des mouvemens très sensibles de systole et de diastole; et sous le ventre il a observé plusieurs ouvertures stigmatiformes [deux ou huit] qui conduisent à autant de cavités particulières et en forme de bourse, dans chacune desquelles se trouve un grand nombre de petites lames très déliées. Ces cavités isolées et les petites lames qu'elles renferment sont sans doute l'organe respiratoire des animaux dont il s'agit. M. Cuvier les regarde comme autant de poumons, et moi je les considère comme des cavités branchiales analogues à celles qu'on observe dans les sangsues, les lombrics, etc.; le propre des branchies étant, premièrement, de pouvoir s'habituer à respirer l'air en nature, comme l'eau qu'elles respirent le plus ordinairement, tandis que le poumon ne saurait respirer que l'air; et, deuxièmement, de n'exister, comme le poumon, que dans des animaux qui possèdent une circulation.

Enfin, du cœur dorsal déjà cité, deux grands vaisseaux partent pour se rendre à chaque cavité respiratoire et se ramifier sur sa membrane. M. Cuvier les regarde, l'un comme une artère, l'autre comme une veine, et suppose que ce sont les vaisseaux pulmonaires. D'autres vaisseaux partent encore du même tronc dorsal pour se rendre à toutes les parties (1). Ce n'est pas

(1) Depuis la publication de ce travail, MM. Treviranus, Dugès et quelques autres anatomistes, ont également étudié le système circulatoire des Arachnides, et ont confirmé les résultats généraux énoncés ci-dessus. Chez toutes les Arachnides qui respirent par des branchies intérieures ou poumons, il existe un cœur dorsal tubiforme et des artères qui distribuent le sang aux diverses parties du corps; les veines paraissent être remplacées par les lacunes que les organes laissent entre eux; mais il existe des vaisseaux bien formés qui établissent la communication entre le cœur et les cavités respiratoires. Quant à la marche du fluide nourricier, les opinions varient: suivant M. Audouin, la circulation se ferait de la même manière que chez les Crustacés, et le sang arriverait des poumons au cœur

tout : dans ces mêmes animaux , ce savant a vu le foie se composer de quatre paires de grappes glanduleuses qui versent leur liqueur dans quatre points différens de l'intestin. (1)

Ainsi, c'est vers la fin des Arachnides que la nature a commencé l'établissement d'un système d'organes particulier pour la circulation des fluides de l'animal ; c'est aussi dans cette classe d'animaux qu'elle a terminé la respiration trachéale par des trachées rameuses , pour y substituer celle du système branchial , système respiratoire très varié , mais qui est toujours local ; enfin c'est encore dans cette même classe qu'elle a commencé à établir la principale des glandes conglomérées (le foie), la formant d'abord de portions séparées , mais rassemblées sous la forme de grappes , et les réunissant ensuite en masses moins divisées , plus solitaires et plus considérables.

Les bourses respiratoires que Cuvier a vues dans les Araignées et les Scorpions , M. Latreille les a observées dans les Phryues ; en sorte que les deux dernières familles , savoir : les Arachnides pédipalpes et les Arachnides fileuses , sont liées entre elles par ce grand trait d'organisation , tel qu'une circulation ébauchée et la respiration par des poches branchiales.

Si , dans les Phalangides , ces bourses n'existent pas encore , du moins les trachées aérifères y ont changé de mode , et ne sont plus bicordonnées avec une série de plexus , mais sont seulement rameuses. La même chose paraît avoir lieu dans les Acarides , et cela provient de la réduction du nombre des stigmates et de leur position. Dans les Arachnides antennées , où les stigmates sont plus nombreux et en général latéraux ,

pour se porter ensuite dans les diverses parties du corps , tandis que M. Dugès pense que ce liquide est envoyé par le cœur aux poumons , aussi bien que dans les autres parties. (Voyez Treviranus, Vermischte Schriften , t. 1. Dugès, Ann. des Sc. Nat. 2^e série. t. 6. Audouin, art. Arachnida, Cyclopedia of Anatomy and Physiology.) Chez les Arachnides trachéennes l'appareil circulatoire n'existe plus. E.

(1) Analyse des travaux de la classe des sciences de l'Institut, pendant l'année 1810 , p. 44 et 45.

les cordons trachéaux ont autant de plexus que de stigmates, comme dans les insectes ; et ces Arachnides en sont effectivement plus voisines, sans être pour cela des insectes. Ainsi la respiration trachéale a changé peu-à-peu son mode, comme les stigmates ont changé dans leur nombre et leur situation, et, se trouvant de plus en plus réduite, elle a en quelque sorte préparé la respiration branchiale, qui se montre effectivement dès que la circulation se trouve établie.

Il résulte de ces considérations que, malgré les différences d'organisation observées dans les Arachnides de différentes familles, ces familles néanmoins sont liées entre elles par des rapports qu'on ne peut méconnaître, et qui ne permettent pas de les séparer ; enfin, qu'elles sont toutes assujéties à un ordre de choses qui les éloigne presque également des Crustacés et des Insectes. On trouve cependant dans l'aspect des Arachnides, en général, quelque chose qui semble les rapprocher un peu plus des Crustacés.

En effet, quoique très distinctes des Crustacés, les Arachnides ont, la plupart, dans leur forme générale, certains traits de ressemblance avec ceux-ci, qui en rappellent l'idée à leur aspect.

Les Cancérides, par leur corps court et leur tête confondue avec le corselet, nous rendent, en quelque sorte, la forme des Araignées ; les écrevisses, la thalassine, nous rappellent, jusqu'à un certain point, la figure des Scorpions ; il n'y a pas jusqu'aux crévettines qui ne semblent offrir une sorte de modèle des Scutigères, etc.

Les Arachnides vivent les unes sur la terre, d'autres, mais en petit nombre, dans les eaux, et d'autres, enfin, sont parasites de différents animaux, dont elles sucent la substance. En général, elles sont carnassières et vivent de proie ou de sang qu'elles sucent ; il n'en existe qu'un petit nombre qui se nourrissent de matières végétales. Aussi plusieurs ont-elles des mandibules qui font les fonctions de suçoir, et d'autres ont-elles un suçoir isolé, quoique accompagné souvent de mandibules et de palpes.

Cette classe d'animaux est très suspecte : beaucoup d'entre eux sont venimeux ; en sorte que leur morsure ou leur piqure

ORDRE PREMIER.

ARACHNIDES ANTENNÉES-TRACHÉALES.

Elles ont deux antennes à la tête, et respirent par des trachées bicordonnées et ganglionnées ou plexifères.

Cet ordre comprend des animaux que l'on a cru pouvoir réunir à la classe des insectes, qui en diffèrent néanmoins par un état de choses dans leur organisation qui amène constamment des résultats dont aucun insecte non altéré n'offre d'exemple, et qui, dans la classe dont il s'agit, ne peuvent trouver nulle part un rang convenable.

Ces animaux sont, à la vérité, plus voisins des insectes par leurs rapports généraux que les autres Arachnides, dont l'organisation est beaucoup plus avancée dans ses progrès; et cependant la nature des uns et des autres n'est pas la même que celle des insectes. En effet, le produit de leur organisation donne lieu pour eux à un ordre de choses qui n'est plus le même que celui auquel tous les insectes sont assujétis, et qu'on ne retrouvera plus dans les animaux des classes suivantes.

Effectivement, aucune de ces Arachnides ne subit de métamorphose réelle; aucune n'offre, après sa naissance, un état de larve tout-à-fait distinct de l'état parfait qui termine ses développemens; toutes conservent la forme et les parties qu'elles avaient en naissant, sans en acquérir aucune sorte nouvelle (1); et si elles n'ont jamais d'ai-

(1) Voyez la note de la page 4.

les, c'est que le propre de leur organisation est de ne leur en point donner, ce qui est opposé à ce qui a lieu à l'égard des insectes.

Les *arachnides antennées-trachéales* ont toutes la tête distincte, munie de deux antennes; des yeux lisses, quelquefois isolés, d'autres fois groupés, formant des amas à surface subgranuleuse; six pattes ou beaucoup davantage. Certaines, parmi elles, acquièrent, en se développant, plus d'anneaux et plus de pattes qu'elles n'en avaient d'abord. Toutes sont toujours sans ailes et conservent pendant leur vie les mêmes habitudes.

Je partage cet ordre en deux sections, formant chacune une branche particulière, savoir:

1^o Les Arachnides crustacéennes.

2^o Les Arachnides acaridiennes.

ARACHNIDES CRUSTACÉENNES.

(*Branche qui, conduit aux crustacés.*)

Elles sont vagabondes, à corps souvent écailleux, et ont des yeux composés, granuleux ou subgranuleux.

Ces Arachnides ne sont assurément point des Crustacés, et encore moins des Insectes. Je leur donne cependant le nom de *crustacéennes*, parce qu'elles constituent une branche isolée qui paraît être la source où les Crustacés ont puisé leur existence (1). Elles se lient effectivement aux Crustacés par les Cloportides, les Assellotes, etc.,

(1) Nous sommes loin de regarder ces animaux comme offrant, dans un état de simplification, le mode de structure

sans cesser néanmoins d'appartenir à la classe où je les rapporte.

Les Arachnides crustacéennes ne vivent point habituellement, comme parasites, sur certains animaux, ce que j'ai voulu exprimer en les disant vagabondes. Elles offrent deux familles distinctes, savoir: les *Thysanoures* et les *Myriapodes*; en voici l'exposition.

LES THYSANOURES.

Deux antennes; des mandibules; quelquefois des mâchoires et des palpes distincts. Six pattes, et en outre des organes de mouvement, soit sur les côtés de l'abdomen, soit à son extrémité.

M. Latreille a nommé *Thysanoures* [queue frangée] les arachnides de cette famille, parce qu'elles ont à l'extrémité de l'abdomen, soit des filets articulés, soit une queue fourchue. Ce sont, selon nous, ces animaux qui commencent la branche véritablement isolée des Arachnides crustacéennes. Les premiers, parmi eux, étant des animaux très petits, ont le corps plus mou qu'écailleux, et néanmoins le luisant ou le brillant qu'il offre dans plusieurs, semble être un indice de sa tendance à le devenir. Dans les derniers animaux de cette famille, les pièces crustacées et luisantes qui couvrent le corps ne sont plus douteuses.

Tous les *Thysanoures* n'ont jamais que six pattes; mais soit la queue fourchue des uns et qui leur sert à sauter,

propre à la classe des Crustacés; la série formée par ceux-ci commence aux Lernées, êtres dont l'organisation est très différente et bien plus simple que celle des Insectes hexapodes aptères ou des *Myriapodes*. E.

soit les appendices mobiles qu'ont les autres de chaque côté de l'abdomen en dessous, et qui semblent de fausses pattes, tout indique en eux des rapports qui les rapprochent des *Myriapodes* qui appartiennent à la même branche. Les *Thysanoures* se divisent de la manière suivante.

- (1) Antennes de quatre pièces. Point de palpes distincts. Abdomen terminé par une queue fourchue, repliée sous le ventre dans l'inaction.

Smynthure.

Podure.

- (2) Antennes multiarticulées. Des palpes distincts; des appendices mobiles de chaque côté de l'abdomen en dessous, et des filets articulés à son extrémité.

Machile.

Forbicine.

[Cette division est très naturelle et correspond à celle généralement adoptée par les entomologistes; la première section constitue la famille des Podurelles de Latreille et la seconde celle des Lépismènes du même auteur. [E.]

SMYNTHURE. (Smynturus.)

Antennes comme brisées, divisées en quatre parties, plus grêles vers leur sommet : à dernier article annelé ou composé. Deux mandibules dentelées au sommet. Palpes non distincts.

Tête séparée. Corps court; abdomen subglobuleux. Queue fourchue, cachée sous le ventre dans l'inaction.

Antennæ subfractæ, in partes quatuor divisæ versùs apicem graciliores : articulo ultimo annulato aut composito. Mandibulæ duæ apice denticulato. Palpi non distincti.

Caput distinctum. Corpus breve; abdomine subgloboso. Caudâ furcatâ, in quiete infrâ ventrem absconditâ.

OBSERVATIONS. — Les Smynthures, que je préférerais nommer Podurelles, sont de très petits animaux que Linné et Fabri-

* Guérin. Encyclop. t. 10: p. 107.

* Templeton et Westwood. Trans of the entom. soc. of London. t. 1.
2. part. p. 94. pl. 11. fig. 4.

Habite en Europe, sous les pierres. Elle a de petites écailles sur le corps.

Etc.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles décrites et figurées par M. Templeton dans le premier volume des Transactions de la Société Entomologique de Londres.

[M. Templeton, dans un travail spécial sur les Thyranoures de l'Irlande, inséré dans les Mémoires de la Société entomologique de Londres, a établi deux nouveaux genres qui rentrent dans cette division du groupe des Thyranoures, et les désigne sous les noms d'*Orchesella* et d'*Achorutes*.

Le genre ORCHESELLE *orchesella*. T. a pour caractère: antennes composées de 6 ou de 7 articles filiformes et presque aussi longues que le corps; appendice furculaire bien développé. L'auteur y range deux espèces:

1. *L'Orchesella filicornis*. Templeton. loc. cit. p. 93. pl. 11. fig. 2.

2. *L'Orchesella cincta*. Templeton. loc. cit. pl. 11. fig. 3. *P. vaga*?
Fabricius.

Dans le genre ACHORUTE, *achorutes* T., les antennes, composées de 4 articles, sont plus courtes que la tête, et la fourche est rudimentaire.

Achorutes muscorum. Templ. loc. cit. p. 97. pl. 12 fig. 6.

Achorutes dubius. Templ. loc. cit. p. 96. pl. 12. fig. 3.

L'auteur pense que cet insecte pourrait bien être le jeune de la Podure aquatique de Lamarck. E.]

MACHILE. (*Machila*.)

Antennes filiformes-sétacées, multiarticulées, insérées sous les yeux. Deux mandibules; deux mâchoires, palpes

maxillaires très grands, saillans. Les yeux composés, presque contigus postérieurement.

Corps allongé, convexe, à dos arqué. Abdomen conique, terminé par plusieurs soies, dont celle du milieu plus grande. Elles servent à sauter.

Antennæ filiformi-setaceæ, multiarticulatæ, sub oculis insertæ. Mandibulæ maxillæque duæ. Palpi maxillares, maximi exserti. Oculi compositi, posticè subcontigui.

Corpus elongatum, convexum, dorso arcuato. Abdomen conicum, setis terminatum: setâ mediâ longiore. Setæ caules ad saltus idoneæ.

OBSERVATIONS. — Les Machiles forment la transition des Podures aux Forbicines. Plus grands que les Podures, ils ont encore, comme elles, la faculté de sauter, non en déployant une queue fourchue, mais en frappant le plan qui les soutient avec les soies inégales de leur queue. Leur corps est allongé, conique, convexe, comprimé sur les côtés, à dos voûté ou arqué. Il est couvert de petites écailles peu brillantes, et a en dessous, de chaque côté, une rangée d'appendices mobiles, qui paraissent être de fausses pattes.

Les Machiles et les Forbicines ou Lépismes offrent chez la femelle une tarière qui n'existe pas chez les Podures, et qui est logée entre les lames terminales de l'abdomen. Leur organisation extérieure a été étudiée avec soin par Latreille. (Voyez un Mémoire sur les Thysanoures, inséré dans le 1^{er} vol. des nouvelles Annales du Muséum.) E.

ESPÈCE.

1. Machile polypode. *Machilis polypoda*.

M. saltatrix; corpore cylindræco-conico; setis caudæ inæqualissimis

Lepisma polypoda. Lin. Fab.

1. *Forbicina teres saltatrix*. Geoff. 2. p. 614.

Machilis polypoda. Latr. Gen. J. p. 165. tab. 6. f. 4.

Habite l'Europe tempérée et australe. Cette espèce est encore la seule

connue; mais je crois qu'on en a observé d'autres qui sont inédites. [Deux espèces bien distinctes paraissent avoir été confondues ici.

L'une, ayant les antennes plus longues que le corps, a été nommée *Lepisma annulicornis* par Latreille (Nouv. ann. du Mus. T. 1) et ne diffère pas de la Forbicine cylindrique de Geoffroy; Latreille y rapporte aussi le *Lepisma saccharina* de Villers (Entom. Lin. vol. 4. tab. 11, fig. 1). et l'espèce figurée par Roemer (Gen. insect. pl. 25. fig. 1).

L'autre, que Latreille nomme *Lepisma brevicornis* (Nouv. ann. du Muséum, t. 1.), a au contraire les antennes plus courtes que le corps, et paraît être le *Lepisma polypoda* de Linné et l'espèce figurée sous le nom de *Machilis polypoda* par Latreille dans son *Genera*; elle vient d'être étudiée avec plus de soin par M. Templeton (Tr. of the Entom. soc. of London, vol. 1. p. 92. tab. 11. fig. 1), et appartient au genre *Forbicine* de Leach, qu'il ne faut pas confondre avec les Forbicines de Lamarck. E.]

[Leach a établi sous le nom de PETROBIUS un nouveau genre qui ne paraît pas devoir être adopté et qui a été réuni par Latreille à ses Machiles: il se compose des Lépis-mènes, dont les antennes (insérées sous les yeux comme chez les Machiles) sont plus longues que le corps, tandis que chez les Forbicines du même naturaliste (c'est-à-dire les Machiles de Latreille et de Lamarck), ces organes seraient plus courts que le corps. L'espèce d'après laquelle Leach a fondé ce genre est le PETROBIUS MARITIME. *Petrobius maritimus*.

Leach. Zoological miscellany, vol. 3. p. 63. pl. 145.

Machilis maritima. Latreille. Règne animal de Cuv. 2^e édit. t. 4. p. 341 et nouv. Annales du Muséum. t. 1. p. 178.

Petrobius maritimus. Westwood et Templeton. Trans. of the entom. soc. of London. t. 1. 2. part. p. 92. E.]

FORBICINE. (*Lepisma*.)

Antennes sétacées, longues, multiarticulées, à articles très petits. Un labre, deux mandibules, deux mâchoires, quatre palpes et une lèvre distincts.

Corps allongé, aplati, écailleux, muni d'appendices en dessous. Six pattes ; trois filets principaux à la queue.

Antennæ setaceæ , longæ , multiarticulatæ ; articulis minimis. Labrum , mandibulæ , maxillæ , palpi quatuor , labiumque distincta.

Corpus elongatum , depressum , squamosum , subtùs appendiculatum. Pedes sex. Cauda setis tribus principalibus.

OBSERVATIONS. — De tous les Thysanoures , les plus écailleux sont les Forbicines. Ce sont elles qui montrent l'ordre de choses auquel tendait la nature en commençant les Smyntures, l'avancant davantage dans les Podurès et les Machiles , enfin le terminant dans les Forbicines, qui indiquent, en quelque sorte, le voisinage des Myriapodes , et , de suite , celui des Cloportes et autres Crustacés qui y succèdent.

Les Forbicines n'ont plus la faculté de sauter , comme les Thysanoures précédens. Leur corps est aplati , écailleux , brillant ; et l'espèce commune , que tout le monde connaît de vue, est un petit animal très remarquable par sa couleur argentine , par sa vivacité à courir , et par l'espèce de ressemblance qu'il a avec un petit poisson. Ses palpes maxillaires, quoique très distincts , ne font point de saillie hors de la bouche , comme dans le Machile ; ses yeux sont granuleux , et ne se joignent pas postérieurement ; enfin , ses pattes ont des hanches très grandes.

De chaque côté , sous l'abdomen , la rangée d'appendices mobiles et articulés à leur base , indique assez que la nature de ces animaux est fort différente de celle des insectes.

[Pour l'organisation extérieure des Forbicines (ou Lépismes) , voyez les planches données par M. Savigny dans le grand ouvrage sur l'Egypte , et le Mémoire de Latreille sur les Thysanoures. C'est cette division qui constitue , pour Leach , le genre Lépisme , tandis que les Forbicines sont des Machiles. E.]

ESPÈCES.

1. Forbicine argentée. *Lepisma saccharina*.

L. unicolor , argentea ; caudæ setis lateralibus divaricatis.

Lepisma saccharina, Lin. Fab.

Forbicina plana, Geoff. 2. pl. 20. f. 3.

Lepisma saccharina, Lat. Gen. 1. p. 164:

* Ejsdem. Encyclop. insect. pl. 25. fig. 1; Règne anim. de Cuvier, 2. édit. t. 4. p. 342; et nouv. Ann. du Mus. t. 1.

* Treviranus. Vermischte Schriften. t. 1. p. 11. pl. 2.

* Westwood et Templeton. Trans. of the entom. soc. of London t. 1. p. 92.

Habite en Europe. Commune dans les maisons.

2. Forbicine rayée. *Lepisma lineata*.

L. corpore fusco : vittis duabus albis.

Lepisma lineata, Lin. Fab.

Oliv. Dict. n. 3.

* Duméril. Dict. des sciences naturelles. Atlas ins. pl. 54. fig. 1.

Habite en Suisse.

Etc.

* Ajoutez.

† Le Lépisme doré. *Lepisma aurea*.

Léon Dufour, Ann. des sc. nat. 1^{re} série, t. 22. p. 419. pl. 13. fig. 1.

† Le Lépisme cilié. *Lepisma ciliatæ*.

L. Dufour. loc. cit. p. 420. pl. 13. fig. 2.

C'est à cette espèce que paraît se rapporter un des Lépismes figurés par M. Savigny. (Egypte. Myriap. pl. 1. fig. 7.)

Etc.

LES MYRIAPODES.

Deux antennes ; deux mandibules propres à inciser ou à bröyer des alimens ; point de vraies mâchoires ; quelquefois deux faux palpes labiaux.

Tête distincte ; corps allongé, articulé, sans distinction de corselet, et ayant, après sa naissance, toujours plus de six pattes, souvent un très grand nombre.

Les *Myriapodes* constituent la seconde famille des *Arachnides crustacéennes*, et terminent cette branche isolée de la classe. La plupart sont connus sous le nom de

mille-pieds ; et tous ensemble forment une coupe particulière, très distinguée de la précédente, en ce que leur corps n'offre point de corselet distinct de l'abdomen, et que, dans beaucoup de races, ce corps dans ses développemens, acquiert progressivement plus d'anneaux et de pattes, d'une manière presque indéterminée. Aussi ces Myriapodes, fort allongés, soit sous la forme des Néréides, soit sous celle de petits serpens, offrent-ils souvent une suite d'anneaux et un nombre de pattes très considérable. Leurs pattes sont terminées par un seul crochet.

La tête de ces animaux présente : 1^o deux antennes courtes en général ; 2^o deux yeux, qui sont une réunion d'yeux lisses, formant des amas subgranuleux, quelquefois néanmoins presque à facettes ; 3^o deux mandibules dentées, divisées transversalement par une suture ; 4^o une sorte de lèvre inférieure sans palpes, divisée et composée de plusieurs pièces soudées. M. Savigny considère les pièces réunies de cette lèvre inférieure, comme les analogues des quatre mâchoires supérieures des Crustacés. Les deux pattes antérieures de plusieurs de ces animaux se joignent à la base de cette lèvre, s'appliquent ou se couchent sur elle, et concourent, avec les deux autres pattes suivantes, à la manducation, tantôt sans changer de forme, tantôt converties, les unes en deux palpes, les autres en une lèvre avec deux crochets articulés et mobiles. Ces parties semblent répondre aux pieds-mâchoires des Crustacés. Voyez, dans l'ouvrage de M. Cuvier, intitulé le *Règne animal distribué d'après son organisation*, vol. 3, pag. 148 et suiv., de plus amples détails sur ces animaux, donnés par M. Latreille.

Les Myriapodes font leur habitation dans la terre, sous différens corps placés à sa surface, sous les écorces des arbres, etc. Ces Arachnides vivent de rapine, et se nourrissent de petits insectes ou d'autres petits animaux ; quelques-unes vivent de substances végétales ; beaucoup

d'entre elles aiment l'obscurité. Les animaux de cette famille se divisent de la manière suivante.

DIVISION DES MYRIAPODES.

- (1) Antennes de quatorze articles ou au-delà, plus grêles vers leur extrémité. Lèvre inférieure double. (*Les Scolopendracées.*)
 (a) Le dessus du corps recouvert de huit plaques, et le dessous divisé en quinze demi-segments, portant chacun une paire de pattes.

Scutigère.

- (b) Le corps divisé, tant en-dessus qu'en-dessous, en un pareil nombre de segments.

Lithobie.

Scolopendre.

- (2) Antennes de sept articles, soit égales dans leur longueur, soit plus grosses au bout. Lèvre inférieure unique. (*Les Iulacées.*)
 (a) Le corps membraneux, très mou, et terminé par des pinceaux d'écailles.

Polyxène.

- (b) Le corps crustacé, cylindracé, sans appendices au bout.

Iule.

Gloméris.

[Les deux groupes principaux, des Scolopendracés et des Iulacés, correspondent aux familles des Chilognates et des Chilopodes dans la classification de Latreille, et sont généralement adoptés. E.]

LES SCOLOPENDRACÉES.

Antennes de quatorze articles et au-delà, plus grêles vers leur extrémité. Lèvre inférieure double : l'une intérieure ; l'autre externe, fermant la bouche en dessous, et munie de deux crochets.

Cette section comprend les Scolopendres et quelques

genres qui les avoisinent par leurs rapports. Ce sont des animaux à corps un peu aplati, en général fort allongé, submembraneux, recouvert de plaques subcoriaces, et ayant des pattes nombreuses. Chaque anneau de leur corps n'en porte qu'une seule paire. Ces animaux paraissent avoir une double lèvre inférieure: l'une, plus intérieure, a postérieurement deux espèces de palpes grêles, saillans, et que l'on croit résultant des deux pattes antérieures avancées dans la bouche; l'autre, externe, ferme la bouche en dessous, porte les deux crochets à venin, et paraît formée de la deuxième paire de pattes ainsi modifiée.

Les Scolopendracées ont, en général, la morsure mal-faisante; mais elle n'est dangereuse que de la part de certaines de leurs races, surtout parmi celles qui habitent des climats chauds. Leur vivacité à courir inquiète lorsqu'on les rencontre, parce qu'on sent qu'il n'est pas toujours facile de s'en rendre maître. Elles fuient la lumière, se cachent sous les pierres, les vieux bois, les écorces, et dans les maisons, derrière les vieux meubles. On rapporte à cette section les trois genres qui suivent.

SCUTIGÈRE. (*Scutigera*.)

Antennes sétacées, multiarticulées; beaucoup plus longues que la tête. Deux mandibules. Deux palpes grêles, saillans, spinuleux, adhérens à la face postérieure de la lèvre interne. Lèvre postérieure armée de deux crochets forts, arqués, percés d'un petit trou sous leur pointe.

Corps allongé, linéaire, déprimé, couvert en dessus d'environ huit plaques coriaces, subimbriquées, et divisées en dessous en quinze segmens. Trente pattes, à tarses longs, grêles, multiarticulés.

Antennæ setaceæ, multiarticulatæ, capite multò longio-

[La structure intérieure des Lithobies a été étudiée avec soin par MM. Tréviranus (*Vermischte Schriften*. t. 2) et Léon Dufour (Ann. des Sc. nat. 1^{re} série, t. 2) et M. Gervais vient de publier des observations intéressantes sur les changemens que ces animaux subissent dans le jeune âge. (Ann. des Sc. nat. 2^e série, t. 7. p. 58.) E.]

ESPÈCE.

1. Lithobie fourchue. *Lithobius forficatus*.

L. rufo-fuscus; *pedibus utrinque* 15.

Scolopendra forficata. Lin. Fab. Ent. 2. p. 390.

Panz. Fasc. 50. t. 13.

Scolopendre à trente pattes. Geoff. 2. p. 674. pl. 22. f. 3.

* *Lithobius forficatus*. Latreille. Règne anim. 2. édit. t. 4. p. 338.

* *Scolop. forficata*. Treviranus. Verm. Schrif. t. 2. pl. 4. fig. 6. 7. pl. 5.

* Leach. Encyclop. brit. sup. pl. 22. et Zool. miscell. t. 3. p. 39. p. 137.

* Duméril. Dict. des sciences nat. Ins. pl. 55. fig. 5.

* Léon Dufour, Ann. des Sc. nat. 1^{re} série, t. 2. p. 81.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série, t. 7. p. 49.

Habite en Europe, sous les pierres.

* Ajoutez deux espèces nouvelles décrites par Leach dans ses Mélanges zoologiques, et une troisième que M. Gervais vient de faire connaître (Ann. des Sc. nat. 2^e s. t. 7. p. 49.). Suivant ce dernier naturaliste, la Lithobie figurée par M. Savigny dans le grand ouvrage sur l'Egypte (Myriap. pl. 1. fig. 3.) serait un jeune individu.

SCOLOPENDRE. (*Scolopendra*.)

Antennes subulées, un peu plus longues que la tête; à articles courts, au nombre de quatorze et au-delà. Deux yeux composés, subgranuleux. Deux mandibules. Lèvre inférieure double: l'intérieure subquadrifide; la postérieure armée de deux crochets forts et arqués en pince.

Corps très long, linéaire, déprimé, également divisé en dessus et en dessous; à articles nombreux, non imbriqués, portant chacun une paire de pattes.

Antennæ subulatæ, capite paulò longiores; articulis brevibus, quatuordecim et ultra. Oculi duo compositi, subgranulosi. Mandibulæ duæ. Labium duplex: internum subquadrifidum; posticum unguis validis chelatim arcuatis armatum.

Corpus prælongum, lineare, depressum, suprà infràque æqualiter divisum; articulis numerosis, non imbricatis, pedum pari unico instructis.

OBSERVATIONS. — Les Scolopendres constituent le principal genre de la section qui les comprend, et nous présentent des animaux dont le mode d'existence et de développement est fort différent de celui des insectes. Ce sont des Arachnides, la plupart suspectes par leur morsure malfaisante, et fort remarquables par la longueur de leur corps, leurs pattes nombreuses et courtes, et leur vivacité à courir. On les distingue des Lithobies, parce que les segmens de leur corps sont à-peu-près égaux entre eux, et ne se recouvrent point; elles diffèrent des Scutigères en ce que leur corps est également divisé en dessus et en dessous. Les unes ont les deux pattes postérieures presque égales aux autres, et dans d'autres ces pattes sont plus longues; il y a des espèces dont les yeux sont peu distincts; enfin, l'on prétend que quelques-unes répandent une lumière phosphorique. Ces animaux ont les stigmates latéraux, et leurs pattes sont terminées par un seul ongle. Ils courent en serpentant. On les trouve sous les pierres, dans les trous des murailles, etc. La plupart se nourrissent de petits insectes.

ESPÈCES.

1. Scolopendre des Indes. *Scolopendra morsitans*.

S. maxima; pedibus utrinque viginti: posterioribus longioribus subspinosus.

Scolopendra morsitans, Lin. Fab. ent. 2. p. 390

Degecr. Ins. 7. pl. 43. f. 1 — 5.

Petiv. Gaz. tab. 13. f. 3.

* Palissot de Beauvois. Ins. d'Afr. pl. 4. fig. 1.

* Leach. Zool. miscel. vol. 3. p. 41.

* Duméril. Dict. des sciences nat. Ins. pl. 55. fig. 4.

* *Scolop. cingulata*. Latreille. Rég. anim. du Crust. t. 4. p. 329.

* *S. maritima*. Gervais. Encyclop. t. 10. p. 395.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 50.

Habite aux Antilles, dans l'Inde, etc. La Scolopendre de Brown. Jam. tab. 42. f. 4., n'en paraît être qu'une variété à dix-huit paires de pattes.

* La *Scolopendra alternans* de Leach, (Encyclop. Brit. suppl. t. 1. pl. 22. et Zool. miscel. t. 3. p. 41. pl. 138), ne paraît être qu'une variété de l'espèce précédente.

2. Scolopendre ferrugineuse. *Scolopendra ferruginea*.

S. pedibus utrinque riginti duo : posterioribus longioribus.

Scolopendra ferruginea. Lin. Fab. ent. p. 391.

Degeer. Ins. 7. tab. 43. f. 6.

Habite en Afrique.

3. Scolopendre ligulaire. *Scolopendra electrica*.

S. fusco-rubens ; corpore lineari perangusto ; pedibus brevibus, pallidis utrinque septuaginta.

Scolopendra electrica. Lin. Fab. ent. p. 391.

Scolopendre n. 4. et n. 5. Geoff. 2. p. 676.

* *Scolopendra fulva*. Treviranus. Vermischte. Schriften. t. 2. p. 33. pl. 7. f. 3-5.

* *Geophilus longicornis*. Leach. Zool. miscel. t. 3. pl. 140. f. 3-6.

* *Geophilus electricus*. Koch. Deutschl. Crust., myriap. etc. fasc. 3. n° 4.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 52.

Habite en Europe, sous les pierres. Elle est commune, à corps étroit, ligulaire, rougeâtre.

Etc.

† Ajoutez :

* *Scolopendra subspinipes*. Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 41.

* *Scolopendra trigonopoda*. Ejusd. loc. cit.

* *Scolopendra gigas*. Ejusd. loc. cit.

* *Scolopendra brandtiana*. Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 50.

* *Scolopendra fulva*. Ejusd. Loc. cit.

* *Scolopendra marginata*. Say. Journ. de l'Acad. de Philadelphie. t. 2. p. 100.

* *Scolopendra viridipes*. L. Dufour. Ann. des Sc. physiques. t. 6. p. 317, etc. etc.

[Leach a réuni dans son genre *CRYPTOPS* les Scolopendres qui ressemblent à des Scolopendres proprement dits par la conformation des antennes et le nombre des pattes; mais chez lesquels les yeux manquent ou sont peu distincts. Il a fait connaître deux espèces nouvelles ayant ces caractères, savoir :

Le Cryptos hortensis. Leach. Encyclop. Brit. suppl. pl. 22. et Zool. miscel. t. 3. p. 42. pl. 139.

Et le *Cryptos Savignii*. Ejusd. Zool. miscel. t. 3. p. 42. — *Scolopendra germanica*. Koch. Deutschl. Crust. myriap. etc. fasc. ix. n° 2. — Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 51.

Cryptops hyalinus. Say. Journ. de l'Acad. des Sc. de Philadelphie. t. 2. p. 111. — Gervais, op. cit.

Etc.

Le genre *GEOPHILUS* du même auteur se compose de Scolopendres dont les antennes sont formées de quatorze articles cylindriques et sont amincies vers le bout, dont les pattes sont plus nombreuses, et celles de la dernière paire plus longues; le corps plus allongé et les yeux peu ou point distincts. Il y range les espèces suivantes :

1. *Geophilus carpophagus*. Leach. Zool. misc. t. 3. p. 43, etc.
2. *Geophilus subterraneus*. Leach. op. cit. p. 44. *Scolopendra subterranea*. Shaw. Transactions of the Linnean societ. vol. 2. p. 7.
3. *Geophilus maritimus*. Leach. loc. cit. pl. 140. fig. 1. 2.
4. *Geophilus acuminatus*. Leach. loc. cit.
5. *Geophilus longicornis*. Leach. loc. cit. pl. 140. fig. 3—6. (Voy ci-dessus n° 3.)

Récemment M. Gervais a augmenté ce genre des espèces suivantes, *Geophilus Walckenaerü* (Gerv. Magasin de zoologie. 5^e année cl. ix. p. 8. pl. 14, 9.

Geophilus simplex. (ejusd. loc. cit.)

Geophilus barbaricus. (ejusd. loc. cit.)

Geophilus maxillaris. Ejusd. Ann. des Sc. nat, 2^e série, t. 7. p. 52.

Il a constaté aussi que l'on doit rapporter à ce genre le *Cryptops levigatus* de M. Brüllé. (expéd. scientif. de Morée.) *Geophilus levigatus*. Gervais. Mag. de zool. t. 5. pl. 137. fig. 2.), ainsi que le *Cryptops Gabrielis*, du même (Expédit. de Morée) et l'espèce figurée par M. Savigny, sous le n° 4, dans la planche des myriapodes du grand ouvrage sur l'Égypte.] E.

LES IULACÉES.

Antennes de sept articles, soit égales dans leur longueur, soit plus grosses au bout. Lèvre inférieure unique, sans crochets en pince.

Les *Iulacées* sont des Myriapodes très voisins des précédens par leurs rapports, ayant aussi, comme eux, après leur naissance, plus de six pattes, et la plupart en acquérant un nombre très considérable. Mais, outre qu'elles sont distinguées des Scolopendracées par le caractère de leurs antennes, les pattes de ces Iulacées sont très courtes, en sorte que la locomotion de ces animaux se fait toujours avec lenteur et par des mouvemens ondulatoires. Parmi ceux de leurs segmens qui portent des pattes, on en voit beaucoup qui en ont chacun deux paires. Dans le repos, ces animaux se roulent, les uns en spirale, les autres en boule.

Les deux ou quatre premières pattes des Iulacées sont avancées sur la bouche, réunies à leur base, rapprochées de la lèvre inférieure; elles sont d'ailleurs semblables aux autres.

Ces animaux se nourrissent de substances, soit végétales, soit animales. On n'en connaît aucun dont la morsure soit malfaisante. Quelques-uns ont le corps très mou et membraneux, et tous les autres ont le corps véritablement crustacé, convexe, presque cylindrique. Ce sont ces derniers qui avoisinent le plus les *Crustacés*, et qui terminent cette branche particulière des Arachnides qui paraît offrir une transition naturelle à la classe des *Crustacés*. Nous ne rapporterons aux Iulacées que les trois genres qui suivent.

POLYXÈNE. (Polyxenus).

Antennes très courtes, filiformes, moniliformes, insérées sous le bord antérieur de la tête. Point de palpes.

Corps mou, allongé, déprimé, ayant sur les côtes des faisceaux d'écailles piliformes, et le segment postérieur terminé par un pinceau d'écailles ciliées. Douze paires de pattes.

Antennæ brevissimæ, filiformes, moniliformes, sub capitis margine antico insertæ. Palpi nulli.

Corpus molle, elongatum, depressum, squammulis piliformibus fasciculatis ad latera instructum, segmento postico penicillo squamularum ciliatarum terminato. Pedum pares duodecim.

OBSERVATIONS. — La *Polyxène*, dont M. Latreille a fait le type d'un genre, fut d'abord rangée parmi les Scolopendres; mais elle en est très distincte; elle l'est aussi des autres Iulacées, et néanmoins elle s'en rapproche par les articles de ses antennes, qui sont seulement au nombre de sept. On ne connaît que l'espèce suivante.

ESPÈCE.

1. *Polyxène à pinceau. Polyxenus lagurus.*

Scolopendra lagura. Lin. Fab. ent. 2. p. 389.

Scolopendre, n. 6. Geoff. 2. p. 677. pl. 22. fig. 4.

Polyxenus lagurus. Latr. Gen. 1. p. 77.

* Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 38. pl. 135. B.

* Duméril. Dict. des scienc. nat. ins. pl. 56. fig. 7.

* Brandt. Tentaminum quorundam monographicorum chilognata, p. 45.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série, t. 7. p. 41.

Habite en Europe, sous les vieilles écorces.

* M. Say en a décrit une seconde espèce sous le nom de *Polixenus fasciculatus* (Journ. of the acad. of Philadelphia. Vol. 2. p. 112,

LULES.

Antennes courtes, submoniliformes, un peu plus épaisses vers leur sommet : 7 sept articles. Deux mandibules à sommet conique, muni de dents courtes. Point de palpes. Lèvre inférieure apaire, la lèvre supérieure subterminale par des tubercules.

Corps allongé, cylindrique, crustacé : 7 segments transverses nombreux, étroits et lisses. La plupart des segments portent chacun deux paires de pattes.

Antennae breves, submoniliformes, nervis quatuor posticulis crassioribus ; articulis septem. Mandibulae duae apices truncato-dentatae, curvae. Palpi nulli. Labium pinnulatum, margine supero tuberculis suberenatum.

Corpus elongatum, cylindricum, crustaceum ; segmentis transversis numerosis, angustis, levibus. Segmenta plerumque tetrapoda sunt.

OBSERVATIONS. — Les rapports des Lules avec les Scolopendres sont si marqués, que de tout temps, les naturalistes les en ont rapprochées en les plaçant dans la même famille. Elles y forment néanmoins, avec la Polyène et les Glomeris une division particulière très distincte, les animaux de cette division n'ayant point leur lèvre inférieure armée de deux crochets en pince comme les Scolopendracées. Leurs antennes d'ailleurs n'ont que sept articles, ou ne sont point sétacées ou en alène comme celles des Scolopendres. Comme les Lules n'offrent point de mâchoires libres, on pense que ces parties sont réunies à la lèvre inférieure.

Les Lules ont généralement le corps crustacé, et, dans leurs développemens, acquièrent plus d'anneaux et plus de pattes. Quoique assez agiles dans les mouvemens de leurs pattes, elles ne marchent qu'avec beaucoup de lenteur, parce que ces pattes sont très courtes. Les premiers et les derniers segments de leur corps ne portent chacun qu'une paire de pattes, et même, dans les mâles, le septième segment n'en a aussi qu'une paire, parce que, selon les observations de M. Latreille, la place de la deuxième paire est occupée par l'organe sexuel. Lorsque ces ani-

maux marchent, leurs pattes agissant successivement, leur font exécuter une ondulation non interrompue, comme s'ils rampaient à la manière des serpents.

La plupart des Iules sont terrestres, vivent sous les pierres, sous les écorces, etc. Elles se nourrissent de petits insectes, de substances végétales, de fruits, surtout les petites espèces.

Toutes les Iules ont le corps allongé, linéaire, et se roulent en spirale dans le repos; mais dans les unes, le corps est cylindracé et sans angles; tandis que dans d'autres, il est aplati sur les côtés inférieurs, offrant en dessus un rebord anguleux qui règne de chaque côté dans la longueur de ce corps. Ces dernières forment le genre Polydème de M. Latreille.

[Ainsi que nous l'avons déjà dit, les Iules subissent après la naissance des changemens considérables. Suivant Degér, les petits de l'Iule des sables n'auraient en naissant que trois paires de pattes, et, suivant M. Savi, les jeunes de l'espèce qu'il désigne sous le nom d'*Iulus communis* seraient complètement apodes. C'est en arrière des membres déjà formés, et lors des dernières mues, que les nouvelles pattes apparaissent, et jusqu'au complet développement de l'animal, il reste en avant de l'anús un certain nombre d'anneaux apodes; enfin M. Gervais a observé aussi que le nombre des yeux augmente avec l'âge. (Voyez à ce sujet Degér, Mém. pour servir à l'hist. des insectes, t. 7; Savi, Memorie scientifica, p. 70; Gervais, Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 7, p. 55.)

E.

ESPÈCES.

Corps cylindracé, immarginé.

1. Iule gigantesque. *Iulus maximus*.

I. flavescens, maximus; pedibus utrinque 134.

Iulus maximus. Lin. Fab. ent. 2. p. 396.

Margr. Bras. p. 253.

Habite l'Amérique méridionale. Sept à huit pouces de longueur. Le anneaux sont bruns postérieurement.

2. Iule des sables. *Iulus sabulosus*.

I. fusco-cinereus; lineis duabus longitudinalibus dorsalibus rufescentibus; pedibus utrinque 120.

Iulus sabulosus. Lin. Fab. Latr. gen. 1. p. 75.

Iule, n. 2. Geoff. 2. p. 679. pl. 22. f. 5.

* *Iulus sabulosus*. Olivier. Encycl. t. 7. p. 415.

* Leach. Zool. miscel. v. 3. p. 33.

* Duméril. Dict. des sc. nat. ins. pl. 55. fig. 1.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 46.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

3. Iule terrestre. *Iulus terrestris*.

I. cinereo-cærulescens; pedibus utrinque 100.

Iulus terrestris, Lin. Fab. Latr. gen. 1. p. 75.

Iule, n. 1. Geoff. 2. p. 679.

* *Iulus terrestris*. Olivier. Encyclop. t. 7. p. 415.

* Leach. loc. cit. p. 34.

* Gervais. loc. cit.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

4. Iule des fraisiers. *Iulus fragariarum*.

I. albidus; corpore gracillimo; stigmatibus purpureis; pedum paribus circiter 50.

* *I. pulchellus*. Leach. Zool. mis. t. 13. p. 35.

* M. Gervais a constaté que ce Myriapode est toujours dépourvu d'yeux et il l'a pris pour type d'un genre nouveau, auquel il a donné le nom de *Blaniulus*. (Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 7, p. 45.)

Habite en France. Commune dans les fraises. Longueur, quinze lignes. Etc.

[Ajoutez les espèces suivantes :

* *Iulus londinensis*. Leach. Encyclop. brit. supp. vol. 1. pl. 22; et zool. miscel. vol. 3. p. 33. pl. 133.

* *Iulus punctatus*. Leach. zool. miscel. vol. 3. p. 34.

* *Iulus niger*. ejusdem loc. cit.

* *Iulus pusillus*. ejusd. loc. cit.

* *Iulus americanus*. Palissot de Beauvois. Ins. d'Afr. pl. 4. fig. 3.

* *Iulus foetidissimus*. Savi. Memorie scientifica. dec. 1. p. 83. tav. 11. fig. 24, 25.

* *Iulus communis*. ejusd. op. cit. v. 11. fig. 1—6.

* *Iulus festivus*. Perty, op. cit. pl. 40. fig. 10.

* *Iulus lucifugus*. Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. p. 45. pl. 4 A. (jeune).

* *Iulus Boveanus*. Ejusd. loc. cit.

Ainsi que quelques espèces nouvelles décrites par M. Risso, dans son hist. nat. de l'Europe méridionale. t. 5. etc. etc. E.

*Corps marginé, aplati sur les côtés inférieurs. (1)*5. Iule aplatie. *Iulus complanatus*.*I. corpore planusculo ; caudâ acutâ ; pedibus utrinque 30.**Iulus complanatus*, Fab. Ent. 2. p. 393.

(1) Cette division correspond au genre *Polydesmus* de Latreille et comprend les Myriapodes qui sont semblables aux Iules par la forme linéaire de leur corps et l'habitude de se rouler en spirale, mais dont les segmens sont comprimés sur les côtés inférieurs avec une saillie en forme d'arête ou de rebord au-dessus; quelquefois cependant cette carène latérale est très peu marquée; le nombre des pattes est presque toujours (sinon toujours) de 30 paires chez les mâles, de 31 chez les femelles; les anneaux du corps sont au nombre de 20, la tête non comprise. Enfin les yeux manquent presque toujours, et Leach a même proposé de ranger dans un genre particulier, sous le nom de *Craspedosoma*, les espèces pourvues de ces organes. Pour plus de détails sur la conformation externe de ces Myriapodes, on peut consulter une note de M. Gervais insérée dans les Annales de la Société entomologique de France, t. 5. A l'espèce type mentionnée ci-dessus il faut ajouter :

L'*Iulus pallipes* d'Olivier (Encyclop. méthod. t. 7. p. 416; *Polydesmus pallipes*, Gervais, Magasin zoologique, 1835, cl. 8, n° 135);

L'*Iulus tridentatus* de Fabricius (Entom. syst. t. 2, p. 393.) *Iulus virginienensis*, Drury, t. 2. p. 393; *Polydesmus virginienensis*, Palissot de Beauvois, Ins. d'Afrique, pl. 4, fig. 5; Gervais, Ann. de la soc. entom. t. 5. p. 378; *Fonteria Virginensis* Gray, Anim. kingd. Ins. pl. 135, fig. 1);

Le *Polydesmus granulosus* de Palissot de Beauvois (pl. 4, fig. 4).

Trois espèces nouvelles décrites et figurées par Perty dans l'ouvrage de Spix et Martins (le *P. glabratus* Perty, op. cit. pl. 40. fig. 7.; le *P. conspersus* P. op. cit. pl. 40. fig. 7, et le *p. scaber* P. op. cit.);

Deux espèces nouvelles décrites par Eschscholtz, sous les noms de *Polydesmus rugulosus* (Mém. de Moscou, t. 6. p. 112;

Scolopendre, n. 3. Geoff. 2. p. 675.

Polydesmus complanatus. Lat. Gen. 1. p. 76.

* Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 37. pl. 135.

* Brandt. op. cit. p. 44.

* Duméril. Dict. des sciences nat. ins. pl. 55. fig. 2.

* Gervais. Annales de la soc. entomol. de France. t. 5. p. 378.

Habite en Europe.

Etc.

[Dans un travail récent sur les Chilognathes ou *Iulacés*, M. Brandt a établi aux dépens des Iules plusieurs genres nouveaux dont les principaux caractères sont tirés de la conformation des antennes. Ce naturaliste sépare d'abord les espèces dont le pénultième article des antennes est presque arrondi et un peu aminci à sa base, et divise ce groupe en *Iules proprement dites* et en *Spirobolus* suivant

Brandt, op. cit. p. 44); et le *Polydesmus lateralis* (Esch. loc. cit.; Brandt. op. cit.)

Enfin le *Polydesmus Blainvillii*, le *Polyd. Rubescens*, le *Polyd. Zebratus* et le *P. Margaritifera* que M. Gervais vient de faire connaître dans les Annales de la Société entomologique (t. 5. p. 379).

Latreille rapporte aussi à ce genre l'*Iulus depressus* et l'*Iulus Stigma* de Fabricius (Entomol. system. t. 2. p. 393 et 4).

Le genre CRASPEDOSOMA de Leach, qui ne paraît pas devoir être séparé du genre *Polydesmus* de Latreille, a pour type deux espèces : le *C. Rawlinsii* (Leach. Encyclop. Brit. suppl. pl. 22; Zool. miscel. t. 3. p. 36. pl. 134. fig. 1-4) et le *C. Polydesmoides*. (Leach. Encyclop. Brit. suppl. pl. 22; Zool. miscel. t. 3. p. 36. pl. 134. fig. 6, 9. M. Gray en a fait connaître une troisième espèce sous le nom de *Craspedosoma Bechii* (Griffith's animal kingd. Ins. pl. 135, fig. 45.)

Le genre STRONGYLOSOMA de Brandt est aussi très voisin des Polydesmes; de même que chez ces derniers les yeux manquent, mais le corps, au lieu d'être déprimé, est cylindrique et allongé; le type de cette division est l'*Iulus stigmatus* d'Eichwald (Zool. spec. P. 11. p. 114; *Strongylosoma iuloides* Brandt, op. cit. p. 43.)

E.

que les antennes ont les quatre articles qui suivent le premier allongés et amincis, le second le plus long de tous et le cinquième plus long que le sixième, ou bien que tous ces articles sont courts, presque sphériques et à-peu-près d'égale longueur. Ce dernier groupe se compose de deux espèces nouvelles : le *Spiroboldus Olfersii* (Brandt. op. cit. p. 40) et le *S. Bungii* Br. (op. cit. p. 41.) Son genre Iule proprement dit comprend les diverses espèces décrites par Leach sous le même nom générique et plusieurs autres. Les Iulacées qui, avec le même mode d'organisation des anneaux du corps que chez les précédents, ont le pénultième article des antennes infundibuliforme ou claviforme, et situé à sa base, constituent trois genres nouveaux, savoir :

1° Le genre *SPIROSTREPTUS*, caractérisé par la conformation de la lèvre inférieure, dont la portion médiane est creusée au dessous d'une fossette médiane presque semi-lunaire et ne présente pas de tubercules à sa base (Espèces: *Spirostreptus Seba* Br. op. cit. p. 41. *Millepeda* Seba Thes. T. 1 tab. 87. fig. 8.—*Spirostreptus Audouinii* Br. loc. cit. *Millepeda*, Seba, 1. tab. 81 fig. 6?)

2° Le genre *SPIROPOEUS* ayant la portion médiane de la lame inférieure garnie au milieu d'un tubercule ovalaire transversal. (Espèce *Spiropæus Fischerii* Brandt. op. cit. 42.

3° Le genre *SPIROCYCLISTUS* ayant cette même portion médiane de la lame inférieure lisse et un tubercule sur la portion basilaire (Esp. *Spirocyclistus acutangulus* Brandt. loc. cit. p. 42).

Enfin M. Gervais vient d'établir, sous le nom de *PLATYULES*, un autre genre nouveau pour les Iules, dont les yeux, au lieu d'être réunis en groupes, sont disposés sur deux lignes sur la face supérieure de la tête. (Voyez Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 7, p. 48. E.

GLOMERIS. (Glomeris.)

Antennes très courtes, submoniliformes, de sept articles: le sixième enveloppant le dernier.

Corps allongé-ovale, convexe en dessus, concavé en dessous, se contractant en boule, et ayant en dessous, de chaque côté, une rangée de petites écailles. Segmens du corps au nombre de onze ou douze, crustacés: le dernier étant plus grand, concave, semi-circulaire. Seize à vingt paires de pattes.

Antennæ brevissimæ; submoniliformes; septem-articulatæ: articulo sexto ultimum obvolvente.

Corpus elongato-ovale, suprâ convexum, subtus fornicatum, in globum contractile, squammularum serie subtus utroque latere instructum. Corporis segmenta undecim vel duodecim crustacea: ultimo majore fornicato semi-circulari. Pedum pares sexdecim ad viginti.

OBSERVATIONS. — Les Glomérus paraissent véritablement distincts des Iules. Leur corps ne se roule point en spirale, mais se contracte en boule comme celui des Cloportes, et offre en dessous une rangée de petites écailles de chaque côté, qui recouvrent la base des pattes. Les parties de leur bouche ne sont pas encore déterminées, mais il est probable qu'elles sont analogues à celles des Iules.

Ce genre, établi par Latreille, termine les Myriapodes et la branche isolée des Arachnides crustacéennes. Les animaux qu'il comprend sont, les uns, terrestres, et vivent sous les pierres, aux lieux montueux, et les autres vivent dans la mer. Ils semblent conduire aux Cloportes dont ils diffèrent au moins par leurs pattes plus nombreuses et par leur défaut de queue. Nous pensons, comme M. Latreille, que c'est près d'eux qu'il faudrait ranger les Trilobites, si leurs caractères essentiels étaient connus. (1)

(1) Cette opinion ne paraît pas fondée; les animaux dont les Trilobites se rapprochent le plus semblent être les crustacés isopodes.

ESPÈCES.

1. Glomérisme ovale. *Glomeris ovalis*.

Gl. lutescens; *pedum viginti paribus*.

Iulus ovalis. Lin. *Æmnn. acad.* 4. p. 253. tab. 3. f. 4.

Oniscus. Gronov. *Zooph.* n. 995. t. 17. f. 4—5.

Glomeris ovalis. Latr. *Gen.* 1. p. 74.

Iulus ovatus. Fab.

Habite l'Océan.

2. Glomérisme bordé. *Glomeris limbatus*.

Gl. niger; *segmentis margine lutescentibus*; *pedum sexdecim paribus*.

Oniscus zonatus. Panz. *fasc.* 9. t. 23.

Glomeris limbata. Lat. *Gen.* 1. p. 74.

* *Glomeris marginatus*. Leach. *Zool. miscel.* t. 3. p. 32. pl. 32.

* Duméril. *Dict. des scienc. nat. insect.* pl. 55. fig. 3.

* Brandt, *op. cit.* p. 33.

Habite en France, sous les pierres.

3. Glomérisme pustulé. *Glomeris pustulatus*.

Gl. ater, *rubro-punctatus*; *pedum sexdecim paribus*.

Oniscus pustulatus. Fab. *Ent.* 2. p. 396.

Panz. *Fasc.* 9. tom. 22.

Glomeris pustulata. Lat. *Genr.* 1. p. 74.

* Gervais. *Ann. des Sc. nat.* 2^e série. t. 7. p.

Habite la France, l'Allemagne, dans les régions australes.

[Dans la monographie déjà citée de M. Brandt, les Gloméridiens sont divisés en trois genres, et le nom de GLOMERIS est conservé seulement aux espèces dont les yeux (au nombre de 8) sont disposés sur une ligne courte de chaque côté de la tête, et dont les anneaux du corps la tête comprise) sont au nombre de 13. Les espèces dont les yeux plus ou moins nombreux sont réunis en masse commune de chaque côté de la tête, et dont le nombre des anneaux (la tête comprise) s'élève à 14, et dont les antennes sont composées de sept articles composant son genre SPHÆROTHERIUM, qui paraît à-peu-près correspondre à la division proposée par M. Gray, sous le nom de

Zephronia. Enfin M. Brandt donne le nom générique de SPHÆROPOEUS aux espèces dont les yeux sont disposés comme chez les précédens, mais dont les antennes ne sont composées que de six articles. M. Gervais, à qui l'on doit une révision générale des Myriapodes, réunit les genres Sphærotherium et Sphæropœus de M. Brandt sous le nom de ZEPHRONIA, déjà employé par M. Gray, et donne la liste suivante des espèces appartenant soit à ce groupe nouveau, soit à la division des Gloméris proprement dits.

Genre GLOMERIS.

1. *Glomeris pustulata*. *Oniscus pustulatus*. Fabr. Entom. syst. 2. 396.
2. *Glomeris guttata*. Risso. Eur. mérid. 5, 148, sp. 3.
3. *G. Klugii* Brandt. Tentamium monographicorum p. 32. Bull. Moscou 6, 125.
4. *G. tetrasticha* Brandt. loc. cit. p. 34. sp. 6.
5. *G. quadripunctata* Brandt. loc. cit. p. 35 sp. 9.
6. *G. hexasticha* Brandt. ibid. sp. 10.
7. *G. lepida* Eichwald. Zool. specialis part. 2. p. 123.
8. *G. marginata*. *Onisc. marg.* Will. entom. 4. 187. tab. 2. f. 15. *Jul. margin.* Olivier. Encycl. méthod. VII. 414. 5; *G. marginata* Leach. Zool. misc. III. 32, pl. 132.
9. *G. limbata*. *Jul. limb.* Oliv. Encycl. méth. VII. 414. 6.
10. *G. castanea* Risso. Eur. mérid. v, 148, 2.
11. *G. annulata* Brandt. loc. cit. sp. 5.
12. *G. nobilis* Koch. Deutschland Crustaceen, Myriap. etc. fasc. 4. tab. 1. (peut être une variété de la *Glomeris marginée*).
13. *G. transalpina* Koch, ibid. tab. 2.; (peut être une simple variété de la même espèce que la précédente).
14. *G. marmorea* Gervais. Ann. des sc. nat. 2^e série,

t. 7. p. 42. *Jul. marmoreus* Oliv. Encycl. méthod. vii, 414, 7.

15. *G. marmorata* Brandt. Prod. sp. 4. Ne paraît pas différer de la précédente.

16. *G. plumbea*. *Jul. plumbeus* Oliv. loc. cit. sp. 3.

Genre ZEPHRONIA.

1. *Zeph. ovalis* T. E. Gray. Anim. Kingdom. insect. pl. 135. f. 5.

2. *Zeph. rotundata* Gervais. loc. cit. *Sphærotherium rotundatum* Brandt. Monogr. p. 36. sp. 1.

3. *Zeph. compressa* Gervais. loc. cit. *Sph. compressum* Brandt. loc. cit. sp. 2.

4. *Zeph. Lichtensteinii* Gervais. loc. cit. *Sphærotherium Lichtensteinii* Brandt. op. cit. p. 37. sp. 3.

5. *Zeph. punctata* Gervais. loc. cit. *Sph. punctatum* Brandt. ibid, sp. 4.

6. *Zeph. elongata* Gervais. loc. cit. *Sph. elongatum* Brandt. ibid. sp. 5.

7. *Zeph. Javanica* Guérin. Iconographie insect. pl. 1, fig. 1. ined.

8. *Zeph. testacea* Gervais. loc. cit. *Jul. testaceus* Oliv. Encycl. méthod. vii. 414. sp. 2.

9. *Zeph. Hercules* Gervais. Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 7. p. 43. *Sphæropæus Hercules*. Brandt. monog. p. 38. Bull. Moscou, vi. p. 200. sp. 1.

10. *Zeph. insignis* Gervais. loc. cit. *Sphær. insignis*. Brandt. ibid. sp. 2.

Troisième Section.

ARACHNIDES ACARIDIENNES.

(Branche qui conduit aux Acarides.)

Elles sont parasites, à corps jamais crustacé, et un ou deux yeux lisses de chaque côté de la tête. Leur bouche offre, soit un muscau renfermant un suçoir rétractile, soit deux mandibules en crochets et deux lèvres.

Ces Arachnides constituent la deuxième branche des antennées-trachéales, celle qui conduit évidemment aux Acarides, et par suite à toutes les autres Arachnides exantennées. En effet, par la pensée, qu'on raccourcisse le corps de ces animaux, qu'on resserre sur le corselet, d'une part la tête, de l'autre l'abdomen, au point de confondre ces parties, on aura à-peu-près la forme générale des Acarides, qui ont aussi des yeux lisses et des habitudes presque toujours analogues à celles des parasites dont il s'agit.

Outre que les animaux de cette section conservent toute leur vie la forme qu'ils avaient à leur naissance, sans acquérir aucune partie nouvelle, la seule considération de leurs yeux lisses montre qu'ils ne sont pas des insectes, quelque peu avancée que soit encore leur organisation. Dans les premiers, parmi eux, la bouche étant à l'extrémité antérieure ou très près de cette extrémité, l'œsophage, pour s'y réunir, traverse une partie de la tête, ce qui n'a pas lieu ainsi dans les insectes où la bouche est plus sous la tête. En effet, quoique ces animaux parasites n'aient que six pattes, et des trachées bicordonnées, ils offrent dans leur organisation, un mode particulier qui, à mesure qu'il se développe, amène des résultats fort

différens de ceux que nous montre l'organisation de tous les insectes.

La branche particulière que forment les *Arachnides acaridiennes* paraît commencer à-peu-près dans le même point de l'échelle animale où commence aussi celle qui amène tous les insectes. Mais quelle est la véritable source de ces Arachnides ? succèdent-elles à d'autres animaux qui aient préparé leur formation ? en un mot, d'où proviennent ces produits de la nature ? Ce sont des questions que je n'ose faire, tant leur solution me paraît difficile. Les faits que j'ai recueillis à leur égard, ceux même que j'ai observés et qui vont jusqu'à embrasser certaines Acarides, telles que les *Mittes*, me conduisent à une conséquence si étonnante, que je préfère suspendre mon jugement sur le sujet dont il s'agit.

Les Arachnides acaridiennes sont parasites des mammifères et des oiseaux : elles terminent le premier ordre de la classe, et ne se divisent qu'en deux genres qui sont les suivans :

POU. (*Pediculus.*)

Deux antennes filiformes, de la longueur du corselet. Deux yeux lisses, un seul de chaque côté. Bouche à museau terminal très court, ayant un suçoir rétractile.

Tête séparée. Corps ovale, un peu aplati; à abdomen grand, nu, ayant des segmens distincts. Six pattes.

Antennæ duæ, filiformes, longitudine thoracis. Oculi duo simplices: utroque latere unico. Os rostro terminali brevissimo: haustello retractili.

Caput distinctum. Corpus ovatum, subdepressum; abdomine magno nudo: segmentis distinctis. Pedes sex.

OBSERVATIONS. — Les Poux sont de petits animaux parasites, qui vivent sur différens mammifères, et principalement sur

l'homme, surtout dans son enfance. Il paraît que les espèces en sont nombreuses, et que souvent l'individu sur lequel vivent ces parasites, en nourrit plusieurs races différentes. Les générations de ces animaux se succèdent très rapidement, et, dans certaines maladies, on est étonné de la manière extraordinaire avec laquelle ils pullulent. On dit que les mêmes espèces se rencontrent constamment sur les mêmes animaux. Hors de son enfance, les soins, la propreté garantissent l'homme de cette vermine.

Les poux ont le corps transparent, et se meuvent avec une sorte de lenteur. On les croit hermaphrodites; leurs œufs sont connus sous le nom de *lentes*.

ESPÈCES.

1. Pou du corps. *Pediculus corporis*.

P. corpore ovali, lobato, albido, subimmaculato; thorace segmentis tribus æqualibus.

Pediculus humanus. Lin. Fab. Lat. Gen. 1. p. 167.

Degeer. Ins. 7. pl. 1. f. 7.

* Nitzsch. Insecta epizoica. p. 47.

Habite sur le corps de l'homme et dans ses vêtements.

2. Pou de la tête. *Pediculus capitis*.

P. corpore ovali, lobato, cinereo: utrinque fasciâ nigrâ interruptâ; thorace segmentis tribus æqualibus.

Pediculus humanus capitis. Degeer. Ins. 7. pl. 1. f. 6.

Le pou ordinaire. Geoff. 2. p. 597.

Pediculus cervicalis. Lat. Gen. 1. p. 168.

* Nitzsch. loc. cit.

Habite sur la tête de l'homme, surtout dans son enfance.

3. Pou du pubis. *Pediculus pubis*.

P. thorace brevissimo, vix distincto; abdomine posticè bicornuto; pedibus validis.

Pediculus pubis. Lin. Fab. Lat. Gen. 1. p. 168.

Redi. Exp. t. 19. f. 1.

Le morpion. Geoff. 2. p. 597.

* Nitzsch. loc. cit.

Habite sur le pubis de l'homme.

Etc. Voyez les espèces connues, qui vivent sur des mammifères.

† Ajouter :

* *Pediculus aphaerocephalus*. Nitzsch. op. cit. p. 47. (vit sur l'écureuil.)

* *Pediculus eurysternus*. Nitzsch. loc. cit. (sur le bœuf.)

* *Pediculus crassicornis*. Nitzsch. loc. cit. Redj. Exper. tab. 23.f. sup.

* *Pediculus urinus*. Nitzsch. loc. cit. *P. suis*. Lin. (sur le cochon.)

Pediculus phocæ. Lucas. Magas. de Zool. t. 4. cl. 9. pl. 121.

[Nitzsch, qui a étudié avec beaucoup de soin les insectes parasites, n'admet pas cet ordre et rapporte les Poux à l'ordre des Hémiptères et les Ricins à l'ordre des Orthoptères ; mais son travail n'est pas accompagné des planches qui seraient nécessaires pour faire bien apprécier la valeur des faits d'organisation sur lesquels il fonde son opinion, et sa classification n'a pas été adoptée par les naturalistes.]

RICIN. (Ricinus.)

Deux antennes très petites, plus courtes que la tête, écartées à leur insertion. Les yeux lisses : un seul ou deux de chaque côté. Deux mandibules en crochet. Bouche inférieure, tantôt sous le sommet de la tête, tantôt presque centrale : l'ouverture en fente, ayant deux lèvres.

Tête séparée. Corps allongé-ovale ; six pattes.

Antennæ duæ, minimæ, capite breviores, sæpè insertioni remotæ. Oculi simplices : utrinque unico vel duobus. Mandibulæ duæ, unciniformes. Os inferum, modò capitis infra apicem, modò subcentrale ; rimosum ; labiis duobus.

OBSERVATIONS. — Linné et Fabricius n'ont point distingué les Ricins des Poux, et c'est à Degeer et à M. Latreille qu'on doit l'établissement de ce genre. Quelques rapports qu'aient les Ricins avec les Poux, ils en sont très distincts par les caractères de leur bouche. Ils en ont les parties plus composées ; car, outre les deux mandibules en crochet déjà observées, ces animaux, suivant M. Savigny, ont des mâchoires avec un trè

petit palpe sur chacune d'elles, etc. Dans les espèces que M. Latreille a examinées, il a vu, de chaque côté de la tête, deux yeux lisses, très petits et rapprochés.

L'abdomen des Ricins, comme celui des parasites qui se nourrissent de sang, est plus grand que le reste du corps de l'animal. Sauf une espèce qui vit sur le chien, les autres Ricins connus se trouvent sur le corps des oiseaux; leurs espèces sont fort nombreuses.

Caput distinctum; corpus elongato-ovatum; pedes sex.

ESPÈCES.

[*Bouche sous l'extrémité antérieure de la tête.*]

1. Ricin du corbeau. *Ricinus corvi*.

R. abdomine ovato: margine striato.

Pediculus corvi. Lin. Fab. Ent. 4. p. 420.

Degeer. Ins. 7. pl. 4. f. 11.

Lat. Hist. nat., etc. 8. p. 105.

* *Philopterus atratus*. Nitzsch. Ins. epiz. p. 32.

Habite sur le corbeau.

2. Ricin de la mouette. *Ricinus sternæ*.

R. capite trigono; abdomine ovato pallido: dorso longitudinaliter nigricante.

Pediculus sternæ. Lin. Fab. Ent. 4. f. 422.

Degeer. Ins. 7. p. 77. pl. 4. f. 12.

Habite sur la mouette.

3. Ricin de la cresserelle. *Ricinus tinnunculi*.

R. capite sagittato, postice utrinque mucronato.

Pediculus tinnunculi. Lin. Fab. 4. p. 420.

* *Liotheum hasticeps*. Nitzsch. op. cit. p. 44.

Panz.

Habite sur la cresserelle (*falco tinnunculus*).

Etc.

[*Bouche subcentrale, sous la tête.*]

4. Ricin de la poule. *Ricinus gallinæ*.

R. capite lunato: angulis acuminatis; thorace utrinque mucronato.

Pediculus gallinæ. Lin. Fab. Ent. 4. p. 423.

Geoff. n. 11.

Habite en Europe, sur les poêles, les perdrix.

5. Ricin du paon. *Ricinus pavonis*.

R. capite globoso maximo; corpore pallido fuscoque striato.

Pediculus pavonis. Lin. Fab. 4. p. 423.

Ricinus pavonis. Lat. Hist. nat. des fourmis. p. 389.

* *Philopterus falcicornis*. Nitzsch. op. cit. p. 35.

Habite en Europe, sur les paons.

6. Ricin du plongeon. *Ricinus mergi*.

R. albidus; capite flavescens; corpore elongato.

Ricinus mergi serrati. Deger. Ins. 7. pl. 4. f. 13-14.

Pediculus mergi. Fab. Ent. 4. p. 421.

Habite en Europe, sur le plongeon.

Etc.

[Nitzsch a divisé les ricins en plusieurs genres dont voici les principaux caractères :

(a) Antennes filiformes ou non renflées à l'extrémité; point de palpes maxillaires.

Genre *Philopterus*. Antennes filiformes, composées de cinq articles et insérées sur le bord latéral de la tête; chez le mâle le troisième article de ces organes offre souvent une branche qui forme avec le premier article une pince. Tarse biarticulé et terminé par deux ongles contigus et courbes qui forment pince avec l'extrémité biépineuse de la jambe.

Genre *Trichodectes*. Antennes filiformes, composées de trois articles; tarses armés d'un seul ongle formant pince, comme les précédents.

(b) Antennes plus grosses vers le bout; des palpes maxillaires.

Genre *Liotheum*. Bouche située à la face inférieure de la tête. Mandibules bidentées; des palpes labiaux biarticulés. Tarses terminés par deux ongles divergens.

Genre *Gyropus*. Bouche située à l'extrémité antérieure de la tête. Mandibules non dentelées; point de palpes labiaux; tarses des quatre pattes postérieures armés d'un seul ongle.

(Voyez Darstellung der familien und Gattungen der thierinsekten (insecta epizyca) von C. L. Nitzsch, inséré dans le 3^e vol. du magasin d'Entomologie de Germar et Zincken, et imprimé à part in-8. Halle, 1818).

M. Léon Dufour a publié dans le quatrième vol. des Annales de la Société entomologique la description et des figures grossies de plu-

nieurs espèces de Philoptères. Enfin, on trouvera aussi dans un ouvrage posthume du célèbre Lyonnet, publié il y a quelques années dans les mémoires du Muséum, la description et la figure d'un grand nombre de ces divers parasites. (Voyez Recherches sur l'Anatomie et les différentes espèces d'insectes, insérées dans les Mém. du Muséum 1832, et tirées à part, in-4°, Paris, 1832. E.

ARACHNIDES EXANT'ENNÉES-TRACHÉALES.

Elles n'ont point d'antennes, et respirent par des trachées rameuses, non ganglionnées. Deux ou quatre yeux lisses.

Les Arachnides qui appartiennent à cet ordre sont véritablement moyennes ou intermédiaires entre celles du premier et celles du troisième ordre de la classe. Si les Arachnides du premier ordre sont singulièrement distinguées de toutes les autres par leur tête toujours antennifère, celles du troisième ordre sont pareillement fort distinguées de toutes les autres, étant les seules qui respirent par des poches branchiales et qui possèdent un système d'organes pour la circulation. Comme je l'ai dit, les progrès de l'organisation dans la composition de ses parties sont rapides dans les animaux de cette classe: en sorte que, d'une famille à l'autre, les différences, à cet égard, sont fort grandes.

Ici, les Arachnides n'ont point d'antennes, et cependant, comme celles de l'ordre premier, elles respirent encore par des trachées; mais les stigmates qui forment l'ouverture au dehors de ces trachées, étant peu nombreux, et plutôt postérieurs ou inférieurs que latéraux, ne donnent plus lieu à ces deux trachées latérales ganglionnées qui se trouvent encore dans les Arachnides du premier ordre. Dans les Arachnides dont il s'agit maintenant, les trachées sont rayonnantes et ramifiées, selon les ob-

servations de M. Latreille, s'étendent encore partout, et ne viennent point, de chaque côté, s'ouvrir au dehors par des conduits latéraux.

Dans toutes ou presque toutes les Arachnides de cet ordre, la tête est confondue avec le corselet; dans un grand nombre même, la tête, le corselet et l'abdomen sont confondus dans la même masse. Leur yeux sont lisses et au nombre de deux ou de quatre. Quant aux pattes, on n'en voit que six dans les Arachnides des trois premiers genres de cet ordre; mais celles des autres genres en ont huit, et les femelles quelquefois ont deux fausses pattes en surplus.

La bouche varie beaucoup selon les familles et les genres dans les animaux de cet ordre. Elle est quelquefois très simple et n'offre qu'une cavité sans parties différentes ou distinctes; d'autres fois encore on y observe des mandibules, des mâchoires et des palpes. Ces animaux sont la plupart terrestres et, en général, des suceurs, malgré les diverses compositions de leur bouche. Je les divise en deux sections, de la manière suivante.

DIVISION

DES ARACHNIDES EXANTENNÉES - TRACHÉALES.

1.^{re} SECT. *Corps, soit sans division, la tête, le tronc et l'abdomen étant réunis en une seule masse, soit divisé en deux, au moins, par un étranglement.*

(a) Bouche tantôt en suçoir, sans mandibules distinctes, et tantôt ayant des mandibules d'une seule pièce, en pince ou en griffe.

Le corps en une masse sans division et sans anneaux distincts.

Les Acarides.

(b) Bouche munie de mandibules très apparentes, et coudées ou composées de deux ou de trois pièces: la dernière toujours en pince.

Le corps, soit divisé en deux, soit offrant des apparences d'anneaux.

Les Phalangides.

II.° SECT. *Corps partagé en trois ou quatre segmens distincts.*

- (a) Corps allongé, sublinéaire, partagé en quatre segmens, sous forme d'articulations.

Les Pycnogonides.

- (b) Corps ovale ou oblong, partagé en trois segmens, dont l'antérieur, plus grand, est en forme de corselet.

Les Faux-Scorpions.

LES ACARIDES.

Bouche tantôt en suçoir, sans mandibules distinctes, et tantôt ayant des mandibules d'une seule pièce, soit en pince, soit en griffe. Tête, corselet et abdomen confondus en une seule masse. Point d'anneaux distincts.

[M. Dugès, qui a fait de ces animaux une étude très approfondie, leur assigné les caractères suivans: abdomen (ou *thoracogastre* Dug.) entier et confondu avec le dernier et le pénultième segments du thorax, souvent même uni de la sorte avec la première portion du thorax (*protodere* Dug.) et avec la tête. Lèvre portant des mâchoires et recouvrant des mandibules.]

Les *Acarides*, selon nous, ne sont que des Poux modifiés et raccourcis. Toutes ont perdu les antennes, et la plupart ont acquis une paire de pattes de plus. Dans les Poux et les Ricins, l'abdomen, déjà fort grand, formait la principale partie du corps, et, dans les *Acarides*, l'abdomen lui seul forme presque le corps entier. En effet, leur corselet, très réduit, semble avoir disparu, et leur tête, qui s'y trouve réunie, paraît située à l'extrémité antérieure de l'abdomen. Comme ceux des Poux, les yeux sont lisses, très petits, quelquefois même nuls ou avortés,

et de chaque côté, au nombre d'un ou deux seulement, ou rapprochés en dessus.

Les animaux de cette famille sont, en général, très petits, et souvent ne paraissent que comme des points mouvans. Les uns sont, comme les Poux, des parasites de différens animaux, de l'homme même, dans certaines maladies, et pullulent aussi d'une manière extraordinaire; tandis que les autres sont errans, et vivent, soit sur la terre, de matières animales ou végétales putréfiées, soit dans le sein des eaux.

Le corps de ces Arachnides est ovale ou globuleux, très mou en général; et comme il est habitué à se gonfler du sang ou des fluides que l'animal pompe pour sa nourriture, est souvent moins aplati que celui des Poux. La bouche, située à l'extrémité antérieure et un peu en dessous de ce corps, varie beaucoup selon les races, à raison des progrès rapides de leur organisation, mais plus ou moins avancés dans ces races. Dans les unes, elle n'offre qu'un suçoir formé de lames étroites et réunies, et quelquefois qu'une ouverture sans aucune pièce particulière apparente. Dans les autres, elle est munie de mandibules cachées ou peu saillantes, d'une seule pièce, soit en pince, soit en griffe.

Si, comme il nous le paraît, ces Arachnides ont une origine fort analogue à celle des Poux, et viennent naturellement à leur suite, elles conduisent évidemment aux Phalangides par les Trogules, les Sirones, et de là aux Faucheurs; etc.

Les Acarides, dont Linné n'a formé qu'un seul genre, sous le nom d'*Acarus*, sont très nombreuses, fort diversifiées dans leurs races, et constituent une famille sur laquelle M. Latreille a répandu beaucoup de jour par ses observations délicates: nous les divisons de la manière suivante.

DIVISION DES ACARIDES.

§. *Six pattes, en tout temps, à l'animal.* (1)

Astome.

Lepte.

Caris.

§§. *Huit pattes, dans l'entier développement de l'animal.*

(1) Pattes simplement ambulatoires (Acarides non aquatiques).

(a) Un suçoir, avec ou sans palpes. Point de mandibules apparentes.

Ixode.

Argas.

Uropode.

Smaris.

Bdelle.

(b) Des mandibules distinctes, et toujours des palpes.

* Palpes sans appendices sous leur extrémité. Les mandibules en pince (ou didactyles).

Mitte.

Cheylète.

Gamase.

Oribate.

** Palpes subchélifères; ayant un appendice mobile sous leur extrémité. Mandibules en griffe.

Érythrée.

Trombidion.

(2) Pattes ciliées ou frangées, et propres à nager (Acarides aquatiques):

Hydrachne.

(1) Ainsi que nous l'avons déjà dit, il ne paraît pas y avoir d'acaride qui, à l'âge adulte, ne présente que six pattes, et il y a tout lieu de croire que les genres dont il est ici question, ne
E.

Elays.

Limnocare.

[Depuis quelques années l'étude des Acariens a occupé l'attention de plusieurs naturalistes (parmi lesquels nous citerons surtout MM. Savigny, Léon Dufour, de Théis, Audouin et Dugès), et a fait des progrès considérables; M. Dugès a publié dans les Annales des Sciences naturelles, une série de mémoires sur la structure et la classification de ces petites Arachnides, et dans ce moment M. Walckenaër se prépare à donner dans son nouvel ouvrage sur les insectes aptères faisant partie des suites à Buffon (édition de Roret) un travail général sur le même sujet. Nous regrettons de ne pouvoir profiter ici des résultats obtenus par ce dernier entomologiste, et, pour donner une idée exacte de l'état actuel de cette partie de la science, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de reproduire ici le *Synopsis* dans lequel M. Dugès a exposé les bases de sa classification des Acariens.

ORDRE DES ACARIENS.

- § 1. Palpes ravisseurs (c'est-à-dire renflés vers le milieu, et ayant le second article le plus grand de tous, le pénultième article armé d'un ou de plusieurs crochets et ayant le dernier article moussu, plus ou moins pyriforme et constituant un appendice uniquement destiné au toucher). Pieds ambulatoires, (c'est-à-dire armés de crochets), yeux latéro-antérieurs.

Famille des Trombidés.

Genres. Raphignathe.
Pachygnathe.
Tétranique.
Rhyncholophe.
Mégamère.

Smaridie.

Trombidion.

Erythrée.

- § 2. Palpes ancreurs, (c'est-à-dire ayant une forme assez analogue à celle des précédens, mais avec le dernier article aigu ou armé de pointes, et avec le troisième ou le quatrième article plus grand que les autres); corps sans divisions; hanches plates, larges, adhérentes et disposées en 4 groupes séparés par de petites distances et quelquefois contiguës sur la ligne médiane; pieds nageurs (c'est-à-dire ciliés et ayant le dernier article peu différent des précédens); yeux supéro-antérieurs. Aqualiques.

Famille des Hydrachnes.

Genres. Diplodonte.

Atace.

Arrenure.

Eylaïde.

Limnochare.

Hydrachne.

- § 3. Palpes filiformes, incurvés, courts et libres; corps déprimé et sans divisions; pieds unguiculés et souvent armés de caroncules, (c'est-à-dire ayant les griffes en grande partie engagées dans une membrane faisant office de ventouse). Parasites.

Famille des Gamasés.

Genres. Dermanysse.

Gamase.

Uropode.

Ptéropte.

Argas.

- § 4. Palpes valviformes, engainant le bec; mandibules triarticulées et ayant le dernier article squammiforme et denticulé; lèvres en forme de cuiller et denticulée; corps entier et recouvert en avant d'une plaque cornée; point d'yeux; pieds unguiculés et caronculés. Parasites.

Famille des Ixodés.

Genre. Ixode.

- § 5. Palpes adhérens à la lèvre et peu développés; mandibules ché-
liformes; point d'yeux; hanches distantes entre elles; pieds ca-
ronculés.

Famille des Acarés.

Genres. Hypope.

Acare.

Sarcopte.

- § 6. Palpes anténniformes (filiformes, allongés et divariqués); mandi-
bules unguiculées ou chéiformes; bec en forme de tête allongée;
un corselet, des yeux.

Famille des Bdellés.

Genre. Bdelle.

- § 7. Palpes fusiformes, sans griffes et cachés sous le rostre; mandibule
en forme de pince; corps cuirassé et présentant 1 ou 2 sillons
transversaux; yeux peu distincts; hanches à peine écartées; pieds
marcheurs (c'est-à-dire dont le dernier article offre à-peu-près
les mêmes dimensions que ceux qui le précèdent).

Famille des Oribatés.

Genre. Oribate.

[E.]

ASTOMER. (Astoma.)

Bouche inférieure, pectorale, très petite: le suçoir et
les palpes non apparens.

Corps ovale, arrondi aux extrémités, mou. Six pattes
très courtes.

Os rostro conico, porrecto, è maxillis duabus coalitis composito. Palpi duo subconici, porrecti, quadriarticuli, rostri longitudine.

Corpus suborbiculatum, depressum, cute coriaceâ Pedes sex.

OBSERVATIONS. — Le Caris, qui semble n'avoir été observé, jusqu'à présent, que par M. Latreille, se distingue des Acarides précédentes, par son corps aplati et coriace. Il diffère des Tiques ou Ixodes, par le nombre de ses pattes.

[D'après les observations de M. Audouin, il y a tout lieu de croire que l'Arachnide décrite par Latreille sous le nom de *carios* (dont on a fait depuis *caris*), n'était autre chose qu'une larve d'Argas. Voyez Annales des Sciences naturelles, 1^{re} série, t. 25, p. 412. E.]

ESPÈCE.

1. Caris de la chauve-souris. *Caris vespertilionis*.

Car. corpore fusco.

La Tique de la chauve-souris? Geoff. 2. p. 627.

Latr. Gen. 1. p. 161. [Règne anim. 2. éd. t. 4. p. 290. et Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 260.]

Habite sur les chauve-souris.

IXODE. (Ixodes.)

Bouche ayant un bec court, terminal, avancé, trilamel-
lé, tronqué, un peu dilaté au sommet. Deux palpes ob-
longs, planes, avancés, engainant le bec. Point d'yeux
distincts.

Corps ovale-arrondi, plus étroit antérieurement, co-
riace. Huit pattes.

*Os. rostro brevi, terminali, porrecto, trilamellato, trun-
cato apice subdilato. Palpi duo oblongi, plani, porrecti,
haustellum vaginantes. Oculi nulli distincti.*

*Corpus ovato-orbiculatum, anticè angustius, subcoria-
ceum. Pedes octo.*

OBSERVATIONS.—Les Ixodes, vulgairement appelés *Tiques*, et auxquels d'anciens naturalistes donnaient le nom de *Ricins*, sont des Acarides plus ou moins coriaces, qui se tiennent habituellement dans les bois, les taillis, sur des plantes peu élevées, et qui s'accrochent aux animaux qu'elles rencontrent pour en sucer le sang. Elles attaquent ordinairement le chiens, les bœufs, les chevaux, etc., et engagent tellement leur suçoir dans leur chair, qu'il est difficile de les en arracher. La lame intermédiaire de leur suçoir est dentée en scie, selon les observations de M. Latreille.

[Voyez pour les caractères de ce genre le tableau page 61, et pour plus de détails sur son organisation, les observations de M. Savigny, consignées dans les belles planches du grand ouvrage sur l'Egypte; celles de M. Audouin, publiées dans les Annales des Sciences naturelles, 1^{re} série, tome 25, et celles de M. Dugès, insérées dans le 2^e volume de la seconde série du même recueil. E.]

ESPECES.

1. Ixode ricin. *Ixodes ricinus*. Latr.

I. flavo-sanguineus; abdominis lateribus marginatis, subvillosis; palpis liberis.

Acarus ricinus. Lin. Fab. 4. p. 425.

Acarus reduvius. Degeer. Ins. 9. pl. 6. f. 1-2.

La Tique des chiens. Geoff. 2. p. 621.

* *I. ricinus*. Latr. Règn. anim. 2. éd. t. 4. p. 288.

* *I. reduvius*. Hahn. loc. cit. p. 66. fig. 152.

Griffith. Anim. Kingd. Ar. pl. 27. fig. 4.

Habite en Europe, dans les bois, sur les chiens, les bœufs, etc.

2. Ixode réticulé. *Ixodes reticulatus*. Latr.

I. supra cinereus; maculis lineolisque fusco-rubris variegatus; palpis subovalibus.

Acarus reticulatus. Fab. Ent. 4. p. 428.

Acarus reduvius. Schrank. Ins. austr. n° 1043. t. 3. f. 1-2.

Cynorhæstes pictus. Herm. apt. p. 67.

* *Ixodes ophiophilus*. Muller. Nova Acta Acad. nat. Cur. Bonnæ t. 15. 2^e partie. p. 236. pl. 67.

* *I. reticulatus*. Latr. Règn. anim. 2^e édit. t. 4. p. 288.

Etc. Ajoutez *Acarus ægyptius*, Lin. Herm. Apt. pl. 4. f. 9.

(* Savigny. *Exp. d'Égypte. Arach. p. 9. f. 10; Walck. op. cit. pl. 32. fig. 1.*)

Acarus americanus, Lin. etc.

* *Ixodes marginalis*. Hahn, op. cit. p. 63. pl. 56. fig. 153.

* *Ixodes plumbeus*. Dugès. *Annales des sciences naturelles. 2^e série. t. 2. p. 33. pl. 7. fig. 7.*

* *Ixodes erinaceus*. Audouin. *Ann. des sc. nat. 1^{re} série. t. 25. p. 415. pl. 14. fig. 2.*

* *Ixodes traheatus*. ejusd. loc. cit. p. 420. pl. 14. fig. 3.

Etc.

ARGAS. (Argas.)

Bouche inférieure; suçoir à découvert; deux palpes coniques, courts, quadriarticulés. Point d'yeux distincts.

Corps ovale-elliptique, déprimé, coriace. Huit pattes.

Os inferum; haustello distincto; palpis duobus brevibus conicis, quadriarticulatis. Oculi nulli conspicui.

Corpus ovato-ellipticum, depressum, coriaceum. Pedes octo.

OBSERVATIONS.—L'Argas diffère éminemment des Ixodes par sa bouche inférieure, et parce que ses palpes, qui n'engainent point le suçoir, ont quatre articles. La seule espèce que l'on connaisse vit sur les pigeons, et souvent en très grande quantité.

[Les Argas paraissent avoir les palpes filiformes comme les Gamases, mais se rapprochent aussi des Ixodes par la conformation des mandibules et de la lèvre; leurs pieds paraissent être à peine caroncclés. M. Dugès leur assigne les caractères suivans; mais, n'ayant pu les observer lui-même, il n'en parle que d'après les figures de Hermann et de Savigny.

« Famille des Gamasés; genre Argas. Cinquième article des palpes aussi long que d'autres articles, mais le premier le plus long de tous; mandibules et lèvre dentelées; rostre inférieur; hanches subégales; pieds subégaux, unguiculés et sans caroncule, ou n'ayant qu'un caroncule très petit. » E.]

ESPÈCES

1. Argas. bordé. *Argas marginatus*.

Latr. Gen. 1. p. 155. tab. 6. f. 2.

Rhyncoprius columbae. Herm. Apt. p. 69. pl. 4. f. 10-11.

Acarus marginatus. Fab. 4. p. 427.

* Latr. Règne anim. t. 4. p. 289.

Habite en Europe, dans les colombiers. Il suce le sang des pigeons.

* Ajoutez :

* *Argas persicus*. Fischer. Mém. sur l'argas. in-4. Moscou. 1823.
Aud. Explication des planches de M. Savigny. p. 428. Arach.
pl. 9. f. 8; Walckenaer Ins. Aptères. pl. 33. fig. 6.

* *Argas Fischeri*. Audouin. Ap. Savigny. Egypte. Arach. pl. 9. f. 6.

* L'Acarien figuré par M. Savigny dans le grand ouvrage sur l'Egypte,
(Arach. pl. 9. fig. 13), et désigné par M. Audouin, sous le nom
d'*Ixode de Forskaël*, paraît être une larve d'Argas.

C'est à côté des Argas que se place le nouveau genre
PTEROPT *Pteroptus* établi par M. Léon Dufour pour ré-
cevoir un Acarien à huit pattes caronculées, à palpes fili-
formes avec le dernier article le plus long de tous, à corps
déprimé, coriace en dessus et sans divisions, sans yeux
et vivant en parasite sur les chauve-souris. M. Dugès a
adopté ce genre et le place dans la division des Gama-
siens.

Esp. *Pteroptus vespertilionis*. Léon Dufour. Ann. d. sc. nat. t. 26.
p. 98. et t. 25. pl. 11. fig. 6.

Ajoutez l'*Argas pipistrellæ*. Audouin. Ann. des scienc. nat. 1^{re} série
t. 25. p. 412. pl. 14. fig. 1; Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 27,
fig. 5.

L'*Acarus vespertilionis*. Herm. Mem. apterol. p. 84. pl. 1 fig. 14.

Gamasus vespertilionis. Latreille. Règ. anim.

Etc.

E.]

UROPODE. (Uropoda.)

Bouche s'ouvrant sous le bord antérieur du corps, dans
le milieu. Le suçoir et les palpes n'étant point apparens.
Point d'yeux distincts.

Corps ovale, arrondi postérieurement; à dos coriace,
un peu convexe. Un long filament fixé à l'anus. Huit pat-
tes courtes.

Os infra corporis marginem anticum medio aperiens:
haustello palpisque inconspicuis. Oculi nulli distincti.

Corpus ovale, posticè rotundatum, dorso coriaceo convexiusculo. Filamentum longum ano infixum. Pedes octo breves.

OBSERVATIONS. — Peut-être le long filèt, fixé à l'anús de l'animal, ne devrait-il être considéré que comme une particularité d'espèce, et, dans ce cas, peut-être encore, devrait-on réunir à ce genre l'*Acarus spinatarsus* d'Hermann (Apt., p. 85, pl. 6. f. 5) qui est aussi parasite d'insectes. L'Uropode se fixe sur le corps de différens Coléoptères par son filet caudiforme.

[M. Dugès a reconnu que le filament dont il est ici question, est tout-à-fait accidentel et seulement un produit d'excrétion. Les pattes des Uropodes sont terminées par un caroncule et deux griffes, et leur bouche, difficile à apercevoir, est pourvue des palpes filiformes assez courts et de mandibules intérieures en forme de bras, et comparables à celles des Gamases. E.]

ESPÈCE.

1. Uropode végétante. *Uropoda vegetans*.

Latr. Gen. 1. p. 158. et Hist. nat., etc., vol. 7. p. 381. et vol. 8. p. 67. f. 8.

Mite végétative. Degeer. Ins. 7. p. 123. pl. 7. f. 15.

* Dugès. Ann. des scienc. nat. 2^e série. t. 2. p. 29. pl. 8. fig. 33-36.

Habite en Europe, sur différens Coléoptères. M. Latreille présume qu'elle a des mandibules, quoique non aperçues.

SMARIS. (Smaris.)

Bouche terminale, ayant un bec avancé, cylindrique, plus grêle vers son sommet. Deux palpes avancés, droits, de la longueur du bec, sans soie au bout. Deux yeux.

Corps ovale, presque rhomboïde, écailleux ou velu. Huit pattes; les antérieures plus longues.

Os terminale: rostro porrecto, cylindrico, versus apicem graciliore. Palpi duo porrecti, recti, rostri longitudine; setâ terminali nullâ. Oculi duo.

Corpus ovatum, subrhombeum, squamosum aut villosum.
Pedes octo : anticis longioribus.

OBSERVATIONS.—Les Smaris sont des Acarides errantes, qui ont des rapports avec les Bdelles, mais s'en distinguent principalement par leurs palpes plus courts et sans soies au bout.

[Ces Acariens, remarquables par la grande extensibilité de leur bec, ont été récemment étudiés avec soin par M. Dugès; ce savant pense que leur place naturelle est à côté des Trombidions, et leur assigne les caractères suivans pour les distinguer des autres genres de la famille des Trombidées.

Palpes courts et portés sur un bec rétractile et protractile, qui, dans l'état de repos, est à peine visible en-dessus; mandibules ensiformes et très aiguës; corps entier, rétréci en avant; hauches très éloignées entre elles, formant quatre groupes bien distincts, et celles de la première paire insérées sous l'avance immobile du corps; pieds palpeurs; ceux de la première paire les plus longs; articles du tarse allongés. E.

ESPÈCES.

1. Smaris du sureau. *Smaris sambuci*.

S. subvillosus; antice acutiusculo, postice retuso.

Latr. Gen. 1. p. 153.

Acarus sambuci. Schrank, Austr. n° 1085.

Herm. Apter. p. 30. pl. 2. f. 8.

Habite en France, en Autriche, sur les arbres, et par terre sur les feuilles.

2. Smaris miniacé. *Smaris miniatus*.

S. villosus, pallidè miniatus; corpore utraque extremitate subaculo.

Trombidium miniatum. Herm. Apterol. p. 28. pl. 1. f. 7.

Habite par terre, entre les débris, les ordures.

3. Smaris papilleux. *Smaris papillosus*.

S. miniatus, papillis brevibus obsitus; antice latiore depresso.

Trombidium papillosum. Herm. Apterol. p. 29. pl. 2. fig. 6.

* *Smaridia papillosa*. Latr. Règn. anim. 2° éd. t. 4. p. 287.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2° série. Zool. t. 1. pl. 1. fig. 13-16.

* Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 22. fig. 6.

Habite en Europe, sur les troncs d'arbres et entre les mousses.

dites. Ces animaux ont une pelotte vésiculeuse à l'extrémité de leurs tarse.

Les Mites sont les plus petites acarides connues; la plupart sont trop petites pour être aperçues à la vue simple. Leur sucoir est un bec court, très fin, qui se compose de deux ou trois lames. Les unes, parasites, vivent dans les ulcères de la gale de l'homme et de quelques animaux; d'autres, parasites encore, vivent sur des oiseaux, et d'autres se nourrissent de diverses substances alimentaires de l'homme. Celle de la gale donne lieu, soit à l'égard de son origine, soit à celui de sa pullulation extraordinaire, à des considérations étonnantes. Celle du fromage est à-peu-près dans le même cas.

[M. Dugès distingue avec raison les Mites ou Acars des Sarcoptes, qui ici se trouvent réunis. Il ne comprend dans le genre *Acare* *Acarus* que les espèces dont le corps mou et renflé est divisé en deux portions par un sillon transversal, de manière à offrir un corselet bien distinct, et dont les pattes sont toutes caronculées et insérées en deux groupes peu distans; celles de la première paire sont remarquables par leur grosseur et celles de la deuxième paire, les plus petites de toutes.

E.

ESPÈCES.

1. Mite de la gale. *Acarus scabiei*.

A. subrotundus; pedibus brevibus rufescentibus: posticis quatuor setis longissimis.

Acarus scabiei. Fab. Ent. 4. p. 430.

Degeer. Ins. 7. p. 94. pl. 5. f. 12-13.

Ciron de la gale. Geoff. 2. p. 622.

Sarcoptes scabiei. Lat. Gen. 1. p. 152.

* Renucci. Thèse inaugurale sur l'insecte qui produit la contagion de la gale. Paris, 1835. n. 83. pl. 2. fig. 1-3.

* Insecte de la gale. Raspail. Ann. des sc. d'observ. t. 2. p. 445, et bulletin de thérapeutique, t. 7. pl. 1. fig. 1-7.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 38. et t. 3. p. 245. pl. XI. B.

* Rayer. Traité des maladies de la peau, pl. 5. fig. 6 et 7.

* Edwards. Elém. de zoologie. p. 286. fig. 469.

Habite dans les ulcères de la gale. [Selon les observations du docteur

Galès, on trouve dans les ulcères de la gale, une mite d'une forme différente. Y en aurait-il de diverses espèces ?

- * L'existence de l'acarus de la gale a été révoquée en doute par quelques naturalistes; mais des observations récentes sont venues confirmer pleioement l'opinion de Redi, de Degeer et de Galès (1), touchant ce parasite, et on a constaté que sa présence suffisait pour déterminer le développement de la gale. MM. Renacci, Raspail, Dugès, etc. l'ont étudié avec soin, et ont fait voir non-seulement qu'il était bien distinct de la mite du fromage, mais qu'il devait former un genre particulier auquel le dernier de ces naturalistes applique le nom de *Sarcopte*, déjà employé par Latreille pour la totalité du genre *acare*. Les caractères assignés par M. Dugès à son genre *Sarcoptes* sont les suivans : Hanches des quatre pieds de devant très écartées des postérieures; caroncles campanulées; corselet engagé. L'espèce unique qu'il y rapporte, *l'acarus de la gale de l'homme*, a le corps déprimé, inégal, subarrondi et labié en avant sur les côtes; le museau obtus, élargi, aplati en forme de pelle; les quatre pieds postérieurs très courts, sans caroncles et terminés par une grosse et longue acie. M. Raspail a fait connaître, sous le nom de *Sarcoptes equi* un autre acarien qui se trouve dans les pustules galeuses chez les Chevaux, et qui a les huit pattes caronculées; l'organisation de la bouche de ce parasite paraît différer aussi beaucoup de ce qui se voit chez le *Sarcopte* de l'homme (Voyez le bulletin général de thérapeutique, t. 7. pl. 2. fig. 3).

2. Mite domestique. *Acarus domesticus*.

A. albus; maculis binis fuscis; corpore ovato, medio coarctato; pilis longissimis; pedibus aequalibus.

Degeer. Ins. 7. p. 89. pl. 5. f. 1—4.

Lat. Hist. nat., etc., vol. 7. pl. 66. f. 2—3.

* Lyonnet. Mém. du Mus. t. 18. pl. 14. fig. 8-13.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série t. 2. p. 40. pl. 7. fig. 13—18.

* Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 22. fig. 2.

Habite en Europe, dans les maisons, dans les collections d'insectes, d'oiseaux.

(1) Il est cependant à noter que l'acarus figuré par ce dernier auteur, n'est pas l'acarus de la gale; mais comme l'a très bien fait voir M. Raspail, la Mite du fromage. E.

3. Mite du fromage. *Acarus siro*.

A. albidus ; femoribus capiteque ferrugineis, abdomine setoso.

Acarus siro, Lin. Fab. Ent. 4. p. 430.

Habite dans le fromage trop long-temps gardé. On se la procure, à volonté, avec cette substance, ainsi que la mite de la farine, qu'il en faut distinguer. Voyez Degeer. Ins. 7. p. 97. pl. 5. f. 15.

* Cette espèce a été figurée aussi sous le nom de *Ciron de la gale* par M. Galès, dans sa thèse inaugurale, et par M. Patrix, dans le Dict. des sc. médicales.

Etc. Ajoutez l'*acarus passerinus* de Fab. (*Sarcoptes passerinus*, Lat.), l'*acarus dimidiatus* d'Herm. Apterol. p. 85. pl. 6. f. 4.

* Dugès, op. cit. t. 2. p. 41. etc.

† Genre HYPOPE. *Hypopus*.

Le genre Hypope de M. Dugès se compose de mites dont le corps est ellipsoïde, aplati et sans divisions ; le suçoir étroit, pourvu de 2 soies rigides dirigées en avant et paraissant composé d'une lèvre soudée aux palpes ; les mandibules cachées, et les pieds courts, disposés en deux groupes peu distans et terminés par un caroncule et des griffes.

† HYPOPE SPINITARSE. *Hypopus spinatarsus*.

Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 37.

Acarus spinatarsus. Herm. Apter. pl. 16. fig. 5.

Le pou du limaçon de Lyonnet et l'*acarus muscarius* de Degeer (t. pl. 7. fig. 2.) paraissent appartenir aussi à ce genre. E.

CHEYLÈTE. (Cheyletus).

Bouche terminale, deux mandibules en pince. Deux palpes épais, en faux à l'extrémité, saillans, en forme de bras. Les yeux apparens.

Corps mou, ovale.

Os terminale : mandibulæ duæ chelatæ. Palpi duo crassissimi, apice falcati, exserti, brachiiformes. Oculi conspicui. Corpus molle, ovatum.

OBSERVATIONS. — Parmi les Acarides qui ont des mandibules, M. Latreille distingue comme genre le *Cheylète*, à cause de ses deux gros palpes avancés en forme de bras. C'est une acaride errante, extrêmement petite.

[Ce genre, établi d'après des figures grossières et des descriptions incomplètes nécessite de nouvelles observations; les animalcules que l'on y a rangés ne paraissent avoir que six pattes, et dans ce cas ne seraient probablement que des larves. M. Dugès n'a pas cru devoir l'admettre. E.]

ESPÈCES.

1. Cheylète des livres. *Cheyletus eruditus*.

Acarus eruditus. Schrank. Austr. n° 1058. tab. 2. fig. 1.

Ejusd. *pediculus musculi*, ibid., n° 1024. t. 1. f. 5.

Acarus eruditus. Oliv. Encycl. n° 13,

Cheyletus eruditus. Lat. Gen. 1. p. 153.

Habite dans les collections d'histoire naturelle, dans les livres exposés à l'humidité.

GAMASE. (Gamasus.)

Bouche terminale: deux mandibules en pince. Deux palpes filiformes, soit saillans, soit très distincts, sans appendice mobile sous leur extrémité.

Corps ovale, soit entièrement mou, soit coriace en dessous.

Os terminale. Mandibulæ duæ chelatæ. Palpi duo filiformes, exserti aut distinctissimi; appendice mobili infra extremitatem nullo.

Corpus ovatum, modò penitus molle, modò supra coriaceum. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Les Gamases diffèrent des Cheylètes par leurs palpes filiformes; des Érythrées et des Trombidions, parce que ces palpes n'ont pas un appendice mobile sous leur extrémité, et se rapprochent des Oribates par celles de leurs espèces qui ont le dessus du corps coriace.

[M. Dugès restreint le genre Gamase aux Acariens de la famille des Gamasés (Voyez page 60), qui ont le 5^e article des palpes le plus petit; la lèvre trifide; les mandibules chélistiformes et à griffe denticulée; le corps entier, obovale, aplati, scutigère, et les pattes de la première paire grêles et allongées, tandis que celles de la seconde sont souvent les plus épaisses. E.

ESPÈCES.

1. Gamase tisserand. *Gamasus telarius*.

G. rubicundq-hyalinus; abdomine utrinque macula fusca.

Acarus telarius. Lin. Fab. Ent. 4. p. 430.

Le tisserand d'automne. Geoff. 2. p. 626. n° 13.

* *Trombidion telarium*. Herm. Man. Apter. p. 82. fig. 15.

* *Tetranychus telarius* (1). Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 1. p. 25.
Habite sur les feuilles de différens arbres, et y forme des toiles très fines.

(1) Le genre TETRANYQUE *Tetranychus* a été fondé par M. Léon Dufour, et adopté par M. Dugès dans son travail général sur les Acariens. Cette nouvelle division générique diffère en effet beaucoup de celle des Gamases avec lesquels on avait confondu les Tétranyques. M. Dugès le place dans la famille des Trombidiés et y assigne les caractères suivans : Un suçoir tout semblable à celui des Raphygnathes (voyez page 59); mais à deux acicules sans soie et qui ont un peu plus de longueur; des palpes aussi à crochets fort courts et épars, mais eux-mêmes en totalité gros, courts, conoïdes, appliqués sur une base triangulaire et formant avec elle une sorte de tête obtuse et bifurquée, des yeux latéro-antérieurs, des hanches insérées de chaque côté en deux groupes, un pour les deux antérieures, un pour les deux postérieures; des pattes

2. Gamase des coléoptères. *Gamasus coleoptratorum*.

G. ovatus, *rufus*; *ano albicante*.

Acarus coleoptratorum. Lin. Fab. Ent. 4. p. 432.

La mite des Coléoptères. Geoff. 2. p. 623. n° 4.

Gamasus coleoptratorum. Latr. Gen. 1. p. 147.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 25. pl. 8. fig. 26, 27.

Habite sur les excréments des bœufs, des chevaux, et s'attache en grand nombre sur les Coléoptères qui s'y rendent.

3. Gamase bordé. *Gamasus marginatus*.

G. ovatus, *brunneus*, *coriaceus*; *abdominis marginibus membranaceis*, *albidis*; *pedibus anticis longioribus*.

Acarus marginatus. Herm. Apterol. p. 76. pl. 6. f. 6.

Gamasus marginatus. Lat. Gen. 1. p. 148.

* *Macrochelis marginatus*. Lat. Règne anim. t. 4. p. 282.

* Dugès, loc. cit. t. 2. p. 26.

Habite sur des fumiers de végétaux; trouvé par Hermann, sur le corps calleux du cerveau d'un homme.

Etc. Ajoutez : l'*Acarus crassipes*. Herm. Apter. pl. 3. fig. 6 et 8. pl. 9. fig. R. — *Gamasus crassipes*. Dugès, loc. cit. t. 2. p. 27.

* L'*acarus testudinarius*. Herman. op. cit. — *Macrochelis testudinarius*. Latreille. Règn. anim. t. 4. p. 282. — *Gamasus testudinarius*, Dugès, loc. cit.

* *Acarus Savignii*. Audouin. Explic. des p lanches de M. Savigny. (Egypte. Arachnides pl. 9. fig. 4.)

* *Gamasus cossi*. Dugès, loc. cit. Pou de la chenille du bois de saule. Lyonnet. Mém. du mus. t. 18.

dont la partie antérieure est toujours la plus longue et dont la cuisse ou troisième article offre des dimensions de beaucoup supérieures à celle des autres articles, terminées enfin par deux crochets fort petits et fort courbés, attachés à un septième article de petites dimensions et dépassés par quatre soies raides, grosses et presque droites. »

Le type de ce genre est le TETRANYQUE LINGRE *Tetranychus lintearius*, Léon Dufour (Annales des Sc. nat., 1^{re} série, t. 25. pag. 281, pl. 9, fig. 4 et 5). M. Dugès a fait connaître aussi plusieurs espèces nouvelles (voyez Annales des Sc. nat., 2^e série, t. 1, p. 27).

* *Gamasus tetragonus*. Dugès, loc. cit. ; pl. 8. fig. 28—32.

* *Gamasus gigas*, et plusieurs autres espèces nouvelles décrites par M. Dugès.

† Genre **DERMANYSSE**. *Dermanyssus*. Dugès.

Ce genre nouveau est extrêmement voisin du précédent, dont il se distingue, ainsi que des autres groupes réunis par M. Dugès dans la famille des Gamasés (voyez page 60) par la mollesse de la peau, la forme aiguë de la lèvre et les mandibules perforantes. Ce naturaliste y range les espèces suivantes, qui sont toutes parasites :

1. *Dermanyssus avium*. Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 2. p. 19. pl. 7, fig. 1—4.

Cette espèce paraît être la même que : le *Pou de pivoine* et le *Pou d'une sorte d'émérillon* de Lyonnet (Mém. du Muséum t. 18. pl. 5. fig. 11. et 12); l'*Acarus gallinæ* de Degeer (Mém. pour servir à l'Hist. des Insectes. t. 7. pl. 6. fig. 13); l'*Acarus hirudinis* d'Hermann (Apterol. pl. 1. fig. 13); le *Gamasus gallinæ* et le *G. Hirudinis* de Latreille (Règne animal. f. 4. p. 285); et le *Smaride des petits oiseaux* de M. Duméril (Dict. des sc. nat. t. 49. p. 367. Atlas pl. 52. fig. A. B.)

2. *Dermanyssus vespertilionis*. Dugès (loc. cit.) p. 22, pl. 7. fig. 5.
3. *Dermanyssus convolvuli*. Dugès (loc. cit.) p. 24.
4. *Dermanyssus oribati*. Dug. (loc. cit.) p. 24. E.

ORIBATE. (Oribata.)

Bouche en bec conique. Mandibules en pinces. Palpes très courts, non saillans.

Corps ovale, rétréci en pointe antérieurement; à peau du dos coriace, doux, presque en bouclier. Huit pattes un peu longues.

Os rostrum conico; mandibulis chelatis; palpis brevissimis, non exsertis.

Corpus ovatum, anticè angustato-acutum; cute dorsali coriaceâ, durâ, subclypeiiforme. Pedes octo longiusculi.

OBSERVATIONS. — Les Oribates, qu'Hermann désigna sous le nom de *notaspes*, sont des Acarides très petites, à dos couvert d'une peau dure, qui ressemble à une écaille clypéacée, ou, en quelque sorte, à des Élytres réunies. Ces Acarides sont errantes, marchent lentement, et se trouvent entre les mousses, sur les pierres et sur l'écorce des arbres.

[Dans la méthode de M. Dugès, les Oribates forment une famille particulière qui se lie aux Acarés et aux Bdellés par leurs mandibules et leurs segmentations, et aux Gamasés par leurs cuirasses écailleuses (Voyez pour les caractères de cette famille, le tableau page 61). E.

ESPECES.

1. Oribate géniculé. *Oribata geniculata*.

O. fusco-castanea, nitida, pilosa; femoribus subclavatis.

Acarus geniculatus. Lin.

Acarus corticalis. Degeer. Ins. 7. p. 131. pl. 8. f. 1.

Acarus, n° 11. Geoff. 2. p. 626.

Oribata geniculata. Latr. Gen. 1. p. 149.

Notapsis clavipes. Herm. Apt. p. 88. pl. 4. f. 7.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série t. 2. p. 46. pl. 8. f. 40—42.

Habite en Europe, sur les mousses, les pierres, etc.

2. Oribate théléprocte. *Oribata theleproctus*.

O. nigra; dorso clypeato, per circulos concentricos striato.

Notapsis theleproctus. Herm. Apt. p. 91. pl. 7. f. 5.

Oribata theleproctus. Lat. Gen. 1. p. 149. Oliv. Encyc. n° 6.

* Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 23, fig. 3.

Habite en Europe, entre les mousses.

Etc. Ajoutez les autres espèces indiquées par MM. Latreille et Olivier dans l'Encyclopédie, par Griffith, dans sa traduction du Règne animal de Cuvier, mais surtout l'*Oribates castaneus* de Hermann, dont la structure a été étudiée avec beaucoup de soin par M. Dugès. Voy. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 2. pl. 48.]

ERYTHRÉE. (Erythræus.)

Bouche en bec conique. Mandibules en griffe. Deux

palpes allongés, saillans, subcheliferes : leur dernier article ayant à sa base un appendice mobile et digitiforme. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, non divisé. Huit pattes.

Os rostro conico. Mandibulae angulatae. Palpi duo elongati, exserti, subcheliferi : articulo ultimo appendice mobili digitiformi ad basim instructo. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, indivisum. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Les Érythrées avoisinent les Trombidions par leurs rapports; elles leur ressemblent par les mandibules et les palpes; mais leurs yeux sessiles et leur corps non divisé les en distinguent. Ce sont aussi des acarides errantes.

[Voici les caractères que M. Dugès assigne à ce genre qui prend place à côté des Trombidions, dans la famille des Trombidiés (page 60); palpes grands, libres et biunguiculés; mandibules unguiculées; corps entier; hanches contiguës; pieds coureurs (c'est-à-dire unguiculés, allongés et ayant leur dernier article grêle et très long); ceux de dernière paire les plus longs.

E.

ESPÈCES.

1. Erythrée faucheur. *Erythræus phalangioides*.

E. corpore obscure rubro : fasciâ dorsali flavo-aurantiâ ; pedibus longis : posticis duobus longioribus.

Mite faucheur. Degeer. Ins. 7. p. 134. pl. 8. f. 7—8.

Trombidium phalangioides. Herm. Apterol. p. 33. pl. 1. f. 10.

Erythræus phalangioides. Lat. Gen. 1. p. 146.

Habite en Europe, entre les mousses. Elle court assez vite.

* M. Dugès a constaté que l'on avait confondu ici deux espèces distinctes, et il les sépare l'une et l'autre des *Erythrées*, pour en former un nouveau genre sous le nom de *Rhyncholophe* (1). Il donne à la

(1) Le genre RHYNCHOLOPHE *Rhyncholophus* de M. Dugès prend place dans la famille des Trombidiés entre les Tetranychus et les Smarides, et a pour caractères : palpes grands,

Mite faucheur de Degeer le nom de *Rhyncholophe Degeer* et au *Trombidium phalangoides* de Hermann le nom de *Rhyncholophe Hermann*. (Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 1. p. 30.)

2. Erythrée neigeuse. *Erythræus nivosus*.

E. ruber, depressus; pilis albis brevissimis sparsim punctulatus.

Trombidium quisquilarium. Herm. Apt. p. 32. pl. 1. f. 9.

Habite par terre, parmi les ordures amassées.

Etc. Ajoutez le *Trombidium parietinum* d'Herm. pl. 1. f. 12, etc.

[Il paraîtrait, d'après les recherches de M. Dugès, que des trois espèces mentionnées ci-dessus, le *Trombidium parietinum* de Hermann (*Erythræus parietinus* Latreille) est la seule qui présente les traits caractéristiques de ce genre. Il a aussi fait connaître trois espèces nouvelles appartenant à ce genre : l'ERYTHRÉE BURCIOLE Dugès (Ann. des Sc. nat. 2^e série, t. 1, p. 40); l'ERYTHRÉE ISABELLE D. (op. cit. p. 42), et l'ERYTHRÉE CIRRIPEDE D. (op. cit. p. 43). Enfin il y rapporte également le *Trombidium cornigerum* de Hermann (Apterol. pl. 2, fig. 9). E.

THROMBIDION (Trombidium.)

Bouche ayant deux mandibules courtes, plates, terminés par un ongle crochu. Deux palpes saillans, courbés en dessous, munis d'un appendice mobile sous leur

libres ; lèvre pénicilligère ; mandibules ensiformes , très longues ; corps entier ; hanches très écartées ; pieds palpeurs (c'est-à-dire renflés à l'extrémité) ; celles de la dernière paire les plus longues. Les larves ont six pattes et diffèrent aussi des adultes par la conformation de la bouche. M. Dugès a fait connaître aussi deux espèces nouvelles : le RHYNCHOLOPHE CENDRÉ. *Rhyncholopheus cinereus* Dug. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 1. pl. 31. pl. 1. fig. 7 à 12, et le R. ROUGISSANT. *R. rubescens* Dug. op. cit. p. 33.

yeux ne sont pas pédonculés; enfin les hanches sont contiguës. Dans le jeune âge ces *Acarus* n'ont que six pattes.]

+ Genre MÉGAMÈRE. (*Megamerus*).

Le genre Mégamère de M. Dugès appartient aussi à la famille des Trombidiées et prend place comme le précédent dans la division des Brevitarses. Il présente les caractères suivans : Palpes unguiculés; mandibules en pinces, longues et libres; corps rétréci; hanches distantes; pieds marcheurs; leur cuisse très grande et leur 7^e article court. Larve hexapode et semblable à l'adulte.

Esp. — *Megamerus longipes*. Dugès. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 51; *Trombidium longipes*. Hermann. Apter.

Megamerus inflatus Dugès. Op. cit.

Megamerus ovatus Dugès. Op. cit. p. 52. pl. 8. fig. 43.

Megamerus celer Dugès. Op. cit. p. 53. pl. 8. fig. 46; *Trombidion celer* Hermann. Apterol.

Etc.

entre PACHYGNATHE. *Pachygnathus*.

Ce genre est très voisin du précédent; il appartient aussi à la division des Trombidiées Brevitarses, et a également les mandibules en pince, mais s'en distingue par la brièveté des palpes. Voici les caractères que M. Dugès y assigne : Palpes coniques à pièces unguiculés; mandibules épaisses, chélistiformes, corps entier et atténué antérieurement; hanches distantes; pieds marcheurs, ayant leur sixième article le plus long, et le septième le plus court; ceux de la première paire les plus longs et les plus gros. Ce genre ne comprend encore qu'une seule espèce, le PACHYGNATHE VELU. Dugès. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 54. pl. 8. fig. 52-54. E.

ANOSTOME. (Anostoma.)

Les *Acarides aquatiques* semblent ne différer des autres *Acarides* que par le milieu qu'elles habitent; car on ne leur connaît point de caractère général bien tranché qui les en distingue. Elles pourraient donc rentrer, soit dans les genres déjà établis pour celles qui vivent dans l'air, soit dans le voisinage de ces genres, où elles en formeraient de particuliers. Cependant, comment respirent-elles? viennent-elles de temps en temps à la surface de l'eau reprendre de l'air?

Il paraît que, comme les autres, ces *Acarides* sont fort nombreuses et très diversifiées. *Muller* en a fait connaître une cinquantaine, auxquelles il a donné le nom d'*hydrachne* ou araignée d'eau; mais il ne nous a point donné de détails suffisans sur les caractères de leur bouche. Ces *Arachnides* ont le corps très mou, en général subglobuleux, elliptique ou ovale, et paraissent toutes errantes dans les eaux. Voici les trois coupes génériques formées parmi elles, par M. Latreille.

[Cette division, désignée par Latreille sous le nom de *Hydrachnelles* (Règne anim. t. 4. p. 289), correspond à-peu-près à la famille des *Hydrachnées* de M. Dugès. Voy. le tableau page 60.]

HYDRACHNE. (Hydrachna.)

Bouche ou suçoir avancé en bec conique, composé de trois lames étroites réunies, dont les deux latérales sont reçues dans l'inférieure. Point de mandibules. Deux palpes avancés, arqués, subcylindriques, articulés, ayant un appendice mobile sous le dernier article.

Corps mou, globuleux. Huit pattes natatoires.

Os vel haustellum in rostrum conicum porrectum: lamellis tribus angustis coalitis: duabus lateralibus in infima receptis. Mandibulae nullae. Palpi duo porrecti, inflexo-erecti, subcylindrici, articulati; appendice mobili infra articulum ultimum inserto.

Corpus molle, globulosum. Pedes octo natatorii.

OBSERVATIONS. — La bouche des *Hydrachnes* offre un suçoir en bec saillant, et n'a point de mandibules, car les trois lames du suçoir paraissent plutôt le résultat d'une lèvre inférieure modifiée, qui reçoit deux mâchoires qui le sont aussi. Les deux palpes de ces Acarides sont analogues à ceux des *Erythrées* et des *Trombidions*, et semblent chélifères.

Les *Hydrachnes* sont fort petites, difficiles à observer et à étudier. Il y a lieu de croire que plusieurs de celles de Møller pourront se rapporter à ce genre.

[M. Dogès restreint ce genre aux *Hydrachnès*, qui ont le troisième article des palpes le plus long de tous, un bec de la longueur des palpes et des lames aiguës pour mandibules. Il a étudié avec soin les métamorphoses de ces Acariens, qui, dans l'état de larve, n'ont que six pattes, et vivent librement dans l'eau, puis passent à l'état de larve, et restent pendant ce temps fixés en parasites sur des insectes aquatiques, et, après avoir subi leur dernière métamorphose (sous la peau de la nymphe) muent encore une fois avant que d'arriver à l'état adulte. E.

ESPÈCES.

1. Hydrachne géographique. *Hydrachna geographica*.

H. nigra; maculis punctisque coccineis. Lat.

Hydrachna geographica, Mull. p. 59. t. 8. f. 3—5.

Latr. Gen. 1. p. 159. et Hist. nat. etc. 8. p. 33. pl. 67. f. 2—3.

Trombidium geographicum, Fab. Syst. 2. p. 406.

* *Hydrachna geographica*, Nuhn. Arachniden. v. 2, p. 49. tab. 59. fig. 134.

Habite dans les eaux douces. Elle est plus grande que les autres.

* Il paraît que l'Arachnide parasite à six pattes, dont M. Audouin a formé le genre *Aethysa* (Mém. de la soc. d'Hist. nat. de Paris. t. 1.

pl. 5. fig. 2. Lat. Règ. anim. de Cuvier. t. 4. p. 290. etc.) est la nymphe de cette espèce d'*Hydrachne*. (1)

1. *Hydrachne ensanglantée. Hydrachne cruenta.*

H. sanguinea; *pedibus aequalibus*. Lat.

Hydrachna cruenta. Mull. p. 63. tab. p. f. 1.

Latr. Gen. 1. p. 159.

Trombidium globator. Fab. Syst. 2. p. 403.

* *Hydrachna globula*. Dugès. Ann. des sc. nat. 3^e série. t. 1. pl. 162. pl. 11. fig. 41—56.

* *Hydrachna chrysis*. De Théis. Ann. des sciences nat. 1^{re} série. t. 27. p. 58. pl. 1. fig. 1.

Habite les eaux des fossés, les terrains inondés.

* M. Dugès rapporte à cette espèce le *Hydrachna globulus* de Herm. (Mém. Aptérol. p. 56; Hahn. Arach. t. 2. p. 51. pl. 59. f. 137), mais Hahn l'en distingue de ces Arachnides. pl. 59. fig. 137).

† Ajoutez : *Hydrachna miniata*. Hahn. op. cit. pl. 59. fig. 136.

* *Hydrachna rarispes*. Hahn. op. cit. p. 52. pl. 59. fig. 138.

ELAIS. (Elais).

Bouche ayant deux mandibules aplaties, terminées par un ongle crochu et mobile. Deux palpes allongés-coniques, subtriarticulés, arqués et pointus au sommet. Quatre yeux.

Corps arrondi-globuleux. Huit pattes.

Os mandibulis duabus depressis, apice unguis uncinato mobilique instructis. Palpi duo elongato-conici, subtriarticulati, apice arcuati, acuti. Oculi quatuor.

Corpus rotundato-globosum. Pedes octo.

(1) Voyez les observations de M. Dugès (loc. cit. p. 196). Il est probable que l'*Actysia Mannerheimi* (Audouin, Ann. des Sc. nat., 1^{re} série, t. 2. p. 497) est la nymphe de quelque autre espèce de ce genre.

OBSERVATIONS. — Les *Elaïs* ont les mandibules des Trombidions ; mais leurs palpes sont sans appendice sous leur extrémité , et leur corps , presque globuleux , n'est point divisé par un étranglement. Comme les autres Acarides , elles ont la tête , le corselet et l'abdomen confondus , sans distinction d'anneaux. Leur bouche n'offre point de suçoir comme dans les genres hydrachne et limnochare.

[Ces Acariens ont une peau molle , des palpes terminés par un doigt renflé et épineux , la bouche formée d'un trou rond et cilié situé au milieu de la base de la lèvre , des yeux très rapprochés , des hanches étroites disposées en quatre groupes fort écartés les uns des autres , et dans lesquels la troisième et la quatrième hanches ne se touchent que par leur extrémité interne ; enfin la vulve consiste en une fente longitudinale à peine bordée et dépourvue des plaques crustacées qu'on remarque chez les Diplodontes. E.

ESPÈCES.

1. *Elaïs étendue. Elaïs extendens.*

Hydrachna extendens. Mull. hydr. p. 62. n° 31. t. 9. f. 4.

Oliv. Dict. n° 11.

Trombidium extendens. Fab. Syst. 2. p. 406.

Elaïs extendens. Lat. Gen. 1. p. 153.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 1. p. 156. pl. 10. fig. 24—34.

Habite en Europe , dans les eaux stagnantes. Elle est rouge , a le corps glabre , et ses pattes postérieures restent étendues pendant la natation.

* Suivant M. Dugès , l'*Hydrachna chrysis* de M. de Théis (Ann. des sc. nat. t. 27. p. 58. pl. 1. fig. 1.) paraît appartenir à ce genre.

LIMNOCHARE. (Limnochares.)

Bouche à suçoir court , à peine saillant. Point de mandibules. Deux palpes courbés , pointus au sommet , dépourvus d'appendice.

Corps ovale, déprimé. Huit pattes; les quatre postérieures écartées.

Os rostro brevi, vix prominulo. Mandibulæ nullæ. Palpi duo incurvati, apice acuti : appendice nullo.

Corpus ovale, depressum. Pedes octo : posticis quatuor remotis.

OBSERVATIONS. — Les *Limnochares*, ayant la bouche plus imparfaite ou moins avancée en développement que celle des Hydrachnes, semblent rentrer dans le voisinage des Smaris. Ils sont, comme ces derniers, sans mandibules, et munis de palpes simples; mais ils sont aquatiques.

[M. Dugès définit ce genre de la manière suivante : Acariens de la famille des Hydrachnés (Voyez page 60), ayant les palpes très petits, filiformes et terminés par un cinquième article très petit et unguiforme; bec cylindrique et grand; corps mou; yeux rapprochés; hanches cachées sous la peau; celles des deux paires antérieures plus grandes que les autres; pieds armés de deux griffes terminales très grandes et rétractiles; larves terrestres, parasites et ne ressemblant pas aux adultes. E.

ESPÈCES.

1. Limnochare satiné. *Limnochares holosericea*.

L. corpore ovato rugoso molli; oculis duobus nigris. Lat.

Acarus aquaticus. Lin. *Trombidium aquaticum.* Fab.

Tique rouge satinée aquatique. Geoff. 2. p. 625. n° 8.

Limnochares holosericea. Latr. Gen. 1. p. 160.

Hydrachna impressa ejusd. Hist. nat., etc., 8. p. 36. pl. 67. f. 4.

* *Limnochares aquaticus.* Dugès, loc. cit. p. 159. pl. 11. f. 33—40.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes des marais. Il a les pattes courtes, et des points enfoncés sur le corps.

2. Limnochare mollasse. *Limnochares flaccida*.

L. corpore sanguineo flaccido mutabili; pedibus longis : posterioribus longioribus.

Trombidium aquaticum. Herm. Apterol. p. 35. pl. 1. f. 11.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

* M. Dugès regarde cette Arachnide comme ne différant pas spécifiquement de la précédente.

† Genre *Atace*, *Atax*.

Le nom d'*Atax*, primitivement employé par Fabricius pour désigner les Acariens auxquels Muller a donné plus tard le nom d'Hydrachnes, a été conservé par M. Dugès, mais en y donnant une acception plus restreinte. Ce naturaliste range dans le genre *Atace*, ainsi circonscrit, les Arachnides de la famille des Hydrachnés, ayant le corps ovoïde assez ferme et lisse; la fente génitale bordée de deux plaques sur chacune desquelles se montrent trois tubercules transparens, lisses, arrondis, assez gros en forme de stemmates; les hanches antérieures en partie contiguës sur la ligne médiane, serrant la lèvre entre elles et formant ainsi ensemble un groupe unique; les deux groupes des hanches postérieures écartés; la quatrième hanche extrêmement large, contiguë à toute la longueur de la troisième; des palpes dont le quatrième article est fort long, atténué, un peu excavé vers le bout pour recevoir le cinquième article dans l'extrême flexion; ce cinquième article en forme de doigt pointu; les mandibules formés d'un corps épais, creux, coupé en bec de plume à son extrémité postérieure, tronqué au bout antérieur, sur lequel s'articule et se fléchit vers le haut un grand et fort crochet ou ongle peu courbé, et fendu ou creusé en canal, pour loger en partie et soutenir cette mandibule; enfin une lèvre en cuilleron, bifide en avant. M. Dugès rapporte à ce genre les espèces suivantes.

Hydrachna histrionica. Herm. Mém. apter. p. 55. pl. 3. fig. 2. *Atax histrionicus*. Dugès. Ann. des sc. nat. 2^e série. t. 1. p. 246. pl. 10. fig. 13. *Hydrachna histrionica*. Hahn. Arach. t. 2. p. 50. pl. 59. fig. 135.

Hydrachna runica. Théis. Ann. des sc. nat. 1^{re} série. t. 27. p. 60. pl. 1. fig. 2.

Hydrachne luteicornis? Harn. Apter. pl. 6. fig. 7. *Atas luteicornis*.
Dugès, loc. cit.

† Genre DIPLODONTÉ. *Diplodontus*.

Le genre Diplodonte de M. Dugès est très voisin du précédent et a pour caractères : des mandibules offrant en opposition au crochet mobile une dent aiguë, droite et immobile; des palpes dont le quatrième article se termine par une pointe égalant le cinquième en longueur; des hanches peu larges, disposées en quatre groupes séparés et dont les postérieurs offrent entre la troisième et la quatrième hanche une demi-divergence en dehors; enfin une plaque génitale, bivalve, granulée et en forme de cône dont la pointe est dirigée en avant. On trouvera dans le Mémoire de M. Dugès des détails intéressans sur les mœurs et sur les métamorphoses d'une espèce de ce genre : le DIPLODONTÉ SCAPULAIRE (*D.-Scapularis*, Dug. Ann. des sc. nat. 2^e série, t. 1, p. 150. pl. 10, fig. 5-12). Il décrit aussi deux autres espèces nouvelles sous les noms de *D. Félipède* (Dug. loc. cit., p. 148, pl. 10, fig. 1-4), et de *D. Menteur* (loc. cit., p. 149).

† Genre ARRÉNURÉ. *Arrenurus*.

M. Dugès range dans ce genre les Hydrachnés, dont le mâle a le corps terminé par une sorte de queue; ils ont la bouche située en dessous, formée d'une lèvre petite et paraissant être percée d'un trou rond comme chez les Élaïdes dont ils se distinguent par la brièveté de leurs palpes sub-chéliformes, par leurs yeux écartés et par plusieurs autres caractères.

Le type de ce genre est l'*Arrenurus virides*. Dugès (Annales, t. 1, p. 155, pl. 10, fig. 18-23). M. Dugès y rapporte aussi l'*Hydrachna cuspidator*, Muller (op. cit.); et l'*Hydrachna albator* du même (op. cit.), dont l'*Hydrachna testudo* de Ferussac (Ann. du Museum, t.) paraît être la femelle. E.

LES PHALANGIDES.

Bouche munie de mandibules très apparentes et coudées ou composées de deux ou trois pièces : la dernière étant toujours didactyle ou en pince. Abdomen segmenté.

Comme les Acarides, les Phalangides ont le tronc et l'abdomen confondus en une seule masse, et leur tête y est intimement réunie. Mais toutes les Phalangides ont des mandibules, et ces parties de leur bouche, au lieu d'être sans articulations ou d'une seule pièce comme celles de certaines Acarides, sont coudées ou composées de deux ou trois pièces dont la dernière est toujours didactyle ou en pince. Ces mêmes mandibules sont tantôt saillantes au-devant du tronc, et tantôt ne forment point de saillie.

Les Phalangides ont deux palpes filiformes de cinq articles, dont le dernier se termine par un petit onglot; deux mâchoires formées par un prolongement de l'article inférieur des palpes; souvent aussi quatre mâchoires de plus, qui sont le produit d'une dilatation de la hanche des deux premières paires de pattes; une lèvre inférieure avec un double pharynx.

Ces Arachnides ont deux yeux distincts; le corps arrondi ou ovale avec des apparences d'anneaux ou de plis sur l'abdomen, au moins en dessous; leurs organes

sexuels placés sous la bouche; et toujours huit pattes souvent très longues. La plupart de ces animaux sont agiles, vivent à terre sur les plantes ou au bas des arbres, et quelques-uns se cachent sous les pierres. On les divise de la manière suivante.

(1) Mandibules non saillantes.

Trogule.

(2) Mandibules saillantes.

Ciron.

Faucheur.

TROGULE. (Trogulus.)

Bouche cachée sous un capuchon en saillie antérieurement. Deux mandibules coudées, biarticulées, courtes, chélifères au sommet. Palpes filiformes. Deux yeux presque sessiles, dorsaux, un peu écartés.

Corps ovale-elliptique, aplati. Huit pattes.

Os sub cucullo anticè prominente textum. Mandibulae duae breves, geniculatae, biarticulatae, apice chelatae. Palpi filiformes. Oculi duo subsessiles, dorsales, remotiusculi.

Corpus ovato-ellipticum, depressum. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Le Trogule, type d'un genre établi par M. Latreille, et dont on ne connaît encore qu'une espèce, est remarquable par l'extrémité antérieure du corps, qui s'avance sous la forme d'un capuchon, et recouvre ou reçoit dans sa cavité les différentes parties de la bouche. Ce capuchon, un peu étroit, s'avance comme un bec obtus ou tronqué.

ESPÈCE.

1. Trogule népiforme. *Trogulus nepæformis*.

Lat. Gen. 1. p. 141. tab. 6. f. 1.

Phalangium tricinatum. Lin.

Phalangium carinatum. Fab. Syst. 2. p. 431.

Habitat le midi de la France, l'Espagne, sous les pierres.

† CÆCULE. (Ceculus.)

M. Léon Dufour a établi sous ce nom un genre nouveau qui prend place auprès des Trogules et qui établit le passage entre ces Arachnides et les Acariens. La bouche des Cæcules est tout-à-fait inférieure et placée dans le chaperon comme chez les Trogules : on y voit une lèvre inférieure demi circulaire et deux mandibules qui paraissent être terminées par un seul crochet ; mais on n'y a pas trouvé de palpes. Il n'y a pas d'yeux distincts. Le corps est ovalaire, déprimé, glabre, et garni en dessus d'une plaque qui représente une sorte de corselet. Enfin les pattes, au nombre de huit, sont uniquement ambulatories, de longueur médiocre et terminées par un tarse uniarticulé, armé de deux ongles simples : le type de ce genre est le CÆCULE PIEDS HÉRISSEZ, *C. Echinipes*, L. Dufour, Ann. des sc. nat. 1^{re} série, t. 25, p. 296, pl. 9, fig. 1-3. E.

OTRION. (Siro.)

Bouche à découvert. Deux mandibules grêles, biarticulées, saillantes, presque de la longueur du corps, en pince au sommet. Deux palpes très grêles, saillans, à cinq articles. Deux yeux écartés, tantôt pédonculés, tantôt sessiles.

Corps ovale. Huit pattes.

Os detectum. Mandibulae duae graciles, biarticulae, exsertae, longitudine ferè corporis, apice chelatae. Palpi

duo gracillimi, exserti, quinque articulati. Oculi duo inter se distantes, modò pedunculo impositi, modò sessiles.

Corpus ovatum. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Les *Cirons*, comme les *Trogules*, appartiennent sans doute aux *Phalangides*, puisque leurs mandibules sont biarticulées, néanmoins par la forme de leur corps et par leur petite taille, en général, même par leurs pattes de longueur médiocre, ils semblent tenir encore aux *Acarides*. Les mandibules et les palpes très longs des *Cirons* les distinguent facilement des *Trogules*. Ils ont deux mâchoires étroites.

1. *Ciron rougeâtre. Siro rubens.*

S. pallide ruber; pedibus dilatioribus breviusculis.

* *Siro rubens*. Latr. Ges. 1. p. 143. tab. 6. f. 2.

Ejusd. Hist. nat., etc., vol. 7. p. 329.

* *Ejusd.* Règ. anim. t. 4. p. 182.

Habite en France, au pied des arbres, entre les mousses.

2. *Ciron crassipède. Siro crassipes.*

S. castaneus; pedibus secundi paris crassioribus.

Acarus crassipes. Herm. Apterol. p. 80. pl. 3. f. 6 et pl. 9. fig. 9.

* Griffith. Anim. Kingd. arach. pl. 25. fig. 5.

Habite en Europe, entre les mousses.

3. *Ciron testudinaire. Siro testudinarius.*

S. castaneus, depressus; pedibus primi paris longissimis.

Acarus testudinarius. Herm. apter. p. 80. pl. 9. f. 1.

* *Gamasus testudinarius* Dugès. Ann. des Sc. nat. 2, série, t. 2. p. 27.

Habite en Allemagne, sous le lichen d'Islande.

FAUCHEUR. (Phalangium.)

Deux mandibules grêles, coudées, saillantes, plus courtes que le corps, en pince au sommet. Deux palpes filiformes, simples, de cinq articles : le dernier en crochet. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux posés sur un tubercule commun.

Corps suborbiculaire, à tête, corselet et abdomen réunis, à peine distincts. Huit pattes grêles et fort longues.

Mandibulæ duæ graciles, fractæ, exsertæ, corpore breviores, apice chelatæ. Palpi duo filiformes, simplices, quinque articulati : articulo ultimo uncinato. Maxillis pluribus paribus. Oculi duo dorsales tuberculo communi impositi.

Corpus suborbiculare : capite thorace abdomineque coadunatis, vix distinctis. Pedes octo graciles, prælongi.

OBSERVATIONS. — Par leur aspect, les *Faucheurs* rappellent l'idée des Araignées, et en ont toujours été rapprochés ; mais on les en distingue facilement, d'abord par leur corps subglobuleux ou orbiculaire, et parce que leur corselet n'est point séparé de l'abdomen d'une manière distincte. Ils n'ont d'ailleurs que deux yeux qui sont fort rapprochés et élevés sur un tubercule qui semble dorsal. Leurs pattes, longues et grêles, donnent encore des signes d'irritabilité quelque temps après qu'on les a arrachées. Ils ont, en général, leurs tarsi grêles et multiarticulés.

Les faucheurs ne filent point, vivent de proie, et se rencontrent par terre, sur les plantes et sur les murs.

[Le genre *Phalangium* a été beaucoup subdivisé par les Entomologistes modernes ; Kirby n'y a conservé que les espèces dont les palpes sont filiformes et sans épines, les pattes rapprochées et à hanches semblables et contiguës à leur naissance, le corps ovoïde ou orbiculaire, et l'abdomen lisse. Cette réforme a été adoptée par Latreille et par Perty ; qui a publié dans l'ouvrage de Spix et Martius sur le Brésil, un travail considérable sur les Phalangides. E.

ESPÈCE.

1. Faucheur des murailles. *Phalangium opilio*.

Ph. corpore ovato, griseo-rufescente, subtilius albo; tuberculo oculifero spinulis coronato.

Phalangium cornutum. Lin. Fab. Syst. 2. p. 430. masc.

Phalangium opilio. Lin. Fab. Syst. 2. p. 429. (femina.)

Phalangium opilio. Lat. Gen. 1. p. 137.

Le faucheur. Geoff. 2. p. 627. pl. 20. f. 6. a. o. *mar.*, p. *femina*.

* Latreille. Biographie des faucheurs. p. 377. — Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 281.

* *Phal. cernatum*. Hermann. Mem. apterol. p. 98. pl. 7. fig. o. P. Q. et pl. 9. f. K; *Ph. parietinum* (*fem.*) p. 102. pl. 8. f. 6. U.

Trochireus. Vermischteschriften B. 1. t. 1. f. 1-5.

* Perty. Delectus animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt Spix et Martius. p. 203.

Habite en Europe. Fort commun.

2. Faucheur rond. *Phalangium rotundum*.

Ph. corpore orbiculato-ovali, supra rufescente, tuberculo oculifero lavi.

Phalangium rotundum. Lat. Gen. 1. p. 139.

Phalangium rufum. Herm. Aptérol. p. 109. pl. 8. f. 1.

* Perty. pl. 203.

Habite en France, dans les bois, les lieux couverts.

3. Faucheur à quatre dents. *Phalangium quadridentatum*.

Ph. corpore ovali, depresso, obscure cinereo; tuberculo oculifero basi tantum spinoso.

Phalangium quadridentatum. Fab. Suppl. p. 293.

Phalangium quadridentatum. Lat. Gen. 1. p. 140.

* Herb. 3^e part. p. 13.

* Léon Dufour. Ann. des Sc. nat. t. 22. p. 382.

* Perty. op. cit. p. 402.

Habite en France, sous les pierres.

Etc.

† Ajoutez plusieurs espèces décrites et figurées par Herbst, par M. Savigny, dans le grand ouvrage sur l'Égypte (Arach. pl. 9.) par Léon Dufour, dans les Annales des Sciences naturelles (1^{re} série, t. 22.) etc. par Griffith dans sa traduction anglaise du Règne animal de Cuvier.

[Plusieurs genres nouveaux ont été établis aux dépens des Arachnides qui, dans la classification de Lamarck, rentreraient dans la division des Faucheurs; tels sont les groupes suivans.

et épineux ou tuberculeux en arrière, enfin dont les pattes sont inégales, les postérieures éloignées des autres, et les hanches mutiques.

Esp. *Eusarcus grandis*. Perty. op. cit. p. 206. pl. 40. fig. 2.

Eusarcus pumilio. Perty. p. 203.

† Genre STYGNE. *Stygnus*.

Enfin le genre *Stygnus* du même offre les caractères suivans : palpes épineux, mandibules grandes et épaisses, pattes inégales, les postérieures éloignées des autres, et les hanches renflées vers le bout et légèrement épineuses ; céphalothorax épineux en arrière, abdomen en majeure partie caché par le céphalothorax.

Esp. *Stygnus armatus*. Perty. p. 207. pl. 40. fig. 3.

E.

LES PYCNOGONIDES.

Corps allongé, partagé en quatre segmens distincts. Huit pattes pour la locomotion dans les deux sexes ; en outre, dans les femelles, deux fausses pattes pour porter les œufs. Quatre yeux lisses, situés sur un tubercule.

Les Pycnogonides forment, parmi les Arachnides exantennées trachéales, une petite famille très singulière, qui tient d'une part aux Faucheurs avec lesquels Linné l'avait réunie, et de l'autre, qui semble se rapprocher par ses rapports, de certains Crustacés, tels que les Cyames et les Chevroles. Effectivement, au lieu d'être intermédiaires entre les Faucheurs et les Faux-Scorpions, les Pycnogonides nous paraissent présenter un rameau latéral, avoisinant les Faucheurs, et qui se dirige vers les Crustacés

qui viennent d'être cités; mais il ne s'ensuit pas que ce soit de ce rameau que les Crustacés tirent leur origine.

Ces singulières Arachnides vivent dans la mer. Leur corps est allongé, linéaire, divisé en quatre segmens distincts, dont le premier, qui tient lieu de tête, se termine par une bouche tubulaire avancée, ayant au moins des palpes et souvent aussi des mandibules. Ce premier segment offre sur le dos un tubercule portant, de chaque côté, deux yeux lisses. Le dernier segment du corps est petit, et se termine en cylindre percé d'un petit trou à son extrémité. Comme ces animaux n'offrent point de stigmates particuliers, c'est probablement par l'extrémité postérieure du corps (1) qu'ils respirent.

[Les Pycnogonides nous paraissent avoir plus d'analogie avec les Crustacés qu'avec les Arachnides, et nous croyons que c'est dans la classe formée par les premiers, qu'il faudrait les ranger. C'est aussi l'opinion de M. Walckenaer, qui a décrit avec soin la structure extérieure de quelques-uns de ces animaux (Voyez ses mémoires sur les animaux sans vertèbres, première partie), et nous avons signalé une particularité remarquable dans la conformation de leur tube digestif (Voyez le Règne animal de Cuvier, t. 4. p. 277, note). E.

Les Pycnogonides se trouvent parmi les plantes marines, quelquefois sous les pierres près des rivages, quelquefois aussi sur des cétacés. On n'en connaît encore que les trois genres suivans.

HYMPHON. (Nymphon.)

Bouche ayant un tube avancé, cylindracé-conique,

(1) Ou plutôt par la peau.

tronqué, à ouverture triangulaire. Deux mandibules bi-articulées, terminées en pince. Deux palpes à cinq articles. Quatre yeux.

Corps étroit, linéaire, divisé en quatre segments. Huit pattes très longues dans les mâles; dix pattes dans les femelles, dont deux fausses et ovifères.

Os tubo porrecto, cylindraceo-conico, truncato; apertura triangulari. Mandibulae duae biarticulae, apice chelatae, Palpi duo, quinquearticulati. Oculi quatuor.

Corpus angustum, lineare, segmentis quatuor divisum. Pedes longissimi: octo in masculis, decem in feminis, quorum duo spurii, oviferi.

OBSERVATIONS. — Quelque singulière que soit la forme des *Nymphons*, ce sont de véritables Arachnides, ayant de l'analogie avec les Faucheurs, ce qu'indiquent leurs yeux lisses, posés sur un tubercule commun. Comme ces animaux ont des pattes très longues et sont aquatiques, leurs mouvemens ne peuvent être que forts lents.

ESPÈCES.

1. *Nymphon grossipède. Nymphum grossipes.*

N. corpore glabro; pedibus longissimis. Lat.

Phalangium grossipes. Lin.

Nymphum grossipes. Fab. Syst. ent. 4. p. 417.

Pycnogonum grossipes. Mull. Zool. dan. tab. 119. f. 5-9.

Oth. Fab. *Fauna groenl.* p. 229.

* *Nymphon grossipède.* Lat. Hist. nat., etc., 7. p. 333. pl. 65. f. 2.

* *Nymphon grossipes*, Savigny: Mém. sur les animaux sans vertèbres, première partie, p. 55. pl. 5. fig. 2.

* Sabine. Append. du voyage du cap Parry. p. 47.

Habite la mer de Norwège (et nos côtes).

OBSERV. Le *nymphum gracile*, Leach, *Arach. cephalost.*, pl. 23. (* zool. miscel. t. 1. pl. 19. fig. 1. Latreille. Encyclop. pl. 337. fig. 5. Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 21. fig. 4.) et son *Amatheca caroliniensis*, ibid. (* zool. miscel., t. 1. pl. 13. Lat. Encyclop. pl. 351, fig. 5) paraissent être deux espèces de notre genre. (1)

(1) C'est dans le volume du *Zoological miscellany* que

PHOXICHILE. (Phoxichilus.)

Bouche ayant un tube avancé, subconique, et à deux mandibules, soit en griffes, soit didactyles. Point de palpes. Quatre yeux lisses.

Corps sublinéaire, divisé en quatre segmens. Huit pattes très longues dans les deux sexes. Dans les femelles deux petites pattes de plus, repliées en dessous.

Os tubo porrecto, subconico, mandibulisque duabus vel unguiculatis, vel chelatis. Palpi nulli. Oculi quatuor simplices.

Corpus sublineare, segmentis quatuor divisum. Pedes octo longissimi in utroque sexu; duo præterea parvuli spurii subtus inflexi in feminis.

OBSERVATIONS. — Les *Phoxichiles* ne paraissent différer des *Nymphons* que parce qu'ils n'ont point de palpes. Ils ont aussi leurs pattes locomotrices fort longues; mais dans les espèces observées, ces pattes sont hérissées de poils ou de spinules. Dans une espèce, peut-être ce qu'on nomme des mandibules ne sont que des palpes; dans ce cas, les *Phoxichiles* offriraient, soit des palpes sans mandibules, soit des mandibules sans palpes, et leur genre serait toujours distinct.

ESPÈCES.

1. *Phoxichile spinipède. Phoxichilus spinipes.*

Ph. corpore glabro; mandibulis biarticulatis cheliferis; pedibus longioribus spinosis.

Pycnogonum spinipes. Osh. Fab. *Fauna groenl.* p. 2321

Leach a publié ces deux espèces de *Pycnogonides*; son genre *Ammonothea* diffère de celui des *Nymphons*, en ce que les appendices chélifères, situés de chaque côté de la bouche, sont plus courts que le bec; et ont le premier article très petit. E

Phalangium aculeatum. Montagu. Act. soc. Linn. 9. p. 100. tab. 5. f. 8.

An nymphum hirtum? Fab. Syst. ent. 4. p. 417.

* Sabine. op. cit. p. 48.

Habite la mer de Norwège, près des rivages. Cette espèce paraît avoir de véritables mandibules sans palpes.

2. Phoxichile monodactyle. *Phoxichilus monodactylus*.

Ph. corpore glabro; mandibulis articulatis ungulo unico terminatis; pedibus longis spinosis.

Phalangium spinosum. Mont. Act. soc. Linn. 9. p. 101. tab. 5. f. 7.

Habite l'Océan boréal. Les mandibules ici ont plus de deux articles ne sont point en pince, et semblent palpiformes. Ce ne peut être un des *nymphum* de Fabricius, d'après son caractère générique.

* Ajoutez le

Phoxichilus proboscideus. Sabine. op. cit. p. 48.

PYCNOGONON. (Pycnogonum.)

Bouche à tube simple, conique, tronqué, avancé; n'ayant ni mandibules, ni palpes distincts. Quatre yeux lisses, rapprochés.

Corps allongé, un peu épais, rétréci postérieurement, divisé en quatre segmens : le dernier plus allongé. Huit pattes pour la locomotion, à peine plus longues que le corps.

Os tubulo simplici conico truncato porrecto; mandibulis palpisque nullis distinctis. Oculi quatuor simplices congesti.

Corpus elongatum, crassiusculum, posticè angustatum, segmentis quatuor divisum : ultimo longiore. Pedes octo gressorii, corpore vix longiores.

OBSERVATIONS. — Le *Pycnogonon*, qu'on a d'abord regardé comme un pou, que Linné ensuite a rangé parmi ses *Phalangium*, ressemble au cyamé par son aspect, et appartient néanmoins aux *Pycnogonides*, parmi lesquelles il constitue un genre très distinct.

ESPECES.

1. Pycnogonon des baleines. *Pycnogonum balænarum*.

Lat. Gen. 1. p. 144.

Fab. Ent. syst. 4. p. 416.

Mull. Zool. dan. 119. 10—12. *femina*.

Leach. Arachn. cephaloa. pl. 23.

Phalangium balanarum. Lin.

Habite l'Océan européen, près des côtes, sous les pierres, et se trouve sur les balcons.

LES FAUX-SCORPIONS.

Le dessus du corps partagé en trois segmens, dont l'antérieur est plus grand et en forme de corselet. Abdomen très distinct et annelé. Deux mandibules en pince. Deux palpes très grands, en forme, soit de pattes, soit de bras chélifères.

Les Faux-Scorpions tiennent autant aux Phalangides que les Pycnogonides; mais ils continuent la série, et semblent, par leurs grands palpes, annoncer le voisinage des Pédipalpes dont les Scorpions font partie.

Les Arachnides dont il s'agit se distinguent facilement des Phalangides, parce qu'elles ont l'abdomen bien distinct du corselet. Elles n'ont point, comme les Pycnogonides, le corps linéaire, partagé en quatre segmens, et deux fausses pattes dans les femelles. Leurs yeux sont au nombre de deux ou de quatre.

Ces animaux sont terrestres, courent avec agilité, et ont la morsure venimeuse, ou au moins malfaisante. On n'en connaît que les deux genres suivans.

GALÉODE. (*Galeodes*.)

Deux mandibules très grandes, avancées, droites, terminées par de grandes pinces. Deux palpes filiformes, pé-

diformes, plus longs que les mandibules, obtus et sans crochets à leur extrémité. Deux mâchoires. Lèvre inférieure ou langue sternale un peu saillante entre les mâchoires. Deux yeux sur un tubercule du corselet.

Corps oblong, mou, velu. Abdomen distinct. Huit pattes : les deux antérieures sans crochets.

Mandibulae duae maximae, porrectae, subparallelae, chelis validissimis terminatae. Palpi duo filiformes, pediformes, mandibulis longiores, apice obtusi exungulati. Maxillae duae. Labium (lingua sternalis, Sav.) inter maxillas subinsertum. Oculi duo thoracis tuberculo impositi.

Corpus oblongum, molle, villosum; abdomine distincto. Pedes octo : duobus anticis apice muticis.

OBSERVATIONS. Le genre des *Galéodes*, établi par Olivier embrasse des Arachnides fort remarquables par les deux mandibules grandes et épaisses qui s'avancent antérieurement, et par leurs palpes, qui ressemblent à des pattes antérieures. À l'aspect de ces animaux, on leur attribuerait dix pattes, dont les quatre antérieures seraient sans crochets; mais les deux prétendues pattes antérieures sont de véritables palpes. La pince qui termine chaque mandibule est formée de deux doigts cornés, dentés au côté interne. Les pattes de ces animaux sont longues, un peu grêles, et, sauf la première paire, leur tarse est terminé par deux crochets. On observe un stigmate de chaque côté du corps, près de la seconde paire de pattes.

Les *Galéodes* effraient par leur figure hideuse, et surtout par leur vivacité à courir; il est probable que leur morsure est très venimeuse. On les trouve dans les lieux sablonneux des pays chauds de l'ancien continent.

ESPECES.

1. Galéode aranéoïde. *Galeodes araneoides*.

G. villosus, cinereo-flavescens; abdomine glabro.

Phalangium araneoides. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. p. 37. tab. 3. f.

Galeode aranéide. Oliv. Encycl. n. 2.

Lat. Gen. 1. p. 135. et Hist. nat. etc., vol. 7. p. 312. pl. 65. f. c.

Solpuga araneoides. Fab. Syst. ent. suppl. p. 294.

* Herbst. t. 1. p. 371. fig. 2.

* Audouin. Dict. classiq. d'hist. nat. t. 9. p. 118. pl. 67. fig. 5 et 6.

* Savigny. Arachn. de l'Egypte. pl. 8. fig. 7.

* Hahn. Arachnides. pl. 73. fig. 164 et 74. fig. 165.

* *Solpuga arachnoide*. Walckenaer. Ins. apt. pl. 26. f. 41.

Habite le Cap de Bonne-Espérance, et dans le Levant. On la dit très venimeuse.

2. *Galeode fatale*. *Galeodes fatalis*.

G. chelis horizontalibus; abdomine depresso villosio.

Solpuga fatalis. Fab. Syst. ent. suppl. p. 293.

Herbst. Monogr. sup. t. 1. f. 1.

Habite au Bengale.

3. *Galeode chélicorne*. *Galeodes chelicornis*.

G. chelis verticalibus cirrhiferis; abdomine lanceolato villosissimo.

Solpuga chelicornis. Fab. Syst. ent. p. 294.

An galeodes setigera? Oliv. Encyc. n. 2.

Habite l'île d'Amboine.

Ajouter :

* *Galeodes dorsalis*. Latreille; *G. intrépide*, Léon Dufour. Ann. des Sc. physiq. de Bruxelles. t. 4. p. 370. pl. 69 fig. 17.

* *Solpuga melanus*. Oliv. Voy. dans l'empire ottoman. pl. 42. fig. 5.
Savigny. Arachn. de l'Egypte. pl. 8. fig. 9.

* *Galeodes spinipalpis*. Griffith. Règne anim. Arach. pl. 1. fig. 4.
Guérin. Iconogr. Arach. pl. 3. fig. 4.

Et plusieurs espèces figurées par M. Savigny, dans le grand ouvrage sur l'Egypte, par M. Walckenaer dans son Hist. des insectes aptères. p. 27. etc.

PINCE. (Chélier.)

Mandibules courtes, didactyles au sommet. Deux palpes très longs, à cinq articles, coudés, en forme de bras, chélifères à leur extrémité. Deux mâchoires conniventes. Deux ou quatre yeux placés sur les côtés du corselet.

Corps ovale, rétréci en pointe antérieurement, aplati;

ayant l'abdomen annelé. Huit pattes, à tarsi terminés par deux crochets.

Mandibulæ breves, apice didactylæ. Palpi duo longissimi, quinque articulati, fracti, brachiiformes, apice cheliferi. Maxillæ duæ conniventes. Oculi duo aut quatuor thoracis lateribus inserti.

Corpus ovatum, anticè angustato-acutum, depressum; abdomine annulato. Pedes octo, tarsi biungulatis.

OBSERVATIONS. — Les *Pinces* sont de petites Arachnides que l'on placerait parmi les Pédipalpes, si elles respiraient par des branchies. On les prendrait pour de petits Scorpions sans queue, ayant, comme les Scorpions, deux grands bras avancés, terminés en pince. Ces petites Arachnides courent assez vite, et souvent vont de côté ou à reculons comme les crabes. On les trouve sur les pierres, les écorces d'arbres et dans les maisons, entre les vieux papiers, les vieux meubles, où elles se nourrissent d'insectes.

[A l'exemple de Hermann, on a divisé ce genre en deux groupes : les CHÉLIFÈRES proprement dits, qui ont le corps déprimé, deux yeux, les tarsi d'un seul article, etc.; et les OBISIENS (*Obisium*, Leach) qui ont le corps subcylindrique, quatre yeux, les tarsi biarticulés, etc. E.

ESPECES.

1. Pince cancroïde. *Chelifer cancroides*.

Ch. thorace lineâ transversâ impressâ bipartito; abdomine glabro Phalangium cancroides. Lin.

Geoff. 2. p. 618.

Chelifer. Scorpion araignée. Lat. Gen. 1. p. 132. n° 1.

Pince cancroïde. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 141. pl. 61. f. 2.

Scorpio cancroïdes. Fab. Syst. ent. 2. p. 436.

* *Obisic cancroïde. Walckenaer. Faune. Paris. t. 2. p. 252.*

* Trewiranus. op. cit. t. 1. pl. 2. fig. 6, 7.

* *Chelifer cancroïdes. Duméril. Dict. des Sc. nat. Insec. pl. 56. No 47.*

* Guérin. Encyclop. t. 10. p. 132.

* De Théis. Ann. des Sc. nat. t. 27. p. 69. pl. 3. fig. 1.

* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 25. fig. 2.

Habite en Europe, dans les maisons, etc. Espèce commune.

2. Pince fasciée. *Chelifer fasciatus*.

Ch. thorace lined transversé subdiviso; abdomine pilis spatulatis transversé fasciato; chelis basi turgidis.

Chelifer fasciatus. Leach. Arachn. cephalost. pl. 23.

Scorpio hispidus. Natur. hist. 5. tab. 6. fig. F.

* Encyclop. brit. Sup. pl. 22.

* *Chelifer Geoffroy*. Leach. Zool. misc. t. 3. p. 50. pl. 142. fig. 1.

* Hahn. Arach. t. 2. pl. 60. fig. 139.

Habite en Europe.

3. Pince cimicoïde. *Chelifer cimicoides*.

Ch. thorace lined transversé diviso; brachiis mediocribus; chelis ovatis.

Scorpio cimicoides. Fab. Syst. ent. 2. p. 436.

Herm. Aptérol. pl. 7. f. 9.

Chelifer cimicoides. Latr. Gen. 1. p. 133.

* Guérin. Encyclop. t. 10. p. 132.

Habite en Europe, sous les pierres, les écorces.

Etc. V. l'*Obisium trombidioïdes*. Leach. Arach. cephalost. pl. 23. (1)

Voyez aussi le *Chelifer trombidioïdes*. Lat. Gen. 1. p. 133.

† Ajoutez :

* *Chelifer Herm.* Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 49. pl. 142. fig. 3.

* *Chelifer Latreillii*. Leach. loc. cit. fig. 5.

* *Chelifer Offerii*. Leach. loc. cit. pl. 142. fig. 2.

* *Chelifer muscorum*. Leach. loc. cit. pl. 142. fig. 4. — De Theis. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 27. p. 66. pl. 1. fig. 4.

* *Chelifer scorpioïdes*. De Theis. loc. cit. p. 73. pl. 3. fig. 2.

* *Chelifer parasita*. Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 26. fig. 1.

* *Chelifer nepoïdes*. Herm. Aptér. p. 116. pl. 5. fig. Q. — De Theis. loc. cit. pl. 3. fig. 3.

* *Chelifer izoïdes*. Hahn. op. cit. p. 53. pl. 60. fig. 140.

(1) C'est probablement le supplément de l'*Encyclopedia Britannica* que Lamarck a voulu citer ici. Leach a donné plus tard à la même espèce le nom d'*Obisium orthodactylum* (Zool. Miscel. vol. 3. p. 51. pl. 141. fig. 2.) et y rapporte le *Chelifer trombidioïdes* de Latreille, ainsi que le *Chel. ischnocheles* de Hermann (Aptérol. p. 118. pl. 6 fig. 14.) M. de Théis a donné une description détaillée de cette espèce dans les Annales des Sciences Naturelles, t. 27, p. 63. (pl. 1, fig. 3.) E

ORDRE PREMIER.

ARACHNIDES EXANTENNÉES-BRANCHIALES.

Point d'antennes. Des poches branchiales pour la respiration. Six à huit yeux lisses.

Dans les Arachnides de cet ordre, l'organisation a obtenu un avancement bien plus grand encore que dans celle des ordres précédens, et la différence est si grande que l'on pourrait être tenté d'en former une classe. En effet, non-seulement ces animaux respirent par de véritables branchies, et n'offrent plus de trachées sous quelque forme que ce soit (1); mais ils possèdent un système de circulation déjà éminemment ébauché, puisqu'on leur observe un cœur allongé, dorsal et contractile, d'où partent, de chaque côté, des vaisseaux divers.

Deux à huit ouvertures stigmatiformes, situées sous le ventre de l'animal, donnent entrée au fluide respiratoire, qui pénètre dans autant de petites poches particulières; et comme les parois intérieures de ces poches sont munies de petites lames saillantes et vasculifères, le sang y vient recevoir l'influence de la respiration. Ce sont là les branchies de ces Arachnides, et l'on sait que le propre de cet organe respiratoire, partout si diversifié dans sa forme,

(1) Quelquefois il existe chez ces animaux des trachées en même temps que des poches branchiales. Voyez les Observations de M. Dugès consignées dans la nouvelle édition du Règne animal de Cuvier. Arachnides. pl. 4.



est de pouvoir s'accommoder à respirer, soit l'eau, soit l'air même.

La bouche des Arachnides exantennées-branchiales offre toujours deux mandibules, deux mâchoires, deux palpes et une lèvre. Leur tête se confond avec la partie antérieure du tronc, et leurs pattes sont au nombre de huit.

Ces animaux vivent de proie, ont un aspect hideux, et leur morsure ou leur piqure, toujours plus ou moins malfaisante, est, dans certaines espèces, surtout dans les pays chauds, susceptible de produire des accidens graves.

On divise cet ordre en deux sections, qui constituent deux familles particulières, savoir :

I^{re} Sect. Les Pédipalpes ou les Scorpionides.

II^e Sect. Les Fileuses ou les Aranéides.

Troisième Section.

LES PÉDIPALPES ou SCORPIONIDES.

Deux palpes très grands, en forme de bras avancés, terminés en pince ou en griffe. Abdomen à anneaux distincts, dépourvu de filière. Organes sexuels situés à la base du ventre.

Les Pédipalpes ont été aussi nommés Scorpionides, parce qu'ils comprennent le genre des Scorpions et qu'ils y tiennent par plusieurs rapports. Ces Arachnides, fort remarquables par leurs grands palpes qui s'avancent en forme de bras, paraissent avoisiner les Aranéides par leurs rapports; mais elles s'en distinguent toutes, parce que leurs palpes ne portent jamais les organes sexuels mâles,

qu'elles ne filent point, qu'elles manquent effectivement de filière; enfin, parce que leur abdomen est distinctement annelé. Comme elles ont plus de quatre yeux, on ne les confondra point avec les Faux-Scorpions qui ont, comme elles, des palpes grands et avancés.

Ces Arachnides sont très suspectes, et l'on a lieu de craindre leur morsure ou leur piqure. Parmi elles, on distingue les genres Scorpion, Thélyphone et Phryné : en voici l'exposition.

SCORPION. (Scorpio.)

Deux palpes grands, épais, en forme de bras, à dernier article plus épais et en pince. Mandibules courtes, droites et aussi en pince. Mâchoires courtes, arrondies. Six ou huit yeux.

Corps oblong, divisé en plusieurs segmens, et muni postérieurement d'une queue allongée, noueuse, terminée par un aiguillon arqué. Deux lames pectinées et mobiles, insérées sous le ventre à la base de l'abdomen. Huit stigmates : quatre de chaque côté. Huit pattes.

Palpi duo magni, crassi, brachia æmulantes : articulo ultimo crassiore, chelato. Mandibulæ breves, rectæ, chelatae. Maxillæ breves, rotundatæ. Oculi sex aut octo.

Corpus oblongum, segmentis pluribus divisum, posticè caudatum : caudâ elongatâ, nodosâ, aculeo arcuato terminatâ. Laminæ duæ pectinatæ, mobiles, infrâ basim abdominis insertæ. Stigmata octo : utrinque quatuor. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Aucun genre n'est plus remarquable que celui des Scorpions ; les espèces qu'il comprend sont aux autres Arachnides branchiales ce que les Ecrevisses sont par leur figure aux crustacés brachiures. Aussi, de même que les Ara-

néides ou les Arachnides fileuses rappellent la figure des crabes, de même les Scorpions rappellent, en quelque sorte, celle des Ecrevisses. Néanmoins, les Scorpions sont des animaux hideux, toujours à craindre, dangereux, surtout dans les climats très chauds, par la piqure qu'ils peuvent faire avec l'aiguillon dont leur queue est armée. En effet, on observe sous l'extrémité de cet aiguillon deux petits trous servant d'issue à une liqueur venimeuse.

Les Scorpions ont le corps allongé ; le corselet composé de quelques plaques, dont l'antérieure, plus grande, est échancrée antérieurement ; l'abdomen annelé ; la queue plus longue et plus étroite que l'abdomen. Leurs yeux sont situés de manière qu'il y en a deux ou trois de chaque côté sur le bord antérieur du corselet, et deux plus gros que les autres, rapprochés et placés sur le milieu de ce corselet. Les deux peignes, situés près de la naissance du ventre, varient dans le nombre de leurs dents, selon les espèces. (1)

Ces animaux sont très carnassiers, saisissent avec leurs serres les cloportes et les insectes qu'ils rencontrent, les piquent avec l'aiguillon de leur queue, et les font passer entre leurs mandibules pour les dévorer. On les trouve à terre, sous les pierres ou d'autres corps et dans l'intérieur des maisons, se cachant sous des meubles, et fuyant la lumière. On n'en voit point dans les pays froids de l'Europe, mais seulement dans ses régions australes et en Afrique, etc.

[Ce groupe naturel a été subdivisé par Leach, et plus récemment par MM. Ehrenberg et Hemprick, d'après le nombre des yeux ; ces naturalistes ne conservent le nom générique de *Scorpions* qu'aux espèces pourvues de six yeux, et donnent le nom de *Buthus* à celles qui en ont huit ; les Scorpionides qui ont dix yeux constituent le genre *Centruus* ; enfin MM. Ehrenberg et Hemprick désignent sous le nom d'*Androctonus* les espèces portant douze yeux. Ces caractères ne paraissent pas

(1) Pour plus de détails sur l'organisation des Scorpions, voyez les Mémoires de Tréviranus (*Vermischte Schriften*) de M. Léon Dufour Journal de Physique, 1817.) etc. E.

coïncider avec des différences importantes dans l'ensemble de l'organisation, et ne méritent peut-être pas de servir de base pour l'établissement de divisions génériques. E.

ESPÈCES.

1. Scorpion d'Afrique. *Scorpio afer*.

S. nigricans; *pectinibus tredecimdentatis*; *manibus subcordatis sexbris pilosis*; *oculis octo*.

Scorpio afer. Lin. Fab. syst. ent. 2. p. 434.

* Roes. Ins. 3. tab. 65. Séba. Mus. 1. t. 70. f. 1. 4.

Latr. Hist. nat., etc., vol. 7. p. 120. pl. 60. f. 1.

Ejusd. Encyclop. pl. 262. fig. 1.

* Règne anim. t. 4. p. 270. etc.

* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 1. fig. 2.

* Guérin. Iconograph. Arach. pl. 3. fig. 2.

* *Buthus afer*. Koch. Arachnides (suite de l'ouvrage de Hahn.) t. 3. pl. 17. pl. 79. fig. 175.

Habite en Afrique et dans les Grandes Indes. C'est la plus grande des espèces.

2. Scorpion d'Europe. *Scorpio europæus*.

S. fuscus; *pectinibus novem dentatis*; *manibus unguulatis*; *oculis sex*.

Scorpio europæus. Lin. Fab. syst. 2. p. 435.

Latr. Gen. 1. p. 130.

* Ejusd. Encyclop. pl. 262. fig. 4. Règne anim. t. 4. p. 270.

Herbst. naturg. skorp. tab. 3. f. 1-2.

Habite l'Europe australe.

3. Scorpion jaunâtre. *Scorpio occitanus*.

S. flavescens; *pectinibus viginti octo dentibus*; *caudâ corpore longiore, lineis elevatis instructâ*.

Scorpio occitanus. Amor. Lat. gen. 1. p. 132.

Scorpio tunetanus. Herbst. nat. skorp. t. 3. f. 3.

* *Scorpio occitanus*. L. Dufour. Journ. de physiq. 1817.

* Leach. Edimb. Encycl. t. 7. p. 428.

* *Buthus occitanus*. Ejusd. zool. mis. t. 3. p. 53. pl. 143.

Habite l'Europe australe, l'Espagne, la Barbarie. Il n'a que six yeux.

4. Scorpion à bandes. *Scorpio fasciatus*.

S. abbreviatus; dorso fasciis albis fuscisque variegato; pectinibus octodentatis, oculis septem; caudâ gracili, abdomine brevioris.

Habite aux environs de Cette, en Languedoc. Cette espèce, bien distincte du Scorpion d'Europe, semble avoir des rapports avec le *S. maurus* de Fabricius. L'animal a trois petits yeux en ligne transverse sur le milieu du corselet, et deux de chaque côté. Son dos présente quatorze bandes transverses, les unes très brunes, et les autres blanches; celles-ci sont un peu moins larges. Le corps est blanchâtre en dessous; chaque pince a huit dents.

Etc.

Ajoutez :

- * *Scorpio bahiensis*. Perty. Delectus. p. 200. pl. 39. fig. 11.
- * *Buthus palmatus*. Hempr. et Ehrenb. symbol. physica. Animalia articulata. Arach. pl. 1. fig. 1.
- * *Buthus spinifer*. Eorundem. loc. cit. pl. 1. fig. 2.
- * *Buthus filum*. Eorum. loc. cit. pl. 3. fig. 3.
- * *Androctonus quinquestriatus*. Eorundem loc. cit. pl. 1. fig. 5.
- * *Androctonus tunetanus*. Eorund. loc. cit.—*S. tunetanus*? Herbst. 111. fig. 3. *S. oceanicus*? Andouin, Savigny. Egypte. Arach. pl. 8. fig. 1.
- * *Androctonus macrocentrus*. Hem. et Ehren. loc. cit. pl. 1. fig. 6.
- * *Androctonus thebanus*. Eorundem. loc. cit. pl. 1. fig. 4.
- * *Androctonus citrinus*. Eorundem. loc. cit. pl. 2. fig. 2.
- * *Androctonus funestus*, Eorundem. loc. cit. pl. 2. fig. 3.
- * *A. liosoma*. Eorundem. loc. cit. pl. 2. fig. 6.
- * *A. melanophysa*. Eorundem. loc. cit. pl. fig. 8.
- * *A. bicolor*. Eorundem. loc. cit. pl. 2. fig. 4.. — *S. australis*. Andouin, ap. Savigny. Eg. Arach. pl. 8. fig. 3.
- * *A. senber*. Hempr. et Ehrenb. loc. cit. pl. 2. fig. 7.
- * *A. variegatus*. Guérin. Magas. de zool. t. 2: cl. VIII. pl. 2.

[Le comte Sternberg a découvert récemment dans le terrain houillier des environs de Rodnitz en Bohême, des Scorpions fossiles qui diffèrent à quelques égards des espèces actuelles, et qui ont reçu le nom générique de *CYCLOPHTHALMUS*, à raison de la disposition presque circulaire de leurs yeux, dont le nombre est de 12 comme chez les *Androctones* (Voyez Actes du musée de Bohême, août 1835, et Buckland. Géol. and Minéral. p. 406. pl. 46').

E.

THÉLYPHONE. (*Thelyphonus*.)

Deux palpes en forme de bras, plus courts que les pattes, terminés en pince. Mandibules écailleuses, en pince. Deux mâchoires conniventes. Huit yeux.

Corps oblong, corselet ovale; abdomen annelé, terminé postérieurement par une soie articulée, et caudiforme. Huit pattes.

Palpi duo brachia æmulantes, pedibus breviores, apice chelati. Mandibulæ corneæ, didactylæ. Maxillæ duæ conniventes. Oculi octo.

Corpus oblongum; thorax ovatus; abdomen annulatum, posticè setâ caudiformi, articulatâ terminatum. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Quelques rapports qu'aient les *Thélyphones* avec les Scorpions, ce sont des Arachnides fort différentes. Elles n'ont point de lames pectinées sous le ventre, point d'aiguillon à l'extrémité de leur filet caudiforme. Ces animaux semblent former une transition des Scorpions aux Phrynés. Leurs yeux sont disposés en trois paquets: leurs pattes antérieures sont longues, menues, tentaculaires.

[Chez les *Thélyphones*, les palpes, en forme de bras, ne présentent pas des organes appartenant par leurs fonctions à l'appareil de la génération. Les pattes de la première paire sont dépourvues d'ongle, et ont le tarse multiarticulé et filiforme, tandis que les autres sont robustes et terminés par deux fortes épines ayant la forme de griffes; l'abdomen est gros, ovalaire, et porte en dessous, près de sa base, les stigmates qui sont recouverts par une plaque; enfin les sacs pulmonaires ou branchiaux sont au nombre de quatre ou de huit.

E.

ESPÈCE.1. *Thélyphone proscorpion.* *Thelyphonus proscorpio.*

Phalangium caudatum. Lin.

Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 30. tab. 3. f. 1-2.

Tarantula caudata. Fab, Syst. 2. p. 433.

Thelyphonus proscorpio. Lat. Gen. 1. p. 130.

Ejusd. Hist. nat., etc., 7, pl. 132, pl. 60. f. 4.

* Ejusd. Encycl. pl. 344. fig. 3 et pl. 345. fig. 1, 7, 10 et 12.

* *Thelyphonus caudatus*. Ejusd. Anim. t. 4. p. 267. etc.

* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 1. fig. 3.

* Guérin. Iconographie. Arach. pl. 3. fig. 3.

* Lucas. Monogr. du genre *Thelyphonus*. Mag. zool. 1835. Cl. VII. pl. 9. fig. 1.

• Habite aux Indes orientales.

Nota. Latreille pense que le *Thélyphone* des Antilles, que l'on nomme le *Vinsigrier* à la Martinique, parce qu'il répand une odeur acide, est une espèce particulière. Voy. le journal de Physique, juin 1777.

• Un jeune entomologiste attaché au Muséum d'histoire naturelle, M. Lucas, vient de publier de nouvelles observations sur ces Arachnides, et d'augmenter considérablement le nombre des espèces. Il en a décrit 5 sous le nom de *Thelyphonus giganteus* (Lucas. Monogr. du genre *Thélyphone*, voy. dans le Magas. de zoolog. de M. Guérin, 1835. Cl. 8. pl. 8), de *Thel. rufimanus* (Lucas. loc. cit. pl. 10. fig. 1), de *Thel. rufipes* (Lucas, loc. cit. pl. 9. fig. 2), de *Thel. angustus* (loc. cit. pl. 10. fig. 3), et le *Thel. spinimanus* (Ejusd. loc. cit. pl. 10. fig. 2). E.

PHRYNÆ. (Phrynus.)

Deux palpes fort longs, épineux, onguiculés à leur sommet. Mandibules courtes, droites, didactyles. Deux mâchoires divergentes. Lèvre inférieure avancée, fourchue au sommet. Huit yeux.

Corps oblong, déprimé. Corselet réniforme. Abdomen presque pédiculé. Huit pattes. Les deux antérieures presque filiformes.

Palpi duo prælongi, spinulosi, apice unguiculati. Mandibulæ breves, rectæ, didactylæ. Maxillæ duæ divaricatæ. Labium porrectum, apice furcato. Oculi octo.

Corpus oblongum, depressum. Thorax reniformis. Abdomen subpediculatum. Pedes octo : duobus anticis filiformibus.

OBSERVATIONS. — On sent que les *Phrynés* avoisinent de très près les Aranéides. Elles ont, comme ces dernières, l'abdomen bien séparé du corselet et même presque pédiculé; enfin elles n'ont plus les palpes chélifères. Néanmoins elles ont encore les mandibules didactyles, et leur abdomen est annelé transversalement. Leur défaut de queue et leurs palpes les distinguent des Scorpions et des Thélyphones.

Ces Arachnides ont la tête confondue avec le corselet, le corps glabre, les palpes coudés, les yeux disposés en trois paquets; elles sont probablement très venimeuses.

ESPÈCES.

1. Phryné réniforme. *Phrynius reniformis*.

Ph. palpis spinoso-serratis, corporis longitudine; pedibus anticis longissimis, filiformibus.

Phalangium reniforme. Lin. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. p. 33. tab. 3. f. 3-4.

Tarentula reniformis. Fab. Syst. 2. p. 432.

Phrynius reniformis. Lat. Gen. 1. p. 129.

* Ejusd. Encyclop. Méth. ins. pl. 344. fig. 1.

* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 1. fig. 1.

* Guérin. Iconogr. Arach. pl. 3. fig. 1.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles.

2. Phryné lunulée. *Phrynius lunatus*.

Ph. palpis corpore subtriplo longioribus, apice spinosis; thorace lunato.

Phalangium lunatum. Pallas. Spicil. zool. fasc. 9. p. 35. tab. 3. f. 5-6. — *Tarantula lunata*. Fab. p. 433.

Phrynius lunatus. Latr. Gen. 1. p. 128.

Ejusd. hist. nat. etc., 7. p. 136. pl. 61. f. 1.

* Ejusd. Encycl. pl. 343. fig. 2.

Habite les Indes orientales, et peut-être aussi l'Amérique.
Etc.

† Ajoutez :

* *Phrynius variegatus*. Perty. op. cit. p. 200. pl. 39. fig. 10.

Deuxième Section.

LES ARANÉIDES ou ARACHNIDES FILEUSES.

Palpes simples, en forme de petites pattes : ceux du mâle portant les organes fécondateurs. Mandibules terminées par un crochet mobile. Abdomen sans anneaux, ayant quatre à six filières à l'anus.

Les *Aranéides*, fort nombreuses et diversifiées, constituent la dernière famille de la classe des *Arachnides*. Elles nous paraissent les plus perfectionnées de cette classe, les plus éminemment distinctes ; et quoiqu'elles se terminent en cul-de-sac, n'offrant aucune transition à d'autres classes, elles ont un rapport remarquable avec les crustacés, dans leurs organes sexuels, toujours doubles sur les individus, quoique, néanmoins, ceux-ci ne soient munis que d'un seul sexe. Leurs organes respiratoires, réduits à un petit nombre de poches branchiales [deux seulement] montrent en cela un perfectionnement qui ne peut être le propre de ceux qui sont plus nombreux.

Ces *Arachnides* sont distinguées des *Scorpionides* ou *pédipalpes*, parce qu'elles n'ont ni palpes ni mandibules chélifères ; que leurs palpes, quoique saillans, sont plus courts que les pattes, et qu'ils sont filiformes, ressemblant à deux petites pattes antérieures ; que leurs mandibules sont terminées chacune par un crochet mobile que l'animal replie, soit transversalement sur le bord antérieur et souvent denté de la mandibule, soit au-dessous ; enfin, parce que, sous l'extrémité supérieure de ce crochet, on aperçoit une petite ouverture pour la sortie du venin.

Ce qui, en outre, caractérise singulièrement les Aranéides, c'est d'avoir près de l'anus en dessous, quatre à six mamelons qui sont autant de filières par où l'animal fait sortir des fils d'une ténuité extraordinaire, et qui lui servent, soit à envelopper ses œufs, soit à tapisser sa demeure, soit à former des toiles pour tendre des pièges aux insectes, et souvent pour se suspendre.

Les Aranéides ont le corps divisé en deux parties : 1° en tronc ou corselet qui est inarticulé, porte six à huit yeux lisses, et avec lequel la tête est confondue ; 2° en un abdomen fixé à la partie postérieure du tronc par un petit pédicule. Cet abdomen est, en général, mou, tandis que le tronc est plus ferme et presque crustacé ; il est ordinairement sans anneaux, ou n'offre que des plis. La disposition des yeux, selon les races, varie beaucoup et peut servir avantageusement pour établir des divisions dans cette famille. On a employé cette considération, ainsi que celle des diverses sortes de toiles que font un grand nombre de ces animaux.

Il n'est pas vrai, comme on l'a cru, que ce soit à des Aranéides que soient dues ces masses toujours tombantes de fils très blancs, nommés vulgairement *coton de la vierge*, qu'on aperçoit dans l'atmosphère uniquement dans les beaux jours, où un ciel très clair succède à un brouillard. J'en ai établi les preuves, dans mes ouvrages, par des observations et des faits qui ne peuvent laisser de doute à cet égard. (1)

Nous avons dit que les organes sexuels étaient doubles dans chaque sexe. Effectivement, ceux du mâle sont situés à l'extrémité des palpes, y forment un bouton ou un

(1) Latreille a montré que l'opinion de notre auteur n'est pas admissible, et que c'est à des Arachnides qu'il faut attribuer ces fils. Voyez le Règne animal de Cuvier, 2^e édition, t. 4, p. 219. E.

renflement en massue, et sont renfermés dans une cavité du dernier article de chaque palpe (1). Ceux de la femelle sont pareillement doubles, mais rapprochés; ils sont placés près de la base du ventre, entre les organes respiratoires, et y offrent, pour ouverture au-dehors, deux conduits tubuleux, cachés dans une fente transverse.

Quant aux organes respiratoires des Aranéides, ils consistent en deux poches branchiales situées de chaque côté près de la base du ventre, et dans lesquelles sont de petites lames en saillie et adhérentes aux parois de ces poches (2). Leur ouverture forme en dessous deux stigmates recouverts, la membrane qui les recouvre laissant une fente transverse pour le passage de l'air. Ces poches ne peuvent être considérées comme des poumons : leur caractère ne le permet pas. Elles sont analogues à la poche unique et respiratoire de certains mollusques trachélipodes qui ne respirent que l'eau.

Les Aranéides sont toutes très carnassières, sucent avec leur bouche et à l'aide de leurs mâchoires, les insectes qu'elles peuvent saisir, les retiennent et les tuent avec les crochets de leurs mandibules. Elles sont presque toutes terrestres, courent, la plupart avec agilité, ont une phy-

(1) Les palpes remplissent un rôle très important dans la fécondation; mais c'est dans l'abdomen que se trouvent les organes sécréteurs et éjaculateurs des liquides spermatiques; les palpes paraissent servir à exciter les organes femelles et à y introduire la liqueur fécondante que ces appendices recueillent sous l'abdomen après son éjaculation. Voyez à cet égard les observations de Treviranus (*Vermischte Schriften*), de M. Walckenaer (*Hist. des Ins. aptères*, t. 1), et surtout de M. Dugès (*Annales des Sciences naturelles*, 2^e série. t. 6). E.

(2) Voyez pour la disposition de ces organes les planches anatomiques de M. Dugès, publiées dans la troisième édition du *Règne animal* de Cuvier. E.

sionomie repoussante, et sont plus ou moins venimeuses. Comme cette famille est extrêmement nombreuse en races diverses, qu'elle offre des caractères assez multipliés et de différens ordres, on a beaucoup varié dans la manière d'y former des divisions. On n'en formait d'abord qu'un seul genre sous le nom d'*araignée*, et tout le monde effectivement reconnaît et désigne ces animaux sous cette dénomination; mais, maintenant, on les partage en un grand nombre de genres différens. Pour cet objet, il faut consulter les intéressans ouvrages de MM. WALCKENAER et LATREILLE. Quoique profitant toujours des observations de M. Latreille, et de la méthode très naturelle qu'il a établie en dernier lieu, je ne partagerai, néanmoins, les Aranéides qu'en quatre genres, et les diviserai de la manière suivante.

[Depuis la publication de cet ouvrage, les Arachnides ont été le sujet d'un grand nombre de travaux importants; l'organisation intérieure de ces animaux a été étudiée par M. Tréviranus, Dugès, etc., leur développement par M. Hérold, et leur histoire zoologique par Leach, Hahn, M. Savigny, M. Léon Dufour, M. Perty et plusieurs autres naturalistes; enfin, M. Walckenaer, à qui l'on devait déjà tant de recherches sur ce sujet, vient de publier le premier volume d'un traité général sur les Arachnides, auquel nous renverrons le lecteur pour les détails que la nature de l'ouvrage de Lamarck ne nous permet pas d'indiquer ici.

E.

DIVISION DES ARANÉIDES.

(1) Mandibules ayant leur crochet replié en travers sur le bord supérieur interne.

Filières, soit formant toutes peu de saillie, soit saillantes au nombre de quatre:

Araignée.

- (a) Mandibules ayant leur crochet fléchi en bas ou en dedans.
 Deux filières plus grandes et plus longues que les autres : celles-ci très petites.
 (a) Palpes insérées à la base des mâchoires, sur une dilatation extérieure et inférieure de ces parties.

Atype.

- (b) Palpes insérées à l'extrémité des mâchoires.

Mygale.**Aviculaire.****ARAGNÉE. (Aranea.)**

Deux palpes saillans, pédiformes, filiformes, articulés, arqués, terminés en massue ou par un bouton, dans les mâles. Mandibules horizontales, ayant à leur sommet externe un ongle ou crochet mobile, subulé; replié transversalement sur le bord interne. Deux mâchoires; une lèvre inférieure. Six ou huit yeux simples, diversement disposés sur le corselet.

Corps ovale, partagé en deux parties. Abdomen subpédiculé. Quatre ou six mamelons à l'anus. Huit pattes onguiculées.

Palpi duo exserti, pediformes, filiformes, articulati, arcuati, in maculis clavâ aut capitulo terminati. Mandibulæ horizontales; apice externo ungulo mobili, subulato, supra marginem internam transversim flexo. Maxillæ duæ; labium. Oculi sex vel octo simplices supra thoracem varie dispositi.

Corpus ovatum, bipartitum : abdomine subpediculato. Anus papillis quatuor aut sex textoriis. Pedes octo unguiculati.

OBSERVATIONS. — Ce genre, comprenant la presque totalité

DIVISION DES ARAIGNÉES EN SIX TRIBUS.

§ ARAIGNÉES SÉDENTAIRES. *Les yeux rapprochés dans la largeur de l'extrémité antérieure du corselet, soit au nombre de six, soit au nombre de huit, et dont quatre ou deux au milieu, et deux ou trois de chaque côté.*

Elles font des toiles, ou jettent au moins quelques fils pour surprendre leur proie, et se tiennent immobiles dans leur piège ou auprès.

I^{re} TRIBU. Araignées tapissières (les *tubitèles*. Lat.).

Elles font des toiles serrées, soit tubulaires, soit en nasse ou en trémie. Quatre filières saillantes, en faisceau. La plupart sont nocturnes.

II^e TRIBU. Araignées filandières (les *inequitèles*. Lat.).

Elles font des toiles à réseau irrégulier, à fils, se croisant en tout sens et sur plusieurs plans. Filières peu saillantes, convergentes et en rosettes.

III^e TRIBU. Araignées tendeuses (les *orbitèles*. Lat.).

Elles font des toiles à réseau régulier, composées de cercles concentriques, coupés par des rayons partant du centre où l'animal se tient le plus souvent. Filières comme dans les filandières. Pattes grêles.

IV^e TRIBU. Araignées crabes (les *latérigrades*. Lat.).

Elles ne font point de toiles, jettent seulement quelques fils pour arrêter leur proie, et se tiennent tranquilles en l'attendant. Les quatre pattes antérieures toujours plus longues que les autres.

§§ ARAIGNÉES VAGABONDES. *Les yeux, toujours au nombre de huit, s'étendant presque autant, ou plus, dans le sens de la longueur du corselet que dans celui de sa largeur.*

Elles ne font point de toiles, courent ou sautent après leur proie, et ne tendent point de piège fixe.

V^e TRIBU. Araignées loups (les *citigrades*. Lat.).

Elles attrapent leur proie à la course, et ne sautent presque point.

VI^e TRIBU. — Araignées sauteuses (les *saltigrades*. Lat).

Elles courent et sautent sur leur proie, se tenant ou se suspendant par un fil. Elles ont souvent les cuisses des deux pattes antérieures plus grandes.

ESPÈCES.

(ARAIGNÉES SÉDENTAIRES.)

I^{re} TRIBU. — Les tapisnières ou *tubitèles*.

(a) *Segestria*. Lat. (1)

1. Araignée sénoculée. *Aranea senoculata*.

A. thorax nigricanti-brunneo; abdomina oblonga griseo; fasciâ longitudinali à maculis nigricantibus.

Aranea senoculata, Lin. Fab. syst. 9. p. 426.

Degeer. Ins. 7. p. 258. pl. 15. f. 5.

Segestria senoculata, Lat. Gen. 1. p. 89.

* Hahn. Arachnides. pl. 1. fig. 2.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 15. fig. 10.

* Walckenaer. Hist. des ins. apt. t. 1. p. 268.

Habite en Europe, dans les trous des murailles, etc., dans des tubes de soie.

2. Araignée des caves. *Aranea cellaria*.

A. fusco nigra, obscure cinereo-sericea; mandibulis viridibus; pectore pedumque origine brunneis.

Aranea florentina. Rom. Faun. étr. 2. p. 133. t. 9. f. 3.

(1) Les *Stomoxarus* sont des Araignées pourvues seulement de six yeux placés sur le devant du céphalothorax, ayant les pattes fort allongées, la lèvre allongée et cylindroïde, et portant quatre stigmates; mais seulement deux poches pulmonaires et branchiales; car, ainsi que l'a constaté récemment M. Dugès, il existe chez ces animaux des trachées aussi bien que des poumons, et c'est par les stigmates de la seconde paire que l'air pénètre dans ces tubes respiratoires, disposition qui se rencontre aussi chez les *Dysdères*. E.

Segestria cellaria. Lat. Gen. 1. p. 88.

* L. Dufour. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 2. pl. 10. fig. 5.

* Savigny. Arachnides d'Égypte. pl. 1, fig. 2.

* *S. perfida*. Latreille. Règn. anim. t. 4. p. 240; cours d'Entomol. p. 515; etc.

* Walckenaer. Faune. Fran. arach. pl. 10. fig. 5. et Hist. des Ins. apt. t. 1. pl. 267. pl. 6. fig. 3 et 4.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 15. fig. 11-15.

* Dugès. Règn. animal de Cuvier, 3^e édit. Atl. arach. pl. 4. fig. 4 et pl. 7. fig. 3.

Habite en Europe, dans les fentes de vieux murs, dans les caves.

(b) *Dysdera*. Lat. (1)

3. Araignée érythrine. *Aranea erythrina*.

A. mandibulis thoraceque sanguineo-rubris; pedibus dilutioribus.

Aranea rufipes. Fab. Syst. 2. p. 426.

Dysdera erythrina. Lat. Gen. 1. p. 90. tab. 5. f. 3. Règne anim. t. 4. p. 234; et cours d'Entomol. p. 512.

* L. Dufour. Ann. des Sc. phys. de Bruxelles. t. 5. pl. 73. fig. 7.

* Hahn. Arachnides. pl. 1. fig. 3.

* Walckenaer. Faune française. Aran. p. 185; et Hist. des ins. apt. t. 1. p. 261.

* Dugès. Règ. anim de Cuvier. 3^e éd. Atlas. Arach. pl. 5. fig. 4.

Habite en France, sous les pierres. Elle est rouge et n'a que six yeux comme les précédentes.

* Le *Dysdera erythrina* de Savigny. Arach. de l'Égypte. pl. 3. fig. 6. paraît être une espèce distincte de la précédente, M. Reuss lui a donné le nom de *D. lata*.

(1) Les *Dysdèras* se rapprochent des *Ségestries* par l'existence de quatre stigmates et de trachées, aussi bien que de poumons, par le nombre et la position des yeux, et par la forme du tube soyeux dans lequel ces *Aranéides* se renferment; ils s'en distinguent par la forme de la lèvre, par la manière dont les yeux sont groupés, etc.

Le genre *ARADON* de M. Savigny (Égypte, Arachn. Expl. de la pl. 1 fig. 3) rentre dans le genre *Dysdère* (Voyez Walckenaer. Ins. aptères, t. 1, p. 264. E.

(c) *Clotho*. Walck. et Lat. (1)4. Araignée de Durand. *Aranea Durandii*.

A. thorax fusco-brunneo, flavo marginato; abdomine nigro: maculis quinque rufis; oculis octo.

Clotho Durandii. Latr. Gen. 4. p. 371. Règne anim. 1. 4. p. 237; et cours d'Entom. p. 519.

* *Uroctes quinque maculata*. L. Dufour. Ann. des Sc. phys. de Brux. t. 5. pl. 76. fig. 1.

* *Clotho Durandii*. Latr. Règn. anim. de Cuvier. 1. 4. p. 237.

* Walckenaer. Ins. apt. t. 1. p. 636. pl. 14. fig. 3.

* Dugès. Règn. anim. du Cuvier. Atlas. Arachn. pl. 6. fig. 2.

Habite à Montpellier, et fait son nid entre les pierres.

(d) *Aranea domestica*. Lat. *Tegenaria*. Walck. (2)

(1) Les *CLOTHOS* de M. Walckenaer, ou *Uroctés* de M. L. Dufour, ont les yeux au nombre de huit et disposés sur deux lignes transversales plus ou moins courbes, les mâchoires courtes et conniventes, de manière à former un cintre autour de la lèvre, les pattes robustes, longues et presque égales entre elles, le corps trapu et les filières rapprochés en un faisceau dirigé en arrière. Le genre *Eryo* de M. Savigny, rentre dans cette division.

E.

(2) Les *ARAIGNÉES PROPREMENT DITES* (*Aranea*), de Latreille, qui comprennent les genres *Tegenaria*, *Agelina* et *Nyssus* de M. Walckenaer, n'ont pas les mâchoires disposées en cintre autour de la lèvre, comme chez les *Clothos* et les *Drassus*; leurs yeux sont au nombre de huit, dont les quatre premiers disposés en une ligne courbe, et leurs filières supérieures sont notablement plus longues que les autres.

Les genres *Lachésis* et *Erigone* de M. Savigny, prennent place dans la section des *Tubitèles* à côté des *Tegenaires* et des *Drassus* auxquels ils ressemblent par leurs mâchoires très inclinées sur la lèvre, mais s'en distinguent par la dilatation de ces organes du côté extérieur au point d'insertion des palpes. Chez les *Lachésis*, le crochet des mandibules est très court, aigu, recourbé et saillant dans le repos, et leur article basilaire n'est pas denté en dessous; enfin les yeux sont inégaux, et

5. Araignée domestique. *Aranea domestica*.

A. griseo-fusca; abdomine nigricante : fasciâ dorsâ longitudinali maculosâ; pedibus elongatis.

Aranea domestica. Lin. Fab. syst. 2. p. 412.

Lat. Gen. 1. p. 96.

* *Tegenaria domestica*. Savigny. Descript. de l'Égypte. Arachn. pl. 1. fig. 5.

* Griffith. Anim. Kindg. Arachn. pl. 11. fig. 11 et 12.

* *Aranea domestica*. Dugès. Atlas, du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 8. fig. 3.

Habite en Europe. Commune dans les maisons, faisant son nid et ses toiles horizontalement, dans les angles des fenêtres et des murs. Elle a huit yeux.

(e) *Drassus*. Walck et Lat. (1)

6. Araignée lucifuge. *Aranea lucifuga*.

A. mandibulis nigricantibus; thorace pedibusque obscurè-brunneis; abdomine murino nigro sericeo.

Drasse lucifuge. Walck. Tab. des ar. p. 45.

Drassus melanogaster. Lat. Gen. 1. p. 87.

Schæff. Ic. ins. pl. 101. f. 7.

* Hahn. Arachniden, pl. 41. fig. 102.

disposés quatre au milieu et deux de chaque côté, de manière à représenter deux lignes courbes, à-peu-près parallèles, dont la concavité serait dirigée en avant (exemple chez le *Lachesis pectorata*, Savigny, Égypte, Arachn. pl. 1, fig. 4; — Latreille, Cours d'Entomol. p. 521. — Walcken. Ins. apt. pl. 17. fig. 1.)

Les **DRASSES** ont les yeux disposés à-peu-près de même que chez les précédentes, mais plus égaux, et chez le mâle, l'article basilaire des mandibules présente du côté extérieur une rangée d'épines. (Voy. Savigny, op. cit. pl. 1. fig. 9. — Latreille, Cours d'Entomol. p. 522. — Walck. op. cit. pl. 17. fig. 2.) E.

(1) Les **DRASSES** se rapprochent des **CLOTHOS** par la disposition générale des yeux et des mâchoires; mais ces derniers organes, au lieu d'être courts et arrondis en haut, sont allongés et tronqués obliquement à leur extrémité, et les mandibules au lieu d'être très petites comme chez les **Clothos**, sont robustes et saillantes. E.

- * *Filistata femoralis*. Roux et Wider. Mem. Senckenbergianum. pl. 14. fig. 5.
- * *Drassus lucifugus*. Walckenaer. Faune. p. 155. et Ins. apt. t. 1. p. 513.
- * *D. melanogaster*. Dugès. Règne anim. de Cuvier. atlas. Arach. pl. 5. fig. 4.

Habite en France, sous les pierres. Elle se renferme dans des cellules de soie. Huit yeux sur deux rangs.

(f) *Clubiona*. Lat. (1)

7. Araignée lapidicole. *Aranea lapidicola*.

A. thorace mandibulis pallide rufescentibus; pedibus dilutioribus; abdomine cinerascens.

Clubiona lapidicola. Lat. Gen. 1. p. 91.

Clubione lapidicole. Walckenaer. Tab. des ar. p. 44.

* Hahn. Arachniden. pl. 40. fig. 100.

* Walck. Ins. apt. t. 1. p. 508.

Habite aux environs de Paris, sous les pierres.

8. Araignée soyeuse. *Aranea holosericea*.

A. elongata, cinereo-murina; thorace pallido-virescente; abdomine rubro-nigricante; vellere murino.

Aranea holosericea. Lin. Deger. pl. 15. f. 13.

Clubiona holosericea. Lat. Gen. 1. p. 91.

* Hahn. Monogr. pl. 4. fig. A; Arachnid. pl. 29. fig. 84.

* Walckenaer. Faune française. Aran. pl. 7. fig. 8. Hist. des ins. apt. t. 1. p. 590.

(1) Les CLUBIONES ne diffèrent guère des précédentes, qu'en ce que les filières extérieures sont à-peu-près d'égale longueur, et que la ligne formée par les quatre yeux antérieurs, est à-peu-près droite.

Le genre *ANTHONNA* de Sundeval (conspectus Arachnidum, p. 20) rentre dans le genre *Clubione*.

Le genre *Dasis* de M. Walckenaer établit à certains égards un passage entre les Dysdères et les Clubiones, mais diffère des uns et des autres par l'existence de 3 griffes aux tarsi comme chez les Tégénaires, les Epéïres, etc.; les yeux, au nombre de 8, sont disposées à-peu-près comme chez les Clubiones. (Voyez Walckenaer; Hist. des Ins. apt. t. 2. p. 611).

- Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 11. fig. 8.
Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

(g) *Argyroneta*. Lat. (1)

9. Araignée aquatique. *Aranea aquatica*.

A. nigricante-brunnea; abdomine nigro velutino : punctis aliquot impressis dorsalibus.

Aranea aquatica. Lin. Fab. Syst. 2. p. 418.

Degeer. Ins. 7. p. 303. pl. 19. f. 5.

Geoff. 2. p. 644. n. 74

Argyroneta aquatica. Lat. Gen. 1. p. 94. Règne anim. p. 242; et cours d'Entomol. p. 523.

• Hahn. Arachniden. pl. 49. fig. 118.

• Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 9. fig. 3.

• Walckenaer. Ins. apt. pl. 22. fig. 4.

[Habite en Europe, dans les eaux douces. Son abdomen est enveloppé dans une bulle d'air. Elle forme dans l'eau, une coque ovale, tapissée de soie et remplie d'air. Il en part des fils dirigés en tout sens et qui s'attachent aux herbes.

II^e TRIBU. Les filandières ou *inéquitèles*.

(a) *Scytodes*. Lat. (2)

10. Araignée thoracique. *Aranea thoracica*.

A. pallido-rufescenti-albidâ, nigro-maculata; thorace magno, gibboso; abdomine subgloboso.

Scytodes thoracica. Lat. gen. 1. p. 99.

(1) Les ARGYRONÈTES sont des Aranéides aquatiques qui ont, comme les Tégénaires, les yeux presque égaux, mais disposés autrement; quatre de ces organes occupent le milieu de la partie antérieure du chaperon et représentent un carré, et de chaque côté on trouve deux yeux très rapprochés entre eux, et placés sur une éminence spéciale. Les mâchoires sont inclinées sur la lèvre dont la forme est triangulaire. E.

(2) Les SCYTODES ressemblent aux Dysdères et aux Ségestries par le nombre de leurs yeux; mais ces organes sont situés par paires en avant et sur les côtés du céphalothorax. Elles ont les mâchoires étroites, cylindroïdes et très inclinées sur la lèvre

Scytode thoracique. Walck. Tab. des ar. p. 79.

* Savigny. Arachn. de l'Égypte. pl. 5. fig. 1 et 2.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 2. fig. 3.

* Guérin. Iconog. Arachn. pl. 1. fig. 3.

* Walckenaer. Hist. des ins. aptér. t. 1. p. 271. pl. 11. fig. 3.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 9. fig. 4.

Habite aux environs de Paris, dans les maisons.

(b) *Theridium*. Lat. (1)

11. Araignée sisyphe. *Aranea sisypbia*.

A. rufa; abdomine globoso : vertice variegato, lineolis albis radiato.

Araignée sisyphe. Lat. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 229.

Theridium sisypum. Lat. Gen. 1, p. 97.

Walck. Tabl. des ar. p. 74.

* Hahn. Arachnides. pl. 58. fig. 138.

* Griffith. Anim. Kindg. Arachn. pl. 10. fig. 4 et 5.

qui est bombée et triangulaire, les pattes fines, etc.; enfin elles tendent des fils lâches qui se croisent en tous sens et sur plusieurs plans.

M. Walckenaer rapproche de ces Arachnides son genre *Urtotes* qui a pour caractères principaux : six yeux disposés sur trois lignes, mâchoires droites, courtes et recouvrant la lèvre qui est triangulaire, pattes fortes et renflées (Voy. Ins. aptères, t. 1, p. 277). E.

(1) Les *Thérédions* ont comme les *Argyronètes* huit yeux, dont les deux latéraux situés de chaque côté sur une éminence commune, et les quatre du milieu disposés en carré. Mais les deux antérieurs de ces derniers sont placés sur une petite éminence; les pattes antérieures et ensuite les postérieures, sont les plus longues; enfin le corselet est en forme de cœur renversé, et l'abdomen est mou et volumineux. E.

Le genre *Latrodectus* de M. Walckenaer est très voisin des *Thérédions* dont ils se distinguent cependant par la disposition des yeux, qui sont presque égaux et rangés sur deux lignes écartées et légèrement divergentes. C'est à cette division qu'appartient le *Malmignatte* du midi (Walck. Ins. apt. pl. 14. fig. 4.)

Habite en Europe, sous les corniches et autres saillies des bâtiments.

12. Araignée couronnée. *Aranea redimita*.

A. flavescens albida; abdomine ovato, annula dorsali rosea.

Aranea redimita. Lin.

Degeer. Ins. 7. pl. 14. f. 4.

Theridium redimitum. Lat. gen. 1. p. 97.

Habite en Europe, sur les arbres. Elle fait son nid dans une feuille qu'elle plie en rapprochant et retenant les bords avec des fils.

Etc. Ajoutez l'*aranea* 13-guttata de Fabricius. Sa morsure est très dangereuse.

(c) *Episinus*. Lat. (1)

13. Araignée tronquée. *Aranea truncata*.

A. oculis octo, supra eminentiam impositis; thorace angusto.

Episinus truncatus. Lat. Gen. 1. p. 97.

* Walckenaer. Ins. apt. pl. 21. fig. 1.

Habite dans le Piémont.

(d) *Pholcus*. Lat. (2)

14. Araignée phalangiste. *Aranea phalangioides*.

A. pallido livida; abdomine elongato, mollissimo, obscure cinereo; pedibus longissimis.

(1) Les *EPISINES* ressemblent aux *Théridions* par les proportions de leurs pattes et le nombre des yeux; mais ils ont ces derniers organes rapprochés sur une élévation commune, et leur corselet est étroit et presque cylindrique. E.

(2) Les *PHOLCUS* ont la seconde paire de pieds plus longue que la quatrième, leurs yeux sont répartis en trois groupes, dont l'un médian et antérieur, composé de deux yeux placés sur une ligne transverse, et dont les deux latéraux composés chacun de trois yeux disposés en triangle. E.

Le genre *ANTÈME* de M. Walckenaer prend place à côté des *Pholques*, et se fait remarquer par la disposition singulière des mandibules qui, portés sur un prolongement antérieur du corselet, donnent à la tête quelque ressemblance avec celle du Charançon. (Hist. nat. des Ins. aptères, t. 1. p. 656. pl. 15. fig. 1.)

Araignée domestique à longues pattes. Geoff. 2. p. 652.

Aranea phalangioïdes. Fourc. Entom. Paris. 2. p. 212.

Pholcus phalangioïdes. Lat. Gen. 1. p. 97.

* Ejusd. Règne animal. t. 4. p. 244.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 13. fig. 6.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 9. fig. 6.

* Walckenaer. Ins. apt. pl. 8. fig. 3.

Habite en France, dans les lieux inhabités des maisons, aux angles des murs. Elle fait vibrer son corps, comme les Tipules.

III^e TRIBU. — Les tendeuses ou orbitèles.

(a) *Linyphia*. Lat. (1)

15. Araignée triangulaire. *Aranea triangularis*,

A. pallido-rufescens-flavescentis; thorace lined dorsali nigro antico, bifido; abdomine maculis fasciisque angulatis, fuscis et albis.

Araignée renversée sauvage. Degeer. 7. pl. 14. f. 13.

Araignée triangulaire. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 242.

Linyphia triangularis. Lat. Gen. 1. p. 100.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 12. fig. 1.

Habite en Europe, dans les haies, les buissons, sur les genêts, où elle fait une toile horizontale, et tend des fils au-dessus.

(b) *Uloborus*. Lat. (2)

16. Araignée de Walckenaer. *Aranea Walckenaeria*.

A. elongata, flavo-rufescens; thorace abdomineque sericeis, dorso albis; abdominis villis fasciculatis.

(1) Les LINYPHIAS ont aussi les pieds de la première paire et ensuite ceux de la seconde paire les plus longs, et les yeux au nombre de huit, dont quatre au milieu formant un trapèze, et deux de chaque côté; les yeux, formant le côté postérieur de ce trapèze, sont beaucoup plus gros que les autres. E.

(2) Les ULORBORS ont les quatre yeux postérieurs disposés à intervalles égaux sur une ligne transversale droite, et les antérieurs représentant une légère courbe dont la concavité est dirigée en avant; leurs mâchoires s'élargissent un peu au-dessus de leur base et se terminent en forme de palette ou de spatule; les tarsi des trois dernières paires de pattes se terminent par un seul ongle. Enfin, le corps est allongé et presque cylindrique. E.

Uloborus Walckenaerius. Latr. Gen. 1. p. 110.

* Hahn. Arachniden. pl. 35. fig. 91.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 10. fig. 4.

* Walckenaer. Ins. apt. pl. 20. fig. 1.

Habite près de Bordeaux, dans les bois, où elle fait sur les pins des toiles horizontales.

(c) *Tetragnatha*. Lat. (1)

17. Araignée patte-étendue. *Aranea extensa*.

A. abdomine longo, argenteo fuscoque virescente; pedibus longitudinaliter extensis.

Aranea extensa. Lin. Fab. Syst. 2. p. 407.

Aranea. Geoff. 2. p. 642. n° 3.

Degeer. Ins. 7. p. 236. n° 10.

Tetragnatha extensa. Lat. Gen. 1. p. 101.

* Hahn. Arachn. pl. 56. fig. 129.

* Giffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 12. fig. 6.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 10. fig. 5.

Habite en Europe, dans les bois, les lieux humides. Ses pattes antérieures sont étendues en avant. Elle fait des toiles verticales.

(d) *Epeira*. Walck. Lat. (2)

♀. Araignée diadème. *Aranea diadema*.

A. griseo-rufescens; abdomine globoso-ovato, rubro-fusco: cruce albo punctata.

Aranea diadema. Lin. Fab. Syst: 7. p. 415.

(1) Les TETRAGNATHES ont les yeux presque égaux, et situés quatre par quatre, sur deux lignes presque parallèles, et séparées par des intervalles presque égaux, les mâchoires longues, étroites et élargies seulement à leur extrémité supérieure; enfin, les mandibules sont longues, surtout chez le mâle. Ce groupe est le même que le genre EUGNATH de M. Savigny. E.

(2) Dans le genre ÉPÉIRE les quatre yeux latéraux sont rapprochés par paires, et presque contigus, tandis que les quatre autres forment au milieu un quadrilatère; les mâchoires se dilatent dès leur base, et forment une palette arrondie; enfin la lèvre est presque demi circulaire. Les ARGOPES de M. Savigny sont des Épéires ayant les yeux latéro-antérieurs plus petits que les autres. E.

Russel. Ins. 4. pl. 35-40. Geoff: 2. p. 647.

Degeer. Ins. 7. p. 218. pl. 11. f. 3.

Epeira diadema, Lat. Gen. 1. p. 106.

* Hahn. Arachnides. pl. 45. f. 110.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 14. fig. 9.

Habite en Europe, dans les jardins. Très commune en automne

Elle fait des toiles verticales. (Voyez pour l'anatomie de cette espèce, le travail de Treviranus. Verm. Schrift. t. 1.)

IV^e TRIBU. — Araignées crabes ou *latérigrades*.

(a) *Micrommata*. Lat. (1)

19. Araignée émeraudine. *Aranea smaragdula*.

A. latè viridis; abdomine fasciè dorsali longitudinalique intensiore.

Le genre *Acrosoma* de Perty est une subdivision des *Epéïres* de Latreille et de M. Walckenaer, comprenant les espèces dont le corps est membranéo-corné, l'abdomen épineux, mutique et très rarement clypéiforme; le céphalothorax plus étroit que l'abdomen, et les yeux, au nombre de 8, savoir: 4 disposés en carré au milieu, et 2 de chaque côté. L'auteur de cette division nouvelle y range un assez grand nombre d'espèces déjà connue et plusieurs *Arachnides* nouvelles trouvées au Brésil par Spix et Martius. (Voy. Delect. p. 195. pl. 8. fig. 7, 8, 9, 10 et 11. Voyez aussi Hahn. *Arachnides*. pl. 43.) E.

(1) Le genre *MICROMMATE* de Latreille ou *SPARASSUS* de M. Walckenaer se distingue des autres divisions de la même tribu par ses mâchoires droites, parallèles et arrondies au bout, et par ses yeux égaux disposés quatre par quatre, sur 2 lignes transverses dont la postérieure est la plus longue, et arquée en arrière. Les pieds ont la même longueur relative que chez les précédents. E.

Le genre *Calastes* de M. Walckenaer établit le passage entre les *Micrommates* et les *Olios*; de même que chez ceux-ci, les mâchoires sont articulées presque horizontalement, et s'avancent à la partie antérieure du corselet, les mandibules sont très allongées et obliques, les yeux presque égaux entre eux et

Aranea smaragdula. Fab, Syst, 2. p. 412.

Lat. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 278.

Araignée toute verte. Dageer, Ins, 7. p. 252. pl. 18. f. 6.

Sparasse. Walckn. Tab, des ar. p. 39.

Micrommata smaragdina. Lat, Gen. 1. p. 115.

* *Micrommate argelas*, L. Dufour. Ann, des Sc. phys. t. 5. p. 306. pl. 95. fig. 1.

* Latreille. Règne animal. 2^e édit, t. 4. p. 252.

* *Smaragdina*. Hahn. Arachniden. pl. 33. fig. 89.

* *Sparassus smaragdulus*. Walck. Ins, apt. t. 1. p. 582.

* Dugès. Atlas du Règne anim. Arachn. pl. 11. fig. 4.

Habite en France, dans les bois. Elle se tient sur les feuilles, guette sa proie, et court après.

Nota. Après ses micrommates, M. Latreille place le genre *Selenopa* (1) (de Dufour) qui est encore inédit. Ici, il y a six yeux de front sur une ligne, et deux autres, situés, un de chaque côté, derrière les extrêmes de la ligne précédente. Une espèce se trouve en Espagne, et une autre à l'Ile-de-France.

(b) *Thomisus*. Walck. et Lat. (2)

A. corpore griseo, nigro maculato; abdomine plano, rhomboidali; pedibus tertiis posticis longioribus.

placés sur deux lignes, dont l'antérieure droite et la postérieure très courbe en avant. Enfin, les pattes sont très allongées et très inégales entre elles. Hist. des Ins. aptères, t. 1. p. 577.)

(1) Les SÉNELOPES diffèrent des Micrommates par les proportions des membres aussi bien que par la disposition des yeux; les pattes de la seconde et ensuite celles des deux paires suivantes, dépassent en longueur celles de la paire antérieure. L'espèce type de ce genre est le *Selenops omalosome* (L. Dufour. Ann. des Sc. phys. t. 5. p. 69. fig. 4. — Latreille, Règne anim. t. 4. p. 253. Walcken. Ins. apt. t. 1. p. 544. Dugès. Atlas du Règne animal. Arach. pl. 12. fig. 1.)

(2) Les THOMISES ont les yeux placés sur deux lignes, en croissant, les mâchoires allongées et cuniventes, les mandibules courtes, et les pattes des deux dernières paires sensiblement plus courtes que celles de la paire antérieure. Les yeux latéraux sont souvent portés sur des éminences.

Le genre DELANE, *Delena* de M. Walckenaer est un démem-

Araignée tigrée. Deger, Ins. 7. p. 302. pl. 18, f. 25.

Aranea lavipes. Lin. Fab. Syst. 2. p. 413.

Thomisus tigrinus. Walck. Latr. Gen. 1. p. 114.

brement de ses Thomises; il y assigne pour caractères : « yeux hauts, presque égaux entre eux, sur deux lignes, rapprochées sur le devant de la tête, et dilatées transversalement. Lèvre large, carrée, échancrée, ou coupée en ligne droite, à son extrémité. Mâchoires droites, ou légèrement écartées et divergentes à leurs côtés internes, inclinées sur la lèvre arrondie. Pattes de longueur inégale; les antérieures les plus longues. » Il rapporte à ce genre le *Thomisus cancerides*, Walck. (Tab. des Aranéides, pl. 4. fig. 29 et 30), l'*Epeira hastifera* de M. Percheron (Mag. de Zoolog. de Guérin, cl. 8, pl. 4), et plusieurs espèces nouvelles (Voyez Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 490).

Le genre *Aaxys*, du même auteur, prend place à côté du précédent, et offre les caractères suivans : « yeux, 8, presque égaux, placés sur deux lignes occupant le devant du corselet; les quatre intermédiaires formant un quadrilatère; les latéraux écartés sur les côtés de la tête, et rapprochés entre eux. Lèvre courte, arrondie à son extrémité, légèrement resserrée à sa base. Mâchoires allongées, inclinées sur la lèvre, cylindroïdes, arrondies à leur extrémité, légèrement creusées sur le côté interne; pattes allongées, étendues latéralement; les deux paires antérieures beaucoup plus grosses et plus allongées que les postérieures. La première paire la plus longue, la seconde ensuite, la troisième la plus courte. » (Voyez Hist. des Ins. aptères, t. 1, p. 497).

Le genre *Eaxys* de M. Walckenaer est également un démembrement des Thomises, et se reconnaît à la disposition des yeux qui sont groupés autour de deux tubercules verticaux, et à quelques autres caractères, il se compose d'une seule espèce : le *Thomisus heterogaster* figuré comme type du genre Thomise, par M. Guérin dans son Iconog. du Règne animal. Arach. pl. 1. fig. 4 (voyez Walck. Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 541.)

Enfin, son genre *Olios* est encore un démembrement des Thomises et se rapproche des Philodromes et des Micrommates plus que de toutes les autres Aranéides. Ces animaux ont les

20. Araignée tigrée. *Aranea tigrina*.

• *Philodromus tigrinus*. Walck. Ins. apt. t. 1. p. 551. (1)

Habite en Europe, sur les arbres. Elle court très vite.

21. Araignée à crête. *Aranea cristata*.

A. corpore pallido-griseo-rufescente; abdomine suborbiculato, supra brunneo; fasciâ dorsali pallidiore; lateribus dentatâ.

Aranea cristata. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 286.

Clerck. Aran. pl. 6. tab. 6.

Tomisus cristatus. Lat. Gen. 1. p. 111.

• M. Walckenaer rapporte à cette espèce.

• Le *Thomisus ulmi*. Hahn. Monogr. der Aran. pl. 2. fig. A; et die Arachn. pl. 10. fig. 30.

• Le *T. lateralis*. Hahn. Monog. der Aranea et Arachn. pl. 10. fig. 31.

• Le *T. Pini*. Hahn. Arachniden. pl. 8. pl. 23.

• Le *T. sabulosus*. Du même. op. cit. pl. 8. fig. 24.

• Le *T. viaticus*. Du même, pl. 8. fig. 29.

yeux étalés sur deux lignes parallèles, dont l'antérieure est de beaucoup plus courte; la lèvre large, quadriforme ou tronquée; les mâchoires écartées droites ou inclinées, et disjointes ou divergentes à leur extrémité; les mandibules allongées et cylindriques, et les pattes presque égales entre elles, allongées et fortes. Ils sont de grande taille, et par leur aspect, rappellent un peu les Mygales.

(1) Latreille range aussi dans la tribu des araignées latérigrades le genre *Philodromus* de M. Walckenaer, division qui a été formée aux dépens des Thomises; il le distingue par ses mandibules allongées et cylindriques, et par la longueur des pieds de la dernière paire ou même des deux dernières paires qui ne diffère pas sensiblement de celle des pieds des deux paires antérieures. Les uns ont le corps large et aplati, avec l'abdomen très court, les autres ont le corps allongé et l'abdomen souvent cylindrique. Enfin, leurs yeux sont disposés comme chez les Thomises, si ce n'est que ceux situés sur les côtés, ne sont jamais portés sur des tubercules ou des éminences.

Le genre *Thaumasia* de Perty (Delect. Anim. p. 192), rentre dans le genre *Philodrome* de M. Walckenaer.

E.

- * Le *Xysticus audax*. Kock. contin. de Panzer fasc. 129. fig. 16. 17.
 - * Le *X. viaticus*. Koch. loc. cit. fasc. 130. fig. 13. 14.
 - * Le *X. mordax*. Du même, loc. cit. fig. 19.
 - * Le *Thom. Clerkii*. Audouin. Savigny. Arachn. d'Egypte. pl. 6. fig. 13.
 - * Et le *Thom. lituratus*. Walck: Faune française. Arachn. p. 83.
- Habite en Europe. Commune en France, dans les jardins, et se trouve souvent à terre.

22. Araignée citron. *Aranea citrea*.

A. citrino-lutea; abdomine magno, suborbiculato, utrinque fasciâ ferrugineâ.

Araignée citron. Geoff. 2. p. 642. no 2. pl. 21. f. 1.

Schoeff. Ins. ic. tab. 19. f. 13.

Tomisus citreus. Lat. Gen. 1. p. 111.

* Hahn. Arach. pl. 11. fig. 32.

* *Th. quadrilineatus*. Ejusd. Monog. pl. 3. fig. 6.

* *Th. calycinus*. Ejusd. op. cit. pl. 1. fig. B.

* *Th. citreus*. Sundev. p. 219.

* Walck. Ins. apt. t. 1. p. 528.

* Dugès. Atlas du Règne anim. pl. 12. fig. 4.

Habite en Europe, sur les plantes.

Et autres, soit indigènes de l'Europe, soit exotiques.

LES PHYLLIDIENS.

V. TRIBU. — Araignées loups ou *citigrades*.

(a) *Ctenus*. Walck. Lat. (1)

23. Araignée unicolore. *Aranea unicolor*.

A. rufescens, griseo-sericea; lineæ tertiæ oculis lateralibus minoribus; thoracis dorso medio postico lineolâ albidâ nigro-marginatâ.

Ctenus unicolor. Lat. Catal. mus.

* *Dolomedes concolor*. Perty. op. cit. pl. 39. fig. 4.

(1) Les CTÈNES ont pour caractères principaux : huit yeux inégaux, dont les 4 antérieurs figurent un carré, et les autres forment avec le côté postérieur de celui-ci une ligne courbe dirigée en arrière; les mandibules droites, écartées et coupées

- *Ctenus unicolor*. Walck. Ins. apt. t. 1. p. 366.
- Habite le Brésil. De la Lande fils. Pattes longues, garnies de petites épines noires.

(b) *Oxyopes*. Lat. (1)24. Araignée bigarrée. *Aranea variegata*.

A. corpore villosa, griseo, rufo nigroque vario; pedibus pallidorufescentibus, fusco maculatis.

Sphasus heterophthalmus. Walck. Tableau des ar. p. 19. ejusd. hist. des Ar. fasc. 3. t. 8.

Oxyopes variegatus. Lat. gen. p. 116. Et Encyclp. n° 1.

obliquement; les pattes allongées et fortes, celle de la première paire, la plus longue.

M. Walckenaer fait rentrer dans ce groupe le genre *PHONKUTIA* de Perty (Delect. Anim. articul. quæ in itin. per Brasil. collig. Spix. et Martius, p. 196.) Exemple : *Ctenus Oudinotii*, Walck. Ins. apt. t. 1. p. 368. pl. 11. fig. 4. E.

(1) Les *Oxyopes* de Latreille, ou *Sphasus* de M. Walckenaer ont les yeux rangés deux par deux, sur quatre lignes transversales, les pattes allongées et fines, les mâchoires étroites, cylindriques et droites. Le genre *Idiopis* de Perty ne paraît pas devoir en être distingué.

Le genre *Hersilia* de M. Savigny, est, à plusieurs égards, intermédiaire entre les *Oxyopes* et les *Dolomèdes*; il a pour caractères principaux : 8 yeux inégaux rassemblés sur une éminence du corselet, et disposés sur deux lignes transversales recourbées en arrière; mâchoires petites, convergentes et très inclinées; pattes allongées, etc. Exemple : *Hersilia caudata*, Savigny, Arachnides d'Egypte, pl. 1. fig. 8. Lucas, Magasin de zool. Cl. VIII. pl. 12. fig. 1-7. — Walck. Ins. apt. t. 1. p. 371. pl. 9. fig. 1.

C'est aussi à côté des *Oxyopes* que prend place le genre *Megamyrmaekion* de M. Reuss, ou genre *Dyclion* de M. Walckenaer; cette division ne se compose que d'une seule espèce, le *Megamyrmaekion caudatum* Reuss. (Mus. Senckenbergianum, t. 1. p. 217. pl. 18. fig. 12; — *Dyclion Reuss*. Walck. Ins. apt. t. 1. p. 380.), et se rapproche des *Clabionas* par la forme géné-

* Hahn. Arachnides. pl. 52. fig. 121.

* Koch. op. cit. pl. 131.

* Dugès. Atlas du Règne anim. Arachn. pl. 12. fig. 6.

* *Sphasus heterophthalmus*. Walck. Ins. apt. t. 1. p. 373.

Habite la France méridionale. Ses pattes ont des piquans très longs.

Etc. Ajoutez l'Oxyope rayé et l'Oxyope indien. Latr. Encycl.

(c) *Dolomèdes*. Lat. (1)

25. Araignée admirable. *Aranea mirabilis*.

A. cinereo rufescens, tomentosa; abdomine ovato, apice acuto, dorso fusco.

rale du corps, des Drasses, par la structure de la bouche, et des Oxyopes par la disposition des yeux.

Le genre *DOLOPHON* de M. Walckenaer se rapproche aussi des précédens par quelques caractères, mais s'éloigne de toutes les autres Aranéides par la forme de son abdomen qui constitue une espèce de chaperon arrondi au-dessus du corselet, et par la disposition des yeux qui, au nombre de 8, inégaux entre eux, sont rangés sur 4 lignes, savoir : deux paires très rapprochées, et situées sur les parties latérales antérieures du front, et deux paires plus grosses, forment au milieu du front un petit trapèze, situé beaucoup en avant des précédentes. E.

(1) Les *DOLOMÈDES* se rapprochent beaucoup des Lycoses, mais s'en distinguent en général facilement par la forme allongée de leur abdomen, et par la longueur relative des pattes ; il est aussi à noter qu'à l'époque de la ponte, ces arachnides construisent une toile pour y placer leur cocon, tandis que les Lycoses portent leurs cocons attachés à l'ann. M. Savigny a donné, dans le grand ouvrage sur l'Égypte, de très belles figures de *Dolomèdes*, genre dont ses *Ocyales* sont un démembrement. C'est près des *Dolomèdes* et des *Ctènes* que M. Walckenaer range le nouveau genre qu'il a établi sous le nom de *Storena*.

Les *STORÈNES* ont 8 yeux presque égaux, occupant le devant et les côtés du corselet, et disposés sur 3 lignes, deux en avant, quatre au milieu, et deux après, rapprochés l'un de l'autre, en arrière ; les mâchoires allongées, cylindriques et inclinées ; les

Aranea mirabilis. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 296. Clerck. Aran. suæc. pl. 5. tab. 10.

Aranea obscura. Fab. Syst. 2. p. 419.

Dolomedes mirabilis. Lat. Gen. 1. p. 117.

Walck. Tableau des ar. p. 16. n° 4.

* Ejusd. Faune française. Arach. pl. 4. fig. 1; et Hist. des ins. apt. t. 1. p. 356.

* Hahn. Arachniden. pl. 51. fig. 120.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 26. fig. 1.

* *Ocyale mirabilis*. Sandeval. p. 198. f. 1.

1 Habite en Europe, dans les bois.

(d) *Lycosa*. Lat. (1)

Les Lycoses sont presque toutes terricoles, se retirant dans des trous, ou sous des pierres, d'où elles sortent pour chasser et attraper leur proie.

26. Araignée tarentule. *Aranea tarentula*.

A. supra cinereo-fusca, subtus atra; abdominis dorso maculis triangularis nigris; pedibus nigro-maculatis.

pattes, de longueur médiocre etc.; la seule espèce est le *Storrena cyanea*, Walck. Tab. des Aranéides, pl. 9. fig. 85 et 86, et Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 361. E.

(1) Les Lycoses se reconnaissent à leurs yeux, au nombre de 8, très inégaux entre eux, et représentent un parallélogramme allongé sur le devant, et les côtes du céphalothorax; à leur lèvre carrée, à leurs mandibules plus hautes que larges et dilatées vers le milieu; à leurs pattes allongées et fortes, et à quelques autres caractères. Le nombre des espèces appartenant à ce genre est très considérable; M. Walckenaer en décrit 63. (Voyez son Histoire des Insectes aptères, t. 1. p. 280.)

C'est aussi dans la tribu des Araignées-loups que Latreille a placé son genre *Myrmecia*, remarquable par les deux étranglements qui séparent le thorax en trois portions, par sa brièveté, par les yeux disposés sur trois lignes en trapèze, et par plusieurs autres caractères. Le type de ce genre est la *Myrmecia fulva*. Latreille. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série, t. 3. pl. 2. fig. 1-8; Walck. Ins. apt. pl. 9. fig. 2. E.

Aranea tarentula. Lin. Fab. Syst. 2. p. 423.

Araignée tarentule. Lat. Hist. nat., etc. t. 7. p. 289. pl. 62. f. 3.

Lycosa tarentula. Lat. Gen. 1. p. 119.

Lycose tarentule. Walck. Tableau des ar. p. 11.

* Suivant M. Walckensser, on aurait confondu sous ce nom plusieurs espèces; il distingue : 1° la *L. tarentule apulienne* (Imperato. Hist. nat. p. 775.—Albin. Nat. hist. of Spiders. tab. 39.—Hahn. Arach. pl. 23. fig. 73.—Guérin. Iconog. arach. pl. 1. fig. 6; Walck. Ins. apt. pl. 7. fig. 3). 2° la *L. tarentule narbonnaise* (*L. melanogaster*. Latr. Nouv. dict. d'hist. nat. t. 18. p. 291.—Hahn. Arachn. pl. 26. fig. 76; Walck. op. cit. pl. 8. fig. 1). 3° la *L. tarentule hellénique* (*L. tarentula*. Brullé. expéd. de Morée.—*L. hellenica*. Koch. pl. 81. fig. 181;) 4° la *L. tarentule hispanique* (*L. tarentula*. L. Dufour. Ann. des Sc. nat., 2^e série, t. 3. pl. 5. fig. 1). etc.

- Habite l'Europe australe. Cette araignée, l'une des plus grosses de l'Europe, est célèbre par l'opinion répandue, que la musique peut arrêter ou anéantir les effets de sa morsure. Quoiqu'on ne puisse nier l'influence réelle de l'imagination sur notre physique, il est néanmoins probable que la médecine peut offrir des moyens curatifs plus assurés, pour les maux que cause le venin de cette araignée. Les effets vénéneux des Tarentules paraissent être très faibles, et on ne peut ajouter foi à ces récits merveilleux, que quelques auteurs anciens ont rapportés à ce sujet.

27. Araignée à sac. *Aranea saccata*.

A. fusca, fuliginosa, villosa; pedibus livido-rufis, fusco annulatis.

Aranea saccata. Lin. Fab. Syst. 2. p. 421.

Araignée loup. Geoff. 2. p. 649. n° 14.

Aranea littoralis. Degeer. 7. pl. 15. f. 23. (* *Lycosa paludicola*: Walck. Ins. apt. t. 1. p. 333.)

Lycosa saccata. Latr. Gen. 1. p. 120.

* Walcken. Hist. des Ins. apt. p. 326.

Habite en Europe, dans les jardins, les champs, par terre.

VI^e TRIBU. — Araignées sauteuses ou *saltigrades*.

(a) *Eresus*. Walck. Lat. (1)

28. Araignée rouge. *Aranea cinnabarina*.

A. nigra; abdomine suprà cinnabarrino: punctis quatuor aut sex nigris.

(1) Les *Eresus* ont les yeux inégaux et disposés de manière

Aranea mirabilis. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 296. Clerck. Aran. succ. pl. 5. tab. 10.

Aranea obscura. Fab. Syst. 2. p. 419.

Dolomedes mirabilis. Lat. Gen. 1. p. 117.

Walck. Tableau des ar. p. 16. n° 4.

* Ejusd. Faune française. Arach. pl. 4. fig. 1; et Hist. des ins. apt. t. 1. p. 356.

* Hahn. Arachniden. pl. 51. fig. 120.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 26. fig. 1.

* *Ocyale mirabilis*. Sandeval. p. 198. f. 1.

Habite en Europe, dans les bois.

(d) *Lycosa*. Lat. (1)

Les Lycoses sont presque toutes terricoles, se retirant dans des trous, ou sous des pierres, d'où elles sortent pour chasser et attraper leur proie.

26. Araignée tarentule. *Aranea tarentula*.

A. supra cinereo-fusca, subtus atra; abdominis dorso maculis triangularis nigris; pedibus nigro-maculatis.

pattes, de longueur médiocre etc.; la seule espèce est le *Sorrens cyanca*, Walck. Tab. des Aranéides, pl. 9. fig. 85 et 86, et Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 361. E.

(1) Les Lycoses se reconnaissent à leurs yeux, au nombre de 8, très inégaux entre eux, et représentent un parallélogramme allongé sur le devant, et les côtes du céphalothorax; à leur lèvre carrée, à leurs mandibules plus hautes que larges et dilatées vers le milieu; à leurs pattes allongées et fortes, et à quelques autres caractères. Le nombre des espèces appartenant à ce genre est très considérable; M. Walckenaer en décrit 63. (Voyez son Histoire des Insectes aptères, t. 1. p. 280.)

C'est aussi dans la tribu des Araignées-loups que Latreille a placé son genre *Myrmecia*, remarquable par les deux étranglements qui séparent le thorax en trois portions, par sa brièveté, par les yeux disposés sur trois lignes en trapèze, et par plusieurs autres caractères. Le type de ce genre est la *Myrmecia faba*. Latreille. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série, t. 3, pl. 2. fig. 1-8; Walck. Ins. apt. pl. 9. fig. 2. E.

Aranea tarentula. Lin. Fab. Syst. 2. p. 423.

Araignée tarentule. Lat. Hist. nat., etc. t. 7. p. 289. pl. 62. f. 3.

Lycosa tarentula. Lat. Gen. 1. p. 119.

Lycose tarentule. Walck. Tableau des ar. p. 11.

* Suivant M. Walckenaer, on aurait confondu sous ce nom plusieurs espèces; il distingue : 1. la *L. tarentule apulienne* (Imperato. Hist. nat. p. 775.—Albin. Nat. hist. of Spiders. tab. 39.—Hahn. Arach. pl. 23. fig. 73.—Guérin. Iconog. arach. pl. 1. fig. 6; Walck. Ins. apt. pl. 7. fig. 3). 2. la *L. tarentule narbonnaise* (*L. melanogaster*. Latr. Nouv. dict. d'hist. nat. t. 18. p. 291.—Hahn. Arachn. pl. 26. fig. 76; Walck. op. cit. pl. 8. fig. 1). 3. la *L. tarentule hellénique* (*L. tarentula*. Brullé. expéd. de Morée.—*L. hellenica*. Koch. pl. 81. fig. 181; 4. la *L. tarentule hispanique* (*L. tarentula*. L. Dufour. Ann. des Sc. nat., 2^e série, t. 3. pl. 5. fig. 1). etc.

- Habite l'Europe australe. Cette araignée, l'une des plus grosses de l'Europe, est célèbre par l'opinion répandue, que la musique peut arrêter ou anéantir les effets de sa morsure. Quoiqu'on ne puisse nier l'influence réelle de l'imagination sur notre physique, il est néanmoins probable que la médecine peut offrir des moyens curatifs plus assurés, pour les maux que cause le venin de cette araignée. Les effets vénéneux des Tarentules paraissent être très faibles, et on ne peut ajouter foi à ces récits merveilleux, que quelques auteurs anciens ont rapportés à ce sujet.

27. Araignée à sac. *Aranea saccata*.

A. fusca, fuliginosa, villosa; pedibus livido-rufis, fusco annulatis.

Aranea saccata. Lin. Fab. Syst. 2. p. 421.

Araignée loup. Geoff. 2. p. 649. n^o 14.

Aranea littoralis. Degeer. 7. pl. 15. f. 23. (* *Lycosa paludicola*; Walck. Ins. apt. t. 1. p. 333.)

Lycosa saccata. Latr. Gen. 1. p. 120.

* Walcken. Hist. des Ins. apt. p. 326.

Habite en Europe, dans les jardins, les champs, par terre.

VI^e TRIBU. — Araignées sauteuses ou *saltigrades*.

(a) *Eresus*. Walck. Lat. (1)

28. Araignée rouge. *Aranea cinnabarina*.

A. nigra; abdomine supra cinnabarrino; punctis quatuor aut sex nigris.

(1) Les Eresus ont les yeux inégaux et disposés de manière

Aranea 4-guttata. Rossi Faun. etr. 2. p. 135. pl. 1. f. B-g.

Coqueb. Illustr. ic. dec. 3. tab. 27. f. 12.

Eresus cinnabarinus. Walck. tab. des ar. p. 21.

Lat. Gen. 1. p. 21.

* Hahn, Monogr. des Spinn. 2^e partie. pl. 2. fig. A.

* *Eresus annulatus*. Ejusd. loc. cit. fig. 3; et Arachniden, pl. 12. fig. 35 et 36.

* *E. cinnabarinus*. Walck. Faune française. Arachn. pl. 4. fig. 7 et 8 et Hist. des ins. apt. t. 1. p. 395. pl. 11. fig. 7.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 24. fig. 5.

* *Eresus Audouini*. Brullé. Expéd. scient. de Morée. pl. 28. fig. 10.

Habite en France, en Italie, etc.

(b) *Sallicus*. Lat. (1)

29. Araignée à chevrons. *Aranea scenica*.

A. saliens, nigra; abdomine utrinque lineis tribus albis, ad angulum acutum coeuntibus, G.

À représenter deux carrés, dont l'un, très petit, est renfermé dans l'autre; leur lèvre est allongée et triangulaire; leurs mâchoires droites, allongées, dilatées et arrondies à leur extrémité, et leurs pattes grosses et de longueur médiocre.

Le genre *Chersis* de M. Savigny, qui correspond au genre *Palpimanus* de M. L. Dufour, et au genre *Platyscelum* de M. Audouin, se rapproche des *Ereses* par l'ensemble de son organisation, et tient aussi au genre *Atte* par la conformation de ses mâchoires; les yeux, comme chez les *Ereses*, forment deux carrés renfermés l'un dans l'autre, mais les mâchoires sont larges, dilatées et conniventes à leur extrémité. Exemple : 1^o *Chersis gibbulus*. Walck. Ins. apt. t. 1. p. 390. — *Palpimanus gibbulus*. L. Dufour. Ann. des Sc. phys. t. 4. pl. 69. fig. 5. — *Palpimanus hæmatinus*. Koch. op. cit. pl. 80. fig. 178 et 179.

2^o *Chersis Savigny*. Walck. op. cit. p. 391. pl. 10. fig. 1 et 2. — *Platyscelum Savigny*: Audouin. Expl. des pl. de la descript. de l'Égypte. Arach. par M. Savigny. pl. 7. fig. 6 et 7. E.

(1) Les *SALTIGUES* de Latreille ou *ATTES* de M. Walckenaer ont 8 yeux inégaux, dont quatre sur une ligne transversale en

Stenus, n. 28. Geoffr. 1. p. 650.

Araea scenica. Lin. Fab. Syst. 2. p. 422.

Salicis scenicus, Lat. Gen. 1. p. 128.

* Hahn. Arach. pl. 15. fig. 43 et 44.

* *Aran. cinereus*. Lister. de Aran. p. 87. fig. 31.

* *Atus scenicus*. Walck. Faune française. Aran. pl. 5. fig. 14-15;
Hist. des ins. apt. t. 1. p. 406.

30. Araignée fourmi. *Araea formicaria*.

A. elongata, thorax entier noir, postérieur rouge; abdomen blanc;
maculé d'un rouge albi.

Araignée fourmi. Degner. Ins. 7. pl. 28. f. 1-2.

Salicis formicarius. Lat. Gen. 1. p. 124.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 24. fig. 9 et 10.

* Walckenaer. Ins. apt. pl. 21. fig. 5 et 6.

Habite en Europe, sur les plantes et les murs.

Etc.

ATYPH. (Atypus.)

Palpes saillans, plus courts que les pattes, et insérés sur une dilatation externe de la base des mâchoires. Mandibules fortes, saillantes, sans râteau, à crochet subulé, fléchi en-dessous. Deux mâchoires. Lèvre inférieure, tantôt très petite, tantôt linéaire et saillante entre les mâchoires. Huit yeux.

Corps oblong, divisé en deux parties, comme dans les araignées. Huit pattes.

avant, et les autres sur deux autres lignes, près des bords latéraux, de façon à représenter une parabole ou un carré ouvert postérieurement; elles diffèrent aussi des Erèses par leurs tarsi qui ne sont armés que de deux crochets, tandis que chez les Erèses, il en existe trois. Ce genre est extrêmement nombreux; on trouve dans l'ouvrage de M. Walckenaer la description de 145 espèces.

Les genres *HELIOPHANUS* et *EXOPHANUS* de Koch (ap. Steller. Deutsche insecten), rentrent dans le genre *Atta*, tel que M. Walckenaer le circonscrit.

E.

MYGALE. (Mygale.)

Palpes saillans, allongés; pédiformes, insérés à l'extrémité des mâchoires. Mandibules ayant leur crochet fléchi en dessous ou sur le côté inférieur, et munies d'un rateau à leur sommet. Deux mâchoires allongées. Lèvre inférieure très petite. Huit yeux.

Port des araignées. Huit pattes. Point de broses à l'extrémité des tarsi et des palpes. Elles construisent dans la terre un nid cylindrique fermé par un opercule.

Palpi exserti, elongati pediformes, ad apicem maxillarum inserti. Mandibulae margine supero in rastellum' dentato: ungula terminali subtus aut infero latere inflexa. Maxillae duae elongatae. Labium minimum. Oculi octo.

Habitus aranearum. Pedes octo. Tarsorum palporumque apices scopulis nullis. Sub terrâ nidum cylindricum operculo clausum struunt.

OBSERVATIONS. — Je partage l'opinion d'Olivier, et je pense que les *mygales*, qui sont des aranéides mineuses ou curculinaires, doivent constituer un genre particulier; le caractère et les habitudes de ces aranéides autorisant cette distinction. Leurs palpes sont plus longs, plus pédiformes que ceux des aviculaires. La première pièce de leurs mandibules a son sommet denté en forme de rateau, ce que les aviculaires n'offrent point. Enfin, les *mygales* se creusent dans la terre, des galeries ou des nids cylindriques, qu'elles tapissent d'une couche de soie, et en ferment l'entrée par un opercule qui adhère d'un côté, comme par une charnière. (1) Elles en sortent pour chasser et attaquer leur proie.

[La plupart des entomologistes réunissent dans un même genre les *mygales* et les aviculaires; qui, en effet, diffèrent fort

(1) Voyez à ce sujet un mémoire de Latreille, inséré dans les Mém. du Muséum, t. 8; et le mémoire de M. Audouin, publié dans les Annales de la Société entomologique, t. 2, etc. E.

peu entre eux. Le groupe ainsi formé est caractérisé de la manière suivante par M. Walckenaer : yeux au nombre de 8 presque égaux entre eux, groupés et ramassés sur le devant du corselet, entre les mandibules; trois de chaque côté, formant un triangle irrégulier dont l'angle le plus aigu est en avant; les deux autres yeux situés entre les précédents, sur une ligne transversale. Lèvre petite, presque nulle, insérée entre les mâchoires. Mâchoires allongées, cylindroïdes, divergentes, creusées longitudinalement à leur côté interne. Palpes allongés, pédiformes, insérés à l'extrémité des mâchoires. Pattes allongées, fortes, peu inégales entre elles. Cet auteur les divise en trois familles (les plantigrades, les digitigrades inermes et les digitigrades mineuses), et donne la description de 37 espèces, dont plusieurs sont nouvelles (voy. Hist. nat. des insectes aptères, t. 1).

Le genre Némésie de M. Savigny rentre dans ce groupe (voy. Arachnides de l'Égypte, pl. 1). E.

ESPÈCES.

1. *Mygale meçonne. Mygale cementaria.*

M. obscurè ferruginea; mandibulis nigricantibus: dentibus quinque elongatis validis. Oliv.

Mygale cementaria, Lat. Gen. 1. p. 84. (Ocelli, t. 3. f. 2).

Ejssd. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 164. pl. 63. f. 1—6.

Walck. *Tabl. ar. d'ar.* p. 5.

Oliv. *Encycl.* vol. 9. p. 86.

* Dorthès. *Trans. of the Linnean society.* vol. 2. pl. 17. fig. 6.

* L. Dufour. *Ann. des Sc. phys. de Bruxelles.* t. 5. pl. 73. fig. 5.

* Latreille. *Règne anim. de Cuvier.* 2^e édit. t. 4. p. 231.

* Griffith. *Anim. Kingd. Arach.* pl. 2. fig. 2.

* Walckenaer. *Faune française, aranéides.* p. v. n. 1. *Ejssd. Hist. nat. des insectes apter.* t. 1. p. 235.

* Dugès. *Règne animal de Cuvier. atlas. arach.* pl. 1.

Habite le midi de la France.

2. *Mygale pionnière. Mygale fodiens.*

M. obscurè brunnea; mandibulis dentibus quatuor brevibus inaequalibus. Oliv.

Mygale Sauvagesii, Lat. Gen. 1. p. 84.

Eysa. Hist. nat., etc. ?- p. 165. pl. 63. f. ?- 10.

Mygale pionnière. Walck. Tableau des ar. p. 5.

Oliv. Encycl. n° 2.

* *M. Sauvagesi.* L. Deleur. Ann. des Sc. phys. t. 5. pl. 73. fig. 3.

* *Latr. Mem. de la soc. d'hist. nat.* p. 125.

* *Rossi. Fauna etrusca.* t. 3. p. 10. fig. 11.

* *M. pionnière.* Andouin. Ann. de la soc. entomolog. t. 2. pl. 14.

* *Walckenaer. Faune française.* Aranéides, pl. 2. fig. 2 et 3.

* *Eysa.* Hist. des ins. aptér. t. 1. p. 237. pl. 5. fig. 2.

Habite en Italie et en Corse.

.. Etc. Voyez Olivier et M. Walckenaer pour trois autres espèces.

AVICULAIRE (Avicularia.)

Palpes saillans; plus courts que les pattes, insérés à l'extrémité des mâchoires. Mandibules sans râteau, ayant leur crochet fléchi en dessous ou sur le côté inférieur. Deux mâchoires. Lèvre inférieure presque nulle. Huit yeux, disposés en croix de Saint-André.

Corps très grand, ayant le port des araignées. Huit pattes fortes : le dernier article de leurs tarses ayant une brosse tomenteuse sous son sommet. Elles se retirent dans diverses cavités qu'elles rencontrent.

Palpi exserti, pedibus breviores, ad apicem maxillarum inserti. Mandibulae rastello nullo : unguâ terminali subtilius aut infero latere inflexâ. Maxillae duae. Labium subnullum. Oculi octo situ crucem Andriæam simulant.

Corpus maximum, araneorum habitu. Pedes octo, validi, tarsorum articulo ultimo scopula tomentosa infra apicem instructo. In cavitates varias secedunt.

OBSERVATIONS. — Sous plusieurs rapports, les *aviculaires* se rapprochent des *mygales*, et néanmoins nous croyons qu'il est convenable de les en séparer. En effet, une taille énorme, des habitudes particulières, et plusieurs caractères tranchés les en distinguent éminemment. Ces grandes aranéides sont très velues, et ont des brosses de poils à l'extrémité de leurs pattes et

de leurs palpes, qui rendent cette extrémité obtuse; elles n'ont point la première pièce de leurs mandibules terminées par des dents en rateau. Ce sont des chasseuses, presque vagabondes, qui se retirent dans des trous, des fentes à terre, ou dans les cavités des arbres, et qui ne se construisent point de nids particuliers comme les mygales. Elles dévorent les fourmis, et sucent quelquefois les petits oiseaux dans leur nid.

ESPÈCES.

1. Aviculaire crabe. *Avicularia canceridea*.

A. hirsutissima, nigro-fusca; pilis elongatis; palpis pedibusque apice ferrugineis.

Aranea avicularia. Lín. Fab. Syst. 2. p. 424.

Mygale aviculaire. Lat. Hist. nat. etc. 7. p. 152. pl. 62. f.

Ejuid. gen. 1. p. 83 (*Oculi*, pl. 3. f. 1).

Walck. Tableau des ar. p. 4.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles. Vulgairement Araignée crabe. Il paraît que plusieurs espèces ont été confondues sous ce nom (* voyez à ce sujet l'ouvrage déjà cité de M. Walckenaer, t. 1. p. 214. 217).

2. Aviculaire de le Blond. *Avicularia Blondii*.

A. oblonga, hirsuto-ferruginea; pedum unguiculis vix prominulis.

Mygale de le Blond. Lat. hist. nat., etc. 7. p. 159.

Et Gen. 1. p. 83. tab. 5. f. 1.

* Palissot de Beauvois. Insectes d'Afrique, pl. 3. fig. 2.

* Hahn. Monog. des Spinn. pl. 1; et die Arachniden, t. 1. p. 25. pl. 7.

* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 6.

* Walckenaer. Hist. des insect. aptér. t. 1. p. 210.

Habite à Cayenne.

3. Aviculaire fasciée. *Avicularia fasciata*.

A. abdomine fasciâ latâ, longitudinali: marginibus sinuatis.

Mygale fasciée. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 160.

Et Gen. 1. p. 83. Règn. anim. t. 4. p. 229.

Séba. Mus. 1. pl. 69. f. 1.

* Hahn. Monog. des Spinn. p. 25. pl. 3; et die Arachn. t. 2. p. 63. pl. 57. fig. 187.

* Walckenaer. Hist. des ins. aptér. t. 1. p. 209.

Habite l'île de Ceylan.

M. Walckenaer a établi sous le nom de *SPHEGROS* un nouveau genre très voisin des *Mygales*, mais qui s'en distingue par les pattes grosses, courtes et renflées, la lèvre étroite et allongée, et quelques autres caractères (voyez Ann. de la Soc. Entom., t. 2. p. 439, et Hist. des Ins. aptères, t. 1, p. 246). La division générique proposée par M. Lucas, sous le nom de *PACHIOSCELIS* (Ann. de la Soc. entom. t. 3. p. 361) et le genre *Actinopus* de M. de Perty (Delect. Anim. articul. quæ Spix et Martius colleger. p. 198) doivent y rentrer. E.

CLASSE HUITIÈME.

LES CRUSTACÉS. (Crustacea.)

Animaux ovipares, articulés, aptères; à peau crustacée, plus ou moins solide; ayant des pattes articulées, des yeux, soit pédiculés, soit sessiles, et des antennes le plus souvent au nombre de quatre, à bouche maxillifère, rarement en forme de bec; les mâchoires en plusieurs paires superposées; la lèvre inférieure presque nulle. Point d'ouvertures stigmatiformes pour la respiration. Cinq ou sept paires de pattes. (1)

Une moelle longitudinale ganglionnée, terminée antérieurement par un petit cerveau. Un cœur et des vais-

(1) Quelquefois moins et quelquefois aussi davantage. Ainsi dans la *Limnæ* on en compte jusqu'à soixante paires, dans l'*Apus* vingt-deux paires, et dans les *Cypris* on en distingue que trois paires. E.

seaux pour la circulation. Respiration branchiale : à branchies externes, tantôt cachées sous les côtés de l'écaille du corselet ou enfermées dans des parties saillantes, tantôt à découvert au dehors, et en général adhérentes à certaines pattes ou à la queue. Chaque sexe le plus souvent double.

Animalia ovipara, articulata, aptera; tegumento crustaceo, plus minusve solido, pedibus articulatis; oculis vel pediculatis vel sessilibus; antennis sæpius quaternariis; ore maxilloso, rarius rostrato; maxillis pluribus partibus superpositis; labio inferiore subnullo; aperturis stigmataliformibus pro respiratione nullis. Pedum paribus quinque vel septem.

Medulla longitudinalis gangliis nodosa, encephalo parvo antice terminata. Cor vasculaque circulationi inservientia. Respiratio branchialis: branchiis externis, modo sub testâ thoracis ad latera opertis, vel in partibus prominentibus inclusis, modo nudis et universè pedibus certis vel caudâ adhurentibus. Sexus quisque sæpius duplex.

OBSERVATIONS. — Les crustacés sont les derniers animaux qui aient le corps et les membres articulés, et dont la peau offre partout une indurescence ou une solidification propre à fournir des points d'appui aux attaches musculaires. Ils viennent donc nécessairement, dans la marche que nous suivons, et même dans l'ordre de leur production par la nature, après les arach-

En effet, ces animaux articulés et essentiellement aptères, paraissent prendre leur source dans les derniers genres de la première branche des arachnides acémifères, auxquelles j'ai donné le nom d'*arachnides crustacéennes*, parce qu'elles seraient des crustacés, si leur organe respiratoire n'était intérieur et trachéal, et si elles possédaient un système de circulation.

Plus éloignés encore des animaux que les arachnides, sous le rapport du mouvement de leurs fluides et sous celui de leur respiration, les crustacés offrent, dans leur organisation intérieure, de grands perfectionnements obtenus, puisque les

deux modes nouveaux, commencés seulement vers la fin des arachnides, savoir : la circulation des fluides et la respiration par des branchies, sont ici devenus généraux pour toutes les races, et de plus en plus développés. Effectivement, le système d'organes spécial pour la circulation des fluides, se montre dans les crustacés de tous les ordres où il a été possible de l'observer, et présente, dans les crustacés décapodes, des perfectionnemens remarquables (1). Il en est de même des branchies, qu'on ne trouve que dans les deux dernières familles des arachnides, où elles ne sont encore qu'ébauchées. On les retrouve ici partout (2), sous des formes et dans des lieux très variés, et elles reçoivent de grands développemens dans les crustacés des derniers ordres. Enfin, dans ces animaux, on ne voit plus de véritables stigmates pour l'entrée du fluide respiratoire.

La considération des articulations du corps et des pattes des *crustacés* a, depuis Linné, fait regarder ces animaux comme de véritables insectes par presque tous les naturalistes; et, dans ce cas, on les rangeait dans l'ordre des aptères, ainsi que les arachnides. Or, d'après la distribution alors généralement admise des animaux, les arachnides et les crustacés se trouvaient à la fin de la classe des insectes, c'est-à-dire, après des animaux dont l'organisation est moins composée que la leur; ce qui était déjà très connu.

Enfin, les zoologistes reconnaissant qu'à l'égard des animaux, la considération de l'organisation intérieure est la plus importante pour la détermination des rapports et des rangs, on fut obligé de reporter les arachnides en avant des insectes, et les crustacés en avant des arachnides; mais on tenait toujours à re-

(1) Voyez à ce sujet les recherches que nous avons publiées en commun avec M. Audouin, dans les *Annales des Sciences naturelles*, t. 11, p. 283. E.

(2) Presque tous les crustacés ont en effet des branchies proprement dites ou des organes modifiés dans leur structure, de manière à devenir des instrumens spéciaux de respiration; mais dans quelques espèces telles que les *Mysis*, les *Phyllosomes* et les *Cyclops*, on ne voit rien de semblable, et c'est par la surface générale du corps que cette fonction semble s'exercer. E.

garder les animaux de ces deux divisions comme de véritables insectes. En effet, M. Cuvier, dans son tableau élémentaire des animaux, plaça les crustacés et les arachnides à la tête de la classe des insectes, et en forma la première division de cette classe.

Je ne partageai point l'opinion de ce savant; et attribuant plus d'importance aux motifs qui lui faisaient reporter les crustacés en avant des insectes, je crus devoir les en séparer entièrement; et dans mon cours de l'année 1799, j'en formai une classe particulière. Ce ne fut que l'année suivante que j'établis celle des arachnides, avant même de savoir que le nouvel ordre de choses observé, depuis long-temps, dans l'organisation des crustacés, était déjà commencé en elles. Ainsi le rang des animaux de ces deux classes est maintenant fixé, et est bien supérieur à celui que l'on doit accorder aux insectes.

Quoique très distincts entre eux, les arachnides et les crustacés se rapprochent tellement par quantité de rapports, que probablement l'on sentira toujours que les deux classes qu'ils constituent, doivent s'avoisiner. Il y en a même un grand nombre parmi eux, qui ont des rapports très marqués dans leur forme générale et dans leur aspect; tels, par exemple, que la plupart des *crustacés décapodes*, qui semblent être des araignées marines.

Quelques citations pourront suffire pour montrer le fondement des rapports dont je viens de parler.

Indépendamment de plusieurs traits de ressemblance observés dans la forme générale de différens animaux de ces deux classes, on voit, dans presque toutes les arachnides exantennées, la tête immobile et tout-à-fait confondue avec le corselet; or, la même chose s'observe dans la plupart des crustacés, surtout dans les décapodes.

On voit de même, dans un grand nombre des arachnides exantennées, soit des palpes, soit des mandibules chélifères, or, dans un grand nombre de crustacés, on trouve non-seulement des pattes chélifères, mais souvent des palpes qui le sont aussi. Qui ne croirait voir, effectivement dans les palpes chélifères des scorpions, de véritables pattes d'écrevisses ou de crabe!

On a vu aussi, dans plusieurs de ces arachnides exantennées, les yeux soutenus par des tubercules et même portés sur des pédicules quoique immobiles; or, dans un grand nombre de crustacés, les yeux sont élevés sur des pédicules, mais mobiles.

Enfin, on a vu, dans les scorpions et les araignées, les organes sexuels évidemment doubles; or, il est très connu qu'ils le sont aussi dans la plupart des crustacés. ●

On ne saurait donc méconnaître les rapports nombreux qui existent entre les crustacés et les arachnides, quoique ces animaux appartiennent à deux classes très distinctes.

Si l'on considère les *animaux articulés*, en général, et si l'on examine ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres, on pourra penser que, pour leur donner successivement l'existence, la nature n'a suivi qu'un seul plan, tant ils tiennent les uns aux autres par des analogies nombreuses. Bientôt, malgré cela, on remarquera que ce plan a reçu, presque dès son origine, des déviations dans la direction de son exécution, par l'influence de certaines circonstances; car son produit a donné lieu à plusieurs branches bien distinctes, et non à une succession suivie d'objets formant une série simple.

Comme nous l'avons dit, à l'entrée de la classe des arachnides, la branche qui embrasse tous les insectes, nous a paru commencer par ceux qui sont essentiellement aptères [les puces]; une direction particulière du plan cité ci-dessus a amené les nombreux animaux dont il s'agit.

Mais le même plan ayant reçu une autre direction presque en même temps, a dû donner lieu à une autre branche, à celle des arachnides; et celle-ci s'est elle-même immédiatement partagée en deux branches particulières; savoir : 1^o celles des arachnides antennées parasites [les *poux* et les *ricins*] qui ont amené les acarides et ensuite les autres arachnides exantennées; 2^o celle des arachnides antennées crustacéennes qui ont fourni la source où tous les *crustacés* ont puisé leur existence.

Si ces considérations sont fondées, il ne serait pas vrai que les arachnides fussent une continuation naturelle des derniers insectes produits [des coléoptères], ni que les *crustacés* en fussent une des dernières arachnides [des aranéides], comme les rangs, justement assignés à ces trois classes, semblent l'indiquer.

Ayant déterminé la source des *crustacés*, dans notre manière de juger ce qui les concerne, disons maintenant un mot de leurs généralités.

Les *crustacés*, un peu plus nombreux que les arachnides, mais beaucoup moins que les insectes, sont en général remarquables par leurs tégumens solides, quelquefois même très durs, comme lorsque les molécules calcaires, dont ils sont empreints, dominent la matière cornée qu'ils contiennent ; mais, selon les familles et les genres, les molécules calcaires diminuant en quantité, la matière cornée de leurs tégumens devient dominante, et ces tégumens à la fin ne sont plus que simplement membraneux, comme dans beaucoup de crustacés branchiopodes.

Ces animaux sont presque tous munis d'antennes qui sont articulées, sétacées, et presque toujours au nombre de quatre. Dans plusieurs, la tête est intimement unie au corselet et tout-à-fait confondue avec lui. Ce corselet, qui couvre le thorax, forme alors une grande pièce, assez dure, à laquelle on donne le nom de *test*. Dans les autres, la tête est distincte, mais le thorax ou le corps est ordinairement partagé en sept segmens qui, en dessous, donnent attache aux pattes. Ce corps est souvent terminé postérieurement par une queue, composée elle-même de plusieurs anneaux. Les pattes, en général au nombre de dix à quatorze, sont composées de six articulations. Souvent les deux pattes antérieures, et quelquefois les deux ou les quatre suivantes, sont terminées en pince; d'autres fois elles sont, soit toutes, soit certaines d'entre elles, terminées par de simples crochets ; et il s'en trouve qui sont uniquement propres à la natation.

Les crustacés ont deux yeux, tantôt élevés sur des pédicules mobiles, et tantôt tout-à-fait sessiles. Ces yeux sont ordinairement composés ou à réseau. Dans plusieurs branchiopodes, les deux yeux sont réunis en un seul.

La bouche de ces animaux offre, en général deux mandibules, une languette au-dessous, et trois à cinq paires de mâchoires. On a donné à la première paire ou aux trois premières (1), le nom de *pieds-mâchoires*, parce que l'on suppose,

(1) En comptant d'arrière en avant.

d'après les observations de M. *Savigny*, que ces mâchoires sont formées par les deux ou les six pattes antérieures de l'animal qui, devenues très petites et rapprochées de l'intérieur de la bouche, ont été modifiées, et ont cessé d'être propres à la locomotion. Il résulterait de cette considération très ingénieuse de M. de *Savigny*, que le nombre total ou naturel des pattes des crustacés serait de seize; ceux qui ont quatorze pattes propres à la locomotion, n'ayant que deux pieds-mâchoires, et ceux qui n'ont que dix pattes, ayant six pieds-mâchoires. (1)

(1) La théorie de M. *Savigny* nous paraît devoir s'étendre non-seulement aux mâchoires et aux pattes thoraciques, mais à toute la série appendiculaire des Crustacés; chez ces animaux le nombre normal des anneaux constituant des corps, nous paraît être de vingt-et-un, et la tendance de la nature est de donner à chacun de ces segmens une paire de membres ou appendices, dont les formes et les usages peuvent varier dans les diverses parties du corps chez un même animal, ou dans les mêmes parties chez des espèces différentes. La première paire de ces appendices, lorsqu'elle existe, appartient aux organes des sens, et constituent les pédoncules oculaires; les deux paires suivantes constituent les antennes, et la quatrième paire les mandibules; les appendices des deux paires suivantes sont presque toujours spécialement affectés à l'appareil buccal; chez quelques Crustacés tels que les Thysanopodes, les huit paires d'appendices qui font suite aux six paires dont il vient d'être question, constituent toutes des pattes locomotrices, mais chez les Edriophthalmes, la première de ces paires de membres, et chez les Décapodes, les trois premières sont transformées en mâchoires auxiliaires; et chez les Siphonostomes, ces trois paires de membres constituent des pattes ancreuses destinées à fixer l'animal sur sa proie. Les membres de la quinzième paire et deux des paires suivantes, sont en général désignés sous le nom de fausses pattes, et varient également dans leurs fonctions; chez les Isopodes, les cinq premières paires de ces appendices deviennent des lamelles respiratoires, et la sixième paire des organes protecteurs des premières; chez

Les branchies des *crustacés* sont extérieures, quoique souvent cachées, et en général sont adhérentes à certaines pattes. Quelquefois néanmoins elles sont placées au-dessous de la queue. Le fluide à respirer, soit l'eau, soit l'air libre, n'y parvient point par des ouvertures en forme de stigmates, comme dans les arachnides et les insectes; caractère dont je me suis servi dans mes cours, pour faciliter la distinction des animaux de cette classe.

Le perfectionnement des crustacés, surtout de ceux du second ordre, est si peu hypothétique, que ces animaux, dans notre marche, sont les premiers en qui l'organe de l'ouïe ait été aperçu, et sont les derniers dans une marche contraire. Ainsi, quoique les insectes et les arachnides soient clairement doués des sens de la vue et du tact, aucun d'eux n'a encore offert le sens de l'ouïe d'une manière distincte.

Les *crustacés* ne se nourrissent que de matières animales. La plupart vivent dans les eaux soit marines, soit fluviatiles; mais quelques raies vivent habituellement sur la terre, et respirent l'air libre avec leurs branchies.

Relativement à l'ordre et à la division des crustacés, je tiens beaucoup à ce qu'il y a d'essentiel dans la distribution de ces animaux, telle que je l'ai publiée, d'après mes cahiers, dans le petit *Extrait de mon cours*, p. 89 à 93; mais j'y vois un renversement à faire dans la distribution générale, afin de commencer par les plus imparfaits de ces animaux, et plusieurs redressements et additions à opérer, d'après les savans ouvrages que M. Latreille a publiés en dernier lieu sur cette classe d'animaux.

Les Amphipodes, ces six paires de membres sont toutes affectées à la locomotion; mais les trois premières sont des fausses pattes natatoires, et les trois dernières constituent en général un organe de saut. Enfin, chez les Décapodes supérieurs, ces mêmes appendices servent comme auxiliaires de l'appareil de la génération, et constituent chez le mâle des organes excitateurs, et chez la femelle des tiges ovifères (Voyez à ce sujet notre *Hist. nat. des Crustacés*, t. 1, p. 40, et la planche 4 de l'atlas de la nouvelle édition du Règne animal de Cuvier.) E.

En conséquence, je divise, comme auparavant, les *crustacés* en deux ordres qui me paraissent très naturels et très distincts, savoir :

- 1° En *crustacés hétérobranchés*, dont les branchies, sous le corps, sont très diversifiées dans leur forme et leur situation, n'adhèrent point à des pieds-mâchoires, et ne sont jamais cachées sous les bords latéraux d'une carapace qui couvre tout le corps;
- 2° En *crustacés homobranchez*, dont les branchies en pyramides et composées de lames empilées, adhèrent aux derniers pieds-mâchoires, et sont toujours cachées sous les bords latéraux d'une carapace ou d'un test qui couvre tout le corps, excepté la queue.

[La grande division des Crustacés homobranchez est parfaitement naturelle, et correspond à l'ordre des crustacés décapodes tel que les auteurs les plus récents l'admettent, mais l'ordre des crustacés hétérobranchés est un groupe tout-à-fait artificiel, et qui ne peut être admis. La diversité de l'organisation est telle dans cette classe d'animaux, que, pour représenter les grandes modifications de structure, on est obligé de multiplier davantage les coupes de premier degré, et de séparer les crustacés en trois sous-classes, savoir: les Xyphosures, les Crustacés suceurs et les Crustacés maxillés, lesquels se subdivisent en plusieurs groupes secondaires; voici le tableau de la classification que j'ai proposé pour ces animaux, dans mon Histoire naturelle des Crustacés (t. 1, p. 231).

A. Sous-classe des CRUSTACÉS MAXILLÉS.

Bouche armée de mandibules et. de mâchoires lamelleuses, propres à diviser des alimens plus ou moins solides (presque jamais parasites).

1^{re} Légion. PODOPHTALMES.

Yeux portés sur des pédoncules mobiles; pattes thoraciques rigides et plus ou moins cylindriques; presque toujours des branchies proprement dites (1); une carapace recouvrant la totalité ou la majeure partie de la tête et du thorax.

(1) Nous entendons par branchies proprement dites, des

Ordre des DÉCAPODES.

Branchies fixées sur les côtés du thorax, et renfermées dans des cavités respiratoires spéciales. Presque toujours cinq paires de pattes thoraciques ambulatoires ou préhensiles.

Ordre des STOMAPODES.

Branchies extérieures et en général fixées sous l'abdomen, quelquefois nulles; en général sept ou huit paires de pattes natatoires ou préhensiles.

II^e Légion. EDRIOPHTALMES.

Yeux sessiles, au nombre de deux; en général point de branchies proprement dites; mais certains appendices des membres conformés de manière à en remplir les fonctions. Point de carapace. Pattes thoraciques, toujours rigides, plus ou moins cylindriques, et en général au nombre de sept paires.

Ordre des AMPHIPODES.

Branche externe ou appendice flabelliforme des pattes thoraciques vésiculeux et servant à la respiration. Abdomen très développé et terminé par un appareil locomoteur (servant au saut ou à la nage) composé des trois dernières paires de fausses pattes, dont la forme diffère toujours de celle des trois premières paires.

Ordre des LOEMIPODES.

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques vésiculeux, et servant à la respiration; abdomen rudimentaire.

organes spéciaux de respiration aquatique qui ne sont pas de simples modifications de quelques organes détournés, pour ainsi dire, de ses usages ordinaires, comme des pattes par exemple.

E.**II.**

Ordre des ISOPODES.

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques nuls ou impropres à la respiration; fausses pattes abdominales des cinq premières paires terminées par des lames membraneuses faisant fonctions de branchies. Abdomen très développé, mais ne servant que peu à la locomotion.

III^e Légion. ENTOMOSTRACÉS.

Yeux sessiles et en général réunis en une seule masse médiane de manière à paraître unique. Point de branchies proprement dites. Pattes pas lamelleuses, rigides, en général biramées et ne portant pas d'appendices conformés de manière à paraître propres à servir spécialement à la respiration.

Ordre des COPÉPODES.

Corps divisé en anneaux bien distincts et ne portant ni carapace ni enveloppe bivalve; pattes thoraciques en général au nombre de 4 ou 5 paires, et natatoires mais jamais membraneuses.

Ordre des OSTRAPODES.

Corps sans divisions annulaires bien distinctes, et renfermé en entier sous un grand bouclier dorsal ayant la forme d'une coquille bivalve. En général 2 ou 3 paires de membres thoraciques.

IV^e Légion. BRANCHIOPODES.

Yeux en général sessiles. Point de branchies proprement dites, mais des pattes thoraciques lamelleuses qui en tiennent lieu.

Ordre des CLADOCÈRES.

Pattes peu nombreuses, ordinairement au nombre de cinq paires; corps renfermé dans une carapace bivalve. Un seul œil.

Ordre des PHYLLOPODES.

Pattes très nombreuses. Thorax, tantôt nu, tantôt caché sous une carapace simple ou bivalve. Deux yeux.

B. Sous-classe des CRUSTACÉS XYPHOSURES.

Bouche conformée pour la mastication, mais dépourvue de mandibules et de mâchoires proprement dites et entourée de pattes ambulatoires, dont la base tient lieu de mâchoires. (Un seul genre.)

C. Sous-classe des CRUSTACÉS SUCEURS.

Bouche conformée pour la succion, tubuleuse et armée seulement de stylets ou de crochets. (En général parasites.)

Ordre des ARANÉIFORMES.

Pattes rigides, cylindriques, grêles, simples, au nombre de 4 ou 5 paires. Corps grêle et cylindrique.

Ordre des SIPHONOSTOMES.

Pattes rigides, en partie ancreuses et en partie lamelleuses et natatoires. Corps déprimé.

Ordre des LERNÉOÏDIENS.

Pattes rudimentaires ou nulles; corps déformé à l'âge adulte.

Les TAILONNÉS appartiennent aussi à la classe des Crustacés, et paraissent établir le passage entre les Isopodes et les Branchiopodes qui se lient aussi avec les Xyphosures. L'ordre des SUCURS ARANÉIFORMES se compose des Nymphons et des Pycnogonons qui, dans la méthode de Lamarck et de Latreille, sont rangés parmi les Arachnides (Voy. p. 100). Les LERNÉES sont placées par notre auteur parmi les vers. (Voy. t. 3.)

ORDRE PREMIER.

CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

Branchies externes, diversement situées, mais placées ailleurs que sous les bords latéraux d'une carapace. Elles sont, soit sous le ventre ou sous la queue ; soit adhérentes aux pattes ou confondues avec elles. Les yeux le plus souvent sessiles et immobiles.

Comme dans notre marche, nous nous élevons toujours du plus imparfait vers ce qui nous paraît plus perfectionné sous tous les rapports, nos crustacés hétérobranchés embrassent les quatre derniers ordres des Crustacés de M. Latreille, et comprennent effectivement les crustacés les moins parfaits, les plus petits, les plus diversifiés dans leurs formes et leurs caractères, ceux qui ont en général les tégumens les moins solides, en un mot, presque tous ceux que j'avais déjà réunis comme formant un ordre distinct, dans l'extrait de mon Cours (p. 91)', publié en 1812.

Ces crustacés si diversifiés entre eux, quelquefois même si singuliers, comme ceux qui appartiennent à la première section (les branchiopodes ou entomostracés), forment un contraste très remarquable avec les crustacés du second ordre qui sont si perfectionnés sous tous les rapports, qui ont tant d'analogie entre eux, et qui offrent une si grande ressemblance dans la nature et la situation de leurs branchies. Aussi sentira-t-on probablement que

ces deux coupes , principales et naturelles , doivent être conservées pour l'intérêt de la science.

Les *crustacés hétérobranchés* ont les branchies tantôt attachées seulement aux pattes qui servent à la locomotion, ou réunies à ces pattes, tantôt situées sous la queue, soit dans des écailles, soit à nu ; et tantôt placées sous le ventre, et fixées à la base des pattes ou de certaines pattes, et renfermées dans des corps vésiculaires. Jamais ces branchies ne sont adhérentes à des pieds-mâchoires.

Leur bouche varie beaucoup dans sa forme et ses caractères : tantôt elle présente une espèce de bec et n'est propre qu'à sucer, et tantôt elle offre des mâchoires ; mais ces mâchoires, en y comprenant les auxiliaires, ne sont jamais au nombre de six paires, comme dans les crustacés du second ordre.

Les femelles de ces animaux portent leurs œufs après la ponte, enfermés, soit dans des bourses suspendues derrière l'abdomen ou sous cet abdomen, soit dans des sacs sous le ventre, soit enfin dans des écailles aussi sous le ventre.

PREMIÈRE SECTION.

DES CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

1^{re} SECT. Les *Branchiopodes*.

Mandibules sans palpes ou nulles. Yeux le plus souvent sessiles, quelquefois réunis. Des pattes branchiales qui ne servent qu'à nager et auxquelles ou à certaines desquelles les branchies sont attachées. Un bec dans les uns et des mâchoires dans les autres, mais dont les deux inférieures sont sans articulations et en feuillets simples.

2° SUCT. Les *Isopodes*.

Mandibules sans palpes. Yeux sessiles. Des pattes uniquement propres à la locomotion ou à la préhension. Des mâchoires dans tous et dont les deux inférieures, en forme de lèvre, recouvrent la bouche. Les branchies situées sous le ventre ou sous la queue. (1). La tête souvent distincte du tronc.

(1) Nous croyons important de ne pas confondre les instrumens de respiration dont il est ici question avec les branchies proprement dites. Chez quelques crustacés, la respiration paraît s'effectuer par toute la surface du corps, et il n'existe aucune partie dont la conformation soit modifiée de manière à la rendre essentiellement propre à devenir le siège de cette fonction; mais chez la plupart des animaux de cette classe, la respiration est plus ou moins complètement localisée, et on remarque deux degrés dans cette division du travail physiologique. Ce sont d'abord des parties déjà existantes qui sont plus ou moins distraites de leurs fonctions ordinaires, et modifiées dans leur structure pour servir à la respiration; puis ce sont des organes spéciaux créés *ad hoc*, qui en sont spécialement chargés. Nous réservons à ces derniers le nom de *branchies proprement dites*, et nous ne les rencontrons guère que chez les Stomapodes et les Décapodes. Les premiers, que l'on pourrait appeler des *branchies adventives*, sont certains appendices des membres thoraciques ou abdominaux, dont l'existence est indépendante de leurs fonctions comme instrumens de respiration, mais dont la texture est restée molle et membraneuse, au lieu d'acquérir une consistance cornée, comme cela arrive lorsqu'elles doivent servir à d'autres usages. Chez les Amphipodes, ce sont les mêmes appendices qui, chez les Isopodes proprement dits, forment la poche ovifère des femelles, et qui, chez les Décapodes, constituent les lames cornées connues sous le nom de *solet des pattes* ou des pattes-mâchoires; chez les Isopodes, ce sont les lames terminales des fausses pattes abdominales qui représentent les branchies, et ces mêmes parties modifiées dans leur structure, deviennent chez les Amphipodes des organes de locomotion, et chez certains Décapodes des instrumens accessoires de la

3^e Sect. Les Amphipodes.

Mandibules palpigères. Yeux saillés. La tête distincte du tronc. Branchies vésiculeuses situées à la base intérieure des pattes ou de certaines pattes, en partant de la deuxième paire.

4^e Sect. Les Stomapodes.

Mandibules palpigères. Les yeux pédiculés. La tête en grande partie reculée sous un corselet antérieur non pédifère. Branchies à nez et en panache sous le ventre au-delà des pattes.

Première Section.**CRUSTACÉS BRANCHIOPODES. (1)**

Mandibules sans palpes ou nulles. Des pattes branchiales qui ne servent qu'à nager, et à respirer, les branchies y étant attachées ou à certaines d'entre elles. Un bec

génération. Ce sont encore des appendices analogues qui servent à la respiration chez les Branchiopodes proprement dits, et on peut toujours les reconnaître à la simplicité de leur structure, et à leur conformation vésiculeuse, ou foliacée, tandis que les branchies proprement dites, à moins d'être réduites à un état rudimentaire, sont d'une structure très compliquée, et offrent une multitude de lamelles ou de cylindres parallèles fixées par une de leurs extrémités seulement. E.

(1) Cette division se compose des éléments les plus hétérogènes, et ne peut être conservée aujourd'hui que l'on connaît mieux la structure des animaux que notre auteur y réunit; elle comprend les Siphonostomes, les Xyphosures et les deux groupes auxquels nous avons réservé les noms de Branchiopodes et d'Estomostracés. E.

les moins avancés en développement, nous les plaçons en tête de leur classe, quoique nous pensions que tous les crustacés tirent réellement leur source, par les isopodes, de la branche des arachnides antennées qui amène les myriapodes.

Nous diviserons les branchiopodes de la manière suivante. (1)

DIVISION DES BRANCHIOPODES.

§ *Pattes natatoires, mutiques, menues, soit simples, soit branchues; la plupart sétifères, jamais dilatées en lames, et ne servant ni à la préhension, ni à marcher (Branchiopodes frangés).*

(1) Test bivalve, enveloppant tout le corps.

Cypris.
Cythérine.
Daphnie.
Lyncée.

(2) Test, soit nul, soit d'une seule pièce et fort court.

Cyclope.
Céphalocle.
Zoë.

§§. *Pattes; soit lamelleuses et ciliées, soit distinguées en deux sortes pour les usages: les unes, antérieures à crochets simples ou doubles, servant à la préhension ou à marcher; et les autres, postérieures, étant seulement natatoires.*

(1) Les yeux pédiculés; toutes les pattes lamelleuses (Branchiopodes lamellipèdes).

(1) Cette division, comme nous l'avons déjà dit ne paraît pas naturelle. E.

BRANCHIOPODES.

273

Branchipe.

Artémis.

(a) Les yeux sessiles (pattes de deux sortes).

(a) Bouche en forme de bec plus ou moins distinct, renfermant un suçoir (Branchiopodes parasites).

Dichélestion.

Cécrops.

Argule.

Calige.

(b) Bouche non en forme de bec. Des mandibules sans palpes ou aucune; des mâchoires ou des pieds-mâchoires (Branchiopodes géans).

Limule.

Polyphème.

BRANCHIOPODES FRANGÉS.

Pattes natatoires, au nombre de six à douze, mutiques, menues, simples ou branchues, jamais dilatées en lames, la plupart sétifères, et ne servant ni à la préhension ni à marcher.

Les *branchiopodes frangés* ou les *lophyropes* de M. Latreille, sont les plus petits des crustacés connus; la plupart sont des animaux presque microscopiques. Leur tête est presque toujours confondue avec l'extrémité antérieure du tronc, et dans le plus grand nombre les deux yeux sont réunis en un seul œil. Les uns sont sans test ou n'en ont qu'un fort court et d'une seule pièce; les autres ont un test comme bivalve qui enveloppe leur corps. Ces petits crustacés sont transparens ou demi transparens ainsi que leur test. Ils vivent dans les eaux douces et tranquilles, et néanmoins quelques-uns habitent les

eaux marines. On rapporte à cette division les genres Cypris, Cythérine, Daphnie, Lyncée, Cyclope, Céphalocle et Zoë, qui suivent.

CYPRIS. (Cypris.)

Deux antennes droites, simples, en pinceau au sommet.
Un seul œil. Tête cachée. Test bivalve, renfermant le corps. Quatre pattes.

Antennæ duæ, rectæ, simplices, apice penicillatæ. Oculus unicus. Caput conditum. Testa bivalvis corpus recondens. Pedes quatuor.

OBSERVATIONS. — Les *Cypris* ont beaucoup de rapports avec les Cythérines; mais leurs antennes sont terminées en pinceau, c'est-à-dire, par un faisceau de poils assez longs, et on ne leur voit que quatre pattes. Leur test s'ouvre et se ferme longitudinalement d'un côté, comme les deux valves d'une conchifère. Ces Entomostracés microscopiques changent de peau et à-la-fois de test, ce qui prouve que ce test n'est qu'une dépendance de leur peau. Ils habitent les eaux douces et stagnantes des marais, des fossés aquatiques, et nagent avec vitesse. Ils ont une queue qui se renferme dans le test avec le corps. De très petits filets articulés et à pointes crochues ont été observés entre les deux paires de pattes.

[Depuis la publication de cet ouvrage, il a paru deux travaux très remarquables sur les petits crustacés dont il est ici question : le premier est l'histoire des Monocles, par Louis Jurine, le second est le mémoire sur les Cypris par M. Straus-Durkheim. Ce dernier naturaliste s'est attaché surtout à faire connaître la structure de ces animaux, tant par des figures que par une description détaillée. Voici les principaux résultats de ces observations. Le corps des Cypris est confondu avec la tête, et ne présente aucune trace de segmens; une queue molle, repliée et garnie de deux soies à son extrémité le termine, et un test bivalve à charnière dorsale l'enveloppe complètement. Un gros

œil noir et sphérique est situé à la partie supérieure et antérieure de leur corps, et surmonte immédiatement les antennes qui sont longues, sétacées et au nombre de deux seulement. La bouche, située vers la partie antérieure de la face inférieure du corps, est garnie d'un labre armée d'une sorte de lèvre inférieure, d'une paire de mandibules palpifères et de deux paires de mâchoires; une lame flabelliforme fixée à la base du palpe mandibulaire, est considérée par M. Straus, mais peut-être sans motifs suffisants, comme étant une branchie. Les pattes sont au nombre de 3 paires dont deux seulement paraissent au-dehors du test; celles de la première paire, plus fortes que les autres, s'insèrent au-dessous des antennes, et se dirigent en avant; celles de la seconde paire sont situées derrière la bouche, et dirigées en bas; enfin, celles de la troisième paire sont grêles, relevées de chaque côté du corps sous le test, et terminées par deux petits crochets. C'est au moyen de leurs antennes et de leurs pattes antérieures que ces petits crustacés nagent; ils ne paraissent pas subir de métamorphoses, et il est à remarquer que tous les individus que l'on a observés jusqu'ici étaient pourvus d'œufs logés sous la partie dorsale de leur test. M. Straus a proposé de former avec les Cypris et les Cythérines un ordre particulier qu'il désigne sous le nom d'*Ostrapodes* (voy. Mém. du Muséum. t. 7).

ESPÈCES.

1. Cypris pubère. *Cypris conchacea*.

C. ovata, *tomentosa*. Lat.

Cypris pubera. Mull. Entomotr. p. 56. tab. 5. f. 1-5.

Monoculus conchaceus. Lin. Fab. Syst. 2. p. 496.

Encyclop. pl. 266. f. 27-30.

Monoculus. n° 3. Geoffr. 2. p. 657.

Cypris conchacea. Latr. Gen. 1. p. 18.

Habite en Europe, dans les eaux pures ou claires des fossés, etc.

• Trois espèces de Cypris paraissent être confondues ici, savoir:

1° LA CYPRIS A DUVET. *Cypris pubera*. Muller; *Monoculus puber*.

Jurine. Monocles. p. 171. pl. 18. fig. 1 et 2. — *Cypris puber*. Olivier. Encyclop. t. 6. p. 253. — Desmarests, Consid. sur les crust. p. 383.

2° La Cypris blanche lisse. *Cypris conchacea*. — *Monoculus conchaceus*. Linné. Fauna suec. n° 2050. — *Monoculus ovato-conchaceus*. Degeer. Mém. pour servir à l'hist. des Ins. t. 7. p. 176. — *Cypris delecta*. Muller. Entom. p. 50. pl. 3. fig. 1-3. — Olivier. Encyclop. t. 6. p. 251. pl. 266. fig. 15-17, d'après Muller. — *Monoculus conchaceus*. Jurine, Monocles. p. 171, pl. 17. f. 7 et 8. — *Cypris conchacea*. Desmarests, Consid. sur les crust. p. 383.

3° La Cypris brune. *Cypris fusca*.

Poisson nommé détanche. Joblot. Obs. d'hist. nat. t. 1, 2, partie. p. 104. — Puceron en forme de rognon. Ledermuller. Amusemens microscop. p. 58. pl. 73. — *Cypris fusca*. Straus. Mém. du Muséum. t. 7. p. 59. pl. 1. fig. 1-16. — Desmarests. Consid. sur les crustacés. p. 384. pl. 55. fig. 1.

2. Cypris ornée. *Cypris ornata*.

C. ovata, anticè subitè sinuata, albo viridi fulvoque variegata.

Cypris ornatus. Mull. entomost. 51. p. 10. t. 3. f. 4-6.

* Olivier. Encyclop. méth. t. 6. p. 251. pl. 266. fig. 18-21. d'après Muller.

Monoculus ornatus. Fab. Syst. 2. p. 495.

Encycl. pl. 266. f. 18-21.

* Jurine. Hist. des Monocles. p. 170. pl. 17. fig. 1-4.

* *Cypris ornata*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 383.

Habite en Danemark, dans les eaux stagnantes.

3. Cypris lisse. *Cypris lævis*.

C. ovato-globosa, glabra, virescens.

Cypris lævis. Mull. Entomost. p. 52. tab. 3. f. 7-9.

Monoculus. Geoff. 2: p. 658. n° 5.

Monoculus lævigatus. Fab. 2. p. 495.

* Ajoutez la Cypris peinte (*Cypris picta*. Straus. Mém. du Muséum. t. 7. p. 59. pl. 1. fig. 17-19; — Desmarests, op. cit. p. 385). Cypris bordée. (*Cypris marginata*. Straus. Mém. du Mus. t. 7. pl. 59. pl. 1. fig. 20-22. — Desmarest. op. cit. p. 384). La Cypris veuve (*Cypris vidua*. Muller. Entomost. pl. 55. pl. 4. fig. 7-9. *Monoculus vidua*. Jurine. Monocl. p. 175. pl. 19. fig. 5-6. *Cypris vidua*. Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 385. pl. 55. fig. 4). La Cypris à une bande (*Cypris unifasciata*. *Cypris fasciata* ? Mull. Entomost. p. 53. pl. 4. fig. 1-3. *Monoculus unifasciatus*. Jurine. Monocl. p. 176. pl. 19. fig. 9 et 10. *Cypris unifasciata*. Desmarests. Consid. sur les crust. p. 386. pl. 55. fig. 5 et 6).

Et un grand nombre d'autres espèces décrites par Jurine, dans son ouvrage sur les Monocles.

Etc. Voyez le *Cypris nephroïdes* de M. Leach. Crust. angl. pl. 20.

Il existe dans les terrains tertiaires de l'Auvergne, et dans quelques autres formations des fossiles qui ont la plus grande analogie avec la Carapace conchyforme des *Cypris*, et qui appartiennent à quelque animal voisin de ces crustacés, ou des Linnadies, tels sont : la *Cypris fuba* (Desmarests, Bullet. de la Soc. Philom. 1813. pl. 4, fig. 8 : et Hist. des crustacés fou. p. 141. pl. 11, fig. 8 ; — Lyell, Principles of Geology. vol. 3. p. 310, et vol. 4. p. 97).

Et la *Cypris scoto-bardigalensis* (Hibbert on the limestone of Bardigal-House. Trans. of the Phil. Soc. Edinb. vol. 13. p. 179.)

CYTHÉRINE. (Cytherina.)

Deux antennes velues dans leur longueur. Un seul œil, tête cachée. Test bivalve, renfermant le corps. Huit pattes.

Antennæ duæ per longitudinem pilosæ. Oculus unicus. Caput conditum. Testa bivalvis corpus recondens. Pedes octo.

OBSERVATIONS. — Ayant donné le nom de Cythérée à un genre de conchifères, je suis obligé de changer la terminaison du nom de celui-ci. Les Cythérines ont des rapports avec les *Cypris*; mais le nombre de leurs pattes et leurs antennes simplement pileuses les en distinguent. Elles n'ont point de queue, et vivent dans la mer. (* Ces crustacés ont une analogie très grande avec les *Cypris*, mais ne sont encore que très imparfaitement connus.)

ESPÈCES.

1. Cythérine verte. *Cytherina viridis*.

C. testâ viridi, reniformi, tomentosa.

Cythera viridis. Mull. Ent. p. 64. t. 7. f. 1-2.

Latr. Gen. 1. p. 19 et Hist. nat. 4. p. 251.

Monoculus viridis. Fab. Syst. 2. p. 491.

Encycl. pl. 266. f. 4-5. (* D'après Muller).

* Desmarests. Consid. sur les Crustacés p. 387.

Habite les mers du nord, parmi les fucus.

TOME V.

2. Cythérine jaune. *Cytherina lutea*.*C. lutea*, test. reniformi., glabra.*Cythera lutea*, Mall. Entomost. p. 65. tab. 7. f. 2. 4.*Monoculus luteus*, Fab. 494.

Encycl. pl. 266. f. 6, 7. (* D'après Muller).

* Desmarests. Consid. sur les crust. p. 388. pl. 55. fig. 8.

Habite les mers du nord, entre les plantes marines.

Etc.

+ Ajoutez.

* *Cythere fluvida*, Muller. Entom. p. 66. pl. 7. fig. 5-6. — Olivier.

Encyclop. t. 6. p. 256. pl. 266. fig. 10. 11. (d'après Muller). —

Desmarests. op. cit. p. 388.

* *Cytherea gibba*, Muller. loc. cit. pl. 7. fig. 7-9. — Olivier. loc. cit.

pl. 266. fig. 12-14. (D'après Muller.) — Desmarests. loc. cit.

Cytherea gibbera, Muller. loc. cit. pl. 7. fig. 10-12. — Olivier. loc.

cit. — Desmarests. loc. cit.

[Il existe d'autres crustacés marins qui ressemblent beaucoup aux Cypris par la conformation générale de leur corps, qui ne peuvent rentrer ni dans l'un ni dans l'autre des deux genres dont il vient d'être question. Tels sont les Ostrapodes que nous désignerons sous le nom de CYPRIDINES ; ils ont deux yeux assez éloignés de la ligne médiane et situés vers le milieu de leur test bivalve, et l'abdomen terminé par une nageoire caudale composée de deux lames cornées insérées sur une base commune, et armées, sur leur bord postérieur, d'épines disposées comme des dents de peigne. Je me propose d'en donner une description détaillée dans le troisième volume de mon Histoire naturelle des Crustacés.

E.

DAPHNIE. (Daphnia.)

Deux antennes rameuses, à rameaux sétifères (1). Un seul œil. Tête saillante. Test subunivalve, s'ouvrant longitudinalement d'un côté. Huit à douze pattes.

Antennæ duæ ramosæ; ramis setiferis. Oculus unus. Caput exsertum. Testa subunivalvis, uno latere longitudinaliter dehiscens. Pedes octo ad duodecim.

OBSERVATIONS. — Parmi les Entomostracés presque microscopiques, les *Daphnies* sont ceux qui ont été le plus observés et qui sont les mieux connus. Ils sont fort remarquables par la forme de leurs antennes, et leur test, quoique bivalve, semble d'une seule pièce qui s'ouvre du côté du ventre par la seule flexibilité de ce test au dos de l'animal. Leur tête est saillante et s'avance un peu d'un côté, souvent en forme de museau. Mais la bouche, au lieu d'offrir un sucoir, a, dit-on, deux mandibules sans dentelures et une soupape qui fait passer les aliments entre ces pièces et deux palpes articulés. La transparence des tégumens permet de voir les mouvemens du cœur, qui se contracte deux cents fois par minute. Les sexes sont séparés; un seul accouplement suffit pour la fécondation de six générations successives, ce qui, je crois, signifie pour la fécondation des œufs de six pontes différentes.

Les *Daphnies* vivent dans les eaux douces, nagent avec célérité, et se servent de leurs pattes et de leurs antennes pour exécuter leurs mouvemens dans les eaux. On en connaît neuf ou dix espèces.

{ Les *Daphnies*, les *Lyncées*, les *Céphalocles* de Lamarck ou *Polyphèmes* de Muller, les *Limnadiés*, les *Branchippes*, les *Arthémises*, les *Apus* (ou *Limules* de Lamarck), les *Néhalies*, et quelques autres petits crustacés, nous paraissent former un groupe naturel caractérisé par la structure de l'appareil buccal et des

(1) Suivant M. Straus, ces organes ne sont pas des antennes mais les pieds antérieurs; et en effet, ils paraissent s'insérer en arrière de l'appareil buccal.

pattes thoraciques, et ce sont les seuls auxquels nous croyons devoir conserver le nom des Branchiopodes. Ce groupe se divise en deux ordres : les CLADOCIRAS, dont les pattes ne sont qu'au nombre de quatre ou cinq paires, et les PHYLLORONES, dont les pattes sont au nombre de huit à douze paires, ou même davantage.

Les Daphnies, dont la structure a été étudiée avec soin par Schæffler, Rhamdor, Jurine, et M. Straus, appartiennent au premier de ces groupes. Leur tête, très distincte du corps, surtout en dessous, porte immédiatement au-dessous de l'œil une paire d'antennes (ou *petits barbillons* Jurine) très courtes. La bouche, placée à la base du bec, est garnie 1° d'un labre caréné; 2° de deux grandes mandibules dentées; et 3° d'une paire de mâchoires dirigées horizontalement en arrière. De chaque côté du cou s'insèrent les pattes antérieures (ou *grandes antennes* de Muller et Jurine, *antennes* de Lamarck), qui sont dirigées en avant, et ont la forme de grandes rames natatoires à deux branches garnies de longues soies plumeuses; l'une de ces branches se compose de trois articles, l'autre de quatre. En arrière de la bouche, on trouve cinq autres paires de pattes, ayant toutes leur second article vésiculeux; celles des quatre premières paires se terminent par une lame natatoire, ciliée sur les bords; la première sert principalement à la préhension; celles de la seconde, de la troisième et de la quatrième paires portent en dehors un appendice lamelleux qui paraît représenter le fouet, et servir à la respiration; enfin, les deux dernières ont une forme très différente des précédentes, et sont désignées par Rhamdor, sous le nom de serres. L'abdomen est grêle, allongé, recourbé en avant, composé de huit anneaux, et terminé par deux petits crochets dirigés en arrière. Entre le dessus du corps et la portion dorsale de la carapace conchiforme se trouve une cavité servant à loger les œufs; les ovaires occupent les côtés de l'abdomen; le cœur est situé dans les régions dorsales antérieures; enfin les organes mâles paraissent aboutir près de la dernière paire de pattes. Il est aussi à noter que ces petits crustacés naissent avec la forme qu'ils doivent conserver, et n'éprouvent pas de métamorphoses comme les Cyclopes, etc.

E.

ESPÈCES.

1. Daphnie puce. *Daphnia pulex*.

D. caudá inflexá ; testá posticè mucronatá. Lat. -

* *Pulex aquaticus arborescens*. Swammerdam. Hist. gen. des Insectes. p. 68. pl. 1.

Biblia. nat. pl. 31.

* *Animaletti aquatici*. Redi. Observat. pl. 16. Les deux dernières figures.

* *Grunen arm-polypen*. Scheffer. Geschwänzer-Zackiger-Wasser-floh.

* *Branchipus conchiformis primus*. Ejusdem. Elem. Entom. pl. 29. fig. 3, 4 ; et Icones insectorum. t. 2. pl. 150. fig. 5.

* *Ferroquet d'eau*. Geoff. Hist. des Ins. t. 2. p. 656.

* *Puceron*. Ledermuller. Amusem. microscop. t. 1. p. 65. pl. 75. fig. 2.

* *Daphnia pulex*. Muller. Zool. Danica prod. n° 2,400.

Daphnia pennata. Mull. Entomost. p. 82. t. 12. f. 4-7.

Monoculus pulex. Lin. Fab. S. 2. p. 491.

* *Pulex arborescens*. Goeze Natur. Forscher. 1775. p. 102.

* Eichhon. Beytrage zur Naturgeschichte. p. 51. pl. 5. fig. II.

* *Monoculus pulex*. Cuvier. Tab. élém. p. 455.

* Manuel. Encycl. p. 722. pl. 265. f. 1-4.

Geoff. 2. p. 655. n° 1.

Daphnia pulex. Lat. Gen. 1. p. 18. et Hist. nat. 4. p. 223. pl. 33. f. 2. 3.

* Jurine. Eull. de la Soc. philomatique. t. 3. p. 33.

* *Daphnia pennata*. Bosc. t. 2. p. 283. pl. 18. fig. 1-3.

* *Daphnia pulex*. Straus. Mém. du Mus. t. 5. p. 392. pl. 19. fig. 1 et 20 ; et t. 6. p. 153.

* Desmarests. Consid. sur les crustacés. p. 372. pl. 54. fig. 3.

Habite en Europe, dans les eaux douces. Elle est d'un rouge de sang.

2. Daphnie longue-épine. *Daphnia longispina*.

D. caudá inflexá ; testá posticè aculeatá : aculeo serrato.

* Schæffer. Die grünen. arm-polypen. p. 59. pl. 2. fig. 1.

Daphnia longispina. Mull. Entom. p. 88. tab. 12. f. 8-10.

Monoculus longispinus. Fab. p. 492.

* Manuel encycl. pl. 265. f. 5-7.

* Degeer. Mém. t. 7. p. 442. pl. 27. fig. 1-4.

Daphnia (Daphnia) *retula* Muller.

Syllaba (Daphnia) *retula* Muller. 1799. pl. 1. fig. 9.

Daphne retula. Muller. Zool. dan. prod. n° 2399.

Daphnia sima. Mull. Entomost. p. 91. pl. 12. fig. 1

Salzer. Insect. p. 266. pl. 30. fig. 10. c.

Monoculus expinosus. Degeer. Mém. t. 7. 457. pl. 27

¶ *Simus*. Manuel. Encyclop. p. 723.

Daph. Sima. Bosc. Crust. t. 2. p. 283.

Daphnia retula. Straus. Mém. du Muséum t. 6. p. 16

Daphnia simia. Gruithuisen. Mém. des curieux de la n
t. 14. 399. pl. 24.

Desmarest. Consid. sur les crust. p. 373.

Habite nos eaux douces.

† Ajoutez la Daphnie géant (*Daphnia magna*). Trem
pour servir à l'hist. des polypes. p. 91. pl. 6. fig. 3. p

Daphnia pulex. Oth. Fabricius Fauna Groen. p. 26

magna. Straus. Mém. du Muséum. t. 5. pl. 29. fig. 2

t. 6. p. 159. Desmarest. op. cit. p. 373.

La Daphnie arrondie (*Daphnia rotunda*). *Daphnia rotu*

Mém. du Muséum. t. 6. p. 161. t. 5. pl. 29. fig. 27

La Daphnie à gros bras (*Daphnia branchiata*). Joblot. Ol

nat. faites avec le microscop. t. 1. p. 10. pl. 18.

Monoculus brachiatus. Jurine Monoc. p. 131. pl. 1

4. *Daphnia macropus*. Straus. Mém. du Muséum. t.

t. 5. pl. 29. fig. 29 et 30. *Daphnia brachint*

sid. sur les crust. p. 373

LYNCÉE. (Lynceus.)

Deux ou quatre antennes simples, velues ou terminées en pinceau. Deux yeux distincts, (1).

Tête ensertile, souvent saillante. Corps ovale, renflé, enfermé dans un test bivalve. Huit pattes sétifères.

Antennæ duæ vel quatuor simplices, villosæ aut apice penicillatæ. Oculi duo distincti.

Caput exsertile, sæpè prominulum. Corpus ovatum, turgidum, testâ bivalvi inclusum. Pedes octo setiferi.

OBSERVATIONS. — Les *Lyncées* ressemblent beaucoup aux *Daphnies*; mais ils ont deux yeux distincts, quoique rapprochés, et leurs antennes sont plutôt simples que branchues. Leur test est transparent, et a une échancrure antérieure par où la tête sort et rentre au gré de l'animal. Des écailles barbuës ou branchiales accompagnent souvent les pattes de ces crustacés. On trouve les *Lyncées* dans les eaux stagnantes où ils nagent avec beaucoup de vitesse. Leur tête est un peu conformée en bec.

[Les *Lyncées* ont l'abdomen infléchi et les pattes antenniformes ou rames, divisées en deux branches comme chez les *Daphnies*; mais suivant M. Straus, la tige pédonculaire est très courte, et les branches sont composées d'un plus grand nombre d'articles que dans les genres voisins. E.

ESPÈCES.**1. Lyncée queue-courte. *Lynceus brachyurus*.**

L. antennis quatuor; testâ globosâ; caudâ deflexâ. Lat.

Lynceus brachyurus. Mull. Entom. p. 69. tab. 8. fig. 1-12.

Lat. Gen. 1. p. 17. et Hist. n. 4. p. 204. pl. 32. fig. 1-12.

Monoculus brachyurus. Fab. Syst. 2. p. 497.

Habite en Europe, dans les marais, au printemps.

(1.) Situés tous les deux sur la ligne médiane; l'un assez grand l'autre très petit et placé au-devant du précédent. E.

2. Lyncée trigonelle. *Lynceus trigonellus*.

L. antennis quatuor; testâ anticè gibba; caudâ inflexâ, seratâ.

Lynceus trigonellus. Mull. Entom. p. 74. tab. 10. f. 5. 6.

Latr. Hist. nat., etc. 4. p. 205. pl. 33. f. 1.

Monoculus trigonellus. Fab. S. 2. p. 498.

* *Monoculus laticornis*. Jurin. Mon. p. 151. pl. 15. f. 6 et 7.

* Desmarets. Consid. p. 376.

Habite en Danemark, dans les fossés aquatiques.

3. Lyncée sphérique. *Lynceus sphæricus*.

L. antennis duabus; testâ globosâ; cauda inflexâ.

Lynceus sphæricus. Mull. Entom. p. 71. t. 9. f. 7-9.

Latr. Gen. 1. p. 17. et Hist. nat. 4. p. 207.

Monoculus sphæricus. Fab. S. 2. p. 497.

* *Chydorus Mulleri*. Leach. Dict. des sc. nat. t. 14. p. 541.

* *Lynceus sphericus*. Straus. Mém. du Muséum, t. 6.

* Desmarets. Consid. sur les crust. p. 373.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

Etc.

[M. Straus-Durckheim a donné le nom de SIDA à un genre de l'ordre des Cladocères, comprenant des Crustacés très voisins des Daphnies, mais qui ont l'abdomen recourbé en haut au lieu d'être infléchi; les rames ou pattes antenniformes de ces animaux sont également divisées en deux branches dont l'une est composée de deux articles, l'autre de trois. Ce naturaliste y rapporte une seule espèce.

Le SIDA CRISTALLIN, *Sida cristallina*. Straus. Mém. du Muséum, t. 6.

p. 157. — *Daphnia cristallina*. Mull. Entom. pl. 14. f. 1 et 4.

— *Mono. elongatus*. Degeer. Mém. t. 7. p. 470. pl. 29. f. 1-4. —

M. cristallinus. Manuel encyclop. t. 724. pl. 265. f. 15-18. —

Daphnia cristallina. Latreille. Hist. des crust. et des Ins. t. 4. p. 230.

Le genre LATONE de M. Straus est une autre division de la famille naturelle dont les Daphnies constituent le type, et comprend les espèces dont l'abdomen est réfléchi comme dans le genre Sida, et dont les rames antenniformes présentent trois branches d'un seul article.

Exemple :

Latone stylifère. *Latona stylifera*.

Straus, Mém. du Muséum, t. 6, p. 456.

Daphnia setifera. Mull. Entomost. pl. 14. f. 5-7.*Monoculus setifer*. Manuel encyclop. meth. art. Monocles. p. 724. pl. 266. f. 1-3.

— Bosc. Crust. t. p. 284.

Daphnia setifer. Lat. Hist. nat. des Crust. Ins. t. 4. p. 211.

R.

† LIMNADIE. (*Limnadia*.)

M. Adolphe Brongniart a donné ce nom à un nouveau genre de Crustacés branchiopodes qui a pour type le *Daphnia gigas* de Hermann. Le corps de cet animal se compose d'une série de plus de vingt anneaux, mais est entièrement renfermé entre les deux valves d'une carapace conchiforme assez semblable à celle des Cypris. La tête est pourvue de deux yeux et de quatre antennes dont deux petites et simples et deux grandes terminées, chacune, par deux filets multiarticulés; la bouche est armée de deux mandibules et de deux mâchoires foliacées dont la réunion forme une sorte de bec. Les vingt-deux anneaux qui suivent la tête portent chacun une paire de pattes lamelleuses, dont la structure a la plus grande analogie avec celle des pattes branchiales des Branchiopes; les pattes de la 11^e et 12^e paires présentent au côté externe de leur base un appendice flabelliforme qui remonte dans la cavité située entre le dos de l'animal et la carapace et servant à fixer les œufs. Enfin, le corps se termine par un anneau dépourvu de pattes, mais portant à son extrémité deux filets divergens qui constituent une sorte de nageoire caudale.

On ne connaît qu'une espèce de Limnadie, savoir :

La LIMNADIE DE HERMANN *Daphnia gigas*. Hermann. Mémoire aptérologique, p. 134, pl. 5.—*Limnadia* Her-

manni. Ad. Brongniart, Mém. du Muséum, t. 6, pl. 13.
 —Desmarests, Consid. sur les crust. p. 380, pl. 56, fig. 1;
 —Latreille, Règne animal, t. 4, page 172); qui a environ 4 lignes de long et se trouve dans les mares.

+ Le genre *Cyzique* de M. Audouin établit le passage entre les Limnadies, les Lyncées et les Apus et ne paraît pas différer du genre *Estherie* de MM. Ruppell et Straus. Ce sont des crustacés dont la carapace a la forme d'une coquille bivalve et dont les pattes non moins nombreuses que chez les Limnadies sont également membraneuses, mais présentent une structure plus compliquée. M. Audouin a signalé deux espèces de ce genre sous les noms de *Cyzicus Bravaisii* et de *Cyzicus tetracerus* (Ann. de la soc. entomologique. Bulletin 1837, p. 10), et MM. Ruppell et Straus ont décrit et figuré avec beaucoup de soin, sous le nom d'*Estheria duhalacensis* (Muséum senckenbergianum, t. 2, p. 119, pl. 7) un crustacé auquel il faudra peut-être rapporter l'une des deux espèces précédentes. E.

CYCLOPE. (Cyclops.)

Deux ou quatre antennes, simples, sétifères. Un seul œil sur le dos du premier segment.

Corps allongé, insensiblement rétréci vers la partie postérieure, divisé en segmens transverses dont le premier est le plus grand. Queue terminée par deux pointes sétacées. Six à douze pattes sétifères.

Antennæ duæ vel quatuor, simplices, setigeræ. Oculus unicus in dorso primi segmenti.

Corpus elongatum, sensim posticè angustatum, segmentis pluribus transversis divisum : segmento primo majore. Cauda biseta. Pedes sex ad duodecim, setiferi.

OBSERVATIONS. — Les Cyclopes sont de très petits crustacés

presque microscopiques, qui font partie du genre *Monoculus* de Linné. Ils n'ont point de tête, à moins qu'on ne prenne leur premier segment pour un test court. Leur corps est allongé, atténué postérieurement, et terminé par deux soies. Le mâle, dit-on, a ses parties sexuelles cachées vers le milieu de l'un de ces antennes. Ce fait, observé dans quelques espèces, est singulier, si toutefois l'on n'a pas pris pour antennes, deux pattes antérieures, dirigées en avant (1). Les femelles portent leurs œufs renfermés dans un sac membraneux, en forme de grappe ovale, et pendant sous le ventre, à l'origine de la queue.

La plupart des Cyclopes vivent dans les eaux douces. Leur taille est si petite, qu'on prétend que nous sommes souvent exposés à en avaler lorsque nous buvons.

Les genres *Anonyx* et *Nauplia* de Muller ne sont que des larves de Cyclope, selon M. de Jurine.

[Les Cyclopes se rapprochent un peu des Cypris par la structure de leurs pattes, qui ne sont en aucune façon branchiales comme chez les Daphnies et les Lyncées. Ils n'ont pas de carapace, mais les divers segments de la partie antérieure de leur corps sont en général confondus en une seule pièce qui en offre jusqu'à un certain point l'aspect; à cette espèce de tête élargie succèdent quatre ou cinq anneaux thoraciques, et en arrière, le corps se termine par un abdomen étroit, composé d'un nombre variable d'anneaux, et garni à l'extrémité de deux appendices natatoires divergens et ciliés. En arrière des antennes, on trouve à la surface inférieure du corps, la bouche qui est garnie d'une paire de mandibules à bords dentés, et portant un barbillon ou tige palpiforme plus ou moins développée, d'appendices représentant les mâchoires, et d'une paire de pattes-mâchoires formées chacune d'une portion pédonculaire très courte portant

(1) Les antennes servent au mâle pour saisir la femelle pendant l'accouplement, mais ne peuvent être considérés comme renfermant les parties sexuelles. Les organes de la génération paraissent être logés comme d'ordinaire, vers la base de l'abdomen, et s'y terminer par deux petits appendices coniques situés sur les côtés du deuxième anneau abdominal. E.

deux branches dont l'externe est reployée sur elle-même, en manière de mains; ces appendices sont dirigés en avant, et appliqués contre la bouche; les pattes qui suivent sont au contraire dirigées en bas et ordinairement en arrière; elles sont composées chacune d'un pédoncule très large, et de deux branches divisées en plusieurs articles, et garnies de soies penniformes; on en compte quatre paires, et en arrière de ces organes, on trouve fixée au dernier anneau du thorax, une cinquième paire d'appendices plus ou moins développés, dont la forme varie suivant les espèces et les sexes.

On doit à Jurine des observations pleines d'intérêt sur le développement de ces petits crustacés. Lorsqu'ils sortent de l'œuf, ils ne ressemblent pas du tout à leurs parens, et sont loin de posséder tous les organes qu'ils auront par la suite; ils subissent, par conséquent, de véritables métamorphoses. Lorsqu'ils sortent de l'œuf, leur corps est presque circulaire, et on ne voit rien qui ressemble à l'abdomen ni aux pattes thoraciques; ils ne sont alors pourvus que de trois paires de membres pédiformes qui représentent les antennes et les pattes-mâchoires. Quelque temps après, les divers anneaux du thorax se montrent, et ils acquièrent les dernières paires de pattes thoraciques; enfin, leur abdomen se développe, et peu après, ils prennent la forme de leurs parens. C'est dans les premiers temps de la vie, lorsqu'ils n'ont que trois paires de membres bien distincts, qu'ils ont été nommés *amymones*, par Muller, et ces mêmes animaux, ayant acquis une paire de pattes de plus, constituent son genre *Nauplius*. E.

ESPÈCES.

1. Cyclope quadricorne. *Cyclops quadricornis*.

C. antennis quatuor; caudâ rectâ, bifidâ.

Monoculus quadricornis. Lin. [Fab. syst. 2. p. 500.

Monocle à queue fourchue. Geoff. 2. p. 656. pl. 21. f. 5.

Cyclops quadricornis. Mull. Entom. p. 109. t. 18. f. 1-14.

Lat. Gen. 1. p. 19.

* Monocle. Degeer. Mém. pour servir à l'hist. des Ins. t. 7. pl. 29.
f. 11 et 12.

- * *Monoculus quadricornis rubens*, Jurin. Hist. des monoc. p. 1: pl. 1. f. 1-1. pl. 2. f. 19. — Var. *albidus* ejusd. p. 44. pl. 2. f. 10-11. — Var. *viridis* ejusd. p. 46. pl. 3. f. 1: — Var. *Fuscus* ejusd. p. 47. pl. 3. f. 2; — Var. *prasinus* ejusd. p. 49. pl. 3. f. 5.

* *Cyclops vulgaris*. Leach.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 362. p. 53. f. 1-4.

Habite en Europe, dans les eaux douces. Il est blanchâtre.

2. Cyclope nain. *Cyclops minutus*.

C. albidus; caudé bisé, longitudine corporis

Cyclops minutus. Mull. Entom. p. 101. t. 17. f. 1-7.

Encycl. pl. 263.

Monoculus minutus. Fabr. Syst. 2. p. 499.

* *Monoculus staphylinus*. Jurin. Hist. des mon. p. 74 pl. 7. f. 1, 2 et 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 363 pl. 53. f. 6.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

3. Cyclope longicorne. *Cyclops longicornis*.

C. antennis duobus longissimis; caudé bifid.

Cyclops longicornis. Mull. Entom. p. 115. t. 19. f. 7-9.

Lat. Gen. 1. p. 20 et Hist. nat. 4. p. 266.

Monoculus longicornis. Fab. syst. 2. p. 501.

Habite la mer de Norvège.

† Ajoutez le Cyclops castor. *Cyclops caeruleus*. Mull. Entom. pl. 15. f. 1-19, *Cyclops rubens*. Ejusd. pl. 16. f. 1-3 et *Cyclops laciniosus*. pl. 16. f. 4-6.

* *Monoculus caeruleus*. Fab. Syst. Entom. t. 2. p. 500. et *M. Rubens* Ejusd. loc. cit.

* *Monoculus castor*. Jurin. Hist. des Monoc. p. 50. pl. 4, 5 et 6.

* *Cyclops castor*. Desmarest. Cons. sur les Crust. p. 363. pl. 13. f. 5.

Habite les eaux douces.

Cette espèce paraît devoir se rapporter au genre *Calanus* de Leach, division qui ne diffère de celle des Cyclopes, proprement dits, que par l'absence des deux antennes postérieures et par le grand allongement des antérieures. (1)

Etc.

(1) Voy. Desmarests, Considérations sur les crustacés, p. 364. Le type de ce genre est *Cyclops finmarchianus* de Muller (Zool. Dan. Prod. 2415; — *Calanus finmarchianus*. Leac. loc. cit.)

[Le genre *Pontia* a beaucoup d'analogie avec celui des Cyclopes, et doit prendre place dans la même division naturelle; il s'en distingue principalement par la conformation des appendices qui correspondent aux antennes inférieures et aux pattes-mâchoires. La tête se termine antérieurement par une espèce de rostre mobile; les antennes antérieures sont longues, sétacées et multi-articulées; les appendices, qu'on peut considérer comme les antennes de la seconde paire (mais qui, peut-être, sont dans la réalité, les analogues des pattes-mâchoires antérieures), sont dirigés en bas, et constituent des appendices natatoires composés chacun d'un article pédonculaire, et de deux branches ciliées au bout, dont l'externe est plus longue que l'interne, et terminées par un article lamelleux, élargi en forme de rame; les mandibules sont très grandes, fortement armées, et portent une grande tige palpiforme, aplatie, composée de deux articles lamelleux, disposés en manière de pincettes didactyles. En arrière de ces organes, on trouve deux paires de mâchoires lamelleuses, et deux paires de pattes-mâchoires, dont l'une très grande, large, aplatie, terminée par deux rames, et garnie d'un grand nombre de poils plumeux. Quatre paires de pattes natatoires, divisées en deux rames, comme chez les Cyclopes, suivent ces pattes mâchoires, et sont fixées aux quatre anneaux thoraciques que précèdent le dernier; celui-ci porte une paire de membres dont la forme varie beaucoup suivant les espèces et suivant les sexes; quelquefois l'un de ces appendices se termine par une grosse main subchéli-forme; enfin l'abdomen, beaucoup plus étroit, même à sa base que ne l'est le thorax, se compose de deux ou trois articles, et se termine par une nageoire formée de 2 lames horizontales.

L'espèce qui a servi de type à ce genre a reçu le nom de *Pontia de Savigny*, *Pontia Savignii* (Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 13. pl. 14. f. 1) et se trouve sur nos côtes.

Une seconde espèce auquel nous donnerons le nom de **PONTIE DE REYNAUD**, *Pontia Reynaudii*, a été recueillie dans l'Océan Atlantique boréal par le Dr Reynaud, et se fait remarquer par les cornes qui terminent latéralement le thorax et par la forme bizarre de l'antenne supérieure et de la dernière patte du côté droit, chez les individus mâles.

Les crustacés fossiles, dont on a formé le genre **EURYPTERUS** paraissent avoir beaucoup d'analogie avec les Cyclopes et semblent établir, à quelques égards, le passage entre ces animaux et les Isopodes; ils ont les deux yeux réniformes et sont remarquables par l'existence d'une paire de pattes aplaties et très larges en forme de palettes natatoires. Les géologues en ont signalé trois espèces, savoir :

L'*Eurypterus ramipes*. DeKay. Ann. du Lycée de New-York. t. 1, p. 375. pl. 29. — Harlan medical and physical Researches, p. 297. — Bronn. Lethæa geognostica. p. 109. pl. 9. fig. 1.

L'*Eurypterus lacustris*. Harlan op. cit. p. 298. pl.

L'*Eurypterus Scouleri*. Hibbert on the Limestone of Burdie-House. Trans. of the Phil. Soc. of Edinb. t. 13. p. 281. pl. 12. fig. 1-15.

Le fossile dont M. Scouler a formé le genre **ENDOTHEA** (Edinb. Journ. of Nat. and Geogr. Science, new. series. 1831. t. 3. p. 352. pl. 10; — Bronn. Lethæa. p. 109. pl. fig. 2) est la tête de la 3^e espèce d'*Eurypterus*, mentionnée ci-dessus (voy. Hibbert. loc. cit.).

Le genre **SAPPHIRINA** de M. Thompson est également intermédiaire entre les Cyclopes et les Isopodes; il a pour type un petit crustacé dont le corps est à-peu-près ovulaire, et aplati au point d'être tout-à-fait foliacé, et divisé en neuf segmens; le premier de ces segmens beaucoup plus grand que les autres, porte une paire d'antennes et les appendices de la bouche; les quatre segmens suivans portent chacun en dessous une paire de petites pattes biramées semblables à celles des Cyclopes, mais moins développées; enfin, le dernier segment abdominal donne insertion à deux petits appendices lamelleux et ovulaires qui se dirigent en arrière.

ESPÈCE.

Sapphirine brillante. *Sapphirina fulgens*.

Oniscus fulgens. Telesius. Neue. Ann. Wetteransch. 1. pl. 213. fig. 24. — *Sapphirina: indicator*. Thompson. Zool. Researches. pl. 8. fig. 2. — *Sapphirina fulgens*. Templeton. Trans. of the Entomol. Soc. of London. vol. 1. part. 3. p. 194. pl. 21. fig. 8.

E.

CÉPHALOCULE. (Cephaloculus.)

Point d'antennes connues. Bouche.... Un œil grand, globuleux, ressemblant à une tête distincte du corselet.

Corps transparent, presque crustacé. Corselet ovale; abdomen sessile, ovale, déprimé. Queue formée par un filet terminé par deux soies, se repliant sous l'abdomen. Dix pattes, dont deux antérieures, sont beaucoup plus grandes, divergentes, fourchues au sommet, et ressemblant à des rames.

Antennæ nullæ cognitæ. Os.... Oculus unicus magnus, globosus, caput à thorace distinctum æmulans.

Corpus pellucidum, subcrustaceum. Thorax ovatus. Abdomen sessile, ovatum, depressum. Filamentum terminale, apice bisetosum, caudam abdomini inflexam efformans. Pedes decem: duobus anticis multò majoribus, apice furcatis, ad latera divaricatis, remiformibus.

OBSERVATIONS. — Le nom de Polyphème que l'on donne maintenant à l'animal singulier de ce genre, parce qu'il n'a qu'un œil, me parut, dans le temps, appartenir plutôt au genre qui renferme les géans des entomostracés, et que Linné désignait aussi sous le nom spécifique de Polyphème, n'en distinguant qu'une espèce. Il en résulte que mes Polyphèmes sont actuellement des Limules pour différens auteurs. Au reste, quelque dénomination que l'on donne à l'animal dont il s'agit ici il n'en est pas moins très singulier par ses caractères.

A la place où se trouve ordinairement la tête, le *Céphalocle* présente une sphère noirâtre, brillante, laquelle est un œil, résultant peut-être de la réunion de deux yeux, et qui est propre à recevoir de toute part l'impression de la lumière et la vue des objets.

Ce petit animal, qu'on a pris d'abord pour une larve, mais qui ne change jamais de forme, habite dans l'eau des étangs et des marais, où on le rencontre en grandes troupes. Il nage sur le dos, et se sert de ses deux pattes antérieures en place de rames. Sa queue, qui se réfléchit sous l'abdomen, est alors en dessus.

[Le genre Polyphème ou Céphalocle est très voisin des Daphnies, et appartient à la même division naturelle. E.]

ESPÈCE.

1. Céphalocle des étangs. *Cephaloculus stagnorum*.

Monoculus pediculus. Lin. Entom. Fauna Tunica. Fab. t. 4. p. 173.

Polyphemus oculus. Mull. Entom. p. 119. pl. 20. f. 1-5.

(* Entom. Syst. t. 2. p. 502).

* *Monocle à queue retroussée*. Geoff. Ins. t. 2. p. 656.

Latr. Gen. 1. p. 20 et Hist. nat. vol. 4. p. 287. pl. 30. f. 3-5.

* *Monoculus oculus*. Manuel Encyclop. t. 7. p. 818. pl. 263. f. 1.

* — Bosc. Crust. t. 2. p. 285. pl. 18. f. 516.

* — Cuvier. Tab. élément. p. 456.

* *Polyphemus pediculus*. Straus. Mém. du Muséum. t. 6. p. 156.

* *Polyphemus stagnorum*. Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 365.
Habite en Europe, dans les étangs, les eaux des marais.

ZOE. (Zoea.)

Quatre antennes insérées au-dessous des yeux : les intérieures simples, les externes bifides. Bouche inconnue.

Tête sessile, à peine distincte, ou se terminant en un long bec subulé, perpendiculaire. Deux yeux grands, sessiles, latéraux, situés à la base du bec. Le premier segment

du corps formant un grand corselet, à dos chargé d'une longue épine, courbée en arrière. Queue aussi longue que le corselet, divisée en cinq segmens : le dernier étant épineux ou en forme de nageoires. Plusieurs pattes très courtes, cachées sous le corselet, mais les deux dernières plus longues et natatoires.

Antennae quatuor infra oculos insertae : interioribus simplicibus ; externis bifidis. Os ignotum.

Caput sessile, vix distinctum, aut in rostrum longum subulatum perpendiculare desinens. Oculi duo magni, sessiles, laterales, ad basim rostri. Corporis segmentum primum thoracem magnum efformans : dorso in spinam longam retrò-curvatam producto. Cauda thoracis longitudine, quinque articulata : articulo ultimo spinoso vel pinniforme. Pedes plures brevissimi : duobus posticis longioribus, natatoriis.

OBSERVATIONS. — Les Zoës sont des crustacés marins, très petits, transparens, fort singuliers par leur conformation, et surtout par les changemens qu'ils paraissent éprouver en se développant ou à mesure qu'ils changent de peau. Leurs caractères sont encore peu connus, et surtout ceux des parties de leur bouche ne le sont nullement. Nous avons suivi ceux indiqués par MM. Bosc et Latreille, le premier en ayant observé une espèce dans la mer Atlantique, loin des côtes. Lorsqu'on voit cet animal dans l'eau, sa transparence fait que l'on n'en aperçoit que les yeux qui sont d'un bleu très brillant, et qu'une tache qui se trouve à la base de l'épine dorsale. Il paraît qu'il existe plusieurs espèces de ce genre, et que le *monoculus taurus* de Slaber doit y être rapporté.

[Il n'est peut-être aucun Crustacé sur lequel les zoologistes aient émis des opinions aussi divergentes qu' sur le petit animal à forme bizarre, découvert par Bosc en haute mer, entre l'Europe et l'Amérique, et nommé par cet auteur Zoé. Bosc le rangea dans la division des Sessiliocles de Lamarck, entre les Branchiopodes et les Crevettes; Latreille, dans la première

édition du Règne animal de Cuvier, le relègue dans son ordre des Branchiopodes, entre les Polyphèmes et les Cyclopes, tout en émettant l'opinion qu'il pourrait bien appartenir à la tribu des Décapodes shizopodes. Cette dernière opinion est aussi celle du docteur Leach, qui a eu l'occasion d'étudier des Zoés recueillies par Crank pendant le voyage du capitaine Tuckey au Zaïre; il les place à la fin de la légion des Podophthalmes, à côté des Nébalies; mais il ne fait pas connaître les raisons qui l'y ont déterminé; aussi, son exemple n'a pas entraîné les zoologistes, et M. Desmarests a continué à les ranger dans l'ordre des Branchiopodes à côté des Branchipes, et Latreille, dans la seconde édition du Règne animal, place ces animaux dans la division des Monocles. Enfin, à cette incertitude sur la place que les Zoés doivent occuper dans la série naturelle des Crustacés, sont venues s'ajouter de nouvelles difficultés: car un naturaliste anglais, M. Thompson, a annoncé, il y a quelques années, que ces singuliers animaux ne sont autre chose que des espèces de larves du Crabe commun de nos côtes; dont les jeunes éprouveraient de véritables métamorphoses avant que de parvenir à l'état parfait (Zoological researches, vol. I, Corck, 1830), opinion qui a été repoussée par la plupart des zoologistes, et fortement combattue par M. Westwood.

D'après l'examen que nous avons eu l'occasion d'en faire, nous sommes porté à adopter une partie des vues de M. Thompson, et à considérer les Zoés comme des crustacés décapodes dont le développement n'est pas achevé, mais nous pensons que ce sont des jeunes de quelques espèces de la section des Anomoures plutôt que des larves d'un Cancérien proprement dit. Il serait trop long d'exposer ici les raisons sur lesquelles nous fondons cette opinion, et nous nous bornerons à envoyer pour plus de détails à l'article Zoé, dans le second volume de notre Histoire naturelle des Crustacés.

E.

ESPÈCE.

1. Zoé pélagique. *Zoe pelagica*.

Zoe pelagica: Bosc. Hist. nat. des Crust. 2. p. 135. pl. 15. f. 3. 4.

Latr. Gen. 1. p. 21 et Hist. nat. 4. p. 298. pl. 35. f. 1. (* Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. 152.)

- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 395.
- * Thompson. Zoological Research. t. 1. pl. 1. f. 3.
- * Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 437.

Habite l'Océan Atlantique. Boss.

- * Le Zoé A MASSÉ. *Zoea clara*. Leach (appendice au voyage du capitaine Tuckey, pl. 18 f. 5; et Journal de physique, 1818, p. 304. fig. 4. — Latreille. Encyclop. pl. 354. f. 5. (d'après Leach). — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 395. — Thompson, op. cit. pl. 1. f. 5. — Edwards loc. cit.) diffère peu du précédent, seulement les prolongemens spiniformes de la carapace se terminent par un bouton arrondi.

- * M. Thompson a décrit et figuré avec soin plusieurs Zoés dans son intéressant mémoire sur les métamorphoses des Crustacés (1), et dans un travail plus récent, dans lequel il assure que les jeunes du Carcin menade passent par la forme des Zoés et des Megalops avant que d'arriver à l'état parfait. (On the double metamorphosis in the Decapodous Crustacea, Trans. of the phil. soc. 1835, 2^e partie, p. 359, pl. 5. f. 1, 2.)

- * Enfin M. Westwood a donné le nom de *Zoea gigas* (On the supposed existence of metamorphoses in Crustacea; of the Philos. soc. 1835, part. 2, p. 312, pl. 4, A) à un autre animal très voisin des précédens.

BRANCHIOPODES LAMELLIPÈDES.

Ces branchiopodes sont singuliers en ce qu'ils sont les seuls de cette section qui aient les yeux pédiculés. Toutes leurs pattes sont natatoires, branchiales et dilatées en lames ciliées. On ne distingue parmi eux que les deux genres qui suivent :

BRANCHIPE. (Branchipus.)

Antennes sétacées, au nombre de deux ou de quatre. Deux yeux composés, pédiculés, mobiles. Deux cornes mobiles, situées sur le front, unidentées au côté externe, fourchues au sommet. Bouche offrant une papille en bec crochu, accompagné de quatre petites pièces.

(1) Zoological researches, 1 vol. (in-8. Cork 1830), pl. 1 et 2.

Tête distincte du tronc. Corps allongé, mou, transparent, divisé en onze segmens. Queue subcylindrique, longue, articulée, diminuant insensiblement, et terminée par deux nageoires ciliées. Pattes lamelleuses, ciliées, natatoires, et au nombre de onze paires.

Antennæ setacæ, duæ aut quatuor. Oculi duo, stipitati, compositi, mobiles. Frons corniculis duobus, mobilibus, latere externo unidentatis, apice furcatis. Os papillâ rostri-formi hamulatâ, corpusculisque quatuor suffultâ instructum.

Caput à trunco distinctum. Corpus elongatum, molle, hyalinum, segmentis undecim divisum. Cauda subcylindrica, longa, articulata, sensim angustata, pinnis duabus ciliatis terminata. Pedes lamellosi, ciliati, natatorii, branchiales; undecim paribus.

OBSERVATIONS. — D'accord avec M. Latreille, je donne maintenant le nom de *branchipes* aux singuliers crustacés dont il s'agit, que j'avais nommés *branchiopodes* auparavant, afin de conserver cette dernière dénomination à la section des crustacés dont ils font partie.

Les *branchipes* sont véritablement singuliers dans leur forme et leurs caractères, et il est fort remarquable de leur trouver des yeux latéraux, pédiculés et mobiles. Leurs sexes sont séparés, doubles et situés sous le second anneau de l'abdomen. Le nombre des antennes, tantôt de deux, tantôt de quatre, distingue probablement les sexes. Ces crustacés n'ont point de test, point de pattes à crochets, et ont le corps allongé, assez étroit, très mou. Les œufs, après leur sortie du corps, restent suspendus dans un sac situé près des deux ouvertures sexuelles de la femelle; la transparence de ce sac permet d'apercevoir la belle couleur bleue de ces œufs.

Il paraît que les *branchipes* prennent, pendant leurs développemens successifs, des figures différentes; ce qui est peut-être cause qu'on en a distingué de diverses espèces. On trouve ces crustacés dans les fossés remplis d'eau. Je ne citerai que l'espèce qui suit :

ESPÈCES.

1. Branchipe stagnal. *Branchipus stagnalis*.

Branchiopoda stagnalis. Syst. des anim. sans vert. p. 161.

Latr. Gen. 1. p. 22. et Hist. nat. des Crust. 4. p. 319. pl. 26 et 27.

Cancer stagnalis. Lin.

Gammarus stagnalis. Fab. Syst. 2. p. 518.

* *Apus pleiiformis*. Schaffer. Monog. in-4. Rathbonne. 1752 et 1757.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 389.

* Herbst. Krabben. t. 2. pl. 35. f. 3 à 10.

† Ajoutez : le BRANCHIPE DES MARAIS. *B. paludosus*.

Cancer paludosus. Mull. Zool. danica. t. 2. pl. 48.

Herbst Krabben. t. 2. pl. 35. f. 3-5.

Chirocephalus diaphanus. Bénédict Prevost. Journal de Physique an 11 et dans l'histoire des Monoc. de Jurin. p. 201. pl. 20, 21 et 22.

Branchipus paludosus. Latreille. Règne anim. t. 4. p. 177. etc.

Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 389. pl. 56. f. 2-5.

Cette espèce diffère de la précédente par la disposition filiforme de ses nageoires caudales, la direction des cornes du mâle, etc. On trouve dans le mémoire de Bénédict Prevost, des observations très intéressantes sur les métamorphoses que ce crustacé éprouve dans le jeune âge.

Habite en Europe, dans les fossés aquatiques.

ARTÉMIS. (Artemisus.)

Deux antennes courtes, subulées. Deux yeux subpédunculés. Bouche..... sous le bord antérieur.

Corps ovale, à tête non séparée, et postérieurement caudifère. Queue longue, terminée en pointes. Dix paires de pattes lamelleuses, natatoires, ciliées, terminées par une soie.

Antennæ duæ, breves, subulatæ. Oculi duo, subpedunculati. Os.....infra marginem anticum.

Corpus ovale, posticè caudatum; capite non distincto.

Cauda longa, àpice acuta Pedum paria decem ; pedibus lamellosis, natatoriis, ciliatis, setâ terminatis.

OBSERVATIONS. — Je nomme *Artémis* un branchiopode dont on prétend que M. *Leach* a fait un genre sous le nom d'*Arthemisia*, dénomination que l'on sait être consacrée à un beau genre de plante. L'*Artémis* paraît avoir des rapports avec le Branchipe, mais il en est très distinct génériquement. Je n'ai en vue que d'en faire une simple mention, en attendant que ses caractères soient bien connus.

ESPÈCES.

1. *Artémis* des eaux salines. *Artemisus salinus*.

Cancer salinus. Lin.

* Schlosser. Observ. périodiques sur la physique etc. de Gautier 1756.

Gammarus salinus. Fab. Syst. ent. 2. p. 518.

Cancer salinus (* Ratchett). Trans. soc. Linn. vol. XI. p. 205. tab. 14. f. 8. 9. 10.

* *Artemia salina*. Leach.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 393.

* Payen et Audouin. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 6. p. 219 et 226. Habite les eaux salines, en Angleterre, etc. Animal très petit.

[Le genre *EULIMÈNE* de Latreille paraît devoir prendre place auprès des *Arthémises* et des *Branchipes*. Il se compose d'un petit crustacé de la Méditerranée, dont le corps dépourvu de carapace est linéaire et annelé dans toute sa longueur, la tête pourvue de quatre antennes courtes presque filiformes et de deux yeux pédonculés ; les pattes, au nombre de onze paires, lamelleuses ou membraneuses et simples ; enfin, l'abdomen semiglobuleux et portant un filet terminal qui a l'apparence d'un tube ovifère. On n'en connaît qu'une espèce : l'*EULIMÈNE* BLANCHATRE (*Eulimene albida*. Latreille. Règne anim. de Cuvier, 1^{re} édit., t. 3, p. 68 ; nouveau dict. d'hist. nat.

t. 10, p. 333, etc. ; — Desmarests. Consid. sur les crust. p. 394).

BRANCHIOPODES PARASITES.

Ceux-ci sont fort remarquables par leur bouche en forme de bec et qui n'est propre qu'à sucer, et par leurs habitudes de se fixer sur les branchies, les lèvres ou d'autres parties du corps des poissons où ils vivent en parasites. Ils ont deux sortes de pattes : les unes antérieures et à crochets pour se fixer ; les autres postérieures et natatoires. On distingue parmi eux les genres *Dichélestion*, *Cécrops*, *Argule* et *Calige*, dont voici l'exposition :

[Cette division correspond à la famille des Siphonostomes de Latreille (Règne anim. de Cuvier, 2^e édit., t. 4, p. 189), et se lie étroitement à celle des Lernées que notre auteur laisse parmi les Épizoaires ; elle entre dans la grande section des crustacés suceurs et a pour caractères principaux l'existence d'un suçoir, de pattes ancreuses et de pattes natatoires. De même que chez les Cyclopes et les autres entomostracés proprement dits, la femelle porte ses œufs enfermés dans une ou deux poches plus ou moins tubiformes, suspendues à la base de l'abdomen, et les petits subissent des changemens considérables. On connaît aujourd'hui un nombre assez considérable de ces petits crustacés parasites, dont quelques-uns présentent les formes les plus bizarres et dont d'autres ressemblent beaucoup à des Cyclopes. M. Burmeister les a très convenablement divisés en trois familles, qu'il désigne sous les noms de *Ergasilina*, *Caligina* et *Argulina*. (Voyez Beschreibung einiger neuen schmarotzerkrebse. Act. acad. Cæs. Leop. Carol. nat. cur. vol. 17.)

E.

DICHELESTION. (*Dichelestium*.)

Deux antennes sétacées. Bouche en forme de bec. Deux palpes [ou bras] avancés, chélifères.

Corps subcylindrique, insensiblement plus grêle vers son extrémité postérieure, divisé en sept anneaux; sans test. Deux pattes antérieures à crochets, et quatre autres crochues et dentées au premier segment; quatre pattes terminées par des doigts dentelés au second segment; le troisième portant de chaque côté un corps ovale. Deux tubercules à l'extrémité du dernier, portant souvent deux filets articulés. (1)

Antennæ duæ setaceæ. Os rostriforme. Palpi (vel brachia) duo porrecti, apice chelati.

Corpus subcylindricum, versus extremitatem posticam sensim gracilius, segmentis septem divisum; testâ nullâ. Pedes antici duo unguiculati et alii quatuor uncinati, dentati, in segmento primo; pedes quatuor alii digitis denticulatis terminati in segmento secundo; corpus ovale, in utroque latere, ad segmentum tertium; ultimo apice bituberculato sæpeque filamentis duobus articulatis instructo.

OBSERVATIONS. — Le *Dichelestion*, observé par Hermann, est peut-être plus dans le cas d'être rapporté aux Épizoaires que le Cécrops. Des observations ultérieures décideront à cet égard, surtout n'étant pas certain qu'il ne puisse y avoir des animaux à pattes articulées et propres à la locomotion, dont l'organisation intérieure soit inférieure même à celle des insectes. On ne nous dit point si cet animal a des yeux.

[Le premier segment du corps est ovalaire et porte comme d'ordinaire les antennes, l'appareil buccal et les pattes ancreuses à l'aide desquelles l'animal se fixe. Ces derniers organes sont

(1) Les filets, dont il est ici question, sont de tubes ovifères.
E.

au nombre de trois paires, comme chez la plupart des Siphonostomes ; mais ceux de la première paire sont rejetés bien plus en avant que d'ordinaire et naissent entre les antennes, aussi quelques auteurs les désignent-ils sous le nom d'antennes chélifformes. Entre les pattes ancreuses de la seconde paire, se trouve le suçoir qui a la forme d'un tube conique dirigé en arrière, et paraît représenter le labre et la lèvre inférieure des crustacés broyeurs ; dans son intérieur, se trouve une paire d'appendices analogues aux mandibules, mais allongés en forme de stylets dentés vers le bout ; et de chaque côté, on voit deux paires d'appendices rudimentaires, qui nous semblent devoir être considérés comme les représentans des mâchoires. Le second anneau est très petit et presque caché entre le segment céphalique, et le troisième anneau qui est ovalaire transversalement ; chacun de ces deux anneaux post-céphaliques, porte en dessous une paire de petites pattes natatoires assez éloignées de la ligne médiane, et composées chacune d'un article basilaire à-peu-près carré, et de deux branches lamelleuses. Le troisième anneau thoracique, donne insertion à une paire d'appendices ovalaires qui paraissent représenter une troisième paire de pattes. Les quatrième, cinquième et sixième segmens, sont apodes seulement chez les femelles. Le dernier de ces anneaux donne attache aux filamens ovifères. Enfin, le corps se termine par un petit article qui représente l'abdomen, et qui porte à son bord postérieur une paire d'appendices lamelleux. E.

ESPECE.

1. Dichélestion de l'esturgeon. *Dichelestium sturionis*.

Herm. Apterol. p. 125. pl. 5. f. 7. 8.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 337. pl. 50. f. 6.

* Latreille. Règne anim. t. 4. p. 200 ; Encyclop. pl. 335 f. 1 et 2.

* Nordmann mikrographische. Beitrage. t. 2 p. 41.

* Griffith. Anim. Kingd. crust. pl. 21. fig. 9.

* Burmeister. Mém. des Curieux de la nat. de Bonn. t. 17. p. 328.

Habite sur les branchies de l'esturgeon.

[Le genre Némésis de M. Risso se rapproche des Dichélestions, plus que tout autre crustacé, par sa forme générale, mais tient davantage des Pandares par les détails de sa structure : la tête n'est guère plus développée que les segmens suivans du thorax, et porte une paire d'antennes sétacées, un suçoir conique et trois paires de pattes ancreuses dont les premières sont petites. Le premier segment thoracique résulte de l'union de deux anneaux et porte en dessous deux paires de pattes ; celles de la première paire sont grêles et simples, celles de la seconde paire écartées entre elles et composées chacune de deux petites rames rudimentaires, fixées sur un grand article basilaire. Les deux anneaux suivans portent chacun une paire de pattes natatoires semblables à ces derniers, et le thorax se termine par un anneau quadrilatère comme les précédens qui donnent naissance, par des angles postérieurs, à deux appendices sphériques et à deux longs tubes ovifères, entre lesquels se voit un abdomen conique, court, composé de plusieurs articles et terminé par deux petits appendices. L'espèce d'après laquelle ce genre a été établi vivait en parasite sur les branchies du *Lamna cornubicus* et a reçu le nom de *Nemesis lamna*. Risso, hist. nat. de l'Eur. Mérid. t. 5, p. 139, pl. 5^e, fig. 25 ; — Roux, Crust. de la Méditerranée, pl. 20, fig. 1-9). M. Roux en a décrit une seconde espèce sous le nom de *Nemesis chachariarum*. (Crust. de la Médit. pl. 20, fig. 10-11).

Le genre LAMPROGLÈNE de M. Nordmann se rapproche également des Dichélestions, mais conduit vers les Lernées à raison de l'état rudimentaire de toutes les pattes thoraciques. La tête est petite obscurément divisée en 7 lobes ; on y remarque en dessus un œil médiane et en avant une paire d'antennes très rapprochées de la ligne médiane, et en dessous de ces organes se trouve une paire d'appendices styloïformes qui ressemblent à une se-

conde paire d'antennes, mais qui nous paraissent être plutôt les analogues des pattes ancreuses de la première paire. Autour de la bouche, on voit deux autres paires de pattes ancreuses qui sont assez grosses. Les quatre premiers segmens thoraciques sont réunis en une seule pièce et ne se distinguent entre eux que par des étranglemens; ils portent chacun une paire de pattes rudimentaires situées près de leur bord latéral et terminées par les vestiges de deux rames. Le dernier anneau thoracique est beaucoup plus petit que les précédens et présente deux orifices, générateurs entre lesquels se voient deux tubercules, qui paraissent représenter les membres de ce segment. Enfin l'abdomen est très long et bifurqué à son extrémité. On en connaît trois espèces : le *Lamproglena pulchella* (Nordmann mikrophische beitrage, t. 2, pl. 1, fig. 1-9); le *Lamproglena lichiae* ejusd. (op. cit. page 134); et *Lamproglena Hemprichii* (ejusd. loc. cit.).

Les *Nicothoés* ressemblent assez à de petits Cyclopes, dont les côtés du corps se seraient prolongés de façon à former deux immenses poches et dont les pattes seraient réduites à un état presque rudimentaire. Ils ont deux yeux écartés entre eux; deux antennes latérales courtes et sétacées, un bec conique et des pattes-mâchoires ancreuses servant à les fixer sur leur proie. A peu de distance en arrière de la bouche, on trouve quatre paires de petites pattes biramées et en arrière du segment que porte les deux grands prolongemens latéraux; est un anneau d'où naissent deux grands sacs ovifères; enfin, le corps se termine par un abdomen conique, très court, mais composé de quatre anneaux et garni de soies à son extrémité. On n'en connaît qu'une espèce qui vit en parasite sur les branchies du Homard et a été nommé pour cette raison *Nicothoé astaci*. (Audouin et Edwards, Mém. sur le Nicothoé. Ann. des Sc. nat. t. 9, pl. 49, fig. 1-9);

—Latreille, Règne anim. de Cuv. t. 4, p. 201;—Burmeister, Acta acad. nat. cur. t. 17. p. 327. E.

CÉCROPS. (Cecrops.)

Deux antennes très petites. Bouche en bec court, sub-pectoral.

Corps ovale, obtus aux extrémités, couvert de quatre écailles inégales, échancrées postérieurement. Point de queue saillante. Pattes très courtes, de deux sortes: les antérieures terminées en alène et comme onguiculées; les postérieures dilatées, membraneuses, natatoires.

Antennæ duæ minimæ. Os rostriforme, breve, subpectorale.

Corpus ovatum, extremitatibus obtusum, squammis quatuor inæqualibus posticè emarginatis obtectum. Cauda nulla exserta. Pedes brevissimi, è duobus generibus: antici subulato-unguiculati; postici dilatato-membranacei, natatorii.

OBSERVATIONS. — Le *Cécrops*, dont je ne connais encore que des figures publiées par M. *Leach*, est-il bien un crustacé? A la vérité, il paraît avoir des rapports avec les crustacés à bec, dont il s'agit ici; mais peut-être découvrira-t-on, par l'étude de son organisation intérieure, qu'il confirme, ainsi que quelques autres que l'on rapporte aussi aux crustacés, le groupe des *épizoaires* que j'ai établi entre les vers et les insectes. Ses trois paires de pattes antérieures, que M. *Latreille* appelle des pieds-mâchoires, et dont la seconde paire paraît très courte, ne me paraissent avoir rien de commun avec les parties de la bouche, quoique la première paire soit très voisine du bec; elles servent à fixer l'animal. On dit que la dernière paire des membraneuses sert à recouvrir les œufs.

[Le genre *Cécrops* établit, à quelques égards, le passage entre les *Caliges* et les *Lernées*.]

ESPÈCE.

1. Cécrops de Latreille. *Cecrops Latreilli*.

Cecrops Latreilli, Leach. Crust. angl. pl. 20. f. 1-8. (* Nous ne connaissons aucun ouvrage de Leach, ayant ce titre et nous pensons que c'est quelque travail inédit qui aura été communiqué à Lamarck par l'auteur.)

* Leach. Encyclop. brit. suppl. t. 7. pl. 20. f. 2.

* Desmarests. Considér. sur les Crust. p. 338. pl. 50. f. 2.

* Latreille. Règne animal. de Cuvier t. 4. p. 199. Encyclop. pl. 335. fig. 3-10.

ARGULE. (*Argulus*.)

Quatre antennes très petites. Deux yeux séparés. Un bec conique, dirigé en bas, à angle droit.

Corps oblong, recouvert par un bouclier large, arrondi-ovale, membraneux, un peu aplati, demi transparent, échancré postérieurement. Douze pattes, de trois genres : les deux antérieures tubuleuses, subhémisphériques, propres à se fixer sur les corps ; celles de la deuxième paire bionguiculées ; les autres natatoires, ayant à leur sommet deux lobes ciliés sur les côtés. Queue courte, terminée par deux lobes.

Antennæ quatuor minimæ. Oculi duo, distincti. Os haustello rostriformi conico, ad angulum rectum infra porrecto.

Corpus oblongum, testâ clypeiformi obtectum ; clypeo ovato-rotundato, planulato, membranaceo, semi-pellucido, posticè emarginato. Pedes duodecim, è tribus generibus : duo antichi tubulosi, subhemisphærici, corporibus affigendis idonei ; pedes secundi paris biunguiculati ; alii natatorii, apice lobis duobus utrinque ciliatis. Cauda brevis, apice biloba.

OBSERVATIONS. — L'argule, qu'auparavant nous nommions

Ozole, avec M. Latreille, est un parasite qui vit dans les eaux douces, sur les têtards des grenouilles, sur les Épinocles et sur d'autres poissons. C'est un petit animal aplati, arrondi-ovale, demi transparent, d'un vert jaunâtre et qui n'a qu'environ deux lignes et demie de longueur. Ses antennes, au nombre de quatre, sont très petites et insérées au-dessus des yeux : les deux antérieures sont plus courtes, triarticulées; les deux autres ont quatre articles. Dans les unes et les autres, le premier article a une épine crochue ou au moins une petite dent. Le bec est un fourreau qui renferme un suçoir exsertile. L'anüs est situé à la naissance de la queue. Dans la femelle, il reçoit l'organe du mâle et sert de passage aux œufs. Cet animal subit diverses variations de forme, à mesure qu'il se développe et change de peau. On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre.

ESPÈCE.

1. Argule foliacé. *Argulus foliaceus*.

* *Monoculus cauda foliaceus* plend. Læffling. Act. soc. Upsal. 1744-50 pl. 11.

* Pou du gastérosté, etc. Baker. Micros. t. 2. pl. 14.

* *Monoculus foliaceus*. Linné. Fann. succ.

* *Monoculus piscinus* ejusd. Syst. nat.

Monoculus argulus. Fab. Syst. 2. p. 489.

Binoculus gasterostei. Lat. Gen. 1. p. 14.

Le binocle du gastérosté. Geoff. 2. p. 661.

* *Argulus delphinus* et *A. Charon*. Muller. Entomost. p. 123. pl. 20. (jeune âge.)

* *Monoculus gyrini*. Cuvier. Tabl. élém. p. 454.

Ozole du gastérosté. Latr. Hist. nat. etc. 4. p. 128. pl. 29. f. 3-7.

Argulus foliaceus. Jurine, Ann. du Mus. vol. 7. p. 431. pl. 26.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 332. pl. 60. f. 1.

Habite dans les ruisseaux des environs de Paris.

CALIGE. (Caligus.)

Deux antennes très petites, sétacées. Deux yeux écartés, situé sur le bord antérieur du bouclier. Bouche for-

mant un suçoir en bec conique, fléchi en dessous, pectoral.

Corps allongé, déprimé, comme divisé en deux parties; l'antérieure recouverte par un bouclier d'une seule pièce; la postérieure ovale ou oblongue, abdominale, se terminant par deux filets longs, et souvent ayant à son extrémité des appendices lamelliformes. Dix à quatorze pattes de deux sortes : les antérieures étant munies de crochets, et les postérieures étant en lames natatoires, divisées, pectinées et branchifères.

Antennæ duæ, minimæ, setacæ. Oculi duo distantes, in margine antico clypei. Os haustello rostriformi, conico deflexo, pectorali.

Corpus oblongum, depressum, in duas partes subdivisum: anticâ parte, clypeo monophyllo tectâ; posticâ ovatâ vel oblongâ, filamentis duobus longis terminatâ, prætereaque ad extremitatem appendicibus lamelliformibus sæpè instructâ. Pedes decem ad quatuordecim, ex duobus generibus: anticis unguiculatis; posticis lamellosis, divisis, pectinatis, natatoriis et branchialibus.

OBSERVATIONS. — Les *Caliges* ne sont pas sans rapports avec nos Limules; ils paraissent en avoir aussi avec nos Polyphèmes; mais ce sont des suceurs et de véritables parasites. Ils ont un suçoir en forme de bec, que l'on dit formé de deux lèvres et de deux petites mandibules réunies. Ces crustacés s'attachent, au moyen de leurs pattes à crochets, sur des cétacés, des poissons, des têtards de grenouilles, dont ils sucent le sang.

Ces habitudes leur ont fait attribuer des rapports avec les Lernées, rapports néanmoins qui nous paraissent assez éloignés. Leur bouclier est aplati, ne recouvre que la partie antérieure du corps, et forme le corselet de l'animal. L'autre partie de leur corps est moins large, allongée, et paraît en constituer l'abdomen. Elle offre à son extrémité deux longs filets articulés, que l'on a regardés comme deux ovaires, mais qui ont toujours paru vides. M. Risso dit que les femelles du Calige prolongé,

paraissent renfermer quelques œufs dans un sac qui est placé au bas du ventre. Ainsi, les filets de la queue ne sont point des ovaires. (1)

[Les entomologistes les plus récents s'accordent à restreindre davantage les limites du genre Calige, et à n'y laisser que les crustacés suceurs, dont la tête est scutiforme et pourvue de deux yeux et de deux antennes montées sur une pièce frontale distincte, dont la bouche est entourée de trois paires de pattes ancreuses, dont le thorax est très peu développé et pourvu de quatre paires de pattes, parmi lesquelles les trois premières sont natatoires, biramées et libres, et dont l'abdomen est très petit et inséré entre deux longs tubes ovifères. E.

ESPÈCES.

[*Bouclier court, orbiculaire.*]

1. Calige des poissons. *Caligus piscinus*.

C. corpore brevi; caudâ bifidâ monophyllâ. Lat.

Monoculus piscinus. Lin. Fab. Syst. 2. p. 489.

Caligus curtus. Mull. Entom. tab. 21. f. 1. 2.

Caligus piscinus. Lat. Gen. 1. p. 12 et Hist. nat. etc. 4. pl. 31. f. 1.

* *Caligus piscinus.* Desmarests Consid. sur les Crust. p. 341.

Habite l'Océan, sur les poissons.

2. Calige prolongé. *Caligus productus*.

C. corpore elongato; caudâ imbricatâ tetraphyllâ. Lat.

Caligus productus. Mull. Entom. tab. 21. f. 3. 4.

Latr. Gen. 1. 1. p. 13. et Hist. nat. etc. 4. p. 31. f. 2.

Monoculus salmoneus. Fab. Syst. 2. p. 489.

* *Dinemoura producta.* Latreille. Règne anim. t. 4. p. 197.

* *Dinemoura producta.* Burmeister. Mém. de l'acad. des cur. de la nat. de Bonn. t. 17. p. 331.

Habite, comme le précédent, sur les poissons marins.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles, décrites par M. Nordmann dans l'ouvrage déjà cité.

(1) Ce sont des tubes ovifères analogues aux poches ovifères des Cyclopes, etc. E.

[*Bouclier oblong , plus large postérieurement.*]

3. Calige bicolore. *Caligus bicolor*.

C. oblongo-ovatus, maculosus; caudâ non imbricatâ; clypeo cuneato posticè truncato.

Pandarus bicolor (1). Leach, *Crust. angulosa*. tab. 20.

* Leach. *Encyclop. Brit. Supp.* pl. 20. f. 1 et *Dict. des sc. nat.* t. 14. p. 535.

* Desmarest. *Consid. sur les Crust.* p. 339 pl. 50.

* Latreille. *Règne anim.* t. 4. p. 497.

* Burmeister. *Act. nat. cur.* t. 17. p. 331.

2. Var ? *Pandarus Boscii*. Leach, *ibid.*

* Leach. *Edinb. Encyclop.* pl. 20.

* Desmarest. *Consid. sur les Crust.* p. 539.

Habite.....

4. Calige de Smith. *Culigus Smithii*.

C. anticè attenuatus; caudâ squamis imbricatis obvolutâ; clypeo elliptico.

Anthosoma Smithii. Leach. *crust. angulosa*. tab. 20.

* Leach. *Edinb. Encyclop. Supp.* t. 7. pl. 20. et *Dict. des sc. nat.* t. 14. p. 533.

(1) Le genre PANDARUS de Leach se compose de quelques crustacés parasites voisins des Caliges, qui ont le thorax recouvert d'écailles plus ou moins grandes, formées par le prolongement de diverses pièces de l'arceau dorsal de deux ou trois des anneaux de cette partie du corps, et qui présentent en dessous, à la suite des pattes-mâchoires ancreuses, une série de quatre paires de pattes natatoires, dont deux au moins sont réunies à leur base de façon à constituer, pour chaque paire, une lame transversale unique. M. Burmeister a proposé récemment la division de ces animaux en deux genres, à l'un desquels il conserve le nom de Pandarus, et à l'autre desquels il donne le nom de Dinematura. Voyez, pour plus de détails, l'article Pandare dans l'ouvrage de M. Desmarest sur les crustacés, un mémoire que nous avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles, t. 28. et le travail de M. Burmeister publié dans les Actes de l'académie des curieux de la nat. de Bonn., t. 17.

- * Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 335. pl. 50. f. 3.
- * Latreille. Règ. anim. t. 4. p. 198. Et Encyclop. p. 335. fig. 11-16.
- * Griffith. Anim. Kingd. crust. pl. 21. fig. 2.
- * Burmeister. op. cit. p. 331.

Habite.....

- * Ce crustacé, l'un des plus singuliers que l'on connaisse a été trouvé fixé à un squalé, sur les côtes de l'Angleterre et constitue le genre *ARTROSOMA* du Dr Leach. La partie antérieure de son corps est recouverte par une petite carapace ovale, et présente antérieurement une paire de petites antennes, un suçoir en forme de bec et trois paires d'appendices constituant des pattes-mâchoires-ancreuses; la moitié postérieure de son corps est enveloppée par huit grandes lames ovales qui sont dirigées en arrière et se recouvrent mutuellement de façon à constituer une sorte de cornet dont la partie évasée, dirigée en arrière, laisse passer le dernier anneau thoracique et l'abdomen qui est rudimentaire et terminé par deux petites cornes au dessous desquelles se fixent deux longs tubes ovifères.

5. Caligé imbriqué. *Caligus imbricatus*.

C. oblongus, luteo-virescens; abdomine utrinque squamis imbricato: clypeo conico; filamentis caudæ brevissimis.

Caligus imbricatus. Risso. Hist. nat. des crust. p. 162. pl. 3. f. 13.

Habite sur les branchies ou sur les lèvres du requin.

- * Ce crustacé est trop imparfaitement connu pour qu'on puisse décider à quel genre il appartient.

Le genre *NOGAGUS* de Leach est très voisin des *Caliges* et des *Pandares* et a pour caractères une carapace ovale portant en avant deux lobes frontaux terminés latéralement par de petites antennes sétacées, un suçoir conique et trois paires de pattes-mâchoires ancreuses; quatre paires de pattes thoraciques lamelleuses et biramées, celles de la première et de la dernière paires isolées. Dernier anneau thoracique grand, quadrilatère et présentant de chaque côté deux prolongemens coniques, mais apodes; abdomen très court, composé d'un seul article dont le bord postérieur donne insertion à deux appendi-

ces lamelleux biarticulés. On ne connaît qu'une seule espèce, le **NOGAGUS** DE LATREILLE, *Nogagus Latreillii*. Leach. (Dict. des Sc. nat. t. 14, p. 536;—Desmarests. Consid. sur les crust. p. 340). — Latreille considère ce genre comme pouvant bien ne pas différer de celui qu'il nomme *Pterygopode*. (Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. 197).

M. Nordmann a donné le nom de **LEPEOPHTHEIRUS** à des Crustacés parasites qui ressemblent un peu aux Caliges par leur forme générale, mais qui ont un œil unique au milieu du front, et qui n'ont pas, comme les précédents, un appendice frontal impair. Le type de ce genre est le *Lerneæ pectoralis* de Muller (Zool. Danica. t. 1, pl. 33, fig. 7; *Lepeophtheirus pectoralis*, Nordmann, op. cit. t. 2, p. 30;—Burmeister, op. cit. p. 330).

Le genre **CHALIMUS** de M. Burmeister se distingue des Caliges par l'allongement considérable de l'abdomen, l'existence d'un seul œil et d'un petit appendice au milieu du front. (Voyez le Mémoire déjà cité de ce naturaliste, inséré dans le 17^e volume des Actes de l'acad. des cur. de la nat. de Bonn).

Le genre **BOMOLOCHUS** du même se rapproche beaucoup du précédent, mais s'en distingue par la conformation des appendices qui entourent la bouche et par la disposition des antennes. Deux espèces s'y rapportent : le *B. parvulus* et le *B. bellones*. (Burmeister, Mémoire des cur. de la nat. t. 17, pl. 14. fig. 1-6;—Nordmann, op. cit. p. 135).

Le genre **ERGASILUS** de M. Nordmann établit le passage entre les Caliges et les Cyclopes, car il se rapproche beaucoup des derniers par la conformation générale du

corps, l'existence d'un œil médiocre, la disposition des antennes et des pattes thoraciques, et tient des Caliges par la structure des pattes ancreuses qui sont situées au devant de la bouche. On en connaît deux espèces : l'*Ergasilus Sieboldii*. Nordmann. Mikrograph. Beitrage, t. 2, pl. 2, fig. 1 et l'*Ergasilus gibbus* ejusd. (op. cit. pl. 3, fig. 1-6).

BRANCHIOPODES GÉANS.

Ces Branchiopodes terminent la section, et sont en général les plus grands de ceux qu'elle embrasse. Ils sont assez remarquables par le grand bouclier qui couvre tout leur corps, et par la queue qui le termine postérieurement. J'y rapporte les deux genres qui suivent :

[Ce groupe n'est pas naturel et ne peut être adopté; des deux genres dont il se compose, l'un appartient réellement à la division des Branchiopodes, l'autre s'éloigne de tous les autres crustacés par un grand nombre de caractères de la plus haute importance et doit former à lui seul un ordre particulier auquel Latreille a donné le nom de Xyphosures.] E.

LIMULE. (Limulus.)

Deux antennes courtes, simples. Trois yeux sessiles, simples : deux plus grands rapprochés et le troisième postérieur plus petit. Un labre distinct. Deux mandibules fortes, sans palpes. Deux paires de mâchoires. Une languette bifide.

Tête confondue avec le corselet. Corps mou, couvert d'un bouclier subcrustacé, mince, arrondi, ovale échan-

gré postérieurement. Pattes très nombreuses (cinquante à soixante paires), branchiales, foliacées : les deux antérieures plus grandes, rameuses, à soies articulées. Queue articulée, courte, terminée par deux filets longs.

Antennæ duæ breves. Oculi tres, sessiles, simplices : duobus majoribus approximatis, tertio postico minore. Labrum distinctum. Mandibulæ duæ validæ, nudæ. Maxillæ quatuor, per paria dispositæ. Lingula bifida.

Caput a thorace non distinctum. Corpus molle, clypeo subcrustaceo, tenui, rotundato, subovale, posticè que emarginato tectum. Pedes numerosissimi, quinquaginta ad sexaginta circiter paria, branchiales, foliacei; duobus anticis majoribus, ramoso-setosis; setis articulatis. Cauda brevis, articulata, setis duabus longis instructa.

OBSERVATIONS. — Comme *Muller*, j'ai donné le nom de *Limule* à des Entomostracés ou Branchiopodes que les entomologistes désignent actuellement sous le nom d'*Apus* (1), et que Linné confondait parmi ses *Monoculus*. Ce sont, après nos polyphèmes, les plus grands Branchiopodes connus.

Les *Limules* constituent un genre presque isolé parmi les Branchiopodes. Leur corps est couvert d'un grand bouclier corné, très mince, débordant, d'une seule pièce, arrondi-ovale, ayant une échancrure profonde postérieurement (2). Leur tête est confondue avec le tronc, et leurs antennes sont très courtes. Leurs yeux sont lisses, sessiles, rapprochés : on en compte trois : deux en devant, et un plus petit, situé derrière. La bouche est garnie d'une lèvre supérieure à-peu-près carrée, de

(1) Le nom d'*Apus* est généralement adopté pour ce genre, tandis que celui de *Limule* est donné par tous les auteurs contemporains au genre suivant, appelé Polyphème par Lamarck. E.

(2) Ce bouclier céphalique, qui représente la carapace, recouvre le thorax; mais n'y adhère pas; les anneaux thoraciques situés au dessous sont complets. E.

deux grandes mandibules minces et voûtées, d'une lèvre inférieure bifide, et de deux paires de mâchoires lamelleuses. Leurs pattes sont très nombreuses : les deux antérieures, beaucoup plus grandes, sont branchues, en forme de rames, et terminées par des soies articulées qui ressemblent à des antennes. Les autres pattes (*au nombre de soixante paires environ), sont beaucoup plus courtes, diminuant progressivement de taille de devant en arrière ; elles sont foliacées, natatoires, branchifères, ciliées d'un côté à leur base, et toutes rapprochées à leur naissance. On leur observe, sur un côté, une lame branchiale, avec un sac ovalaire et vésiculeux en dessous. Toutes ces pattes et leurs lames sont presque continuellement agitées par un mouvement assez rapide. Celles de la moyenne paire sont pourvues d'une capsule à deux valves qui renferme des œufs. Enfin, l'abdomen est dépourvu d'appendices autres que deux longs filets terminaux.

Ces crustacés vivent dans les eaux douces, les fossés pleins d'eau, les mares, les eaux tranquilles. On les y trouve en grand nombre et comme en société ; ils se nourrissent principalement de têtards. On n'en connaît encore que deux espèces.

ESPÈCES.

1. *Limule cancriforme. Limulus cancriformis.*

L. carinâ dorsali posticâ non mucronatâ ; lamina nullâ inter setas caudales.

Limulus palustris. Mull. Entomotr. p. 107.

* Schœffer. Abhand. von insecten. t. 2.

Binoculus. Geoff. 2. p. 660. pl. 21. f. 4.

Monoeculus apus. Fab. Suppl. p. 305.

Apus vert. Bosc.

Apus cancriformis. Latr. Gen. 1. p. 15.

Ejoud. Hist. nat. etc. vol. 4. p. 193. pl. 19 et 20. (* Copiées d'après Schœffer.)

* Savigny. Mém. sur les anim. sans vert. p. 63. pl. 7.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 360. pl. 52. fig. 1.

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. 2^e édit. t. 4. p. 181.

Habite en France, en Allemagne, dans les fossés remplis d'eau.

2. Limule prolongée. *Limulus productus*.

L. carinâ dorsali in spinam productâ ; lamina inter setas caudales.
Monoculus apus. Linn.

Limule serricauda. Herm. Apterol. p. 130. p. VI.

Apud productus. Latr. Gen. 1. p. 16.

EjUSD. Hist. nat. etc. vol. 4. p. 195. pl. 28.

* *Lepidurus productus*. Leach.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 360. pl. 52. f. 2.

Habite en Europe, dans les fossés aquatiques. Il est plus petit que le précédent. La lame qui est placée entre les deux filets, à l'extrémité de la queue, est dentelée.

* Ajoutez: *Apus Montagu*. Leach. Edinb. Encyclop, supplém. t. 2. pl. 20.

POLYPHEME. (Polyphemus.)

Antennes nulles. Bouclier très grand, crustacé, arrondi antérieurement, un peu convexe en dessus, concave en dessous, divisé en deux parties inégales par une suture transverse : la partie postérieure moins large, plus aplatie, en scie sur les côtés, et échancrée à l'extrémité. Deux yeux composés, sessiles, écartés, en demi-lune. La bouche, les palpes, les pattes maxillaires, et des lames branchiales disposés sous le bouclier.

Deux palpes rapprochés à leur insertion, biarticulés, didactyles au sommet. Dix pattes maxillaires, disposées par paires articulées, chélifères, ayant à leur base interne des appendices comprimés, ou crêtes très épineuses au bord interne. La bouche entre les pattes maxillaires et cachée.

Cinq ou six lames transverses, cornées, un peu divisées, subnatatoires, recouvrant alternativement les branchies, et disposées dans la cavité postérieure du bouclier. Queue longue, subulée, trigone.

Antennæ nullæ. Scutum maximum, crustaceum, anticè rotundatum, suprâ convexiusculum, subtùs concavum, su-

turâ transversâ inæqualiter bipartitum; parte posteriore minore, planiore, lateribus serratâ, extremitate emarginatâ. Os, palpi, maxilli-pedes laminæque branchiales infrâ scutum dispositi. Oculi duo, compositi, sessiles, distantes, lunati suprâ scutum.

Palpi duo, insertione approximati, biarticulati, apice didactyli. Pedes maxillosi decem per paria digesti, articulati, apice chelati; basi internâ appendicibus compressis, cristatis margine interno spinosissimis. Os intrâ pedes maxillares occultatum.

Laminæ quinque vel sex, transversæ, corneæ, subdivisæ, natatoricæ, branchias alternatim tegentes, in scuti postici cavitate receptæ. Cauda longa, subulata, trigona.

OBSERVATIONS. — Parmi des animaux aussi petits que la plupart des Entomostracés ou Branchiopodes, les *Polyphèmes* sont extraordinaires par leur taille, et ce sont véritablement les géans de cette division. Aussi Linné, en donnant à la seule espèce qu'il ait connue le nom de *M. polyphemus*, a-t-il convenablement désigné la taille gigantesque de cet animal. Depuis on a donné le nom de Polyphème à un animalcule de nos marais (notre Céphalocle), et l'on a préféré, pour les grands Entomostracés dont il s'agit ici, le nom de *Limulus* que Muller donna à un genre vaguement déterminé, qui embrassait des Entomostracés de genres différens.

Les *Polyphèmes* sont des crustacés marins qui ont quelquefois deux pieds de longueur. Ils sont larges et arrondis antérieurement, et n'offrent en dessus qu'un grand bouclier crustacé, divisé en deux segmens inégaux par une suture transverse, et muni postérieurement d'une queue en stylet trigone. C'est seulement sous ce bouclier que l'on distingue : 1° Deux palpes en avant, plus petits que les pattes maxillaires, et insérés sur un tubercule qui tient lieu de lèvre supérieure; ils remplacent les mandibules, si l'on ne veut leur en donner le nom; 2° Cinq paires de pattes maxillaires, didactyles, mais dont celles de la première paire, dans les mâles, n'ont qu'un doigt; 3° Cinq ou six lames transverses subincisées, et entre lesquelles sont situées

les branchies sous la forme de feuillets empilés. Les sexes sont séparés; leurs organes sont placés derrière la dernière paire des pattes maxillaires, à la base d'une lame transversale, en sa face postérieure. L'anus est à la racine de la queue qui termine le corps.

Ces crustacés vivent dans les mers des pays chauds. On n'en connaît encore que très peu d'espèces, qui sont même médiocrement distinctes.

[Les Limules proprement dits, que Lamarck décrit ici sous le nom de Polyphèmes, constituent, comme nous l'avons déjà dit, une sous-classe particulière à laquelle on peut conserver le nom de Xyphosure, déjà employé par Gronovius, pour les désigner; suivant M. Straus-Durckheim, ces animaux devraient même être exclus de la classe des Crustacés, et prendre place parmi les Arachnides. Mais cette opinion ne nous paraît pas suffisamment motivée, et nous pensons que c'est à la suite des Crustacés ordinaires qu'il faut les ranger.

Un des traits les plus remarquables de l'organisation des Xyphosures, est le mode de conformation de leur appareil masticateur; la bouche n'est armée ni de mandibules, ni de mâchoires proprement dites; mais est placée au milieu des pattes dont l'article basilaire est muni en dedans d'un lobe denté qui remplit les fonctions de mâchoires. A la suite de cette double série de pattes préhensiles, se trouve une paire d'appendices lamelleux réunis à leur base, qui portent à leur face postérieure les organes sexuels. Le second segment du corps qui paraît représenter l'abdomen, porte cinq paires de fausses pattes lamelleuses semblables aux appendices dont nous venons de parler, et garnies à leur face postérieure des branchies qui paraissent composées de fibres très nombreuses et serrées les unes contre les autres sur un seul plan. Suivant M. Cuvier, le cœur est un gros vaisseau qui règne le long du dos comme chez les Squilles et donne des branches des deux côtés. L'œsophage remonte en avant et conduit dans un estomac très charnu, dont les parois sont hérissées de tubercules; et l'intestin est large et droit; le foie verse la bile dans l'intestin par deux canaux de chaque côté; enfin, le test est rempli en grande partie par les organes de la génération.

E.]

ESPÈCES.

1. Polyphème des Moluques. *Polyphemus gigas*..

P. maximus, carinâ mediâ scuti antici medi inermi; caudâ supernè per totam longitudinem serratâ.

Monoculus polyphemus. Lin.

Limulus polyphemus. Fab. Syst. 2. p. 487.

Limulus moluccanus. Lat. Gen. 1. p. 11. et Hist. nat. 4. pl. 16. 17.

Polyphemus gigas. Lam. Syst. des anim. sans vert. p. 168.

Cancer perversus. Rumph. Mus. tab. 12. f. a, b.

* *Cancer moluccanus*. Clusius. Exot. p. 128.

* Schœffer. Monog. pl. 7. f. 4-5.

* *Limulus polyphemus*. Savigny. Mém. sur les anim. sans vertèbres, pl. 8.

* *Limulus moluccanus*. Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 355.

* *Limulus tridentatus* ? Leach. Dict. des sc. nat. t. 14. p. 357.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. On le nomme vulgairement le crabe des Moluques. Ses épines caudales sont petites et fréquentes.

2. Polyphème occidental. *Polyphemus occidentalis*.

P. scuto tenuiusculo; carinâ mediâ scuti antici spinulis tribus, caudâ supernè rarè denticulatâ.

Polyphemus occidentalis. Lam. Syst. des anim. sans vert. p. 168.

Limulus polyphemus. Latr. Gen. 1. p. 11.

Limulus cyclops. Fab. Syst. 2. p. 488 et Supp. p. 371.

* *Arana carafecho* Parra. Descr. de difer. piezas de hist. nat. pl. 56. f. 1 et 2.

* *Limulus americanus*. Leach. Dict. des sc. nat. t. 14. p. 537.

* *Limulus polyphemus*. Say. Crustacea of the United states. Journ. of the acad. of sc. of Philadelphia. vol. 1. p. 435.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 354. f. 51.

* *Limulus americanus*. Buckland. Geology and mineralogy. pl. 45. fig. 1.

Suivant M. Say le *Limulus Sowerbii* de Leach (Zool. miscel. t. 2. pl. 84) est un jeune individu de cette espèce.

Habite l'Océan américain, les mers de la Caroline méridionale. Il devient moins grand que celui des Moluques, et a sa queue presque inerte.

Etc. Sous le nom de *Limulus heterodactylus*, M. Latreille en indique une espèce, qui vit dans les mers de la Chine. (* Ce crustacé, dont

les quatre parties antérieures sont terminées au moins dans l'un des sexes, par un seul doigt, constitue le genre *TACHYPLIUS* de Leach. (1)

- * Ajoutez quelques autres espèces décrites par Leach dans le dictionnaire des sciences naturelles, mais imparfaitement connues.
- * M. Desmarests a donné le nom de *LIMULE DE WALCH* (2) à un crustacé fossile qui se rencontre dans le calcaire de Solenhofen et qui appartient évidemment à ce genre. M. Buckland en a figuré une autre espèce trouvée dans le minerai de fer de Coalbrook Dale, et nommée *Limulus trilobitoïdes*. (3) Enfin, d'après ce naturaliste il faudrait aussi y rapporter l'*Entomolitus monoculites* trouvé dans le terrain carbonifère du comté de Derby en Angleterre et figuré par Martin dans son *Petrefacta Derbiensia*. pl. 45. f. 4. (4)

+ TRILOBITES.

C'est entre les Branchiopodes et les Isopodes que paraissent devoir prendre place un nombre considérable d'animaux connus à l'état fossile seulement et désignés généralement sous le nom de TRILOBITES. Pendant longtemps, il a régné une grande confusion dans l'histoire de ces débris organiques et une divergence d'opinion non moins grande touchant leurs affinités naturelles. Quelques naturalistes considéraient ces fossiles comme des coquilles à trois lobes; d'autres pensaient que c'étaient des

(1) *Tachyplius*. Leach. Dict. des Sc. nat. — Desmarests, Considér. sur les Crust. p. 356. — Latreille. Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 188.

(2) *Cancer perversus* Walch et Knorr. Monumens du déluge, t. 1, p. 136, pl. 14, fig. 2; — *Limulus Walchii*, Desmarests. Crustacés fossiles, p. 139, pl. 11, fig. 6 et 7. — König Ic. fos. sel. pl. 2, fig. 28.

(3) Voyez Buckland, Geology and mineralogy considered with reference to natural theology, tab. 46. fig. 3.

(4) Buckland, op. cit. p. 395.

animaux voisins des Oscabrions; enfin, la plupart des auteurs les plus récents les regardent comme étant des Crustacés, et cette dernière opinion acquiert chaque jour plus de force.

Les Trilobites qu'on a appelés d'abord *Entomolites*, et qu'un auteur récent (M. Dalman) propose de nommer *Palæades*, sont des animaux articulés, dont le corps se compose d'une série d'anneaux et dont la forme générale rappelle beaucoup celle de plusieurs Isopodes. De même que chez ces derniers crustacés, ils présentent trois parties plus ou moins distinctes : une tête, un thorax et un abdomen. La tête (appelée bouclier par M. Brongniart à qui on doit le premier travail approfondi sur ces animaux) est grande, clypéiforme, ordinairement arrondie en avant, tronquée ou concave en arrière, bombée en dessus et en général divisée en trois lobes plus ou moins distincts par deux dépressions ou sillons longitudinaux. Chez plusieurs, on voit sur la face supérieure de la tête, des tubercules qui ressemblent beaucoup aux yeux lisses des Apus, et chez d'autres il existe deux yeux réticulés qui, par leur disposition, rappellent exactement ceux des Séroles et de quelques autres Isopodes. On ne voit aucune trace d'antennes, et jusqu'ici on n'a rien découvert de bien positif relativement à la disposition de l'appareil buccal ; il paraîtrait cependant, d'après quelques observations de MM. Dekay, Stokes et Sars, que la bouche occupe la face inférieure de la tête, et présente en avant une lame bifurquée, assez semblable à l'espace compris entre la lèvre supérieure et les bords du cadre buccal chez les Décapodes brachiures, ce qui porterait à faire soupçonner l'existence de pattes-mâchoires lamelleuses. Le thorax (ou abdomen Brongniart) qui fait suite au bouclier céphalique, se compose d'un nombre variable d'anneaux bien distincts et présente presque toujours deux sillons longitudinaux qui

divisent chaque anneau en trois lobes, dont un médian ou dorsal et deux latéraux désignés sous le nom de flancs. Cette division du thorax en trois lobes est si remarquable qu'elle a frappé tous les observateurs et a valu à ces animaux leur nom de Trilobites; elle manque quelquefois cependant (comme dans l'*Asaphus armadillo* de Dalman) et ne les distingue pas essentiellement de tous les animaux de l'époque actuelle, comme le pensait M. Brongniart; car une disposition analogue se voit chez un grand nombre d'Isopodes; seulement chez ceux-ci la pièce médiane ou tergale est très grande et les pièces latérales ou épimériennes sont très petites, tandis que chez les Trilobites, c'est le contraire qui a ordinairement lieu. Souvent il n'existe aucune limite naturelle entre le thorax et la portion postérieure ou abdominale du corps (postabdomen Brongniart) et celle-ci se compose d'anneaux semblables à ceux dont nous venons de parler, mais dont les dimensions diminuent progressivement; d'autres fois, l'abdomen (ou *Pygidium* Dalman) est bien distinct du thorax et se compose d'anneaux d'une forme différente qui sont quelquefois réunis par une expansion marginale d'apparence membraneuse, ou bien il ne consiste qu'en un seul bouclier semblable à celui formé par la tête et analogue à l'abdomen des Sphéromes, et enfin on voit quelquefois à la suite de cet abdomen un appendice étroit et allongé ou lamelleux qui constitue une espèce de queue ayant quelque ressemblance avec celle des Limules ou formant une sorte de nageoire caudale. Jusqu'ici, on n'est point parvenu à découvrir des traces bien certaines de pattes chez aucun trilobite; et tout porte à croire que ces appendices étaient membraneux et lamelleux comme chez les Apus.

Les Trilobites étaient des animaux marins et plusieurs d'entre eux avait la faculté de se replier en boule comme les Sphéromes de nos mers. On en trouve dans diverses

parties de l'Europe, dans l'Amérique-Septentrionale, dans l'Amérique du Sud et à l'extrémité méridionale de l'Afrique, mais ils ne se rencontrent que dans les roches stratifiées les plus anciennes et ils ont été tous détruits avant le dépôt des couches qui sont postérieures à la formation carbonifère.

On en connaît aujourd'hui un très grand nombre et les différences de structure qu'ils offrent sont si grandes qu'on a senti la nécessité de les subdiviser en plusieurs genres ; M. Brongniart est le premier qui ait présenté une classification de ces fossiles, et ses divisions forment encore la base de la méthode adoptée par la plupart des naturalistes. On a proposé depuis peu un nombre assez considérable de genres nouveaux, mais la plupart de ces groupes ne paraissent pas devoir être adoptés.

A l'exemple de M. Dalman, nous diviserons cette classe de crustacés fossiles en deux sections, savoir :

Les TRILOBITES PROPREMENT DITS (*Palæades genuinæ* Dal.) qui ont la tête semilunaire et le thorax divisé en plusieurs anneaux distincts ;

Et les TRILOBITES DOUTEUX ou BATTOÏDES qui ont la tête suborbiculaire, l'abdomen de même forme et le thorax peut-être caché sous ces boucliers ou peut-être membraneux, mais toujours détruits.

TRILOBITES PROPREMENT DITS.

Cette section comprend presque toutes les espèces connues. C'est à ces fossiles qu'est spécialement applicable tout ce que nous avons dit de l'organisation de ces animaux en général, et peut-être devraient-ils former à eux seuls le groupe des Trilobites, car la nature des Battoïdes est encore un peu problématique. M. Dalman les divise en deux familles : les Trilobites oculés et les Trilobites typhiens.

§ 2. TRILOBITES OCULÉS.

Yeux réticulés bien distincts et élevés, situés sur la surface supérieure du bouclier céphalique. Corps contractile pouvant se replier plus ou moins complètement en dedans.

— Genre *Calymene*. *Calymene*.

Les *Calymènes* sont des Trilobites dont le corps est ellipsoïde, épais et bombé; leur tête est semi-circulaire et son lobe moyen ou saillie frontale (appelée *gabella* par Dalmann) est convexe et garni latéralement de trois paires de lobules ou tubercules séparés par des sillons transversaux. Leurs yeux ont la forme de tubercules réticulés et sont situés vers le niveau du milieu du front; enfin, de chaque côté de la face supérieure de la tête une ligne de suture qui part du front, se dirige en arrière, passe devant les yeux, puis se recourbe brusquement en dehors, et se termine près des angles postérieures du bouclier céphalique. Les anneaux de thorax et de l'abdomen se différencient par des entailles et ne parviennent quelquefois être distingués: les uns et les autres sont trilobés et ont leurs bords entiers. Les premiers sont au nombre de 10 à 14 et ont les cotés ou arcs costaux des lobes latéraux ou bandes apicales de devant et derrière et paraissent se terminer en lames. Les anneaux de l'abdomen ressemblent aux segments thoraciques par la disposition de leur lobe dorsal; mais les arcs costaux des lobes latéraux semblent avoir été réduits ou même complètement vers le bout et sont distingués vers leur extrémité. Mode de contraction qui ne se retrouve pas dans les genres voisins: enfin, il est aussi à noter que les anneaux abdominaux ne sont jamais réunis en une

lame clypéiforme comme cela a lieu chez beaucoup d'autres Trilobites, et que le corps ne présente à son extrémité postérieure ni extension ni prolongement membraneux.

Espèces ayant les angles postérieurs de la tête arrondis.

1. Calymène de Blumenbach. *Calymene Blumenbachii*.

C. capite subtriangulâri, glabella utrinque trituberosa; oculis eminentibus, loborum glabella pari intermedio proximis.

Petrified insect. Littleton. Phil. Trans. 1750, pl. 47 et 48.

Concha trilobos. Knorr. Monum. du déluge. t. 4. sup. pl. 9. f. 1.

Parkinson. Organic remains. vol. 3. pl. 17. f. 11-14.

Trilobitus tuberculatus. Brünnich. Nouv. mém. de la Soc. roy. de Danemark. t. 1 (1781), p. 389.

Entomostracitus tuberculatus. Wahlenberg. *Petrificata telluris suecanæ.* Nova acta. Rég. Soc. scien. upsaliensis. t. 8. p. 31; et Journ. de Physique, t. 91. p. 35. fig. 6.

Nova acta soc. Upsaliensis. vol. 8. p. 31. et Journal de physique. t. 91. p. 35.

Trilobites paradoxus. Schlotheim. Petrefactenkund. p. 38.

Calymene Blumenbachii. Brongniart. Hist. des Crust. foss. p. 11. pl. 1. fig. 1. A. B. C. D.

Trilobites Blumenbachii. Schlotheim. Nachträgen. t. 2. p. 33.

Calymene Blumenbachii. Var. Rasomousky. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série t. 8. p. 190. pl. 28. f. 4.

Calymene Blumenbachii. Dalman. Mém. de l'Ac. des sc. de Sockholm. 1826. t. 2. p. 226. pl. 1 f. 2. et 3.

— Payton. Trilobites of Dudley, brochure in-4. Londres 1827. contenant 14 figures de ce Calymène.

— Harlan. Critical notices of various organic remains discovered in North America: Med. and phys. researches p. 300.

— Buckland. Geology and mineralogy. pl. 46. f. 1-3.

— Bronn Lethæa geognostica. p. 110. pl. 9. fig. 3.

M. Dalman distingue plusieurs variétés de cette espèce qu'il caractérise de la manière suivante:

Var. 1. (TUBERCULATA) *segmentis trunci (thoracis) 12, pygidii (abdominis) circiter 7; corpore versus latera punctis elevatis, confertissimis sed obsoletioribus obsito.*

Var. 2. (BLUMENBACHII vera? *Segmentis trunci 13, pygidii circiter 8.*

A. — (tuberculosa) *corpore supra lævi, ad latera subtiliter alutaceo, segmentis rachidis apice tuberculosi.*

B. (pulchella) corpore undique punctis elevatis apertis aspero, rachidis segmentis viz tuberculis,

Trouvée dans le calcaire de transition de Dudley, de Gothland, de la Bohême et de l'Ohio, etc.

2. Calymène de Tristan. *Calymene Tristani*.

C. capite fornicato, genis inflatis, oculis exsertis, rugis tribus in fronte, lateralibus, obliquis, rotundis; corpore scabro.

Tristan. Journal des mines. t. 28. p. 22.

Calymeni Tristani. Brongniart. op. cit. p. 22. pl. 1. f. 2.

Trilobites Tristani. Schlotheim Nachtr. 2. p. 33.

Calymeni Tristani. Dalman. op. cit. p. 264.

Trouvée dans un schiste argileux aux environs de Nantes et dans des phyllades du Cotentin.

3. Calymène gentil. *Calymene bellatula*.

C. capite semilunari antice marginato, margine orali ascendente; prominentia frontali utrinque trilobâ, loboque supra-orali maximo; oculis prominulis loborum pari antice proximis.

Dalman. loc. cit. p. 228. pl. 1. f. 4.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

4. Calymène polytome. *Calymene polytoma*.

C. capite brevi transverso, glabella utrinque triloba, sulcoque recto a genis distincta, oculis parvis valde remotis; segmentis trunci una cum pygidii 23.

Dalman. op. cit. p. 229. pl. 1. f. 1.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

5. Calymène actinure. *Calymene actinura*.

C. oculis in genis? — lævis, capite antice rotundato prominentia frontali utrinque trituberosa; scuti caudalis laciniis radiantibus (utrinque 5) acuminatis, intermediis conniventibus, scuto anali triplo longioribus.

Entomostracites actinurus. Dalman. Acta Reg. Acad. Scient. Holm. 1824. p. 370. pl. 14. f. 1.

Calymene actinura. Ejusdem. Mém. de l'Acad. de Stockholm 1826. t. 2. p. 231.

Même gisement.

6. Calymène large-front. *Calymene latifrons*.

C. fronte inflata, latissima, subverticali, trapezoidea et (integumento exteriori sublato) punctis elevatis obsoletis numerosis sparsa; gena

*utroque oculata, mucrone destituta, inflata, annulorum impressio-
num densarumque seriebus subarcuatis cruciatis undique notata ;
extremitate corporis lævigati utraque ambitu congruente, obtuso-
rotundato.*

Bronn. Ueber Zwei neu Trilobiten. Zulechrf. fur mineralogie von
Leonhard. 1825, t. 1. p. 318. pl. 2. f. 1-4.

Dalman. op. cit. p. 267.

Grauwacke de l'Eifel.

7. Calymène de Schlotheim. *Calymene Schlotheimii.*

*C. fronte supra basin anteriorem retractam protuberante, non rugosa,
superne depressa, lata, ad angulos laterali-posticos in mucronem
producta, punctis convexis inæqualibus inæqualiter dispositis nu-
merosis undique notata ; gena utraque oculata, punctorum æqua-
lium elevatorum, superne complanatorum, media supertusorum
seriebus densis cruciata ; corporis lævigati extremitatibus rotun-
datis, postica angustiore et in parte corporis inferiore concava
reposita.*

Bronn. Journal de Leonhard. 1825. t. 1. p. 319. pl. 2. f. 5-8.

Dalman. op. cit. p. 267.

Grauwacke de l'Eifel.

8. Calymène sclerops. *Calymene sclerops.*

*C. capite semilunari convexo, genis sulcis duobus transversis ; oculis
valde elevatis, granuloso-reticulatis, operculo angustato depresso-
que ; segmentis trunci 11 ; pygidio sulcis radiantibus.*

Dalman. op. cit. p. 232. pl. 2. f. 1.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

9. Calymène macrophthalme. *Calymene macrophthalma.*

*C. capite antice, caudaque postice attenuatis, oculis magnis, exser-
tis ; rugis tribus in fronte lateralibus obliquis ; segmentis trunci 12
vel 13.*

Brougniart. Crust. fossiles. p. 15. pl. 1. f. 5.

Sternberg Verhandl. der Gesellschaft des vaterl. Museums in Bohemen
11. helf. p. 75 pl. 1. fig. A. B.

Trilobites macrophthalmus. Schlotheim. Nachträgen p. 34.

Calymene macrophthalmus. Dalman. op. cit. p. 266.

— Hoeninghaus. Isis d'Oken 1824, IV. p. 464. pl. 5. f. 1-4.

— Buckland. Mineralogy and geology. pl. 46 f. 4 et 5.

— Bronn. Lethæa. p. 110. pl. 9. fig. 4.

Trouvé dans le calcaire de transition ? de Coal-Brook Dale en An-
gleterre. M. Dalman croit devoir distinguer au moins comme une

variété le Trilobite figuré par M. Brongniart sous le même nom que le précédent (pl. 1. f. 5. A. B.) et indiqué comme ayant été trouvé à Hunaudière en Normandie.

Il paraît que les fossiles décrits par M. Green sous le nom de *Calymene butfa* et de *C. rana*, sont des variétés de cette espèce. (Voy. Harlan op. cit. p. 301).

10. Calymène ponctué. *Calymene punctata*.

C. trunco lævi, scuto caudali verrucarum serie triplici.

Entomostracites punctatus. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 32. pl. 2. f. 1. et journal de Physique. t. 91. p. 35. f. 5.

• *Entomolithus* n. 2. Linné. Mém. de Stockholm. 1759. p. 22. pl. 1. f. 1. (l'abdomen).

Lehmann. Nov. comm. Petrop. t. 10. pl. 12. f. 10. (l'abdomen).

Trilobites punctatus. Brongniart. op. cit. p. 36. pl. 3. f. 4.

— Schlotheim. Nachträgen. t. 2. f. 37.

Calymene punctata. Dalman. op. cit. p. 233.

Gothland.

11. Calymène agréable. *Calymene concinna*.

C. capite semilunato, margine antico incrassato, glabella convexa integra, pone oculos transversim impressa et utrinque tuberculo aucta; trunco segmentis 10; pygidio majusculo.

Dalman. op. cit. p. 234. pl. 1. f. 5.

Calcaire de transition du Gothland.

12. Calymène arachnoïde. *Calymene arachnoides*.

C. capite antice attenuato, verrucoso; glabella lata, oculis magnis corpore verrucoso, costis in spinis elongatis.

Hœninghaus. Lettre lithographiée sur le Calymène arachnoïde. Crofeld, 1835, avec figure.

Cette espèce diffère beaucoup des Calymènes ordinaires, et paraît se rapprocher à quelques égards des Paradoxides et de quelques Asaphes (tels que l'*A. mucroné*). On n'y voit pas de limites distinctes entre le thorax et l'abdomen, et elle devrait peut-être former le type d'une division particulière.

§§. Espèces ayant les angles postérieurs de la tête allongés et amincis.

13. Calymène variolaire. *Calymene variolaris*.

C. capite rotundato, lobis inflatis valde tuberculatis, angulis externoposticis in mucronem productis.

Parkinson. Organic remains. t. 3. pl. 17. f. 16 (la partie antérieure seulement).

Calymene variolaris. Brongniart. op. cit. p. 14. pl. 1. f. 3. A. B. C.

Trilobites variolatus? Schlotheim Nachträgen. t. 2. p. 34.

Calymene variolaris. Dalm. op. cit. p. 263.

Calcaire de transition de Dudley.

14. Calymène remarquable. *Calymene speciosa*.

C. capite semi-circulari, angulis spiniformibus; fronte valde convexo utrinque trilobo; postico lobo tuberculari, genis punctis impressis numerosis; linea fasciali valde extrorsum flexa.

Sars. Mém. sur les Trilobites, Isis, 1835. p. 339. pl. 9. fig. 7.

Calcaire de transition de la Norvège.

15. Calymène front-enflé. *Calymene clavifrons*.

Plurimi characteres, C. speciosæ, sed fronte multo majore et maxime prominente, fere globoso.

Sars. op. cit. p. 339. pl. 9. fig. 8.

Même gisement.

Ajoutez le *Calymene callicephalus*. Green. Monographie des Trilobites, accompagnant une collection de modèles en plâtre, p. 30; Harlan op. cit. p. 300. (Ohio).

Le *Calymene selencephala*. Green. op. cit. p. 320. — Harlan. op. cit. p. 300. (New-York.)

Le *Calymene platyps*. Green. op. cit. p. 325. — Harlan. loc. cit. (Montagnes de Helderberg, dans le New-York.

Le *Calymene diops*. Green. op. cit. p. 37 et 38. fig. 2; Harlan op. cit. p. 301.

Le *C. odontocephala*. Green. Journ. de Silliman. t. 25. p. 334.

C. decipiens. König Icones fossilium elutis, pl. 3. fig. 32.

Etc.

Le Genre TRIMERUS de Green ne paraît différer que fort peu des Calymènes, et ne s'en distingue guère que par l'absence de sillons transversaux sur le front, de la petitesse et de la position des yeux, la petitesse des lobes latéraux, et quelques autres caractères peu importants; on n'en connaît qu'une espèce :

Le *Trimerus delphinocephalus*. Green. Monographie des Trilobites. p. 82. fig. 1. — Harlan. op. cit. p. 305. — Brönn, Lethæa. p. 113. pl. 9. fig. 5.

+ Genre ASAPHE. *Asaphus*.

Le genre Asaphe tel qu'il a été établi par M. Brongniart et adopté par Dalman, comprend un grand nombre de Trilobites, dont les uns se lient d'une manière étroite aux Calymènes, et dont d'autres s'en éloignent beaucoup. Les caractères les plus remarquables de ces animaux consistent dans la disposition des yeux réticulés, en général semblable à celle qui existe chez les Calymènes et dans la conformation de l'abdomen, dont les anneaux ne sont pas bifurqués latéralement, et sont tantôt confondus en un grand bouclier souvent aussi grand que la tête, tantôt réunis par une bordure membraneuse ou suivis d'un prolongement caudiforme. Le corps de ces Trilobites est en général plus aplati que chez les Calymènes, mais peut également se rouler en boule; leur tête est semi-circulaire et souvent les angles postérieurs se prolongent en pointes plus ou moins larges; les yeux sont saillans, réticulés, et en général semi-lunaires; tantôt ils sont placés près du milieu du front, tantôt près des bords latéraux de la tête; la ligne de suture qui se voit sur les côtés de la face supérieure de la tête est plus éloignée de la ligne médiane, et se recourbe moins en dehors vers sa partie postérieure. Le thorax est toujours bien distinct de l'abdomen, et se compose de six à dix anneaux seulement; quant aux proportions des diverses parties du corps, elles sont très variables.

Plusieurs naturalistes ont cru devoir pousser les divisions génériques plus loin que ne l'avait fait M. Brongniart, et ont formé, aux dépens des Asaphes divers genres, nouveaux; mais ces innovations n'ont pas été admises par la plupart des auteurs, et en effet, elles ne paraissent pas reposer en général sur des bases suffisantes. Les différences qu'on remarque dans l'organisation de ces Trilobites sont cependant si grandes, que, malgré les passages graduels

qui se remarquent entre les divers types les plus distincts réunis dans ce groupe, on sent la nécessité de les séparer. Nous croyons qu'on ne devrait pas ranger dans ce genre, comme l'a fait M. Dalman, les espèces dont le thorax n'est pas trilobé, ni celles dont la tête n'est pas semi-circulaire antérieurement; enfin, on pourrait diviser les autres espèces en deux groupes, suivant que leur abdomen se compose d'anneaux distincts, et en apparence mobiles, ou bien que les divers segmens de cette partie du corps sont soudés entre eux et confondus en une seule pièce clypéiforme. De ces deux dernières divisions, la première comprend la plupart des espèces auxquelles le nom générique d'Asaphe a été premièrement donné, et pourra le conserver; la seconde correspond à-peu-près au genre *CRYPTONYME* de M. Eichwald; enfin, les espèces dont le bord antérieur de la tête n'est pas arqué, constituent les sous-genres des *ASAPHES LICHASES* et des *ASAPHES AMPHYX* de M. Dalman, et celles qui diffèrent de tous les autres Trilobites connus par l'absence des sillons longitudinaux d'où résulte la division des anneaux thoraciques en trois lobes constituant le sous-genre des *ASAPHES NILBUS* du même auteur; groupes qu'il serait peut-être convenable d'élever au rang de genres comme l'a proposé M. Sars.

Quoi qu'il en soit, nous continuerons à laisser tous ces Trilobites dans le genre Asaphe, et nous nous bornerons à employer les divisions indiquées ci-dessus comme des coupes propres à faciliter la distinction des espèces.

Première Section. *ASAPHES ARTICULÉS,*

Anneaux thoraciques trilobes; tête semi-circulaire; abdomen composé d'un nombre considérable d'anneaux distincts dans toute leur longueur, probablement mobiles les uns sur les autres et ne paraissant être réunis que par une membrane marginale.

§ *A. Extrémité de l'abdomen prolongé en pointe ou garnie d'un appendice caudal.*

1. *Asaphe caudigère. Asaphus caudatus.*

A. capite semi lunari angulis posticis extensis; oculis conicis valde elevatis granuloso reticulatis; — scuto caudali costato plicato in caudam continuam producto.

Parkinson. Organic Remains. t. 3. pl. 17. fig. 17 (abdomen).

Trilobus caudatus. Brünnich. Nouv. mém. de la Soc. roy. de Danemark (1781, t. 1. p. 392. n. 3. fig.

Asaphus caudatus. Brongniart. Crust. foss. p. 22. pl. 2. f. 4. A. B. C. D.

Trilobites caudatus. Schlotheim. Nachtr. t. 2. p. 35.

Asaphus caudatus. Dalman. op. cit. p. 236. pl. 2.

Buckland. Geology and Mineralogy. pl. 45. fig. 9-11. et pl. 46. f. 11. et 12.

Fossile du calcaire de transition de Dudley et de Gothland, etc.

2. *Asaphe mucroné. Asaphus mucronatus.*

A. capite semi-lunari, angulis posticis in spinam extensis; glabella lata, utrinque 4-incisa; oculis granulosis loborum tertio pari proximis; pygidio costis bifidis mucroneque spiniformi.

Entromostracites caudatus. Wahlenberg. loc. cit. p. 28. pl. 2. f. 8; et Journ. de Physique. t. 91. p. 34. fig. 3.

Asaphus mucronatus. Brongniart. op. cit. p. 24. (d'après Wahlenberg).

Trilobites mucronatus. Schlotheim. Nachtr. t. 2. p. 37.

Asaphus mucronatus. Dalman. op. cit. p. 236. pl. 2. fig. 3.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie, de la Scanie, etc.

§. AA. *Extrémité de l'abdomen arrondie.*3. *Asaphe de Debuch. Asaphus buchii.*

A. corpore ovato, antice obtuso; pars caudæ membranacea ad marginem longitudinaliter striata.

Parkinson. Organic remains. vol. 3. pl. 17. f. 13.

Asaphus Debuchii. Brongniart. Crust. foss. p. 21. pl. 2. f. 2. A. B. C.

Trilobites de Buchii. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 34.

Asaphus Buchii. Dalman. p. 274.

Trouvé dans du Psammite dans le pays de Galles.

4. *Asaphe de Hausmann. Asaphus Hausmanni.*

A. cauda rotunda, cuto coriaceo tuberculis minimis, spinulosis tecta.

Brongniart. op. cit. p. 21. pl. 2. fig. 3. A. B. (l'abdomen seulement).

Trilobites Hausmanni. Schlotheim. Nachr. t. 2. p. 20.

Sternberg. Verhand. der Gesellschaft des Vaterl. Museums in Bochemen III Heft. p. 77. pl. 2. f. 3. A. B. C. D.

Trilobites cornigeri-cauda. Schlotheim. Journal de Leonhard. t. 4.
pl. 1. f. 4. ?

Asaphus Hausmanni. Dalman. op. cit. p. 270.

Calcaire de transition de la Moldavie et de la Bohême.

Suivant M. Brongniart, la membrane caudale serait arrondie, tandis que suivant Sternberg, elle serait prolongée en pointe.

5. Asaphe frontal. *Asaphus frontalis.*

A. capitis angulis posticis rotundatis; prominentia frontali bisbi-impressa, oculis distantibus; pygidio rotundato, costis utrinque sex radiantibus obtusatis.

Dalman. op. cit, p. 242.

Du calcaire rougeâtre de l'Ostrogothie.

6. Asaphe de Brongniart. *Asaphus Brongnartii.*

A. chypeo semi-circulari utrinque in angulis brevibus et obtusis producto, fronte laevi, subconvexo, capite et genis conniventibus marginato; oculis lateralibus; thoracis (abdominis) articulis duodecim? Postabdomine (pygidio) unipartito, sulcis transversis exarato.

De Lonchamps. Mém. de la Soc. Linnéenne du Calvados 1825. t. 2, p. 312. pl. 19. f. 1-7. et pl. 20. f. 1.

Du grès quartzeux de May, près de Caen.

7. Asaphe de Fischer, *Asaphus Fischerii.*

A. capitis parte intermedia utrinque ad latera et antico margine sulcis duobus profundis incisa, a lateralibus partibus divisa; linea divisionis per oculorum tubera vix exserta sub angulo flexa decurrente has denuo dividente. Segmentorum trunci intermedia parte lateralibus triplo fere brevioribus. Cauda (abdomen) articulata, intermediis partibus brevissimis, lateralibus longissimis, tenuissimis.

Eichwald. Geognostico-zoologicæ per Igriam marisque Baltici provincias observationes. (Cassan 1825) p. 52. pl. 3. f. 2.

Trouvé dans le calcaire des environs de St-Petersbourg.

Les espèces suivantes sont encore trop imparfaitement connues pour pouvoir être caractérisées d'une manière satisfaisante, mais paraissent devoir prendre place dans cette subdivision du genre Asaphe.

Asaphus gemmuliferus. Phillips. (Geol. of Yorkshire. t. 2. p. 339. pl. 22. f. 11.)

On ne connaît que la moitié postérieure du corps de ce Trilobite; chaque lobe est garni de six rangées longitudinales de tubercules

circulaires et bien circonscrits, et l'abdomen est garni d'une membrane marginale ondulée par le prolongement des sillons interannulaires. Ce fossile, trouvé dans les environs de Dublin, paraît appartenir à la même espèce que le Trilobite indéterminé figuré par M. Brongniart, sous le n. 12 de la 2^e planche de son ouvrage sur les crustacés fossiles. Peut-être faudra-t-il aussi y rapporter le *Trilobites pustulatus* de Schlotheim (Nagtrügen 11, p. 42, pl. 22. fig. 6). M. Buckland a reproduit la figure donnée par M. Phillips dans l'atlas de son ouvrage sur la zoologie et la minéralogie considérées dans leurs rapports avec la théologie naturelle (pl. 46. fig. 10).

Asaphus seminiferus. Phillips. (Geol. of Yorkshire. vol. 2. p. 240. pl. 22. f. 10.)

Dans cette espèce, chaque segment abdominal est orné d'un grand nombre de petits points élevés et arrondis, disposés par rangées transversales; la membrane marginale n'est pas striée, et la tête est granulée. Du calcaire de transition du comté de Derby.

Asaphus globiceps. Phillips. (Geol. of Yorkshire. t. 2. p. 22. f. 16-20.

Cette espèce, qui se rapproche beaucoup des Calymènes par la forme générale du corps, est remarquable par le renflement et l'élévation du front. M. Phillips fait observer qu'elle a beaucoup d'analogie avec le Trilobite figuré par Martin sous le nom d'*Entomol. Derbyensis* (pl. 45. fig. 1). du calcaire du Yorkshire.

Asaphus quadrilimbatus. Phillips. (Geol. of Yorkshire. t. 2. p. 239. pl. 22. f. 1 et 2.)

Asaphus? grypturus. Green (Trans. of the Geolog. soc. of Pennsylvania. vol. 1. p. 37. pl. 6.

Grande espèce, dont les segments abdominaux sont lisses, bombés, et ont les lobes latéraux obtus et plus de moitié moins larges que le lobe moyen, trouvée dans du minerai ferrugineux, dans le schiste de transition de la nouvelle Ecosse.

Etc.

Deuxième Section. ASAPHES ANCHYLOURES.

Anneaux thoraciques trilobés; tête semicirculaire; abdomen composé d'une seule pièce clypéiforme résultant de la soudure de tous les anneaux post-thoraciques; point de membrane marginale distincte.

§ B. Bouclier abdominal trilobé et ayant le lobe moyen subannelé tandis que les lobes latéraux n'offrent au plus que des vestiges de sillons transversaux interannulaires.

8. Asaphe dilaté. *Asaphus dilatatus*.

A. corpore breviter ovato, margine lævi; capite magno, angulis posticis acuminatis; pygidio rotundato costis paucioribus (7-8) evanescentibus.

Trilobus dilatatus. Brünnich. Nouv. mém. de la Soc. roy. de Danemark (1781) t. 1. p. 393.

Asaphus de Buchü, Var. Brongniart. Crust. foss. p. 21.

Asaphus dilatatus. Dalman. op. cit. p. 272.

* Sara. Mém. sur les Trilobites. Isis. 1835. p. 336. pl. 8. fig. 5.

Terrain de transition de la [Norwège. N'est peut-être qu'une variété de l'*As. Buchii*.

9. Asaphe front étroit. *Asaphus angustifrons*.

A. capite plusquam semiorbiculari, angulis posticis haud extensis; oculis subverticalibus valde approximatis; linea fasciali antice acuminata, postice introrsum flexa; tuberculo pone singulum oculum.

Dalman. op. cit. p. 239. pl. 3. f. 2.

Calcaire gris de l'Ostrogothie.

10. Asaphe cornigère. *Asaphus cornigerus*.

A. capite semilunari convexo, lævi, angulis posticis rotundatis; sulco subbasali transverso profundoque; linea fasciali (postice) oblique extrorsum decurrente, tandem intus flexa; — Pygidio semiorbiculari, costis obsoletis.

Entomostracites expansus. Wahlenberg. Nouv. act. d'Upsal. t. 8. p. 25, et Journ. de Physiq. t. 91, p. 32. fig. 13.

Entomolithus paradoxus, a. expansus. Linné. Itiner. Oeland. p. 147. fig.

Trilobites cornigerus. Schlotheim, Leonhard. Mineral. Taschenbuch. vol. 1. p. 1. pl. 1. f. 1-3? et Petrefactenkunde. p. 381, Nachträge. t. 2. p. 34.

Asaphus cornigerus. Brongniart. Crust. foss. p. 18. pl. 2. f. 1. A. B. et pl. 4. f. 10.

Asaphus expansus. Dalman. p. 241. pl. 3. f. 3 et 4.

— Bronn. Lethæa. pl. 114. pl. 9. fig. 7.

Très commun dans le calcaire de transition de la Suède.

11. Asaphe de Lichtenstein. *Asaphus Lichtenstenii*.

A. capite semilunari margine antico rotundato limboque parvo, angulis posticis elongatis sed rotundatis; oculorum tubera haud adeo exserta medio fere capiti inserta; pygidio semiorbiculari; intermedia pygidii parte majore profunde transverse sulcata, ad apicem fere decurrente, attenuata.

Cryptonymus Lichtenstenii, Eichwald. Geognostico-zoologiam per Igriam marisque Baltici provincias obs. p. 47. pl. 2. f. 3.

Environs de St.-Petersbourg. Ce Trilobite est très voisin de l'Asaphe cornigère et devrait peut-être ne constituer qu'une simple variété de cette espèce.

12. Asaphe de Weiss. *Asaphus Weissii*.

A. margine capitis antico utrinque sinuato exciso, medio acuminato, postico transverso sulco insigni; oculis postice sitis pedunculatis; caudae parte intermedia prominula transverse sulcata apicem versus parum attenuata.

Cryptonymus Weissii. Eichwald. op. cit. p. 46. pl. 2. f. a.

Calcaire des environs de St.-Petersbourg. Paraît ne différer que fort peu de l'Asaphe cornigère.

Le TRILOBITE DE TZARSKO-SILO de M. Razomowsky (Ann. des Sc. nat. 11^e série. t. 8. p. 187. pl. 28. fig. 1-3) n'est pas un Calymène comme l'auteur le pense, mais un Asaphe appartenant à cette subdivision. Il se rapproche de l'Asaphe cornigère par la conformation des anneaux thoraciques, du bouclier abdominal, et par la forme arrondie des angles postérieurs du bouclier céphalique, mais en diffère par la forme générale plus triangulaire de ce même bouclier. Nous sommes porté à croire que c'est la même espèce qui a été décrite par M. Eichwald, sous le nom de *Cryptonymus Weissii*.

§. B. B. Bouclier abdominal sans lobes bien distincts et dépourvu de sillons interannulaires.

13. Asaphe de Schlotheim. *Asaphus Schlotheimii*.

A. capite semicirculari latissimo, at brevissimo, fronte angusto; oculorum tuberibus longe pedunculatis; pygidio capite angustiore, intermedia parte ad apicem fere prominula, transverse quodammodo sulcata.

Cryptonymus Schlotheimii. Eichwald. op. cit. p. 45. pl. 4. f. 2.

Calcaire de St.-Petersbourg.

14. Asaphe læviceps. *Asaphus læviceps*.

A. capite amplo semicirculari lævissimo; oculis distantibus subdepressis, plica inferiore; linea faciali postice extrorsum flexa; — rachide pleuris latiore.

Dalman. op. cit. p. 243. pl. 4. f. 1. a, b, c, d.

Calcaire de l'Ostrogothie.

15. Asaphe gigantesque. *Asaphus gigas*.

A. capite sub triangulari, lobis rachidis latioribus; pygide subtriangulari.

Isotelus gigas. Dekay. Annals of the lyceum of New-York. vol. 1. p. 176. pl. 12. f. 1 et pl. 13. f. 1.

Asaphus gigas. Dalman. op. cit. p. 276.

Brongniartialisotela. Eaton. Geolog. text Book.

Asaphus gigas. Bronn. Lethæa. p. 115. pl. 9. fig. 8.

Trouvé à Trenton Falls dans le Canada; long. 6 à 12 pouces.

L'*Isotelus planus* du même auteur, ne paraît être qu'une variété du jeune âge de l'espèce précédente (voyez Ann. of the Lyc. of New-York. t. 1. pl. 178. pl. 13. f. 2.)

16. Asaphe palpébral. *Asaphus palpebrosus*.

A. capite semi circulari; linea faeciali pone oculos brevi extrorsum ducta; oculis subalteralibus magnis, exsertis, plica palpebrali basali magna; fronte valde convexa, tumida.

Dalman. op. cit. p. 245. pl. 4. f. 2. a, b, c, d, e.

Calcaire de transition supérieur de l'Ostrogothie.

17. Asaphe étendu. *Asaphus extenuatus*.

A. subellipticus, oculis subverticalibus, capite sub-sagittato, sutura faciali ad basin intus reflexa; angulis posticis elongatis acuminatis, pygidii basin attingentibus.

Entomostracites extenuatus. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 295. pl. 7. f. 4.

Asaphus extenuatus. Dalman. p. 237. pl. 2. f. 5.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

18. Asaphe grand. *Asaphus grandis*.

Fronte distincta convexa, anticè rotundata, medio coarctata linea, faciali basi inflexa; pygidio longissimo; rachide caudali coarctata longa; costis evanescentibus. Cæteris cum A. extenuat tot maximam habet similitudinem.

Sars. Isis. 1835. p. 337. pl. 9. fig. 6.

19. Asaphe à queue courte. *Asaphus brevicaudatus*.

A. clypeo semi-elliptico, in angulis longis, latis obtusis lateraliter producto; fronte depressa, capitio et genis conniventibus marginato; oculis lateralibus; post abdomine unipartito brevi, laevi.

Delongchamps. Mém. de la Soc. Linnéenne du Calvados. t. 2. p. 315. pl. 20. f. 2-4.

Grès intermédiaire de May.

20. Asaphe queue épaisse. *Asaphus crassicauda*.

A. trunco 10-articulo, capite maximo semicirculari gibboso; angulis posticis rotundatis; linea fasciali arcu antico amplissimo postice brevi ac subrecta; oculis parvis ad capitis tempora.

Entomostracites crassicauda. Wahlenberg. p. 27. pl. 2. f. 56. et p. 294. pl. 7. f. 56; Journal de Physique, t. 91, p. 33. fig. 2.

Trilobites Esmarckii. Schlotheim, Jais. 1827. III. p. 315. pl. 1. f. 8.

Asaphus (illænus) crassicauda. Dalman. op. cit. p. 250. pl. 5. fig. 2.

Bronn. Lethæa. p. 115. pl. 9. fig. 9.

Suivant M. Beck les Trilobites décrits par Eichwald sous les noms de *Cryptonymus Rudolphii* (Eichw. Per Igriam marisq. Baltici provincias Obs. p. 50. pl. 2. f. 1.), de *Cryptonymus Rosenbergii* (op. cit. p. 48. pl. 3. f. 3), de *Cryptonymus Parkinsonii* (op. cit. p. 51. pl. 4. f. 1.) et de *Cryptonymus Wahlenbergii* (op. cit. p. 50. pl. 4. f. 3), ne seraient que des variétés de l'*Asaphus crassicauda*.

21. Asaphe centrote. *Asaphus centrotus*.

A. trunco 9-articulato; capite maximo semiorbiculari convexo, angulis posticis extensis; oculis parvis temporalibus; linea fasciali antrorsum amplissima, pone oculos extrorsum arcuata.

Asaphus (illænus) centrotus. Dalman. op. cit. p. 248. pl. 5. f. 1.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

22. Asaphe large queue. *Asaphus laticauda*.

A. capite truncato valde convexo; oculis ad latera capitis convexissimis; linea fasciali pone oculos oblique extrorsum tendente; pygidio suborbiculari, limbo latissimo planissimoque, costis radiantibus.

Entomostracites laticauda. Wahlenberg. op. cit. p. 28. pl. 2. fig. 7. 8; et Journal de Physique. t. 91, p. 34. fig. 2.

Asaphus laticauda. Brongniart. Crust. foss. p. 24. pl. 3. f. 8.

Trilobites crassicauda. Schlotheim. Nachtrâg. II. p. 3.

Asaphus (illænus) laticauda. Dalman. op. cit. p. 251.

Calcaire de transition de la Dalécarlie.

Le *Trilobites marginatus* de Razomowsky (Ann. des Sc. nat., 1^{re} série, t. 8, p. 191, pl. 28, fig. 7-8) est le bouclier abdominal de quelque espèce d'Asaphe de cette subdivision. Il paraît ressembler à l'*Asaphus dilatatus* et à l'*Asaphus angustifrons* plus qu'à tout autre, mais s'en distingue par la manière dont le bord de ce bouclier se relève tout autour. On l'a trouvé à Nikolsk en Russie.

Troisième Section. — ASAPHES ONISCOIDES.

Corps dépourvu de sillons longitudinaux et n'offrant par conséquent pas les trois lobes qui se voient chez tous les autres trilobites (sous-genre Nuthinia Dalman.)

23. Asaphe armadille. *Asaphus (nileus) armadillo*.

A. corpore in globo contractili brevi convexo brevissimo absque sulcis dorsali longitudinalibus; capite subtruncato pone oculos exciso; oculis sublateralibus maximis, absque plica palpebrali. Pygidio brevi integerrimo, absque costis.

Dalman. op. cit. p. 246. pl. 4. f. 3. a, b, c, d.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

Le genre *DEPLEURA* de Green paraît se rapprocher des *Asaphes onisioïdes* par l'absence et l'obscurité des divisions longitudinales des corps. Voici les principaux caractères qui y ont été assignés. Corps contractile, peu déprimé et légèrement rétréci postérieurement. Tête verruqueuse, trilobée; joues saillantes; yeux circulaires, très écartés et obliques; thorax sans lobes distincts et composé de onze segmens; côtes doubles; bouclier abdominal arrondi et sans articulations. L'espèce unique d'après laquelle cette division générique a été établie est le :

Depleura Dekagi. Green. Monographie. p. 79. fig. 8. — Harlan. op. cit. p. 304. — Bronn. *Leithaa Geognostica*, p. 113. pl. 9. fig. 6 et 7.

Trouvé à Lockport et dans plusieurs autres localités, aux Etats-Unis.

L'un des fossiles d'après lesquels M. Eaton a établi le sous-genre *Nuthinia* (*Geological textbook* p. 32) paraît être le bouclier céphalique de quelque grande espèce d'*Asaphe*.

Le genre *CERAURUS* de Green paraît établir le passage entre les *Asaphes* articulés et les *Paradoxides*; il ressemble à ces derniers par la forme générale et l'aplatissement

du corps, mais s'en distingue par l'existence d'yeux circulaires bien distincts quoique petits, situés vers le milieu des joues. Le corps est très aplati, un peu rétréci postérieurement et non rétractile; la tête est très large et a ses angles postérieurs prolongés en forme de cornes dirigées en arrière; le thorax se compose de douze segmens dont le lobe moyen est très petit et les lobes latéraux ou côtes grands; enfin l'abdomen se termine par une paire de prolongemens semblables aux cornes postérieures des Paradoxides.

La seule espèce connue est le

Ceraurus pleurexanthemus. Green. Monog. p. 84. fig. X.

TRILOBITES TYPHLIENS.

Point d'yeux réticulés; tubercules oculiformes peu ou point distincts. Corps en général très aplati et ne se roule pas en boule.

+ Genre **AMPYX**. *Ampyx*.

Ce petit groupe, établi d'abord par Dalman, comme un sous-genre de ses Asaphes et élevé avec raison par M. Sars au rang de genre, est facile à distinguer par la disposition singulière de la tête qui est triangulaire et a le front avancé en forme de rostre ou de corne conique et pointue. Il n'y a point d'yeux; le thorax est très court et composé seulement de cinq ou six anneaux; l'abdomen est clypéiforme et entier; enfin le corps peut se rouler en boule.

1. *Ampyx nasillard*. *Ampyx nasutus*.

A. segmentis trunci 6, capite triangulari prominentia frontali maxima, subpyriformi, elevata, ultra marginem oralem producta.

Asaphus (Ampyx) nasutus.

Dalman. op. cit. p. 253. pl. 5. f. 3.

— Bronh. Lethæa p. 16. pl. 9. fig. 2.

Du calcaire de transition de l'Ostrogthie.

2. *Ampyx rostral. Ampyx rostratus.*

Fronte triangulari-conica, in spinam teretem longam tenuissimam protracta; pygidio marginato, rachide caudali seriebus 6 punctorum minimorum, lateribus sulcis 2.

Sars. Isis. 1835. p. 334. pl. 18. fig. 3.

3. *Ampyx mammeloné. Ampyx mammilatus.*

Fronte rotundato-conica, ad basin utrinque eminentiâ oblonga parum convexa sulco medio insignita; pygidio triangulari margine crasso striato, lateribus sulco unico.

Sars. loc. cit. p. 335. pl. 8. fig. 4.

4. *Ampyx incertain. Ampyx incertus.*

A. clypeo triangulari in angulis brevibus incurvatis lateraliter producto; fronte magno, convexo, antice acuto, postice bituberculato; genis parvis; oculis lateralibus.

Asaphus incertus. Delonchamps. Mém. de la Soc. Lin. du Calvados. t. 2. p. 316. pl. 20. fig. 5.

+ Genre **CONOCÉPHALE** (*Conocephalus*).

Le genre **CONOCÉPHALE** de Zenker semble établir le passage entre les Asaphes, les Ogygies et les Paradoxides; l'espèce unique dont il se compose n'a pas d'yeux réticulés placés comme chez les Asaphes, vers le milieu des joues, mais présente de chaque côté près de l'angle antérieur du lobe frontal un tubercule oculiforme arrondi. La tête, de même que chez les Ogygies et les Paradoxides, est grande, beaucoup plus large que le thorax et prolongée postérieurement en deux grandes cornes qui se dirigent en arrière; le front est étroit, triangulaire et creusé de chaque côté par trois petits sillons obliques; les joues sont grandes et divisées obliquement par une ligne qui s'étend de chaque côté des tubercules oculiformes vers l'angle du bouclier céphali-

que. Le tronc est aplati et elliptique, il se compose d'une quinzaine d'anneaux bien distincts, suivis d'un petit bouclier abdominal arrondi, trilobé et subannulé au milieu; le lobe moyen des anneaux thoraciques étroit, et les lobes latéraux très longs, recourbés en arrière dans leur tiers externe, bifurqués ou trifurqués vers le bout et contigus dans presque toute leur étendue.

Le *Conocephalus costatus* de Zenker (Beiträge zur Naturgeschichte, der Urwelt, p. 49, pl. 5, fig. G. H. I. K) qui a servi à l'établissement de ce genre, se trouve dans le calcaire de transition de la Bohême.

Le *Trilobites Sulzeri* de Schlotheim (Nachträgen zur Petrefactenkunde, 2^e partie, p. 34. pl. 22, fig. 1), ressemble beaucoup à l'espèce précédente par la position des tubercules oculiformes et la conformation du tronc, mais ne paraît pas avoir les angles postérieurs du bouclier céphalique prolongé en manière de cornes; il provient également de la Bohême et suivant M. Bronn ne différencierait pas spécifiquement du *C. costatus* (Lethæa Geognostica. pl. 121. pl. 9 fig. 15).

† Genre OGYGIE *Ogygia*.

Le genre Ogygie de M. Brongniart se compose d'un petit nombre de Trilobites qui sont remarquables par l'aplatissement de leur corps; leur forme générale est celle d'une ellipse allongée, terminée en pointes à peu-près égales à ses deux extrémités. Le bouclier céphalique beaucoup plus large que le thorax, se prolonge postérieurement en deux cornes libres et pointues qui longent les côtes du thorax. On remarque sur sa partie antérieure un sillon longitudinal médian qui ne se voit pas dans les autres Trilobites, et sur les côtés, deux sillons arqués; le lobe frontal est saillant, mais ne présente ni sillons transversaux ni tubercules; enfin, de chaque côté, vers le

milieu du bouclier, se trouve une protubérance oculiforme qui ne présente du reste ni structure réticulée, ni l'espèce de rebord palpébral qui entoure la cornée chez les Asaphes et les Calymènes. Le thorax se compose de huit anneaux, dont le surface est striée. L'abdomen est formé d'une dizaine d'anneaux dont les lobes latéraux paraissent être semi-membraneux vers le bout et ne dépassent pas la membrane marginale qui semble les unir; ceux des derniers segments se dirigent de plus en plus en arrière, de façon que le rachis ou portion moyenne de l'abdomen n'occupe qu'environ les deux tiers de la longueur de cette partie du corps; enfin, M. Brongniart pense qu'il existe quelquefois sur les côtés du corps des traces indicatives de l'existence de poches ovifères analogues à celles de divers entomostracés. Mais l'apparence qui donne naissance à cette opinion pourrait bien avoir été produite par l'une des paires d'appendices abdominaux, laquelle aurait été foliacée et aurait débordé l'abdomen en dessus comme cela se voit chez quelques Isopodes.

ESPECES.

1. Ogygie de Guettard. *Ogygia Guettardi*.

Corpore depresso ovato, utrinque acuminato capite antice subbifido; postice in duobus mucronibus corporis fere longitudine, elongato;

Brongniart. Crust. foss. p. 28. pl. 3. f. 1. A. B.

Trilobites Guettardi. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 35.

Ogygia Guettardi. Dalman. op. cit. p. 279.

Buckland. Mineral. and geol. pl. 46. f. 9.

Bronn. Lethæa. p. 120. pl. 9. fig. 19.

Schiste ardoise d'Angers.

2. Ogygie de Desmarest. *Ogygia Desmarestii*.

Corpora depresso ovato; antice obtuso; capite angulis posticis in duobus mucronibus brevibus desinente.

Brongniart. op. cit. p. 28. pl. 3. f. 2.

Trilobites Desmarestii. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 35.

Ogygia Desmarestii. Dalman. op. cit. p. 279.

Même gisement.

- Le genre OTARION de M. Zenker ne paraît pas différer beaucoup du genre Ogygie de M. Brongniart, et devrait peut-être y rentrer. Il se compose de Trilobites aplatis et dépourvus d'yeux, dont le corps est obovaire, le bouclier céphalique grand et cornigère, les lobes latéraux larges, contigus et obtus à leur extrémité, le front court et arrondi en avant, et séparé des joues par deux petits tubercules oculiformes. Les lobes latéraux du thorax sont composés de segmens très grands et entiers. Enfin l'abdomen est petit et composé de segmens plus ou moins confondus entre eux. Il est à noter qu'on n'aperçoit pas sur le devant du front un sillon médian comme chez les Ogygies. Voici du reste les caractères que Zenker assigne aux deux espèces dont il compose ce genre.

Otarion diffractum.

Corpus parvum. Pinnae (paria decem) convexae, obtusae, approximatae, ultimae (caudales) minimae, conglutinatae; scuta caudalia oblonga, minutissima.

Zenker. Beitrage. p. 44. pl. 4. f. O, P. L. Q. R.

Eronn. Lethæa. p. 123. pl. 9. fig. 17.

Calcaire de transition de Beraun en Bohême.

Octarion squarosum.

Corpus magnum. Pinnae depressae, acutae; ultimae squarro-distantes; scuta caudalia suborbicularia.

Zenker. op. cit. p. 47. pl. 4. f. 4. S. M. N.

Même gisement.

Le genre CRYPTOLITHUS de Green, se rapproche beaucoup des Otariens de Zenker, mais s'en distingue par l'absence des tubercules oculiformes et par quelques caractères; le corps est contractile, la tête semilunaire, convexe et entourée d'une bordure assez longue, sculptée en réseau; le front est très saillant et avance plus que les joues; le thorax est aplati, trilobé et composé de six à dix anneaux sillonnés; enfin, l'abdomen est beaucoup plus petit que la tête et sans divisions.

Le type de ce genre est le

Cryptolithus tessellatus. Green. Monog. p. 73. fig. 4.—Harlan. op. cit. p. 304. — Bronn. Lethæa. p. 118. pl. 9. fig. 13.

Si l'on adopte ce genre, il faudra probablement y rapporter ainsi que l'a fait M. Green, l'*Entomostracites granulatus* de Wahlenberg (Mém. d'Upsal, t. 8, p. 30, pl. 2, fig. 4 et journal de Physiq. t. 91. p. 34 fig. 4) que M. Brongniart a laissé parmi les *incertæ sedis* (Crust. fossil. p. 36, fig. 3, pl. 3) et que M. Dalman range dans le genre Asaphe (Mém. de Stockh, p. 228, pl. 2, figure 6). Ce Trilobite singulier a les cornes postérieures du bouclier céphalique plus longues que le corps, le thorax composé de six anneaux, et l'abdomen formé d'une seule lame clypéiforme lisse et arrondie (1); il se trouve dans le schiste argileux supérieur des montagnes d'Alleberg dans la Westrogothie.

La *Nuttainia concentrica* de M. Eaton paraît appartenir à ce groupe.

† PARADOXIDES. *Paradoxides*.

Les Paradoxides ont le corps très déprimé et peu ou point contractile; leur bouclier céphalique ne porte ni yeux réticulés, ni tubercules oculiformes bien circonscrits, et n'offrent pas de sutures jugales comme chez les Asaphes et les Calymènes; son bord antérieur est semi-circulaire et son lobe moyen plus ou moins sillonné en haut, est bien distinct des lobes latéraux. Le tronc est large et déprimé et il n'existe pas de limites bien tranchées entre le thorax et l'abdomen; le lobe moyen des divers anneaux est en général étroit, mais les lobes latéraux sont très allongés et se terminent par des prolongemens

(1) Le fragment décrit par M. Brongniart, comme étant l'abdomen de cette espèce n'y appartient pas.

ginato, rachide caudali segmentis 5-6, lateribus sulcis duobus profundis, posticè spinis 2 longissimis.

Olenus forficula. Sars. Mém. sur les Trilobites. Isis. 1835. p. 333. pl. 8. fig. 1.

Norwège.

8. Paradoxe scaraboïde. *Paradoxides scaraboides.*

P. capite hemisphærico, antice rotundato; fronte subovato antrosum angustiore; trunco angusto, rachide pluris latiore; scuto anali magno utrinque tridentato.

Entomotrachites scarabæoides. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 41. pl. 1. f. 2.

Paradoxides scarabæoides. Brongniart. op. cit. p. 34. pl. 3. f. 5.

Trilobites scarabæoides. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 36.

Bromell. Act. litt. Upsal. 1729. p. 525. cum icona.

Olenus scarabæoides. Dalman. op. cit. p. 257.

Paradoxides scarabæoides. Harlan. pl. f. 7.

Dans le schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.

Jusqu'à ces derniers temps, on pensait que ce Trilobite, ainsi que les deux espèces suivantes, n'avaient pas, comme les précédentes, les angles postérieurs du bouclier céphalique prolongé en forme de corne, mais d'après les observations récentes de M. Sars, il paraît que, dans les échantillons bien conservés, ce caractère se retrouve ici et dans l'espèce suivante. (Voy. le Mag. d'Hist. nat. de Christiania, 1827).

9. Paradoxe gibbeux. *Paradoxides gibbosus.*

P. capite transverso antice truncato, planiusculo; prominentia frontali oblonga, gibbosa, carinaque transversali; scuto caudale subtriangulâri utrinque bidentato.

Entomolithus paradoxus B. Cantharidum. Linneus. Act. Acad. Holm. 1759. pl. 1. f. 4.

Entomotrachites gibbosus. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 39. pl. 1. f. 4; et Journ. de Physique. t. 91 p. 37. fig. 10.

Paradoxides gibbosus. Brongniart. Crust. foss. p. 35. pl. 3. f. 6.

Trilobus truncatus. Brunnich. Nouv. Mém. de Danemark. p. 391.

Trilobites gibbosus. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 36.

Olenus gibbosus. Dalman. op. cit. p. 257.

Schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.

10. Paradoxe triarthre. *Paradoxides triarthrus.*

P. Corpore subrotundato brevi; capite hemisphærico, antice rotundato,

prominentia frontalis latissima 5-sulcata, scuto caudali margine rotundato.

Harlan. Medical and physical researches. p. 401. f. 5.

Schiste carbonifère d'Utica, province de New-York.

Le *paradoxides arcuatus* de Harlan (op. cit. p. 402, fig. 1-3) dont on ne connaît que le bouclier céphalique, ne paraît différer de l'espèce précédente que par la forme des lobes latéraux qui sont d'abord très étroits, puis se dilatent brusquement en une éminence presque circulaire vers le niveau de l'espace compris entre le premier et le second sillon du front; mais dans les divers échantillons figurés par l'auteur, la disposition de cette partie varie un peu et les particularités que nous venons de signaler comme devant faire distinguer ces fossiles de l'espèce précédente, ne dépendent peut-être que de la manière dont les échantillons ont été dégagés de la gangue pierreuse dont ils étaient environnés.

Le *Triarthrus Bechii* de M. Green (Monogr. p. 37, fig. 6.—Harlan, op. cit. p. 305 et 402, figure 6. — Bronn Lethæa. p. 117. pl. 9. fig. 10) est très voisin des précédents dont il ne paraît différer que par la direction des sillons frontaux des deux paires antérieures qui sont concaves en avant, tandis que le chez *P. arcuatus* et le *P. triarthrus*, leur cavité est dirigé en arrière. M. Harlan a fait voir que le genre TRIARTHURUS de M. Green ne pouvait être admis et avait été caractérisé d'une manière tout-à-fait faussé par ce dernier auteur.

M. Razomowsky a fait connaître des fragmens d'un Trilobite qui se rapproche beaucoup des Paradoxides, mais qui est pourvu d'un petit bouclier abdominal, terminé par un long appendice flexible et impair qui ressemble beaucoup aux espèces de cornes latérales des anneaux précédents. Il considère ce fossile comme devant constituer un genre nouveau, mais n'y donne pas de nom. (Voyez Ann. des Sc. nat. t. 8, p. 193, pl. 28, fig. 11.)

Le genre *Eleipsocephalus* de Zenker ne paraît différer que fort peu des Paradoxides dépourvus de cornes céphaliques cet auteur le caractérise par la phrase suivante :

Corpus oblongum, exacte ellipticum. Scutum capitale ecorne; caput sublineari-ellipticum integerrimum; cristæ, alares, oculi nulli. Pannæ convexæ. Scutum caudale semilunare, parvum; rachis caudalis integerrima.

Espèce *Eleipsocephalus ambiguus* Zenker (op. cit. p. 51, pl. 4, fig. G. H. L. K.) trouvé dans la Grauwacke en Bohême.

Il nous paraît impossible de rapporter à aucun des genres précédens le Trilobite décrit par M. Wallenberg sous le nom d'*Entomostractus laciniatus* (Nouv. mém. d'Upsal, t. 8, p. 34 pl. 2, fig. 2). M. Brongniart le considère comme un Paradoxide (*Paradoxides laciniatus*, Brong. op. cit. p. 35, pl. 3, fig. 3), et M. Dalman le place dans le genre *Asaphe* où il constitue un sous-genre particulier appelé *Lichas* (Dalm. op. cit. p. 251). L'abdomen de cet animal se termine par une espèce de nageoire caudale assez semblable à celle des écrevisses et composée de cinq lames foliacées, disposition qui ne se voit chez aucun autre trilobite. Le bouclier céphalique présente aussi une forme singulière; il est rectangulaire antérieurement et présente de chaque côté un lobe triangulaire. On ne connaît pas la structure du thorax de ce Trilobite dont on n'a trouvé que des fragmens dans le schiste argileux de la Westrogothie.

Quant au genre *BRONGNIARTIA* de M. Eaton, il ne nous paraît pas avoir été caractérisé avec assez de détails pour être reconnaissable. (Voy. Eaton, Geological text book et Brong. Lathum. p. 118).

TRILOBITES ANORMAUX ou BATTOIDES.

Les fossiles rangés dans cette section diffèrent considérablement des trilobites ordinaires et ne sont encore qu'imparfaitement connus. Ce sont de petits boucliers presque circulaires que M. Brongniart considère comme ayant recouvert tout le corps de l'animal et que M. Dalman regarde comme étant seulement des portions du corps et comme ayant appartenu, les uns, à la tête, les autres à l'abdomen d'un Trilobite, dont le thorax aurait été réduit à un état rudimentaire ou membraneux. Ils ne forment qu'un seul genre auquel M. Brongniart a donné le nom

d'AGNOSTE. *Agnostus*.

M. Dalman a cru devoir substituer à ce nom celui de *Battus*, mais nous ne voyons aucun motif suffisant pour adopter cette innovation. L'espèce unique dont ce genre se compose se rencontre en quantité innombrable dans un calcaire lamelleux de la Suède. Chaque bouclier est à-peu-près de la grosseur d'un pois et représente une ellipse tronquée, dont le bord arrondi est précédé d'une petite gouttière, et dont la surface est divisée par deux sillons longitudinaux en trois lobes; le lobe moyen est moins long que les lobes latéraux qui se joignent entre eux dans une partie de leur longueur; enfin le lobe moyen présente à sa base deux tubercules et est creusé de quelques sillons dont la disposition varie un peu. Ces boucliers, quoique se ressemblant d'une manière générale, offrent aussi d'autres différences et appartiendraient suivant M. Brongniart, à deux variétés, mais paraissent être plutôt, ainsi que le pense Dalman, des parties différentes d'un même animal; l'un d'eux un peu plus grand que l'autre et offrant une ligne médiane entre la portion des lobes latéraux qui dépassent le lobe moyen, paraît être le

bouclier céphalique et celui qui ne présente pas cette ligne semble avoir dû être le bouclier abdominal, dont la disposition ne s'éloignerait que peu de celle de la même partie chez les Asaphes anchiloures.

Ces fossiles singuliers et dont la nature est encore problématique, ont été décrits sous les noms d'*Entomli-thus pisiformis* par Linné (syst. nat. id XII, III p. 160); d'*Entosmostracites* par Walenberg (Mém. d'Upsal, t. 3, p. 42, pl. 1, fig. 5. et journal de physique, t. 91, p. 37, fig. 12); d'*Agnostus pisiformis* par M. Brongniart (Crustacés fossiles p. 38, pl. 4, fig. 4; et de *Battus pisiformis* par M. Dalman (Mém. de Stockh. 1826, p. 258, pl. 6. fig. 5.)

E.

DEUXIÈME SECTION.

CRUSTACÉS ISOPODES.

Mandibules sans palpes (1). Deux paires de mâchoires et des pieds-mâchoires réunis ou rapprochés en forme de lèvre inférieure, recouvrant la bouche. Les yeux sessiles. Pattes uniquement propres à la locomotion ou à la préhension. Les branchies situées sous l'abdomen, soit antérieurement, soit à son extrémité postérieure, au-delà des pattes. La tête le plus souvent distincte du tronc.

(1) C'est à tort que Lamarek, Latreille, et la plupart des auteurs assignent ce caractère aux Isopodes, car chez un grand nombre de ces crustacés, les mandibules sont pourvues d'une tige palpiforme, tout-à-fait semblable à celle qui se voit chez la plupart des Amphipodes.

E.

Les *isopodes*, selon nous, sont réellement les premiers crustacés produits par la nature; ils viennent en effet très naturellement à la suite de la première branche des *arachnides antennées*, qui se termine par les myriapodes, et en sont probablement originaires. Nous avons néanmoins été forcés de présenter avant eux, et comme première section, les *branchiopodes*; parce que ces crustacés, hors de rang et formant un rameau latéral, ne pouvaient être placés ailleurs.

Le corps des *crustacés isopodes* est ovale ou oblong, souvent déprimé, annelé ou divisé en segmens transverses, et a presque généralement la tête distincte du tronc. Ce corps offre un tronc divisé en sept anneaux crustacés, ayant chacun une paire de pattes. Il se termine par une queue (1) formée d'un nombre variable d'anneaux, et garnie en dessous de lames ou de feuillets servant à la natation, et dans plusieurs portant ou recouvrant les branchies (2). Dans les uns, en effet, les branchies sont postérieures, situées sous la queue; tandis que dans les autres, elles sont placées sous l'abdomen antérieurement, dans des corps vésiculaires qui adhèrent aux pattes ou à

(1) On donne généralement le nom de thorax à la portion du corps des crustacés qui est située entre la tête et l'anneau qui suit les ouvertures des organes de la génération du mâle, et on appelle abdomen celle que notre auteur désigne ici sous le nom de queue. E.

(2) Les lamelles respiratoires situées sous l'abdomen ne sont presque jamais des branchies, proprement dites, mais seulement l'une des branches des fausses pattes devenue membraneuse et vasculaire, comme cela se voit aussi pour l'un des appendices des pattes thoraciques chez les Amphipodes. La femelle de l'Ione fait cependant exception, car elle porte de chaque côté de l'abdomen des branchies rameuses. E.

certaines d'entre elles, ou qui sont à la place de celles qui manquent. (1)

Les organes sexuels de ces crustacés sont séparés : ils sont doubles dans les mâles où on a pu les découvrir, et sont placés sous les premiers feuillets de la queue, s'y annonçant par des filets ou des crochets. Les femelles portent leurs œufs sous la poitrine, soit entre des écailles, soit dans une poche. (2)

Les crustacés isopodes sont, les uns, terrestres, se tenant sous les pierres ou sous les écorces, ou dans les fentes des murs, et toujours dans des lieux sombres et humides, où ils rongent différentes matières; tandis que les autres sont aquatiques, vivant, soit dans l'eau douce, soit dans les eaux marines. Tous ceux qui sont aquatiques se nourrissent de substances animales, et plusieurs d'entre eux s'attachent aux cétacés ou à divers poissons pour en sucer le sang.

Nous diviserons les *isopodes* en deux coupes principales, qui embrassent quatre petites familles, savoir les Cloportides, les Asellides, les Ionelles, les Caprellines.

DIVISION DES ISOPODES.

ISOPODES proprement dits.

1^{re} COUPE. *Branchies situées sous la queue.*

* Branchies non à nu, ni dendroïdes. Elles sont, soit entre des écailles

(1) Les crustacés dont les appendices respiratoires sont placés sous le thorax (que Lamarck appelle ici l'abdomen) ne doivent pas rester dans l'ordre des Isopodes; ceux dont il est ici question constituent un ordre particulier auquel Latreille a donné le nom LORMIPODES. E.

(2) Cette poche est formée par les appendices flabelliformes des pattes thoraciques devenus foliacés et relevés contre le sternum. E.

les, soit sur des écailles vasculaires, soit dans l'épaisseur de certaines écailles, comme dans des bourses aplaties. (Pterygibranches. Latr.)

(a) Deux antennes apparentes. *Les Cloporides.*

Armadille.

Cloporte.

Philoscie.

Ligie.

(b) Quatre antennes apparentes. *Les Asellides.*

Aselle.

Idotée.

—

Sphéronome.

Bopyre.

°° Branchies à ans, et dendroïdes ou en forme de tiges plus ou moins divisées, (Phytibranches. Latr.) *Les Javelles.*

Typhis.

Ancée.

Pranize.

Apsoude.

Tone.

2° COUPÉ. *Branchies situées sous la partie antérieure de l'abdomen entre les pattes.*

Elles sont pressées dans des corps ovoïdes, vésiculaires, placés de chaque côté sur le second, troisième et quatrième anneaux, ou seulement sur le deuxième et le troisième. (Cystibranches. Latr.)
Les Caprellines.

Leptomère.

Chevrolles.

Cyame.

[Les Isopodes, proprement dits, sont des crustacés édriophthalmes dont l'abdomen n'est jamais rudimentaire et porte en dessous cinq paires de fausses pattes bran-

chiales, ayant toutes à-peu-près la même forme et les mêmes fonctions; les appendices du pénultième anneau (ou fausses pattes de la sixième paire) ont une forme et des usages différens de celles des précédens. Le thorax, composé en général de 7 anneaux, mais n'en offrant quelquefois que 5, porte presque toujours sept paires de pattes, lesquelles sont souvent garnies d'un palpe foliacé, servant à protéger les œufs et les petits, mais ne portent presque jamais un appendice vésiculaire propre à la respiration comme cela a lieu chez les Amphipodes et les Lœmipodes. Enfin, la conformation de leur appareil buccal varie et c'est à tort que la plupart des auteurs leur assignent pour caractère d'avoir les mandibules dépourvues d'appendices palpiformes.

Ces crustacés forment trois familles naturelles; les Idotéidiens, les Cymothoadiens et les Cloportidiens, qu'on peut distinguer de la manière suivante :

A. Pattes mâchoires operculiformes et dépourvues de tige palpiforme où n'en offrant que des vestiges.

* Pattes thoraciques ambulatories; dernier segment de l'abdomen, plus petit, que les précédens; antennes internes rudimentaires.

Famille des Cloportidiens.

* Pattes thoraciques ancreuses, dernier segment de l'abdomen, presque toujours beaucoup plus grand que les précédens; antennes internes en général bien développées.

Famille des Cymothoadiens.

AA. Pattes-mâchoires palpiformes. Dernier anneau abdominal, beaucoup plus développé que les précédens; toutes ou presque toutes les pattes ambulatories.

Famille des Idotéidiens.

Dans cette classification, la famille des Cloportides ou Cloportidiens a les mêmes limites que dans la méthode adoptée par Lamarck et comprend les Isopodes terrestres. La famille des Cymothoadiens se compose des Isopodes parasites et comprend les Cymothoa de Lamarck, les

Bopyres, les Iones, les Ancées et les Typhis; enfin, la famille des Idotéidiens se compose des Isopodes marins non parasites et comprend les genres Idotée, Sphérôme, Anthure, Aselle, etc.

LES CLOPORTIDES.

Deux antennes apparentes. Les deux intermédiaires étant plus petites, cachées, presque imperceptibles.

Les *Cloportides* nous paraissent les premiers crustacés formés par la nature; ils font en quelque sorte suite aux Gloméries et aux Iules qui terminent les Arachnides myriapodes, et ensuite amènent successivement tous les autres crustacés.

Ces premiers crustacés ont le corps ovale, aplati en dessous, convexe en dessus, divisé en segmens transverses dont les sept premiers portent chacun une paire de pattes, et les six autres forment une espèce de queue. C'est sous cette queue et dans certaines des écailles dont elle est garnie, que se trouvent les organes respiratoires de ces animaux, et c'est Latreille qui les a découverts et qui a vu qu'ils étaient renfermés dans l'intérieur de ces écailles.

Les *Cloportides* ont deux yeux sessiles et composés. Leur bouche offre un labre, une sorte d'épiglotte, deux mandibules, deux paires de mâchoires, et deux pièces inférieures subarticulées, formant une lèvre inférieure, et qui sont des pieds mâchoires ou des mâchoires auxiliaires, selon M. Savigny. Ces animaux sont la plupart terrestres, et plusieurs d'entre eux se roulent en boule dans le danger. Ils sont divisés en quatre genres.

[Voyez pour plus de détails sur la structure extérieure des Cloportides, les belles planches publiées par M. Savigny dans la *Description de l'Égypte*. E.]

ARMADILLE (*Armadilla*.)

Deux antennes extérieures, très apparentes, de sept articles et insérées sous le bord antérieur de la tête : les intermédiaires non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, convexe en dessus, couvert de segmens crustacés transverses, se mettant en boule. Les appendices de la queue non saillans. Quatorze pattes.

Antennæ externæ duæ distinctissimæ, septem-articulatæ, sub margine antico capitis insertæ : intermediis non conspicuis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, superne convexum, segmentis crustaceis transversis tectum, in globum contractile. Appendices caudæ non prominulæ. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Armadilles* tiennent de très près aux cloportes, ne s'en distinguent même, au premier aspect, que parce que les appendices de leur queue ne sont point saillans, et se roulent plus facilement et plus ordinairement en boule lorsqu'ils craignent quelque danger. Leurs anneaux sont plus convexes en dessus que ceux des Cloportes. Selon les observations de Latreille, les écailles branchiales et supérieures du dessous de leur queue ont une rangée de petits trous donnant passage à l'air.

ESPÈCES.

1. Armadille commune. *Armadillo vulgaris*.

A. griseo-plumbeus; segmentis margine postico albicantibus. Lat.
Oniscus armadillus. Lin.

Cuv. journ. d'hist. nat. 2. p. 23. pl. 26. f. 14. 15.

Armadillo vulgaris. Lat. Gen. 1. p. 71.

* Ejsd. Règne Anim. de Cuvier. t. 4. p. 144.

(B) Var. *Oniscus cinereus*. Panz. fasc. 62. t. 22.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 323.

* *Armadillidium Zenckeri*. Brandt. Conspectus p. 23. (1)

(1) M. Brandt donne le nom générique d'ARMADILLIDIUM aux Armadilliens qui ont l'article terminal externe des appen-

- * *Armadillo pustulatus*. Duméril. Dict. des Sc. nat. t. 3. p. 226.
Insectes. pl. 58. f. 1. /
 - * Desmarest. op. cit. p. 323. pl. 49. f. 6 et 7.
 - * Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 8. fig. 8.
- Habite en Europe, sous les pierres, sur les murs, etc.

2. *Armadille mélangée. Armadillo variegatus.*

- A. segmentis nigris; albo marginalis; dorso variegato.* Lat.
 - Oniscus variegatus*. Will. Entom. 4. p. 188. tab. 11. 16.
 - Oniscus pulchellus*. Panz. fasc. 62. t. 21.
 - Armadillo variegatus*. Latr. Gen. 1. p. 72.
- Habite en Europe.

OLOPORINE. (Oniscus).

Quatre antennes, insérées sous le bord antérieur de la tête; deux extérieures très apparentes, sétacées, coudées, de sept à huit articles; deux intermédiaires très petites, non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, couvert de segments crustacés, transverses, subimbriqués. Deux appendices saillans à l'extrémité de la queue. Quatorze pattes.

Antennae quatuor, basi capitis margine antico insertae: externis duabus distinctissimis, setaceis, fractis, septem vel octo articulatis intermediis minimis vix aut non conspicuis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, segmentis crustaceis transversis subim-

dices postérieur de l'abdomen, inséré sur le sommet de l'article basilaire, triangulaire ou tétragonal et tronqué au bout, tandis qu'il réserve le nom d'ARMADILLE aux espèces qui ont ce même article très petit, et inséré sur le milieu du bord interne de l'article basilaire, qui ont les pièces latérales des anneaux thoraciques simples, et quelques autres particularités de structure de peu d'importance que distinguent ces Isopodes des deux genres nouveaux, établi par le même auteur, sous les noms de CUBARIS et de DIPLOEXOCHUS.

bricatis tectum. Cauda appendicibus duabus prominulis ad apicem. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Cloportes* sont de petits crustacés bien connus et assez communs dans nos maisons, qui courent avec célérité lorsqu'on veut les saisir. Ils sont un peu convexes en dessus, aplatis en dessous, et ont sept paires de pattes courtes qui tiennent aux sept premiers anneaux de leur corps. On n'aperçoit que deux de leurs antennes, qui sont assez grandes et coudées.

Ces crustacés, surtout les Armadilles, avoisinent par divers rapports les *Glomérus* qui terminent les arachnides myriapodes, et paraissent réellement en provenir et commencer la classe à laquelle ils appartiennent. Ceux parmi eux qui n'ont que sept articles aux antennes apparentes, sont les Porcellions de Latreille.

Les *Cloportes* femelles ont sous le ventre une poche formée par une pellicule mince, dans laquelle l'animal fait passer ses œufs lorsqu'il les pond (1). Quant aux organes respiratoires de ces animaux, c'est dans les quatre premières écailles qui sont sous la queue, que Latreille les a découverts. Ce sont de petites poches branchiales situées dans l'épaisseur des lames que je viens de citer.

Ces animaux se tiennent dans les lieux frais et un peu humides, recherchent l'obscurité, et se nourrissent de différentes matières, soit animales, soit végétales, qu'ils rongent.

ESPÈCES.

1. Cloporte commun. *Oniscus asellus*.

O. supra obscure cinereus, scaber maculis seriatim lateribusque flavescens.

(1) Les jeunes restent pendant un certain temps sous le thorax de leur mère, et ne présentent, dans les premiers temps de la vie que six paires de pattes distinctes, il est aussi à noter que leur corps est alors d'une forme bien plus allongée que chez l'adulte.

E.

Oniscus asellus. Lin. Latr. Gen. 1. p. 70.

* *Oniscus asellus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 320. pl. 49. fig. 5.

Oniscus murarius. Fab. Suppl. p. 300.

Cuv. Journal d'hist. nat. 2. p. 22. pl. 26. f. 11-13.

Cloporte ordinaire. Geoff. 2. p. 670. pl. 22. f. 1.

* *Oniscus murarius*. Brand. op. cit. p. 20.

Habite en Europe, sous les pierres, le bois pourri, sur les murs, etc.

2. Cloporte granulé. *Oniscus granulatus*.

O. antennis septem-articulatis; corpore supra scabro granulato.

Porcellio scaber. Latr. Gen. 1. p. 70.

* *Porcellio scaber*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 321.

* Brandt. Conspectus. Monogr. Onisc. p. 14.

Oniscus asellus. Fab. Suppl. p. 300. Panz. fasc. 9. t. 21.

Habite en Europe, sur les murs, etc.

3. Cloporte lisse. *Oniscus lævis*.

O. antennis septem-articulatis; corpore lævi.

Porcellio lævis. Latr. Gen. 1. p. 71.

Cloporte ordinaire, var. B. Geoff.

* *Porcellio lævis*. Desmarest. op. cit. p. 321.

Habite en Europe, sur les murs, sous les pierres, etc.

Etc.

M. Brandt a établi, sous les noms de *TRICHONISCUS* et de *PLATYARTHUS*, deux genres nouveaux qui ne diffèrent des Cloportes que par le nombre des articles du filet terminal des antennes, lequel est de six seulement; chez les Trichonisques, ce filet est sétacé et l'article précédent est cylindrique et grêle, tandis que chez les Platyarthres, les articles dont ce filet se compose, sont coniques et l'article qui le précède est oblong, dilaté et comprimé. (Voyez la monographie des Oniscoïdes. Insérée dans le Bulletin de la Soc. des Nat. de Moscou.)

E.

PHILOSOME. (Philoscia.)

Deux antennes externes très apparentes, de huit articles, nues à leur base; les intermédiaires non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps oval à segments crustacés transverses, rétréci vers la queue. Quatre appendices styliformes, presque égaux et saillans à la queue. Quatorze pattes.

Antennæ externæ duæ distinctissimæ, octo-articulatæ, basi nudæ: intermediis non conspicuis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, ad caudam angustatum, segmentis crustaceis transversis: caudæ appendicibus quatuor styliformibus subæqualibus, prominulis. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Philoscies* ne diffèrent des *Cloportes* que parce que les antennes externes sont découvertes à leur insertion, et que les appendices saillans qui terminent leur queue sont au nombre de quatre, et presque égaux. Néanmoins, les deux appendices extérieurs sont un peu plus longs.

ESPECE.**1. Philoscie des mousses. *Philoscia muscorum*.**

Art. Gen. 1. p. 69. et Hist. nat. 2. p. 43.

Oniscus silvestris. Fab. Syst. 2. p. 397.

Coqueb. illustr. ic. deç. 1. p. 27. tab. 6. f. 12.

Oniscus muscorum. Cuv. Journal d'hist. nat. 2. p. 21. pl. 26. f. 6-8.

* *Philoscia muscorum. Desm. Consid. sur les Crust. p. 319.*

Habite en France, sous les feuilles tombées et pourries.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles décrites par M. Brandt. dans sa monographie des Oniscoidiens (Bullet. des Nat. de Moscou.)

LIGIE. (Ligia).

Deux antennes externes très apparentes, ayant leur dernière pièce composée d'un grand nombre de petits

articles; les intermédiaires non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, à segments transverses. Deux appendices bifides à l'extrémité de la queue. Quatorze pattes.

Antennæ externæ duæ distinctissimæ, articulo ultimo & pluribus aliis minoribus compositæ, intermediis occultatis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum; segmentis dorsalibus transversis. Appendices duæ bifidæ ad extremitatem caudæ. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Ligies* ressemblent aux *Cloportes* par leur aspect; mais elles sont ordinairement un peu plus grandes, plus aplaties et en sont distinguées par leurs antennes, qui semblent composées d'un grand nombre d'articles. Les deux appendices qui forment une saillie à l'extrémité de leur queue sont courts et bifides.

Ces crustacés sont agiles, et la plupart vivent dans les eaux au bord de la mer.

ESPÈCES.

1. Ligie océanique. *Ligia oceanica*.

L. appendicibus caudæ brevibus latiusculis bifidis: stylis setaceis.

Oniscus oceanicus. Lin. Oliv. encycl. vol. 6. n. 18.

Ligia oceanica. Fab. Suppl. p. 301.

Ligia oceanica. Lat. Gen. t. p. 68. et Hist. nat. 7. p. 69. f. 1.

* *Hist. Règne min. de Cav. t. 4. p. 442.*

* *Ligia oceanica*. Desm. Consid. sur les Crust. p. 312. pl. 49. f. 3 et 4.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 8. fig. 6.

* Brandt. Conspec. monograph. Oniscoid. p. 10.

Habite en Europe, aux bords de la mer.

2. Ligie italique. *Ligia italica*.

L. antennis corporis fere longitudine; caudâ elongatâ bifidâ: stylis bifidis.

Ligia italica. Fab. Suppl. p. 301.

Latr. gen. t. p. 67.

* *Hist. Crust. de Rica* p. 152.

* Desm. Op. cit. p. 348.

* Savigny. Descrip. de l'Égypte. Crust. p. 18. fig. 7.

Roux. Crust. de la Méditer. pl. 13. f. 5.

Habite la Méditerranée, au bord de la mer.

3. Ligie des hypnes. *Ligia hypnorum*.

L. antennarum articulo secundo appendiculifero; setis caudæ inæqualibus: duabus internis longioribus.

Oniscus hypnorum. Cuv. Journal d'hist. nat. 2. p. 19. pl. 26. f. 3. 4. 5.

Fab. suppl. p. 300.

* *Oniscus agilis*. Panzer Fauna German. Fasc. 9. f. 24.

Ligia hypnorum. Latr. Gen. 1. p. 68.

* Ejusd. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. 141.

* Desm. Op. cit. p. 318.

Habite en France, sous les monnaies, et sur les côtes de l'Océan.

Etc

* Ajoutez quelques espèces nouvelles figurées par Roux dans son ouvrage sur les Crustacés de la Méditerranée. pl. 13 et par Party dans sa description des animaux articulés, recueillis au Brésil, par Spix et Martius, ainsi que celles décrites par M. Brandt.

Le genre *Ligidium* de M. Brandt ne diffère des Ligies proprement dites, que par quelques particularités de forme dans les appendices postérieurs de l'abdomen. (Voyez Conspectus monographiæ Crustaceorum oniscoïdorum Latreillii auct. p. 11 * Brandt. Mosquæ. 1833.)

Le genre *Tylos*, établi par Latreille, mais connu principalement par les figures que M. Savigny en a données, se rapproche beaucoup des Armadilles par la forme générale du corps, et ressemble aux Ligies par le nombre considérable des articles de la portion terminale des antennes externes; ce qui le caractérise surtout, c'est la conformation de l'abdomen : le dernier segment de cette portion du corps est demi circulaire et remplit exactement l'échancrure formée par l'anneau précédent. Enfin, les appendices abdominaux de la dernière paire sont très petits et entièrement cachées sous l'abdomen. (Voyez Latreille, Règne anim. de Cuvier, t. 4, p. 141 et Audouin, Explication des planches de M. Savigny, dans la description de l'Égypte, p. 286.)

On ne connaît qu'une espèce de ce genre, savoir :

Le *Tylos armadillo*, Latreille, loc. cit. ; *Tylos Latreillii* Audouin apud Savigny, Égypte, crust. pl. 13, fig. 1. E.

Le genre *Doro* de M. Guérin rentre dans cette division de l'ordre des Isopodes, et se rapproche beaucoup des *Tylos* et des *Cloportes*. Les caractères que ce naturaliste y assigne sont les suivans : « Antennes de garticles, dont les quatre derniers forment une tige beaucoup plus courte que le précédent, et composé d'articles inégaux; corps ne paraissant pouvoir se contracter que très imparfaitement en boule; appendice ou styles postérieurs s'avancant au-delà du dernier segment. »

Doro A. EPRINUS. *Doro echinata*. Guérin. Mag. de Zoologie. cl. 7. pl. 21.

LES ASELLIDES.

Quatre antennes apparentes; les deux intermédiaires plus courtes.

Dans l'ordre de la nature, les *Asellides* suivent immédiatement les *Cloportides*; aussi plusieurs parmi elles furent confondues avec les *cloportes* mêmes par différens naturalistes. On les en distingue par leurs quatre antennes apparentes, sauf le singulier genre du *Bopyre* qui n'en offre point, et par le dernier segment de la queue qui est souvent plus grand que ceux qui le précèdent. C'est encore sur des écailles ou dans l'intérieur de certaines écailles qui sont sous cette queue, que se trouvent les branchies de ces animaux.

Toutes les *Asellides* sont aquatiques, ont quatorze pattes et les yeux sessiles lorsqu'ils existent. Plusieurs parmi elles sont parasites des poissons.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, p. ces Isopodes diffèrent beaucoup entre eux par leur structure et par leurs mœurs, et nous paraissent devoir être divisés en deux familles naturelles.

ASSELLE. (Asellus.)

Quatre antennes apparentes, sétacées, inégales, pluriarticulées : deux supérieures plus courtes, quadriarticulées ; deux inférieures beaucoup plus longues, à cinq articles. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux sessiles, simples.

Corps oblong, déprimé ; à tête distincte ; à segments crustacés, transverses. Queue d'un seul segment, ayant deux appendices au bout. Quatorze pattes.

Antennæ quatuor, conspicuæ, setacæ, inæquales, pluriarticulatæ : duabus superis quadriarticulatis brevioribus ; duabus inferis multò longioribus quinque articulatis. Maxillæ pluribus paribus. Oculi duo sessiles, simplices.

Corpus oblongum, depressum ; capite distincto ; segmentis crustaceis transversis. Cauda segmento unico ; appendicibus duabus ad apicem. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Aselles* sont des crustacés aquatiques que Linné confondait avec les Cloportes, que Geoffroy a le premier distingués, et qui diffèrent principalement des quatre genres qui précèdent, parce que leurs quatre antennes sont apparentes. Elles n'ont point de nageoires sur les côtés de la queue, mais le dessous offre deux grandes écailles qui recouvrent les branchies, et au bout, il y a deux appendices quelquefois fourchus ou qui portent deux styles. Leurs pattes sont terminées par un crochet. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans une poche membraneuse qui occupe une grande partie du dessous de leur corps. (1)

(1) On doit d'intéressantes observations sur le développement des jeunes, à M. Rathke. (Voy. *Abhandlungen zur Bildungs- und*

Ces crustacés se nourrissent d'animalcules qu'ils cherchent à saisir. Une espèce commune vit dans les eaux douces; mais il paraît qu'il en existe dans la mer, qui offrent des particularités dont on pourrait se servir pour les distinguer si cela devenait utile. Voyez les genres *Janire* et *Jæra* de M. LEACH. (1)

Le genre *Gara* de Leach se reconnaît à l'existence de deux tubercules à la place des stylots terminaux de l'abdomen et à quelques autres particularités de structure; on n'en connaît aussi qu'une seule espèce; le *Jæra albifrons* (Leach. Edinb. Encyclop. sup. t. 7. p. 434; Desmarest. op. cit. p. 326; Latreille. Règne anim. t. 4. p. 141. E.

ESPÈCE.

1. Aselle ordinaire. *Asellus vulgaris*.

Aselle d'eau douce. Geoff. 2. p. 672. pl. 22. f. 1.

Asellus vulgaris. Latr. Gen. 1. p. 63.

* Eysd. Règne anim. t. 4. p. 140.

Oniscus aquaticus. Lén.

Squilla asellus. Degeer. Ins. 7. p. 496. pl. 31. f. 1.

Asellus aquaticus. Sch. Supp. p. 303.

* *Asellus vulgaris*. Desmarest. Consid. sur les Insect. p. 326. pl. 49. fig. 1 et 2.

* *Oniscus aquaticus*. Rathke Abhandl. t. 1. pl. 1. et Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2. pl. 11. C.

Habite en Europe, dans les eaux douces, les mares, etc.

Entwickelung, etc. t. 1. p. 3; et *Annales des Sciences naturelles*, 2. série, t. 2, p. 139).

(1) Les *JANIRES* de Leach ou *ONISCOUS* de Latreille diffèrent des *Aselles* par le rapprochement de leurs yeux, leurs antennes supérieures plus courtes que le pédoncule des antennes externes et par les crochets bifides de leurs tarsi; la seule espèce connue est le *Janira maculosa*. (Leach. Edinb. Encyclop. Suppl. t. 7. p. 434; et *Trans. Soc. Linn.* 2. 11, p. 373; — Desmarest, *Consid. sur les Insect.* p. 325. — *Oniscodes maculosa*, Latreille. Règne anim. t. 4. p. 141.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, p. ces Isopodes diffèrent beaucoup entre eux par leur structure et par leurs mœurs, et nous paraissent devoir être divisés en deux familles naturelles.

ÆCELLES. (Æcelles.)

Quatre antennes apparentes, sétacées, inégales, plurarticulées : deux supérieures plus courtes, quadriarticulées ; deux inférieures beaucoup plus longues, à cinq articles. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux sessiles, simples.

Corps oblong, déprimé ; à tête distincte ; à segments crustacés, transverses. Queue d'un seul segment, ayant deux appendices au bout. Quatorze pattes.

Antennæ quatuor, conspicuæ, setacæ, inæquales, plurarticulatæ : duabus superis quadriarticulatis brevioribus ; duabus inferis multò longioribus quinque articulatis. Maxillæ pluribus paribus. Oculi duo sessiles, simplices.

Corpus oblongum, depressum ; capite distincto ; segmentis crustaceis transversis. Cauda segmento unico ; appendicibus duabus ad apicem. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Æcelles* sont des crustacés aquatiques que Linné confondait avec les Cloportes, que Geoffroy a le premier distingués, et qui diffèrent principalement des quatre genres qui précèdent, parce que leurs quatre antennes sont apparentes. Elles n'ont point de nageoires sur les côtés de la queue, mais le dessous offre deux grandes écailles qui recouvrent les branchies, et au bout, il y a deux appendices quelquefois fourchus ou qui portent deux styles. Leurs pattes sont terminées par un crochet. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans une poche membraneuse qui occupe une grande partie du dessous de leur corps. (1)

(1) On doit d'intéressantes observations sur le développement des jeunes, à M. Rathke. (Voy. *Abhandlungen*.)

2. Idotée tridentée. *Idotea tridentata*.

l. linearis; caudâ apice tridentatâ; antennis externis corporis longitudine

Idotea tridentata. Latr. Gen. 1. p. 64.

Oniscus tridens. Scop. entom. carn. n° 1141.

Cloporte tridenté. Oliv. encycl. 6. p. 26.

Habite l'Océan d'Europe.

3. Idotée marine. *Idotea marina*.

l. sublinearis, semicylindrica; caudâ obtuso-acutâ, sub-emarginatâ.

Oniscus balthicus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 66. tab. 4. f. 6.

Idotea marina. Fab. Suppl. p. 308.

Habite la mer Baltique.

4. Idotée étique. *Idotea hectica*.

l. lineari-depressa; antennis externis corporis sublongitudine.

Oniscus hecticus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 61. tab. 4. f. 10.

Aselle étique. Oliv. Encycl. vol. 4. n. 13.

Habite l'Océan Atlantique. * Cette espèce entre dans la division des sténosomes de M. Leach. (1)

5. Idotée ungulée. *Idotea ungulata*.

l. sublinearis; caudâ oblongâ, apice truncato-bidentatâ; antennis externis corpore brevioribus.

Oniscus ungulatus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 62. tab. 4. f. 11.

* *Oniscus linearis*. Pennant. Brit. zool. t. 4. pl. 18. fig. 2.

An idotea linearis? Fab. Suppl. p. 304.

* *Stenosoma lineare*. Leach. Trans. Linn. Soc. t. 11. p. 366.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 290. pl. 46. fig. 12.

Habite la mer de l'Inde. •

Etc. Voyez les idotées de M. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 134.

Voyez aussi les Sténosomes de M. Leach.

[Le genre LEPTOSOME (*Leptosoma*) de M. Risso ne diffère guère des Idotées que par la soudure complète de

(1) Le genre STENOSOME de M. Leach ne diffère guère des Idotées proprement dites que par la longueur des antennes qui dépassent la moitié de celle du corps. E.

IDOTÉE. (*Idotea*.)

Quatre antennes apparentes, inégales : les deux externes beaucoup plus grandes, pluriarticulées. Deux yeux sessiles.

Corps oblong et allongé ; à segmens crustacés transverses ; à tête distincte. Queue à deux ou trois segmens, nue, n'ayant aucun appendice au bout. Quatorze pattes.

Antennæ quatuor, conspicuæ, inæquales : duabus externis multò majoribus, pluriarticulatis. Oculi duo sessiles.

Corpus oblongum vel elongatum ; segmentis crustaceis transversis ; capite distincto. Cauda nuda ; segmentis duobus vel tribus ; apice appendicibus nullis. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Idotées* sont des crustacés marins dont la queue n'a point de nageoires latérales, ni d'appendices au bout. Par ce dernier caractère, elles diffèrent des *Aselles*. Elles ne se mettent point en boule comme les sphéromes qui d'ailleurs ont à la queue des nageoires latérales.

Sous la queue des *Idotées*, deux grandes écailles allongées, étroites et parallèles, en recouvrent d'autres ainsi que les branchies.

Ces crustacés se nourrissent de petits animaux marins ; on soupçonne qu'ils sucent aussi des poissons.

ESPÈCES.**1. Idotée entomon.** *Idotea entomon*.

I. ovata ; segmentis ad latera prominulis ; caudâ elongatâ conicâ.

Oniscus entomon. Lin. Pallas spicil. zool. fasc. 9. p. 64. tab. 5. f. 1-6.

Cymothoa entomon. Fab. S. 2. p. 505.

* *Squilla entomon*. Degeer. Mém. t. 7. pl. 32. fig. 1 et 2.

Idotea entomon. Lat. Gen. 1. p. 64.

Ejusd. Hist. nat. vol. 6. p. 361. pl. 58 f. 2. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 289.

* Eichwald Per Ingriam marisque Baltici provincias, obs. pl. 5. fig. 1.
Habite l'Océan d'Europe.

2. Idotée tridentée. *Idotea tridentata*.

I. linearis; caudâ apice tridentatâ; antennis externis corporis longitudine

Idotea tridentata. Latr. Gen. 1. p. 64.

Oniscus tridens. Scop. entom. carn. n° 1141.

Cloporte tridenté. Oliv. encycl. 6. p. 26.

Habite l'Océan d'Europe.

3. Idotée marine. *Idotea marina*.

I. sublinearis, semicylindrica; caudâ obtuso-acutâ, sub-emarginatâ.

Oniscus balthicus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 66. tab. 4. f. 6.

Idotea marina. Fab. Suppl. p. 308.

Habite la mer Baltique.

4. Idotée étique. *Idotea hectica*.

I. lineari-depressa; antennis externis corporis sublongitudine.

Oniscus hecticus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 61. tab. 4. f. 10.

Aselle étique. Oliv. Encycl. vol. 4. n° 13.

Habite l'Océan Atlantique. * Cette espèce entre dans la division des sténosomes de M. Leach. (1)

5. Idotée ungulée. *Idotea ungulata*.

I. sublinearis; caudâ oblongâ, apice truncato-bidentatâ; antennis externis corpore brevioribus.

Oniscus ungulatus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 62; tab. 4. f. 11.

* *Oniscus linearis*. Pennant. Brit. zool. t. 4. pl. 18. fig. 2.

An *idotea linearis*? Fab. Suppl. p. 304.

* *Stenosoma lineare*. Leach. Trans. Linn. Soc. t. 11: p. 366.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 290. pl. 46. fig. 12.

Habite la mer de l'Inde. •

Etc. Voyez les idotées de M. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 134.

Voyez aussi les Sténosomes de M. Leach.

[Le genre LEPTOSOME (*Leptosoma*) de M. Risso ne diffère guère des Idotées que par la soudure complète de

(1) Le genre STENOSOME de M. Leach ne diffère guère des Idotées proprement dites que par la longueur des antennes qui dépassent la moitié de celle du corps. E.

tous les anneaux abdominaux en une seule pièce qui est grande et pointue.

Esp. *Leptosoma appendiculata*. Risso. Hist. nat. de l'Eur. méridion t. 5. p. 107. pl. 5. fig. 23.

Le genre *ZENOBIA*, du même auteur, ne paraît se distinguer aussi des Idotées proprement dits que par l'existence de cinq anneaux parfaitement distincts à l'abdomen.

Esp. *Zenobia prismatica*. Risso. op. cit. t. 5. p. 110. pl. 5. fig. 24.

† Genre *ANTHURA*. *Anthura*.

Les Anthures de Leach se rapprochent aussi un peu des Idotées par la conformation de leur abdomen, car les fausses pattes de la dernière paire sont très grandes et enveloppent les bords du segment terminal ainsi que les fausses pattes branchiales et constituent ainsi une espèce de cavité respiratoire, analogue à celle des Idotées; mais ces appendices, au lieu d'être simples et d'adhérer au segment terminal, sont libres et composés chacun de deux grandes lames foliacées. Le corps de ces Isopodes est vermiforme et leurs antennes très courtes; enfin les pattes de la première paire sont terminées par une petite main subchéliforme et les suivantes sont toutes grêles et de longueur médiocre.

ESPÈCE.

Oniscus gracilis. Montagu. Trans. of the Linn. Soc. vol. 9. pl. 5. fig. 6. — *Anthura gracilis*. Leach. Edinb. Encyclop. Suppl. t. 7. p. 404. et Trans. Lin. Soc. t. 11. p. 366. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 291. pl. 46. fig. 19. — Latreille: Règne anim. t. 4. p. 133. — Milne-Edwards. Hist. nat. des Crust. pl. 31. fig. 3 et 4.

† Genre *ARCTURE*. *Arcturus*.

Le genre Arcture de Latreille est une des divisions les plus remarquables de la famille des Idotéides; il se com-

pose de crustacés qui se rapprochent des Sténosomes par la forme générale de leur corps, par la disposition de leurs antennes et par l'existence d'appendices operculiformes recouvrant en dessous les fausses pattes branchiales de l'abdomen, mais qui diffèrent des Isopodes ordinaires par la conformation singulière des pattes thoraciques; celles de la première paire et des trois dernières sont grêles, cylindriques et onguiculées comme d'ordinaire, tandis que celles de la 2^e, de la 3^e et de la 4^e paires sont terminées par un long article barbu et au lieu d'être ambulatoires comme les autres sont évidemment natatoires.

L'Anthurus tuberculatus (Lat. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. 139).
qui a servi à l'établissement de ce genre, et qui provient des mers polaires, nous paraît être la même espèce que l'*Idotea Baffini*, découvert par M. Sabine sur la côte ouest de la baie de Baffin, à la latitude de 71° (Sabine. Append. to capt. Parry's voyage, p. 52. tab. 1 fig. 4 et 6; Edw. Hist. nat. des Crustacés, pl. 31. fig. 1.)

Le genre *LEACHIA* de M. Johnston ne diffère que fort peu du précédent et nous semble pouvoir y être réuni sans aucun inconvénient; le principal caractère qui l'en distingue consiste dans l'allongement extrême du quatrième anneau thoracique qui occupe à lui seul plus de la moitié de la longueur du corps.

Leachia lacertosa Johnston. Contributions to British Fauna Edinb.
Phil. Journ. vol. 13. p. 229. R.

SPHÉROMIE. (Sphaeroma.)

Quatre antennes apparentes, petites, inégales; les deux externes un peu plus longues. Deux yeux sessiles.

Corps oblong, convexe, à segmens transverses subimbriqués, se contractant en boule. Queue à deux segmens, munie de chaque côté, sur le dernier, d'une nageoire pédiculée, formée de deux écailles. Quatorze pattes.

HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

Antennæ quatuor, conspicuæ, exiles, inæquales : externis longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus oblongum, convexum, in globum contractile : segmentis transversis subimbricatis. Cauda segmentis duobus : ultimo utroque latere squamis duabus natatoriis pedunculo communi insidentibus instructo. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Sphéromes* sont en quelque sorte des Armadilles marines, et se contractent aussi en boule ; mais ces sphéromes ont quatre antennes apparentes et leur queue est munie de nageoires latérales, ce que les Armadilles n'offrent point. Leurs antennes sont menues, sétacées, multiarticulées.

M. Latreille associe aux *Sphéromes* les genres *Campecopea næsa*, *cymodoce* et *dynamene* de M. Leach.

[Les *Sphéromes* et quelques petits genres voisins forment une tribu très naturelle qui se range dans la famille des Idotéides, et se reconnaît du premier coup-d'œil à la forme générale du corps et de la structure de l'abdomen ; ces Isopodes n'ont jamais le corps grêle et linéaire comme les Idotées ou les Rhoés, ni rétréci aux deux extrémités, comme chez la plupart des Cymothoadiens, mais très large partout, et comme tronqué aux deux bouts. Les pattes sont en général toutes grêles, courtes et conformées pour servir à la marche seulement ; les antennes sont très rapprochées les unes des autres, grêles et dirigées horizontalement en dehors ; les mandibules sont pourvues d'une tige palpiforme, grêle et ciliée ; les premiers anneaux de l'abdomen sont plus ou moins confondus en une seule pièce, et le sixième segment présente des dimensions très considérables, et est creusé en dessous d'une cavité destinée à loger les fausses pattes branchiales ; enfin, les appendices de ce dernier segment sont grands, lamelleux et placés de chaque côté du bouclier abdominal, de façon à constituer une sorte de nageoire caudale. Presque tous les auteurs les plus récents s'accordent à diviser, à l'exemple de Leach, cette tribu en plusieurs genres (1), et restrei-

(1) Les caractères sur lesquels ces genres reposent sont cependant loin d'avoir toute la précision et l'importance désirables, et il serait à souhaiter que l'on fît une révision approfondie

gnent le genre Sphérome aux espèces dont les appendices postérieurs de l'abdomen ont leurs deux lames terminales, saillantes, à découvert, et à-peu-près égales entre elles, le corps susceptible de se rouler en boule, et l'abdomen à découvert. E.]

de cette partie de la classification des crustacés. Voici du reste la définition que Leach a donné de ces divers genres.

Les ZUZARES ressemblent aux Sphéromes, par la faculté de se rouler en boule et par l'existence de deux lames saillantes de chaque côté de l'extrémité postérieure de l'abdomen; mais la lame externe de ces appendices, au lieu d'avoir la même forme que l'interne, est plus grande et convexe en dessus.

Zuzara semipunctata. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 344. —

Desmarest. Consid. sur les crust. p. 299.

Zuzara diadema. Leach. loc. cit. — Desm. loc. cit.

Les DYNAMÈNES ne peuvent se rouler en boule comme les précédens auxquels ils ressemblent du reste par l'existence de deux lames saillantes aux appendices terminaux de l'abdomen; enfin, l'abdomen, au lieu d'avoir son dernier article entier présente une simple fente à son extrémité.

Dynamena Montagai. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 344. —

Desmarest. Consid. p. 298.

Dynamena viridis. Leach. loc. cit.

Les CYMODOCÈRES ressemblent aux Dynamènes par la disposition des appendices et par l'impossibilité de se rouler en boule, et s'en distinguent par l'existence d'une petite lame au milieu de l'échancrure située à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Cymodocea Lamarckii. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 343. —

Desmarest. Consid. sur les crust. p. 297. pl. 48 fig. 4.

Cymodocea bifida. Leach. loc. cit.

ESPÈCES.

1. Sphérôme cendré. *Sphæroma cinerea*.

S. lævis; segmento ultimo rotundato: appendicibus laminis acutis, margine denticulatis.

Sphæroma cinerea. Latr. Gen. 1. p. 65. et Hist. nat. vol. 7. p. 16.

Sphérôme cendré. Bosc. Hist. nat. des crustacés. vol. 2. p. 186.

Oniscus globator. Ball. Spicil. zool. fasc. 9. p. 70. t. 4. f. 18.

Cymothoa serrata. Fab. Syst. 2. p. 510.

* *Spheroma cinerea*? Risso. Crust. de Nice. p. 146.

* *Spheroma serratum*. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 346.

* Desmarest: Consid. sur les Crust. p. 301. pl. 47. fig. 31.

Habite l'Océan d'Europe, sous les pierres des rivages.

Les CILICÉES, les NÉSÉES et les CAMPÉCOPÉES diffèrent des Sphérômes et des genres précédens par la conformation des appendices postérieurs de l'abdomen, dont la lame extérieure seule est saillante.

Les CILICÉES ont tous les anneaux du thorax d'égale longueur et la lame terminale de l'appendice caudal droit est assez longue.

Cilicæa Latreillii. [Leach. op. cit. p. 342 — Desmarest. op. cit. p. 296. pl. 48. fig. 3.

Les NÉSÉES ont l'avant-dernier article du thorax plus grand que le dernier et la lame terminale de l'appendice caudal droite.

Nesea bidentata. Leach. op. cit. p. 342 — Desmarest. op. cit. p. 395. pl. 47. fig. 2. *Oniscus bidentatus*. Adams. Trans. of the Linn. Soc. vol. 8. pl. 2. fig. 3. *Spheroma dydima*. Tristan. ann. du Muséum, t. 13, p. 371, pl. 27, fig. 1-5.

Enfin, les CAMPÉCOPÉES ont également le pénultième anneau thoracique plus grand que le précédent; mais la lame terminale des appendices postérieurs est courbée et très allongée.

Campecopea hirsuta. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 341. — *Oniscus hirsutus*. Montagu. Trans. Linn. Soc. v. 7. pl. 6. fig. 8.

2. Sphérome épineux. *Sphæroma spinosa*.

S. segmento ultimo spinoso pileato; appendicibus acutis ciliatis.

Sphæroma spinosa. Risso. Hist. nat. des crust. p. 147. pl. 3. f. 14.

Habite... la Méditerranée ? entre les zostères auxquelles il se cramponne.

Etc. Voyez-en quelques autres espèces dans l'ouvrage de M. Risso. (Ainsi que l'article Cymothoadés de Leach, dans le 12^e volume du Dict. des Sciences naturelles; les planches de Crustacés par M. Savigny, dans le grand ouvrage sur l'Égypte, etc.)

[Nous croyons devoir distinguer des divers genres déjà établis dans la tribu des Sphéromiens un petit crustacé appartenant à la collection du Musée britannique où il a été étiqueté par M. Leach *Næsea depressa*.. En effet cet Isopode, tout en ayant la forme générale des Nesées, en diffère, ainsi que de tous les autres Sphéromiens, par la conformation des pattes des deux premières paires qui sont terminées par une main subchéliforme, tandis que les pattes suivantes sont, comme d'ordinaire, simplement ambulatoires. Nous proposerons de désigner cette nouvelle division générique sous le nom de NÆSIDIE. *Næsidia*.

Le genre PTRELAS de M. Guérin se rapproche de la division précédente et du genre Æga de Leach. Voici les caractères qui y sont assignés. Yeux très visibles; composés d'un grand nombre de facettes; antennes supérieures plus courtes que les inférieures, insérées sur le bord antérieur de la tête, ayant leurs deux premiers articles grands, aplatis et larges et le filet terminal inséré en arrière du deuxième article, composé de plusieurs petites articulations; antennes inférieures deux fois plus longues que les supérieures, insérées au dessous d'elles et ayant leurs trois premiers articles courts, transversaux, les deux suivans grands, aplatis et larges, et le filet termina^l com-

Ainsi que nous l'avons déjà dit, p. ces Leopodes diffèrent beaucoup entre eux par leur structure et par leurs mœurs, et nous paraissent devoir être divisés en deux familles naturelles.

ASELLES. (Aselles.)

Quatre antennes apparentes, sétacées, inégales, plurarticulées : deux supérieures plus courtes, quadriarticulées ; deux inférieures beaucoup plus longues, à cinq articles. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux sessiles, simples.

Corps oblong, déprimé ; à tête distincte ; à segments crustacés, transverses. Queue d'un seul segment, ayant deux appendices au bout. Quatorze pattes.

Antennæ quatuor, conspicuæ, setacæ, inæquales, plurarticulatæ : duabus superis quadriarticulatis brevioribus ; duabus inferis multò longioribus quinque articulatis. Maxillæ pluribus paribus. Oculi duo sessiles, simplices.

Corpus oblongum, depressum ; capite distincto ; segmentis crustaceis transversis. Cauda segmento unico ; appendicibus duabus ad apicem. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Aselles* sont des crustacés aquatiques que Linné confondait avec les Cloportes, que Geoffroy a le premier distingués, et qui diffèrent principalement des quatre genres qui précèdent, parce que leurs quatre antennes sont apparentes. Elles n'ont point de nageoires sur les côtés de la queue, mais le dessous offre deux grandes écailles qui recouvrent les branchies, et au bout, il y a deux appendices quelquefois fourchus ou qui portent deux styles. Leurs pattes sont terminées par un crochet. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans une poche membraneuse qui occupe une grande partie du dessous de leur corps. (1)

(1) On doit d'intéressantes observations sur le développement des jeunes, à M. Rathke. (Voy. *Abhandlungen zur Bildungs und*

Ces crustacés se nourrissent d'animalcules qu'ils cherchent à saisir. Une espèce commune vit dans les eaux douces, mais il paraît qu'il en existe dans la mer, qui offrent des particularités dont on pourrait se servir pour les distinguer si cela devenait utile. Voyez les genres *Janira* et *Jæra* de M. LEACH. (1)

Le genre *Gæra* de Leach se reconnaît à l'existence de deux tubercules à la place des stylets terminaux de l'abdomen et à quelques autres particularités de structure; on n'en connaît aussi qu'une seule espèce; le *Jæra albigens* (Leach. Edinb. Encyclop. sup. t. 7. p. 434; Desmarest. op. cit. p. 316; Latreille. Règne anim. t. 4. p. 141. E.

ESPÈCE.

1. Aselle ordinaire. *Asellus vulgaris*.

Aselle d'eau douce. Geoff. 2. p. 672. pl. 22. f. 2.

Asellus vulgaris. Latr. Gen. 1. p. 63.

* Equis. Règne anim. t. 4. p. 140.

Oniscus aquaticus. Lin.

Squilla asellus. Degeer. Ina. 7. p. 496. pl. 81. f. 1.

Asellus aquaticus. Fab. Supp. p. 803.

* *Asellus vulgaris*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 315. pl. 69. fig. 1 et 2.

* *Oniscus aquaticus*. Rathke Abhand. 1. 2. pl. 1. et Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2. pl. 11. C.

Habite en Europe, dans les eaux douces, les mares, etc.

Entwickelungs, etc. t. 1. p. 3; et *Annales des Sciences naturelles*, 2. série, t. 2, p. 139).

(1) Les *JANIRAS* de Leach ou *ONISCORUS* de Latreille diffèrent des *Aselles* par le rapprochement de leurs yeux, leurs antennes supérieures plus courtes que le pédoncule des antennes externes et par les crochets bifides de leurs tarses; la seule espèce connue est le *Janira maculosa*. (Leach. Edinb. Encyclop. Suppl. t. 7. p. 434; et Trans. Soc. Linn. t. 22, p. 373; — Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 315. — *Oniscus maculosa*, Latreille. Règne anim. t. 4. p. 141.)

IDOTÉE. (*Idotea*.)

Quatre antennes apparentes, inégales : les deux externes beaucoup plus grandes, pluriarticulées. Deux yeux sessiles.

Corps oblong et allongé ; à segmens crustacés transverses ; à tête distincte. Queue à deux ou trois segmens, nue, n'ayant aucun appendice au bout. Quatorze pattes.

Antennæ quatuor, conspicuæ, inæquales : duabus externis multò majoribus, pluriarticulatis. Oculi duo sessiles.

Corpus oblongum vel elongatum ; segmentis crustaceis transversis ; capite distincto. Cauda nuda ; segmentis duobus vel tribus ; apice appendicibus nullis. Pedes quatuordecim.

OBSERVATIONS. — Les *Idotées* sont des crustacés marins dont la queue n'a point de nageoires latérales, ni d'appendices au bout. Par ce dernier caractère, elles diffèrent des *Aselles*. Elles ne se mettent point en boule comme les sphéromes qui d'ailleurs ont à la queue des nageoires latérales.

Sous la queue des *Idotées*, deux grandes écailles allongées, étroites et parallèles, en recouvrent d'autres ainsi que les branchies.

Ces crustacés se nourrissent de petits animaux marins ; on soupçonne qu'ils sucent aussi des poissons.

ESPÈCES.**1. Idotée entomon. *Idotea entomon*.**

I. ovata ; segmentis ad latera prominulis ; caudâ elongatâ conicâ.

Oniscus entomon. Lin. Pallas spicil. zool. fasc. 9. p. 64. tab. 5. f. 1-6.

Cymothoa entomon. Fab. S. 2. p. 505.

* *Squilla entomon*. Degeer. Mém. t. 7. pl. 32. fig. 1 et 2.

Idotea entomon. Lat. Gen. 1. p. 64.

Ejusd. Hist. nat. vol. 6. p. 361. pl. 58 f. 2. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 289.

* Eichwald Per Ingriam marisque Baltici provincias, obs. pl. 5. fig. 1.
Habite l'Océan d'Europe.

2. Idotée tridentée. *Idotea tridentata*.

I. linearis; caudá apice tridentatá; antennis externis corporis longitudine

Idotea tridentata. Latr. Gen. 1. p. 64.

Oniscus tridens. Scop. entom. carn. n° 1141.

Cloporte tridenté. Oliv. encycl. 6. p. 26.

Habite l'Océan d'Europe.

3. Idotée marine. *Idotea marina*.

I. sublinearis, semicylindrica; caudá obtuso-acutá, sub-emarginatá.

Oniscus balthicus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 66. tab. 4. f. 6.

Idotea marina. Fab. Suppl. p. 308.

Habite la mer Baltique.

4. Idotée étique. *Idotea hectica*.

I. linearis-depressa; antennis externis corporis sublongitudine.

Oniscus hecticus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 61. tab. 4. f. 10.

Aselle étique. Oliv. Encycl. vol. 4. n° 13.

Habite l'Océan Atlantique. * Cette espèce entre dans la division des sténosomes de M. Leach. (1)

5. Idotée ungulée. *Idotea unguolata*.

I. sublinearis; caudá oblongá, apice truncato-bidentatá; antennis externis corpore brevioribus.

Oniscus unguolatus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 62. tab. 4. f. 11.

* *Oniscus linearis*. Pennant. Brit. zool. t. 4. pl. 18. fig. 2.

An *idotea linearis*? Fab. Suppl. p. 304.

* *Stenosoma lineare*. Leach. Trans. Linn. Soc. t. 11: p. 366.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 290. pl. 46. fig. 12.

Habite la mer de l'Inde. •

Etc. Voyez les idotées de M. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 134.

Voyez aussi les Sténosomes de M. Leach.

[Le genre **LEPTOSOME** (*Leptosoma*) de M. Risso ne diffère guère des Idotées que par la soudure complète de

(1) Le genre **STENOSOME** de M. Leach ne diffère guère des Idotées proprement dites que par la longueur des antennes qui dépassent la moitié de celle du corps. E.

les hanches sans dilatation notable en dessous, mais leurs pattes sont toutes d'égale longueur et les appendices postérieurs de l'abdomen terminés par deux lames allongées, pointues et très inégales, dépassent de beaucoup le dernier segment abdominal qui est à-peu-près quadrilatère.

Anilocra capensis. Leach. loc. cit. ; Desmarest. op. cit. p. 306. pl. 48. fig. 1.

Anilocra mediterranea. Leach. loc. cit. ; Desmarest. loc. cit.

Edwards. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 3. pl. 14. fig. 6-8.

Anilocra Cuvieri. Leach. loc. cit. Desm. loc. cit. ; *Cymothos*.... Savigny. Egypte Crust. pl. 11. fig. 10.

Les CANOLIBES de M. Leach ne diffèrent guère des 'Anilocres que par la conformation des appendices postérieurs de l'abdomen dont les deux lames sont ovalaires et à-peu-près de même longueur, caractère qui est de très peu d'importance et qui ne nous paraît pas suffisant pour motiver une distinction générique.

Canolira Rissoniana. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 350 ; Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 305

Les ÆGA, les CONILÈRES et les ROCINÈLES du même auteur ont les ongles des pattes des 2^e, 3^e et 4^e paires très courbés, mais ceux des pattes suivantes à peine arqués et leur tête n'est pas saillante au-dessus de la base des antennes. Les Æga se distinguent par la forme élargie et comprimée des deux premiers articles des antennes supérieures (Exemple. *Æga emarginata* Leach, op. cit. p. 349; Desmarest. op. cit. p. 305, pl. 47 fig. 4 et 5). Les Rocinèles du même auteur ont au contraire ces deux articles très grands et convergens antérieurement (Esp. *Rocinella danmoniensis*, Leach. loc. cit. — Desm. op. cit. p. 304). Enfin les Conilères ressemblent aux précédens par leurs antennes, mais ont les yeux petits, écartés et nullement proéminens (Esp. *conilera Montagui*. Leach. op. cit. p. 348 ; Desmarest. op. cit. p. 304.)

Le genre **NÉLOCIRE** (*Nelocira*) de Leach, s'éloigne davantage des *Cymothoa* et se rapproche un peu des *Sphéromeïdes* ; ici, les ongles de tous les pieds sont faibles ou médiocres et peu arqués, les pattes sont grêles, plus ou moins épineuses ou ciliées et ambulateires plutôt qu'ancreuses ; les antennes inférieures sont assez longues, les yeux granulés et l'abdomen composé de cinq segmens distincts et les lamelles terminales des appendices postérieurs élargis et à-peu-près de même grandeur.

Nelocira Swainsoni. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 347; Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 302. pl. 48. fig. 2.

Les **EURYDICES** du même auteur ne diffèrent des précédens que par les yeux qui sont lisses au lieu d'être granulés.

Eurydice pulchra. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 347, et Trans. Linn. Soc. t. xi. p. 370; Desm. op. cit. p. 302.

Enfin, les **CIROLANES** ressemblent aux *Nélocires* par tous les caractères énumérés ci-dessus, si ce n'est par le nombre des segmens abdominaux qui est de six.

Cirolana Cranchii. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 347; Desmarest. op. cit. p. 303.

† Genre **SÉROLE**. *Serolis*.

Les **Séroles** sont des *Cymothoïdes* très remarquables par l'élargissement de leur corps et la position de leurs yeux qui occupent la face supérieure de la tête et sont placés à distance à-peu-près égale de la ligne médiane du front et du bord latéral de la tête; disposition qui rappelle ce qui se voit chez les *Trilobites*. Les antennes s'insèrent au bord antérieur du front, près de la ligne médiane; celle de la première paire sont médianes, mais les secondes sont très grandes; les pattes de la première paire sont terminées par une petite main subchéliforme et les suivantes sont ambulateires et terminées par un ongle à-peu-près droit

et non préhensile. Les trois premiers segmens de l'abdomen sont très petits et refoulés au fond de l'échancrure profonde formée par le bord postérieur du dernier segment thoracique, enfin le dernier segment abdominal est grand et porte deux appendices terminés par des lames très petites.

Cymothoa paradoxa. Fabricius. Supplem. Ent. syst. p. 304. *Squilla Fabricii*. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 340; — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 293; — Buckland. Geology and mineralogy. pl. 45. fig. 6-8. E.

BOPYRE. (Bopyrus.)

Point d'antennes. Point d'yeux distincts. Bouche comme bilabiée, située sous le bord du segment antérieur; à suçoir qui paraît sortir entre les lèvres.

Corps ovale, rétréci postérieurement, aplati, presque membraneux, à queue petite et très courte. Sept pattes fausses, très petites, contournées, inarticulées de chaque côté, insérées sous les bords latéraux du corps.

Antennæ nullæ. Oculi nulli distincti. Os subbilabiatum, sub margine segmenti antici dispositum; haustello intrà labia emergente.

Corpus ovalium, posticè attenuatum, planum, submembranaceum; caudâ parvâ, brevissimâ. Pedes spurii, minimi, contorti, inarticulati, utrinque septem, infrà marginem corporis inserti.

OBSERVATIONS.—J'avais placé le *Bopyre* parmi les Epizoaires, et depuis j'ai déferé au sentiment de Latreille qui le regarde comme un crustacé. Malgré le misérable état où le réduit l'imperfection de ses parties, ce savant lui trouve de l'analogie avec les *Cymothoas*.

Le *Bopyre* est un petit animal fort plat, presque membraneux, et qui vit en parasite sur les Alphées, les Palémons, en s'intro-

duisant sous l'écaille de leur corselet, et les suçant. Sa forme est celle d'une petite Sole. Il n'a qu'environ quatre lignes et demie de longueur. Il a de petites lames membraneuses au-dessus des pattes, et deux rangées de petites écailles sous la queue.

[Les Bopyres et les Iones doivent prendre place dans la famille des Cymothoadiens, mais y forment une petite tribu particulière caractérisée par la petitesse du dernier segment de l'abdomen, l'absence d'appendices articulés de chaque côté de cet anneau, la brièveté des pattes et leur structure subchéliforme. Ces crustacés vivent tous en parasites sur d'autres animaux de la même espèce, et sont remarquables par la grande différence qui existe entre les mâles et les femelles ; ces derniers ont le corps ovalaire, et en apparence déformé, tandis que les mâles, beaucoup plus petits que les femelles, sont grêles, ressemblent assez à des Idotéides.

Les Bopyres mâles aussi bien que les femelles paraissent manquer d'antennes, mais on leur voit deux petits yeux situés sur la face supérieure de la tête ; leur corps est ovalaire, allongé et parfaitement symétrique ; le thorax se compose de sept segments à-peu-près égaux entre eux, et cachant complètement les pattes ; enfin l'abdomen porte en dessous des appendices lamelleux qui sont également cachés sous sa face inférieure. La femelle est contournée de côté, et les anneaux thoraciques inégaux et beaucoup plus larges que la tête ou l'abdomen ; à la surface inférieure du thorax, on voit les pattes qui sont d'une brièveté extrêmes, contournées et ancreuses, et qui, pour la plupart, donnent naissance, par leur base, à de grandes lames membraneuses, lesquelles se reploient en dedans et en arrière, de manière à constituer une poche servant à loger les œufs ; sous l'abdomen on trouve 5 paires de lamelles blanches et molles ; enfin, la bouche est recouverte par deux pattes-mâchoires operculiformes, disposées comme des volets.

E.

ESPECES.

1. Bopyre des chevrettes. *Bopyrus squillarum*.

B. pallidè lutescens ; caudà subacutà.

Bopyrus squillarum. Latr. Gen. 1. p. 67. et Hist. nat., etc., 7. p. 50. pl. 59. fig. 2-4.

Monoculus crangorum. Fab. Syst. Suppl. p. 306.

* *Bopyrus squillarum*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 385.
pl. 49. fig. 8-13.

Habite sous l'écaille du Palémon squille.

2. Bopyre des palémons. *Bopyrus palemonis*.

B. luteo-virescens, *varius*; *caudá rotundatá*.

Bopyrus palemonis. Risso. Hist. nat. des crust. p. 148.

* Desmarest. op. cit. p. 326.

Habite la Méditerranée, sous l'écaille thoracique des Palémons.

LES IONELLES.

Deux ou quatre antennes. Deux yeux sessiles. Dix ou quatorze pattes. Les branchies à nu sous la queue, et en forme de tiges plus ou moins divisées.

Les *Ionelles* constituent une petite famille nouvellement établie par M. Latreille sous le nom de *phytibranches*. Elle est fort remarquable par le caractère des branchies qui sont à nu sous la queue; et c'est principalement par ce caractère que ces crustacés isopodes se distinguent des Asellides. Il est très curieux de voir que, dans ces crustacés, les branchies commencent par être situées sous la queue de l'animal, qu'ensuite elles se trouvent transportées sous la partie antérieure de l'abdomen, adhérant à certaines pattes, ou toujours sous l'abdomen, variant dans leur situation, selon les familles, et qu'elles finissent dans les décapodes, par être cachées sous les bords latéraux de l'écaille du corselet, ayant de l'adhérence avec la base extérieure des pieds-mâchoires.

Toutes les *Ionelles* sont aquatiques et marines; certaines d'entre elles ont toutes leurs pattes natatoires; d'autres n'ont pour la natation que leurs pattes postérieures. Ces animaux, probablement nombreux, sont encore peu connus.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle et ne nous semble pas devoir être adoptée. E.]

TYPHIS. (Typhis.)

Deux antennes très petites. Deux yeux petits, sessiles.

Corps oblong, convexe, courbé, divisé en segmens transverses, et muni de chaque côté, de deux lames mobiles, oblongues, pointues au sommet. De petites écailles à l'extrémité de la queue. Dix pattes, dont les quatre antérieures sont didactyles.

Antennæ duæ minimæ. Oculi duo, parvi, sessiles.

Corpus oblongum, convexum, incurvum, segmentis transversis divisum; utroque latere laminis duabus mobilibus oblongis apice acuminatis instructum. Squamæ parvæ ad apicem caudæ. Pedes decem : quatuor anticis didactylis.

OBSERVATIONS. — Les *Typhis* sont de petits crustacés marins, assez singuliers par leurs caractères, et par leurs habitudes de se courber en bas, et même de se contracter presque en boule, en inclinant leur tête, courbant leur queue sous leur corps, et cachant toutes leurs parties inférieures, à l'aide de leur quatre lames foliacées qui se ferment comme des valves. Ils se tiennent ordinairement sur des fonds sablonneux, et viennent de temps en temps nager à la surface de l'eau pour saisir de petites Équorées dont ils font leur nourriture.

[Les *Typhis* appartiennent à l'ordre des Amphipodes, et à la famille des Hypéridiens. Ils ont quatre antennes; celles de la première paire sont grosses, coudées et courtes, celles de la seconde paire très longues, grêles, cylindriques et reployées trois fois sur elles-mêmes, de manière à se cacher sous les côtés de la tête. La bouche est conformée comme chez les Hypérines, les Phronimes, etc. Les pattes des quatre premières paires sont grêles et cylindriques; celles des deux premières paires sont courtes, appliquées contre la bouche et terminées par une petite main plus ou moins complètement didactyle, tandis que celles de la troisième et de la quatrième paires sont assez longues et monodactyles; les pattes de la cinquième et de la sixième paires ont une conformation tout-à-fait anormale;

c'est leur article basilaire qui constitue les valves lamelleuses qu'on voit de chaque côté, et qui recouvrent tout le dessous du corps, comme les battans d'une porte; les articles suivans de ces pattes sont grêles et cylindriques; enfin, les pattes de la septième paire sont très petites, et réduites presque entièrement à une lame cornée cachée sous les précédentes. Les appendices vésiculaires fixées sous le thorax, en dedans de la base des pattes, et servant à la respiration, sont au nombre de six paires, comme chez la plupart des Amphipodes. Enfin, l'abdomen se compose de sept segmens, dont les trois premiers sont très grands, et portent chacun une paire de fausses pattes natatoires, ciliées, et dont les quatre derniers forment avec les appendices lamelleux des trois dernières paires, une sorte de nageoire caudale. (Voy. l'article *Typhis* du Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. 16, p. 449.)

E.

ESPÈCE.

1. *Typhis ovoïde. Typhi ovoid es.*

Risso. Hist. nat. des crust. p. 122. pl. 2. fig. 9.

* Ajoutez :

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 282. pl. 46. fig. 5 (d'après Risso).

* Latreille. Encyclop. Ins. pl. 33. fig. 36 (d'après Risso); Règne anim. t. 4. p. 124, etc.

* Le *typhis ferus*. Edw. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. p. pl. 11. fig. 8.

* Le *typhis repax*. Epw. loc. cit.

ANCKÉE. (Anceus.)

Quatre antennes sétacées. Deux yeux sessiles, composés. Deux cornes avancées, arquées en faux, pointues, mandibuliformes, sur le front des mâles.

Corps oblong, déprimé. Queue à plusieurs segmens transverses, terminée par des lames natatoires. Cinq paires de pattes monodactyles.

Antennæ quatuor, setaceæ. Oculi duo, sessiles, compo-

siti. Frons masculorum cornubus duobus porrectis falcatis, acutis, mandibuliformibus instructa.

Corpus oblongum, depressum. Cauda segmentis pluribus transversis divisa, lamellis natatoriis terminata. Pedes decem, omnes monodactyli.

OBSERVATIONS.—Le genre *Ancée*, établi par M. Risso, et rapporté par Latreille à la division des Crustacés isopodes, qui ont des branchies à nu sous la queue, est remarquable par les deux grandes saillies en forme de mandibules avancées que les mâles ont au-devant de la tête. Aucune de leurs pattes n'est terminée en pincés. Ces crustacés sont marins, vivent entre les plantes marines ou se cachent dans les interstices des coraux, des madrepores.

[Les Ancées nous paraissent devoir constituer une tribu particulière dans la famille des Cymothoïdiens; leur bouche est recouverte d'une paire de pattes-mâchoires operculiformes; et au-dessous de leur abdomen se trouvent des fausses pattes branchiales.

E.

ESPÈCES.

1. Ancée forficulaire. *Anceus forficularius*.

A. pedum paribus tribus anticis antrorsum versis; caudâ laminis tribus terminatâ.

Anceus forficularius. Risso: Hist. nat. des crust. p. 52. pl. 2. fig. 10.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 283. pl. 46. fig. 7.

Habite la Méditerranée, entre les coraux.

2. Ancée maxillaire. *Anceus maxillaris*.

A. pedibus æqualiter patentibus, monodactylis; caudâ subciliatâ, apice laminis destitutâ.

Cancer maxillaris. Montag. trans. soc. Linn. 7. p. 65. t. 6. f. 2.

* Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 285. pl. 46. fig. 6. (et non 7, comme l'indique la légende.)

* Latreille. Encyclop. Insect. pl. 336. fig. 25.

Habite l'Océan britannique.

(* Cette espèce nous paraît avoir été mal caractérisée; car elle ne nous paraît pas différer d'un Ancée que nous avons trouvé sur les côtes de la Manche, et qui a l'abdomen terminé par une nageoire composée de cinq lames comme celle des Macroures.)

PRANIZIE. (Praniza.)

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles.

Corps allongé, divisé en trois segmens, dont les deux premiers fort étroits, et le troisième très grand. Dix pattes : les quatre antérieures attachées aux deux premiers segmens ; les six autres au segment postérieur. Des appendices en feuillets à la queue.

Antennæ quatuor, inæquales. Oculi duo, sessiles.

Corpus elongatum, segmentis tribus divisum : duobus primis per angustis ; tertio posteriore maximo. Pedes decem : antiqui quatuor segmentis angustis affixi : alii sex segmento posteriore. Appendices foliaceæ ad caudam.

OBSERVATIONS. — Les *Pranizes*, établies comme genre par M. *Leach*, sont remarquables par la grandeur du troisième segment de leur corps. Elles n'ont que dix pattes, dont aucune n'est terminée en pince. Leur queue est divisée en cinq ou six segmens, dont le dernier est garni latéralement d'écailles nataires.

[Les *Pranizes* nous paraissent devoir prendre place dans la famille des Isopodiens, et y constituer une tribu particulière facile à distinguer par le nombre des anneaux du thorax réduit à cinq seulement ; les segmens que portent les deux premières paires de pattes sont confondus avec la tête et ces deux paires d'appendices, quoique conformés à-peu-près de même que les pattes des cinq paires suivantes, sont extrêmement petits et appliqués contre la bouche. Chez les mâles, les cinq anneaux du thorax sont bien distincts ; et c'est chez la femelle seulement que les trois derniers paraissent réunis en une masse ovoïde. E.

ESPÈCE.1. *Pranize bleuâtre. Praniza coerulata.*

* *Oniscus marinus*. Slabber. Physicalische belustigungen. p. 37. pl. 9. fig. 1 et 2.

Oniscus coerulatus. Montagu. Trans. soc. Lin. vol. XI. p. 15. t. 4. fig. 2.

- * *Praniza caerulea*. Leach. Trans. Linn. soc. t. 11. pl. 4. fig. 2.
 - * Latreille. Encyclop. pl. 336. fig. 28 (d'après Montagu) et pl. 329. fig. 24 et 25. (d'après Slabber); Règne anim. t. 4. p. 125.; etc.
 - * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 284. pl. 46 fig. 8. (d'après Montagu).
 - * Westwood. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 27. p. 326. pl. 6. fig. 3.
 - * Ajoutez :
 - * *Praniza maculata*. Westwood. Ann. des Sc. nat. t. 27. p. 326. pl. 6. fig. 4-25.
 - * *Praniza Montagui*. Ejusd. loc. cit.
 - * *Praniza Bramhialis*. Otto Nova acta Acad. nat. curios. Bonae. t. 16.
 - * *Praniza fusca*. Johnston. Magazine of nat. Hist. vol. 5. p. 520. fig.; Westwood. loc. cit. p. 330. pl. 6. fig. 26.
- Habite l'Océan Européen.

APSEUDE (Apséudes.)

Quatre antennes : les deux externes plus longues , sétacées , multiarticulées. Deux yeux sessiles.

Corps allongé , terminé postérieurement par deux soies. Quatorze pattes : les deux antérieures chélifères ; les deux ou quatre dernières natatoires.

Antennæ quatuor : duobus externis longioribus, setaceis, multiarticulatis. Oculi duo sessiles.

Corpus elongatum, posticè setis duabus terminatum. Pedes quatuordecim : duobus anticis chelifervis ; duobus aut quatuor ultimis natatoriis.

OBSERVATIONS.— Le genre des *Apséudes*, établi par M. LEACH, comprend des crustacés isopodes qui sont nageurs et ambulateurs, puisqu'ils ont des pattes à crochets et d'autres qui sont natatoires. Les deux pattes antérieures sont terminées en pince ; et la queue est munie de deux longues soies. Ces crustacés vivent entre les plantes marines.

[Les Apséudes, à en juger par la figure que Montagu en a

TOME V.

publiée, et par les descriptions que MM. Leach, Damparest et Latreille en ont données, seraient des crustacés tout-à-fait anomaux, et ne pourraient, à raison de la structure singulière de leur abdomen, prendre place dans aucune des familles naturelles dont se compose la grande division des Edriophthalmes. Aussi, ont-ils jusqu'ici beaucoup embarrassé les classificateurs; mais ces prétendues anomalies n'existent réellement pas; en effet, l'examen de l'individu même qui a servi aux observations de Montagu et de Leach, et qui, étiqueté de la main de ce dernier, est conservé dans le Musée Britannique, nous a fait voir que l'Apseude taupe a tous les caractères généraux de nos genres *Rhoe* et *Tanaïs*, et qu'il doit former avec ces crustacés une petite tribu particulière dans la famille des Idotéides. Chez tous, la forme générale du corps est à-peu-près la même que chez les Idotées et l'abdomen se compose de cinq à sept segmens dont la conformation ne présente rien de particulier, seulement les appendices abdominaux au lieu d'être lamelleux et de servir d'opercules pour les fausses pattes branchiales, sont styliformes et constituent une espèce de queue à l'extrémité postérieure du corps. Un autre caractère qui leur est commun, et qui les distingue des autres Isopodes en même temps, qu'il les rapproche des Amphipodes, c'est que leurs pattes antérieures se terminent par une main à pince didactyle parfaitement bien conformée.

Les Apseudes ont les antennes internes moins longues que le pédoncules des antennes externes dont le premier article est très grand; les pattes de la seconde paire grandes, aplaties et terminées par un article large, obtus et spinifère; l'abdomen composé de cinq anneaux très courts, et d'un dernier segment aussi grand que tous les autres réunis; enfin, les appendices de la dernière paire simples et terminés chacun par une longue soie.

E.

ESPÈCES.

1. Apseude taupe. *Apseudes talpa*.

A. antennis articulo ultimo plumosis; pedibus secundi paris apice dilatatis, compressis; dentatis.

Cancer gammarus talpa. Montag. Trans. soc. Linn. vol. 9. p. 98. tab. 4. fig. 6.

Apseudes. Latr.

* *Apseudes talpa*. Leach. Trans. of the Linn. soc. t. 11. p. 372; etc.

* Latreille. Encyclop. méthod. pl. 336. fig. 26; Règne anim. t. 4. p. 174, etc.

* *Eupheus talpa*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 285. pl. 46. fig. 9.

Habite l'Océan européen.

* Toutes les figures citées ci-dessus sont des copies de celles de Montagu, et sont tout-à-fait inexactes en ce qui concerne l'abdomen.

2. Apseude ligioïde. *Apsyde, ligioides*.

A. antennis inferioribus brevissimis; setis caudæ nudis.

Eupheus ligioides. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 124. tab. 3. fig. 7.

* Desm. op. cit. p. 285.

Habite la Méditerranée, entre des fucus. La deuxième paire de pattes n'est point dilatée à son extrémité.

* A en juger par la figure donnée par M. Risso, ce petit crustacé n'aurait en tout que cinq paires de pattes : ce qui n'est pas probable. Il nous paraît devoir se rapporter à notre genre Tanaïs.

Le genre *RHOE* ne diffère guère des *Apseudes* que par la conformation des antennes; celles de la première paire sont très grandes et terminées par deux filets multiarticulés, tandis que celles de la seconde paire sont grêles et de longueur médiocre; les pattes de la seconde paire sont grandes et dilatées comme dans le genre précédent; enfin les appendices terminaux de l'abdomen sont bifides.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre à laquelle nous avons donné le nom de

Rhoea Latreilli. Edw. Ann. des Sc. nat. t. 13. p. 288 pl. 13 A. fig. 1-8.

Le genre *TANAIS*. Edw. diffère des deux précédens par la conformation des pieds de la seconde paire qui sont grêles et cylindriques comme les suivans; par la petitesse des antennes et par quelques autres caractères. E.

Tanais costæ. Edw. Précis d'Entomol. pl. 29. fig. 1.

Tanais Dulongii. Edm. Ms. — *Gammarus Dulongii.* Audouin. Explication des planches de M. Savigny; Egypte. Crust. pl. 11. fig. 1.

Gammarus heteroclitus. Viviani Phosphorentia maris. p. 9. pl. 2. fig. 11 et 12.

IONE. (Ione.)

Antennes courtes, subulées. Corps ovoïde, plus large et obtus antérieurement, entièrement formé d'un grand corselet. Queue courte, à quatre segmens transverses, terminée par deux languettes spatulées. Quatorze pattes sans ongles, en languettes spatulées, natatoires, diminuant insensiblement de longueur postérieurement.

Antennæ breves, subulatæ. Corpus obovatum, anticè latius et obtusum, thorace maximo penitùs compositum. Cauda brevis, segmentis quatuor transversim divisa, appendicibus binis lingulato-spatulatis terminata. Pedes quatuordecim, natatorii, lingulato-spatulati, posticè sensim breviores; unguiculis nullis.

OBSERVATIONS. — L'*Ione* forme un genre remarquable, dont les caractères sont assez bien tranchés. C'est un crustacé nageur, d'une forme assez particulière, son corps, comme sans anneaux, paraissant n'offrir qu'un grand corselet. La figure qui le représente ne montre que deux antennes; apparemment parce que les deux antérieures sont fort courtes. Sous la queue de cet animal, des branchies à nu, pédiculées, et rameuses ou dendroïdes, sont bien apparentes.

[Les Iones, très imparfaitement étudiées par Montagu, le seul auteur qui en ait parlé *de visu*, ont été encore plus mal caractérisés par les auteurs systématiques, qui ont jusqu'en ces derniers temps complètement négligé le mâle pour établir la définition du genre d'après la femelle seulement. Ces crustacés doivent comme nous l'avons déjà dit, prendre place à côté des Bopyres dans une division particulière de la famille des Cymothodiens

(voy. p.); mais ils diffèrent de ces parasites par l'existence de deux paires d'antennes, et par le grand développement des appendices des divers segmens abdominaux qui, chez le mâle, ont la forme de cylindres membraneux simples, et chez la femelle sont ramifiés et très touffus; les pattes sont aussi beaucoup plus longues que chez les Bopyres, et se terminent toutes par une main ovale armée d'une griffe mobile; enfin chez le mâle, le thorax est étroit, et les pattes simples; mais chez la femelle, le thorax est ovale, et les pattes portent chacune du côté interne de leur base, une grande lame ovale qui se dirige horizontalement en dedans, et concourt à la formation d'une poche incubatoire; il existe aussi à la base des pattes des deux ou trois premières paires un grand appendice vésiculaire analogue à celui qu'on voit chez les Amphipodes. E.

ESPÈCE.

Ione thoracique. *Iona thoracica*.

Oniscus thoracicus. Montag. Trans. soc. Linn. vol. 9. p. 103. tab. 3. fig. 3.

Ione. Latr. Cuv. Règne anim. 3. p. 54. (* et Encyclop. méthod. Ins. pl. 336. fig. 46.)

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 286. pl. 46. fig. 10.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 9. pl. 49. fig. 10 et 11.

(* Toutes les figures citées ci-dessus sont copiées d'après celles de Montagu, et sont très mauvaises.

Habite l'Océan Européen.

* Habite en parasite dans la cavité branchiale de la Callianasse souterraine.

LES CAPRELLINES.

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles, composés. Corps le plus souvent linéaire. Branchies dans des corps vésiculaires, situées sous la partie antérieure de l'abdomen, adhérentes à la base externe de certaines pattes ou occupant leur place.

Nos *Caprellines*, réduites, d'après les caractères ci-dessus, sont les *cystibranches* de Latreille, et constituent la dernière famille des Isopodes. Ce sont des crustacés marins, de petite taille, et en général d'une forme singulière. Leur corps est ordinairement linéaire, avec des pattes grêles et longues, au nombre de dix ou de quatorze. Ce qui les rend très remarquables, ce sont les corps vésiculaires, ovoïdes, et très mous, que l'on présume renfermer leurs branchies, et qui sont placés sur les second, troisième et quatrième segments, quelquefois seulement sur le second et le troisième, en adhérant aux pattes qui s'y trouvent.

Ces animaux se trouvent parmi les plantes marines, et certains d'entre eux sont parasites des baleines ou de quelques poissons.

[Cette division correspond à l'ordre des Læmipodes et se distingue facilement des autres Edriophthalmes par l'état rudimentaire de l'abdomen qui est réduit à un simple tubercule. Elle se subdivise en deux petites familles naturelles : les Caprelloldiens ou Læmipodes filiformes et les Cyamoldiens ou Læmipodes ovalaires. E.

LEPTOMERE. (Leptomera.)

Quatre antennes sétacées; les supérieures ou postérieures plus longues. Deux yeux sessiles.

Corps linéaire, à articles longitudinaux, le premier se confondant avec la tête. Queue très courte. Dix ou quatorze pattes disposées en série continue, et toutes onguiculées.

Antennæ quatuor, setacæ : duabus superioribus vel posterioribus longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus lineare; articulis longitudinalibus : primo a

capite non distincto. Cauda brevissima. Pedes decem aut quatuordecim in serie continuâ dispositi, omnes unguiculati.

OBSERVATIONS. — Sous cette dénomination générique, je réunis les Leptomères et les Protons de Latreille; ne connaissant pour Proton que le *Gammarus pedatus* de Muller que Latreille indique comme synonyme, et qui a évidemment quatorze pattes.

Nos *Leptomères* ne paraissent différer des Chevrolles que parce que la deuxième et la troisième paire de pattes n'avortent point. Au reste, ces crustacés sont encore très peu connus, et leurs espèces surtout attendent de nouvelles observations pour être convenablement déterminées.

ESPÈCES.

1. Leptomère rouge. *Leptomera rubra*.

L. pedibus quatuordecim setaceis : secundi paris tibiis clavatis.

Squilla ventricosa. Mull. zool. dan. p. 20. tab. 56. fig. 1-3. fem.

Leptomera ex D. Latr.

Herbet. canc. t. 36. f. 11.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 276.

Habite l'Océan boréal, entre les fucus, les conferves.

2. Leptomère pédiaire. *Leptomera pedata*.

L. pedibus quatuordecim ; quatuor primis subchelatis ; ultimis quatuor aliis longioribus.

Gammarus pedatus. Mull. zool. dan. p. 33. tab. 101. f. 2. 21.

An proton ? Latr. Leach.

* *Proton pedatum*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 276. pl. 6. fig. 3.

Habite. . . . l'Océan boréal ?

CHEVROLLE. (Caprella.)

Quatre antennes : les deux supérieures plus longues ; leur dernière pièce composée de très petits articles nombreux. Deux yeux sessiles, composés.

Corps allongé, linéaire ou filiforme, divisé en articles

inégaux. Queue très courte. Dix pattes onguiculées ; à paires disposées en une série interrompue.

Antennæ quatuor : superioribus duabus longioribus : ultimo articulo aliis minimis numerosisque composito. Oculi duo sessiles, compositi.

Corpus elongatum, lineare, subfiliforme, articulis inæqualibus divisum. Cauda brevissima. Pedes decem unguiculati : paribus serie interruptâ dispositis.

OBSERVATIONS. — Le genre *Chevrolle*, maintenant réduit, se rapproche beaucoup des *Leptomères*, et semble annoncer le voisinage des *Crevettes*, etc. Ces crustacés isopodes sont singuliers et remarquables par leur corps grêle, presque filiforme, à segmens inégaux, plutôt longitudinaux que transverses, et à paires de pattes inégalement disposées, formant une série interrompue. Le second et le troisième anneaux du corps n'ont que de fausses pattes : mais ils soutiennent quatre appendices sub-ovales, susceptibles de gonflement, qui contiennent probablement les organes de la respiration. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans un sac attaché sous le troisième anneau du corps.

Les *Chevrolles* se tiennent parmi les plantes marines, marchent à la manière des chenilles arpentuses, se redressent en faisant vibrer leurs antennes, et nagent en courbant en bas les extrémités de leur corps.

ESPÈCES.

1. Chevrolle scolopendroïde. *Caprella scolopendroides*.

C. manibus secundi tertique paris didactylis ; uno maximo falcato altero minimo, subrecto.

Gammarus quadrilobatus. Mull. Zool. dan. t. 114. f. 1. 2. fem.

Bast. op. subs. 1. tab. 4. f. 2, 2. b. c.

Oniscus scolopendroides. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 15.

An cancer linearis ? Linn.

Squilla quadrilobata ? Mull. zool. dan. t. 56. f. 4. 5. 6. mas.

* *Caprella linearis*. Latr.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 278.

Habite l'Océan d'Europe boréal.

2. Chevrolle phasme. *Caprella phasma*.

C. pedibus secundi paris manu subdidactylæ; corporis segmentis primis dorso mucronatis.

Cancer phasma. Montag. trans. soc. Linn. 7. p. 66. t. 6. f. 3.

* *Caprella phasma*. Desmarest. op. cit.

Habite l'Océan d'Europe.

Etc. Voyez les *cancer atomus* et *filiformis* de Linné. Dans ce genre, les distinctions spécifiques laissent encore beaucoup à désirer.

* Ajoutez aussi quelques espèces décrites par Latreille (Nouv. Dict. d'Hist. nat.); par Leach et M. Desmarest (Voyez Consid. sur les Crust. p. 277); et par M. Templeton, Transactions of the Entomolog. Soc. of London. vol. p. 191. pl. 20. fig. 6. et pl. 21. fig. 7.,

CYAME. (Cyamus.)

Quatre antennes inégales : les deux supérieures plus longues, sétacées, de quatre articles. Un labre échancré; deux mandibules à sommet bifide; quatre mâchoires réunies en deux pièces transverses; une lèvre inférieure formée de deux palpes articulés, onguiculés, réunis par leur base.

Tête en cône obtus, petite, non distincte du premier segment. Corps ovale, déprimé, à six segmens transverses, celui de la tête excepté. Un tubercule à l'extrémité postérieure, formant une queue très courte. Deux yeux composés, sessiles, sur les bords latéraux et antérieurs de la tête; deux petits yeux lisses, sur son vertex. Huit pattes onguiculées et articulées. Deux paires de fausses pattes, sur les second et troisième segmens, auxquelles adhèrent des vésicules branchiales.

Antennæ quatuor, inæquales : duabus superioribus longioribus setaceis, quadriarticulatis. Labrum emarginatum. Mandibulæ duæ, apice bifidæ. Maxillæ quatuor, in duas partes aut laminas transversas connatæ. Labium è palpis duobus articulatis et unguiculatis basi connatis compositum.

Caput obtusè conicum, parvum, a segmento primo non distinctum. Oculi duo compositi, sessiles, ad latera antica capitis. Ocelli duo in vertice. Corpus ovatum, depressum, segmentis sex transversis divisum (segmento capitis excluso). Pedes octo articulati unguiculati : pedes spurii quatuor, in segmento secundo tertioque, quibus vesiculas branchiales adhærent. Cauda tuberculo minimo terminali.

Le *Cyame*, que Linné rangeait parmi les Cloportes, est effectivement un véritable crustacé ; mais, quoique parasite, il appartient à la famille des Caprellines (des Cystibranches de Latreille). Il a moins de rapports qu'on ne pense avec le Pycnogonon, qui est une arachnide, quoiqu'il en ait un peu l'aspect et presque les habitudes.

Des quatorze pattes du *Cyame*, les deux premières fort petites, ne servent point à la marche, et sont transformées en palpes qui, par l'union de leur base, forment une lèvre inférieure à la bouche. Les quatre fausses pattes sont mutiques, inarticulées et ont à leur base les vésicules respiratoires. Dans les femelles, quatre écailles arrondies, concaves, placées sous le deuxième et le troisième segmens, servent à renfermer les œufs.

On trouve les *Cyames* cramponnés en grand nombre sur le corps des baleines, ce qui les a fait nommer *poux de baleine* par le vulgaire.

ESPÈCE.

1. *Cyame* de la baleine. *Cyamus ceti*.

Oniscus ceti. Lin. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 14.

Mull. Zool. dan. tab. 119. f. 13-17.

Cyamus ceti. Latr. Gen. 1. p. 60.

Larunda ceti. Leach. Crust. annulos. pl. 21.

* *Panope ceti*. Leach. Edimb. Encyclop. t. 7. p. 364.

* *Cyame*. Savigny. Mém. sur les Anim. sans vertèb. 1. fasc. pl. 5. fig. 1.

* Treviranus. Verm. Schrif. (Anatom. und Physiol. inhalts. B. 2. h. 1.)

* *Cyamus ceti*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 280. pl. 46. fig. 4.

* Edwards. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 3. p. 328. pl. 14. fig. 13 et 14.

* *Cyamus ovalis*. Roussel de Vauzème. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2. p. 259. pl. 8. fig. 1-3.

Habite l'Océan de l'Europe, sur les baleines, etc.

Nota. Une autre espèce, très petite, des Indes orientales, et encore inédite, est connue de Latreille.

* Suivant M. Roussel de Vauzème, on aurait confondu sous le nom de *Cyamus ceti*, trois espèces de Cyames qui vivent toutes sur la baleine; mais ce naturaliste ne paraît pas avoir fait assez d'attention aux changemens de forme que l'âge amène chez ces animaux. (Voyez Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 2.)

Deuxième Section.

CRUSTACÉS AMPHIPODES.

Mandibules palpigères; deux ou quatre antennes; la tête distincte du tronc; les yeux sessiles, des branchies vésiculeuses, situées à la base intérieure des pattes, sauf celles de la paire antérieure.

Les *Amphipodes* sont les premiers crustacés dont les mandibules sont palpifères, celles des précédens en étant généralement dépourvues. Mais leurs yeux sont sessiles et immobiles, et leur tête est distincte du tronc. Leur troisième et dernière paire de mâchoires représente une lèvre inférieure, à l'aide de deux palpes ou deux petites pattes réunies à leur base. (1)

Le corps de ces animaux est plus membraneux que crustacé, oblong, le plus souvent arqué et comprimé

(1). Ce caractère se retrouve aussi chez plusieurs *Isopodes*.

sur les côtés. Il est divisé en sept anneaux portant chacun une paire de pattes dont les quatre premières sont ordinairement dirigées en avant. A la base intérieure de chaque patte, en commençant à la seconde paire, on aperçoit un corps ovale et vésiculeux qui paraît être une branchie. Postérieurement, le tronc se termine par une queue de six à sept articles, offrant en dessous cinq paires de filets divisés en deux branches articulées (1). Ces filets, très mobiles, sont regardés comme des pattes natatoires, et semblent néanmoins analogues aux pattes branchiales des Stomapodes.

Les antennes des *Amphipodes* sont quelquefois au nombre de deux, mais plus souvent il s'en trouve quatre. Leur bouche offre un labre; deux mandibules portant chacune un palpe filiforme; une languette, deux paires de mâchoires; et au-dessous deux pieds-mâchoires, formant une lèvre inférieure, avec deux palpes.

Les *Amphipodes* nagent et sautent avec agilité; c'est toujours sur le côté qu'ils se posent (2). Les uns habitent les eaux douces des ruisseaux et des fontaines, les autres vivent dans les eaux salées. Les femelles portent leurs œufs rassemblés sous leur poitrine, et recouverts par de petites écailles.

(1) Le nombre des fausses pattes abdominales est de six paires; celles des trois premières paires sont très mobiles et terminées par deux lames longues, étroites et ciliées sur les bords; les autres sont réunies en une espèce de queue, et constituent tantôt une nageoire terminale, tantôt un organe de saut; dans le premier cas, elles sont terminées par des lames ovalaires, dans le dernier, par des appendices styliformes. E.

(2) Cette remarque ne s'applique guère qu'aux genres dont notre auteur parle; plusieurs amphipodes qui ne lui étaient pas connus, n'ont pas le corps comprimé et nagent dans la position ordinaire. E.

DIVISION DES AMPHIPODES.

* Deux antennes.

Phronime.

** Quatre antennes.

(1) Les quatre antennes presque semblables pour la forme, les inférieures n'imitant pas des espèces de pattes.

(a) Antennes supérieures plus longues que les autres.

Crevette.

(b) Antennes supérieures plus courtes que les autres.

Talitre.

(2) Antennes inférieures subonguiculées au bout, et imitant des pattes.

Corophie.

[Les Amphipodes forment deux familles naturelles savoir :

1° Les CRÉVETTINIENS qui ont le corps grêle et allongé; la tête petite et les pattes-mâchoires recouvrant toute la bouche et formant une espèce de lèvre inférieure terminée par quatre grandes lames cornées et deux longues tiges palpiformes et qui ne sont point parasites.

Genres Crevette, Talitre, Corophie, etc.

2° Les HYPERINIENS qui sont plus ou moins parasites et ont en général le corps gros et bombé; la tête forte et les pattes-mâchoires très petites, recouvrant seulement la base des autres appendices buccaux, terminées par trois lames cornées et dépourvues de tiges palpiformes ou n'en présentent que des vestiges.

Genres Hypérée, Phronime, Tiphis (p. 285), etc. E.

PHRONIME. (Phronima.)

Deux antennes courtes, de trois articles. Deux yeux sessiles.

Tête grosse, sessile, ayant antérieurement une saillie conique en forme de bec, inclinée en bas. Corps mou, allongé; le tronc demi-cylindrique, divisé en six anneaux; la queue étroite, partagée en cinq segmens: le dernier terminé par quelques appendices styliformes. Dix pattes; la troisième paire fort longue, à mains didactyles (1).

Antennæ duæ breves, triarticulatæ. Oculi duo sessiles.

Caput magnum, sessile, anticè eminentiâ conicâ rostriformi subtùs inflexâ terminatum. Corpus molle, elongatum: trunco semi-cylindro, segmentis sex diviso; cauda angustata, segmentis quinis: ultimo appendicibus aliquot styliformibus instructo. Pedes decem: tertio pari longissimo, manibus didactylis.

OBSERVATIONS. — Les *Phronimes* dont le genre fut reconnu et déterminé par Latreille, semblent les Amphipodes les plus rapprochés des Chevrolles qui paraissent leur servir de transition. Ces singuliers crustacés ont l'habitude de s'emparer de certaines radiaires mollasses, telles que des Béroës ou certaines Médusaires, et de se faire un domicile de leur corps, avec lequel ils nagent. Ils viennent quelquefois à la surface de l'eau, et se nourrissent des animalcules qu'ils peuvent saisir.

[Ces crustacés éprouvent, par les progrès de l'âge, des changemens considérables dans la forme générale de leur corps, et surtout dans la conformation de leur tête et de leurs pattes (Voyez les Ann. des Sc. nat. 2^e série, t. 3). E.]

(1) C'est à tort qu'on a attribué aux *Phronimes* seulement six anneaux thoraciques, cinq anneaux abdominaux et cinq paires de pattes; ils ont sept paires de pattes insérées chacune à un anneau thoracique distinct, et ce sont les pattes de la cinquième paire qui sont terminées par une main didactyle; l'abdomen se compose de sept anneaux dont le cinquième et le sixième sont plus ou moins confondus en un seul tronçon, et dont le dernier est lamelleux. E.

ESPÈCES.

1. Phronime sédentaire. *Phronima sedentaria*.

Ph. corpore margaritaceo, cum punctis rubris. Ex D. Risso.

Phronima sedentaria. Latr. Gen. 1. p. 58. tab. 2. f. 2. 3. et Hist. nat. vol. 6. p. 289.

Cancer sedentarius. Forsk. Faun. arab. p. 95.

Herbst. cane. tab. 36. f. 8.

Risso. Hist. nat. des crust. p. 120.

* *Phronima sedentaria*. Desmarest. Consid. sur les crust. p. 257. pl. 45. fig. 1. (d'après le *P. custos* de Risso.)

* Griffith. Anim. Kingd, Crust. pl. 22. fig. 1.

* Edwards. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 20. p. 394. et 2. série: t. 3. p. 329. pl. 14. fig. 9 et 10.

Habite la Méditerranée.

2. Phronime sentinelle. *Phronima custos*.

Ph. corpore lineari albissimo.

Phronima custos. Risso. Hist. nat. des crust. p. 121. pl. 2. f. 3.

Habite la Méditerranée. Cette Phronime est-elle bien distincte de la précédente ?

* Le *Phronima atlantica* de M. Guérin (Mag. de Zoologie, cl. VII, pl. 18, fig. 1), diffère du Phronime sédentaire par la forme des pattes de la 5. paire, mais pourrait bien ne pas constituer une espèce distincte et en être seulement un jeune individu.

† Genre **HYPERIE**. *Hyperia*.

Le Genre **HYPERIE** de Latreille se compose de quelques Amphipodes parasites, à corps trapu et renflé et à grosse tête, qui ont quatre antennes courtes et styliformes insérées sur la face antérieure de la tête, sept anneaux thoraciques et sept paires de pattes toutes simples, non préhensiles et à-peu-près de même forme et de même grandeur; les trois premiers anneaux de l'abdomen très grands et portant chacun une paire de fausses pattes semblables à celles des Crevettes, et les quatre anneaux suivans sont

très petits et constituant une sorte de nageoire caudale, garnie latéralement de trois paires d'appendices grêles et allongés, terminés chacun par deux lamelles lancéolées d'une petitesse extrême.

ESPÈCES.

HYPERIE DE LATREILLE. *Hyperia Latreillii*.

Oniscus medusarum? Othon Fabricius Fauna Groenlandia. p. 275 ;
Marflue. Strom. Sondmor. vol. 1. tab. 1. fig. 12 et 13.

Hyperia Suerii. Phronima. Latr. Encyclop. méthod. Ins. pl. 328.
 fig. 17 et 18. (d'après Strom.)

Hyperia Suerii? Ejusd. Règne anim. t. 4. p. 117 ;

Desmarest. Consid. sur les crust. p. 258.

Hyperia Latreillii. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 388. pl. 11.
 fig. 1-7.

Hiella Orbignii. Straus. Mém. du Muséum. t. pl.

HYPERIE DES CYANÉES. *Hyperia cyanæ*. Edw. op. cit. *Talitrus cyanæ* Sabine. App. to cap. Parry's voyage. pl. 1. fig. 2-8.

HYPERIE PÉLAGIQUE. *Hyperia pelagica*. Edw. op. cit.

Lanceola pelagica. Say. Journ. of the Acad. of Sc. of Philadelphia.
 t. 1. p. 218.

Etc.

[Le genre **PHORCUS** se distingue des **Hypéries** par ses antennes bifides, fusiformes et pourvues d'un appendice styliforme, par l'état rudimentaire des antennes inférieures et par la conformation des pattes ; celles des quatre premières paires sont courtes, les cinquièmes sont très longues, mais filiformes et ne peuvent guère servir à la locomotion, tandis que celles de la sixième paire, encore plus longues, sont au contraire très fortes, et celles de la septième paire sont rudimentaires.

Phorcus Regnaudii. Edw. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 20. p.

Le genre **LESTRIGON** est également très voisin des **Hypéries** et s'en distingue par la conformation des antennes qui sont toutes très longues et terminées par une tige

subulée et multiarticulée très grêle et aussi longue que le corps. La tête très grosse et renflée ; le premier segment du thorax rudimentaire ; l'abdomen plus grand que le thorax et aucune patte n'est préhensile, mais celles de la seconde paire présentent une espèce de petite main formée par l'antépénultième article.

Lestrigon Fabrei. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 392 et Hist. des Crust. pl. 30. fig. 17.

Le genre *DAIRA* est voisin du précédent, mais en diffère par l'existence d'une seule paire d'antennes lesquelles sont presque rudimentaires et par la conformation des pattes des deux premières paires dont l'antépénultième article constitue une main terminée par une pince didactyle à doigt mobile biarticulé.

Daira Gabertii. Edwards. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 20. p.

Dans le genre *THEMISTO* de M. Guérin, la conformation générale du corps est à-peu-près la même que chez les Hypéries et celle des pattes des deux premières paires comme dans la division précédente, mais les pattes de la troisième et quatrième paires, au lieu d'être grêles et cylindriques, portent une espèce de main triangulaire formée par l'antépénultième article, sur le bord duquel s'infléchit une griffe formée par les deux derniers articles ; les pattes de la cinquième paire sont grêles et excessivement longues.

Esp. *Themisto* de Gaudichaud. *Themisto Gaudichaudii*. Guérin. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. 4. p. 379. pl. 12 C. fig. 1-17.

Le genre *DACTYLOCEÆ* de Latreille se rapproche également des Hypéries, mais ressemble aussi un peu aux Phronimes par la forme de la tête et la disposition des antennes, dont la paire supérieure est représentée seulement par deux petits tubercules cornés et celles de la seconde paire sont styloformes et presque ru-

dimentaires. Le thorax est divisé en six segments; les pattes des deux premières paires sont courtes, grêles et adactyloles; celles des quatre paires suivantes sont terminées par une main assez semblable à celles des Crevettes; les pattes de la septième paire sont presque rudimentaires; mais de même que celles des deux paires précédentes, elles ont leur premier article lamelleux et clypéiforme; enfin, les appendices abdominaux des trois dernières paires, au lieu d'être grêles et presque styliiformes comme chez les Hypéries, les Phronimes et les genres voisins, ont la forme de grandes lames membraneuses ovalaires.

Esp. *Dactylocera Nica*. Edw. Ann. des S. nat. 1^{re} série, t. 20, p. 392, et Hist. nat. des Crust., pl. 30. fig. 18. Le *Phrosina sasilunata* de M. Risso (Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5. pl. 3 fig. 10-12) paraît appartenir aussi à ce genre, comme l'a très bien remarqué Latreille (Règne anim. t. 4. p. 117).

Le genre *HIERACONYX* de M. Guérin est extrêmement voisin des Dactyloocères, mais s'en distingue par l'existence de quatre antennes terminées chacune par un petit filet multiarticulé, par l'absence d'une main subchéliforme aux pattes de la sixième paire, etc.

Esp. *Hieraconyx raccourci*. *Hieraconyx abbreviatus*. Guérin. Magasin de zoologie. cl. VII. pl. 17-fig. 2.

Le genre *PRIMNO* de M. Guérin paraît être intermédiaire entre les Dactylocères, les Hypéries et les Phronimes; la tête est conformée à-peu-près comme chez ces derniers et ne porte aussi qu'une seule paire d'antennes styliiformes; les pattes des quatre premières paires sont médiocres, grêles vers le bout et non chéliformes; celles de la cinquième paire sont très grandes et leur antépénultième article est très large et très épineux sur le bord antérieur, tandis que les deux derniers articles sont grêles et cylindriques; les pattes de la sixième paire sont aussi très longues, mais très grêles excepté vers leur base; et

celles de la septième paire sont filiformes dans presque toute leur longueur; enfin les appendices abdominaux des trois dernières paires sont lamelleux et simples.

Esp. Primno à grands pieds. *Primno macropa*. Guérin. Mag. de zoologie. cl. vii. pl. 17. fig. 1.

Dans le genre *ANCHYLOMÈRE* la forme générale du corps est à-peu-près la même que chez les Hypéries, mais l'article basilaire des pattes des trois dernières paires est lamelleux et extrêmement grand; les pattes de la cinquième paire se terminent par une grande main subchiliforme dirigée en arrière, tandis que celles des deux paires suivantes ne sont pas préhensiles; les antennes sont très courtes et styloformes ou nulles, et les appendices abdominaux des trois dernières paires sont foliacés et ovales.

Esp. Anchylomère de Blosseville. *Anchylomera Blossevillii*. Edw. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 394.

Anchylomère de Hunter. *Anchylomera Hunteri*. Edw. loc. cit. et Hist. des crust. pl. 30. fig.

Le genre *PRONOÉ* de M. Guérin établit, à quelques égards, le passage entre les Hypéries, les Dactylocères et les Typhis; il se rapproche de ces derniers par la conformation singulière et la position des antennes de la seconde paire et par la disposition des appendices abdominaux et par la forme lamelleuse du premier article des pattes des trois dernières paires, mais s'en distingue par le développement peu considérable de ces lames, par la longueur et la forme des autres articles des pattes de la cinquième paire et par quelques autres caractères.

Esp. Pronoé à grosse tête. *Pronoe capito*. Guérin. Mag. de zoologie. cl. vii. pl. 17. fig. 3.

Le genre *ORTICERHALL* prend également place dans la famille des Hypériniens et se rapproche aussi des Typhis par la conformation des antennes de la seconde paire qui sont

ESPÈCES.

Antennes à trois articles dont le dernier est une soie articulée. (1)

1. Crevette des ruisseaux. *Gammarus pulex*.

G. pedibus quatuor anticis breviusculis, manu unguiculiformi terminatis.

Gammarus pulex. Fab. Syst. 2. p. 516.

Cancer pulex. Lin.

Crevette des ruisseaux. Geoff. 2. p. 667. pl. 21. fig. 6.

Gammarus pulex. Lat. Gen. 1. p. 88. et Hist. nat. 6. pl. 57. fig. 1.

* Montagu. Trans. of the Linn. soc. vol. 9. pl. 4. fig. 2.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 267. pl. 55. fig. 8.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 4. p. 127.

Habite en Europe, dans les eaux des fontaines et des ruisseaux.

2. Crevette épineuse. *Gammarus spinosus*.

G. pedibus anticis manu destitutis; dorsi segmentis posterioribus acuminato-spinosis.

Cancer gammarus spinosus. Montag. Trans. Soc. Linn. vol. xi. p. 5. tab. 2. fig. 1.

Dexamine spinosa. Leach. Trans. Soc. Linn. vol. xi. p. 358. (2)

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 263. pl. 45. fig. 6.

Habite l'Océan britannique.

3. Crevette crochue. *Gammarus articulatus*.

G. pedibus anticis duobus chelatis, secundi paris manu majusculo: dactylo reflexo; caudâ apice incurvâ.

Cancer articulatus. Montag. Trans. Soc. Linn. vol. 7. p. 71. tab. 6. f. 6.

(1) Chez tous ces crustacés les antennes supérieures sont composées d'un pédoncule formé de trois articles et d'un filet terminal multi-articulé; le pédoncule des antennes inférieures présente un article de plus. E.

(2) Le genre *Dexamine* de Leach est trop imparfaitement connu pour pouvoir être adopté; il paraît devoir rentrer dans la division des *Amphitroës*. E.

Leucothoe articulata. Leach. Trans. Soc. Linn. xi. p. 358.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 263. pl. 45. fig. 5.

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 122. et Encyclop. Ins. pl. 336. fig. 30.

* Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p.

Habite l'Océan britannique.

Antennes de quatre articles, le dernier articulé.

4. Crevette palmée, *Gammarus palmatus*.

G. corpore nigricante ; pedum pari secundo manu dilatato compresso.

Cancer palmatus. Montagu. Trans. Soc. Linn. 7. p. 69.

Melita palmata. Leach. Crust. annul. pl. 21. (2)

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 264. pl. 45. fig. 7.

* Latreille. Encyclop. Ins. pl. 336. fig. 31 ; et Règne anim. t. 4. p. 121.

Habite l'Océan britannique, sous les pierres des rivages.

(1) Le genre *Leucothoe* diffère beaucoup des Crevettines ordinaires par la conformation des pattes et par quelques autres caractères ; le pénultième article des pattes de la première paire constitue une espèce de doigt mobile qui se termine par une griffe recourbée et s'applique sur le bord supérieur d'un long prolongement de l'anté-pénultième article, de façon à représenter une pince didactyle. Les antennes sont simples comme chez les Amphitoës, mais plus courtes, et les mandibules garnies d'une tige palpiforme. La seule espèce bien connue appartenant à cette division est le *Lycasta furina* de M. Savigny (Descr. de l'Égypte, Crust. pl. 11. fig. 2 ; Edw. Ann. des Sc. nat. t. 20, p. 381). Le *Gammarus articulatus* de Montagu (Linn. Trans. t. 7. pl. 6. fig. 6.) paraît être aussi un *Leucothoe*. E.

(2) Les Crevettines dont Leach a formé le genre *Mélite* ne diffèrent des Crevettes que par la direction suivant laquelle l'article terminal des pattes de la seconde paire s'infléchit sur l'article précédent ; chez les Crevettes, cette griffe s'applique sur la tranche de la main, tandis que chez les *Mélites*, elle se replie contre le milieu de la surface interne de cet article ; mais ce caractère n'a presque aucune importance, et nous pensons qu'il est avec raison que Lamarck s'est refusé à l'adoption de ce genre nouveau. E.

5. Crevette grosse-main. *Gammarus grossimanus*.

G. pedum paribus duobus anticis manuferis ; caudâ apice nudâ.

Cancer gammarus grossimanus. Montag. Trans. Soc. Linn. 9. p. 97.
tab. 4. f. 5.

Mæra grossimana. Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 359. (1)

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 265.

* Latreille. Encyclop. Ins. pl. 336. fig. 45.

Habite les rivages de l'Océan britannique.

6. Crevette fucicole. *Gammarus pherusa*.

G. cireneus, rubro varius ; pedibus anticis manu oblongo terminatis.

Pherusa fucicola. Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 360. (2)

Ejusd. crust. annul. pl. 21.

* Desm. Consid. sur les crust. p. 268. pl. 45. fig. 16.

Habite les rivages de l'Océan britannique, entre les fucus.

Elle n'a point d'appendice à la base du quatrième article des antennes.

Etc. Le *gammarus rubricatus*. Montagu. Trans. Soc. Linn. 9. p. 99.
tab. 5. fig. 1. est encore de ce genre. *Amphitoe*. (3) Leach.

* Ajoutez un grand nombre d'espèces nouvelles décrites ou figurées
par Montagu. Linn. Trans. vol. 9 ; Leach. Edimb. Encyclop. t. 7 ;
Desm. Consid. p. 267 ; Say. Jour. of the acad. of Philad. vol. 1 ;
Savigny. Egypte. Crust. pl. 11 ; Edwards. Ann. des Sc. nat.
t. 20, etc.

(1) Le genre *MOERA* de Leach doit également être rejeté, car suivant ce naturaliste, il ne diffère des Crevettes et des Amphitoés que parce que la main de la seconde paire est comprimée et dilatée chez le mâle au lieu d'être de même forme dans les deux sexes. E.

(2) Les *Phéruses* doivent être réunies aux Amphitoés dont elles ne diffèrent que par un peu moins d'élargissement dans les mains. E.

(3) Le genre *AMPHITOE* de Leach se distingue des Crevettes par l'absence du filet multi-articulé accessoire à l'extrémité du pédoncule des antennes supérieures. On en connaît un grand nombre d'espèces (voyez les Annales des Sciences naturelles, t. 20. pl. 375.) E.

Nous avons donné le nom générique d'Isæa à des Amphipodes qui sont très voisins des Crevettes, mais qui ont toutes les pattes subchéliformes (voyez Ann. des Sc. nat. t. 20, pag. 380, et Hist. des Crust. pl. 29, fig. 11).

Dans notre genre Lysionasse il n'est au contraire aucune patte qui ait ce mode d'organisation (voyez le *Lysionassa costæ*. Edwards, Ann. des Sc. nat. t. 20, pl. 10, fig. 17).

Le genre Phlias de M. Guérin ne diffère du précédent que par l'absence du filet multiarticulé, accessoire des antennes supérieures. (Esp. le *Phlias serratus*, Guérin, Mag. de zool. cl. VII, pl. 19).

TALITRE. (Talitrus.)

Quatre antennes inégales, sétacées, articulées ; les supérieures étant plus courtes ; deux yeux sessiles ; bouche comme dans les Crevettes. (1)

Corps allongé, semi-cylindracé ; à segmens crustacés transverses. Quatorze pattes. Port des Crevettes.

Antennæ quatuor, inæquales, setaceæ, articulatæ : superioribus brevioribus. Oculi duo sessiles. Os ut in Gammarellis.

Corpus elongatum, semi cylindraceum ; segmentis crustaceis transversis. Pedes quatuordecim. Habitus Gammarorum.

OBSERVATIONS. — Les Talitres ressemblant aux Crevettes par leur aspect et leurs habitudes, on pourrait ne les en point séparer ; cependant, le caractère des antennes inférieures qui sont plus longues que les supérieures est si remarquable, que nous

(1) Excepté que les mandibules ne portent que des vestiges d'une tige palpiforme.

avons suivi, *Latreille* qui les a distingués. On peut néanmoins les diviser encore, comme l'a fait *M. Leach*. En effet, dans les uns, la tête ne forme point de saillie en devant, et avec ceux-là, *M. Leach* forme ses *Talitres* et ses *Orchestias*; tandis que dans les autres, le devant de la tête se prolonge en forme de bec, comme dans les *Phronimes*; et ces derniers constituent les *Aty-les* du zoologiste anglais.

[Les auteurs les plus récents s'accordent à séparer génériquement ces trois groupes, et à conserver le nom de *Talitres* aux espèces dont les antennes supérieures sont plus courtes que le pédoncule des antennes inférieures, et dont les pattes de la seconde paire ne se terminent point par une main subchéliforme. :E.]

ESPÈCES.

1. Talitre sauterelle. *Talitrus locusta*.

T. pedibus omnibus monodactylis; antennis superioribus brevissimis.

* *Squilla saltatrix*. Klein. Rem. sur les crust. fig. D-F.

Cancer locusta. Lin.

Gammarus locusta. Fab.

Oniscus locusta. Pal. Spicil. zool. fasc. 9. tab. 4. f. 7.

* *Astacus locusta*. Pennant. Brit. zool. vol. 4.

Talitrus locusta. Lat. Gen. 1. p. 58.

* Ejusd. Encyclop. Ins. pl. 336. fig. 4. (d'après Montagu.)

Cancer gammarus saltator. Montag. Soc. Lin. trans. 9. p. 94. tab. 4. f. 3.

* *Talitrus locusta*. Leach. Trans. of the Linn. Soc. vol. XI. p. 356. (le mâle) et *Talitrus littoralis*. Ejusd. Ediub. Encyclop. vol. 7. p. 402 (la femelle.)

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 260. pl. 45. fig. 2.

* Griffith. Anim. Kingd. pl. 22. fig. 1.

* Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 364.

Habite l'Océan d'Europe.

2. Talitre gammarelle. *Talitrus gammarellus*.

T. pedibus omnibus monodactylis: secundi paris manu magna subcompressa.

Oniscus gammarellus. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 8.

Talitrus gammarellus. Latr. Gen. 1. p. 57.

Cancer gammarus locusta? Montag. Trans. Soc. Lin. 9. p. 92. tab. 4
1. 1. *Orchestia*. Leach. (1)

* *Orchestia littorea*. Leach. Edinb. Encyclop. et Trans. of the Linn. Soc. vol. XI. p. 356.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 261. pl. 45. fig. 3.

* Edw. loc. cit.

Habite l'Océan d'Europe, près des rivages.

3. Talitre cariné. *Talitrus carinatus*.

T. sapite rostro descendente; abdominis segmentis quinque ultimis carinatis, posticè acutè productis.

Atylus carinatus. Leach. Trans. Soc. Linn. XL. p. 557. (2)

* Ejusd. zoological miscellany. t. 2. pl. 69.

Gammarus carinatus. Fab. Syst. 2. p. 515.

* *Atylus carinatus*. Desmarest. Consid. sur les crust. p. 262. pl. 45.
fig. 4.

Habite

Etc.

COROPHIE. (Corophium.)

Quatre antennes inégales : les deux inférieures plus longues, plus épaisses, pédiformes, articulées, subonguiculées au bout.

Le reste comme dans les Crevettes.

Antennæ quatuor, inæquales : inferis duabus longio-

(1) Le genre *ORCHESTIE* diffère principalement des Talitres proprement dites par l'existence d'une grande main subchéli-forme aux pattes de la seconde paire ; on doit y rapporter aussi les Amphipodes figurées par M. Savigny sous les numéros 7 et 8 dans la 11^e planche des crustacés du grand ouvrage de l'Egypte; l'*Orchestia Fischeri*, Edw. (Ann. des Sc. nat. t. 20, p. 363), etc.

E.

(2) Le genre *ATYLE* doit prendre place dans la tribu des Corophioïdes ou Crevettiniens marcheurs et se distingue par ses antennes non pédiformes, et ses mains de la seconde paire très petites et à griffes simples.

E.

ribus , crassioribus , pediformibus , articulatis , apice subunguiculatis.

Cætera ut gammaris.

OBSERVATIONS. — Les *Corophies* ayant les antennes inférieures plus longues , plus épaisses et comme onguiculées au bout, sont en cela très remarquables, et se servent probablement de ces parties, comme de bras ou de pattes , pour saisir leur proie. D'après ces habitudes particulières, Latreille a eu raison de les distinguer.

[Les *Corophies* forment le type d'une tribu de la famille des Crevettiniens que nous avons désignés sous le nom de Crevettiniens-marcheurs, et qui se distinguent des Crevettiniens sauteurs par la forme grêle de leur corps, par le peu de développement des lames épimériennes des quatre premiers anneaux thoraciques et par la conformation de l'espèce de queue formée par les appendices abdominaux des trois dernières paires qui n'est point ici un organe de saut comme chez les Crevettes, les Talitres, etc. Les *Corophies* se distinguent des autres genres de la même division par leurs antennes inférieures pédiformes par l'absence d'un filet aux antennes supérieures et par la conformation des pattes de la seconde paire, lesquelles ne sont ni didactyles ni préhensiles. Dans le jeune âge les antennes inférieures ne sont pas plus grosses que chez les Crevettes. E.

ESPECE.

1. *Corophie longicorne. Corophium longicorne.*

C. corpore lateribus depresso ; antennis inferis quadriarticulatis corpore longioribus.

Cancer grossipes. Lin.

Gammarus longicornis. Fab.

Oniscus volutator. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 9.

Corophium longicorne. Lat. Gen. 1. p. 59.

* D'Orbigny (père). Journ. de physique. t. 93. p. 194.

* Leach. Trans. of the Linn. Soc. vol. XI, etc.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 270. pl. 46. fig. 1.

* Griffith. Anim. King. Crust. pl. 2.

* Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 384, et Hist. des Crust. pl. 29. fig. 16,

Habite l'Océan d'Europe.

Etc. Rapportez aux Corophies les genres *Podocera* et *Jassa* de M. Leach.

Les JASSES et les PODOCÈRES de Leach diffèrent des Corophies en ce que leurs quatre pattes antérieures sont terminées par une grosse main subchéliforme; elles ne diffèrent entre elles que par l'allongement un peu plus considérable du filet terminal des antennes supérieures chez les premiers et par quelques autres caractères également peu importants.

Le genre UNCIATA de Say doit prendre place auprès des genres précédens, mais s'en distingue par l'existence de deux tigelles multiarticulées à l'extrémité des antennes supérieures.

Le genre CÉRAPODE (*cerapus*) de Say a également les mains de la seconde paire subchéliforme, mais la griffe de ces organes, au lieu d'être simple, est composée de deux articles et les pattes de la première paire sont petites et non préhensiles. Ces crustacés singuliers vivent dans des tubes cylindriques, à la manière des Larves de Friganes.

Esp. *Cerapus tubularis*. Say. Journ. of the acad. of Science of Philadelphia. vol. 1. p. 49. pl. 4. fig. 7-11. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 261. pl. 46. fig. 2. — Latreille. Règne anim. t. 4. — Edw. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 383.

Cerapus abditus. Templeton. Trans. of the Entomol. soc. vol. 1. p. 188. pl. 20. fig. 5.

Enfin, notre genre ERICTHONIE établit le passage entre ces Crustacés et les Leucothoés; la conformation générale du corps est la même que chez les précédens, mais les antennes ne sont pas pédiformes et les pattes de la seconde paire sont terminées par une longue main imparfaitement didactyle dont la griffe est biarticulée. (voyez Ann. des Sc. nat. t. 20, p. 382, et Hist. nat. des Crust. pl. 29. fig. 12).

quatrième Section.

CRUSTACÉS STOMAPODES.

Mandibules palpigères (1). Les yeux pédiculés. La tête en grande partie reculée sous un corselet antérieur non pédigère. Branchies à nu et en panache sous le ventre, au delà des pieds (2).

Les *Stomapodes* connus sont encore peu nombreux ; on n'en a même fait qu'un seul genre, sous le nom de *Squilla* ; mais maintenant Latreille en forme deux. Ces Crustacés sont les derniers des Hétérobranchés, et semblent, par leur forme allongée et leurs yeux portés sur des pédicules mobiles, former une transition aux Crustacés homobranches, par les Macroures ; leur caractère est particulier et fort éminent. En effet, parmi les Crustacés à mandibules palpigères, les Stomapodes sont les seuls qui aient les branchies à nu et en panache sous le ventre. Ces branchies sont suspendues à la base d'écailles ou de lames articulées qui sont des pattes natatoires.

La tête, loin d'être distincte, me paraît ici en grande partie reculée sous un corselet antérieur non pédifère. La bouche, occupant le dessous de ce corselet antérieur, a

(1) Ce caractère n'est pas plus constant ici que chez les Edriophthalmes, et n'a pas l'importance que notre auteur semble y attribuer. E.

(2) Quelquefois les branchies, en forme de panaches ramifiées sont suspendues sous le thorax, et d'autres fois elles manquent complètement ; mais elles ne sont jamais renfermées dans des cavités comme chez les Décapodes. E.

reculé l'attache des pattes sous une partie postérieure, comme aux dépens de l'abdomen. Ainsi, je distingue le corselet en partie antérieure et en partie postérieure. La première, sous la forme d'un corselet ordinaire, est avancée au delà des pattes, et se divise en deux portions : l'une, antérieure, très petite, porte les yeux et les antennes intermédiaires (1), tandis que l'autre, fort grande et déprimée, soutient les antennes extérieures (2). La seconde partie du corselet est pédifère, et souvent se compose de trois segmens étroits, assez semblables aux autres segmens de la queue.

La bouche des Stomapodes a un labre; deux mandibules dentées et pourvues d'un palpe filiforme; une languette double; deux paires de mâchoires portant des palpes, et deux paires de pieds-mâchoires, dont la dernière est très grande, en forme de bras, qui se terminent chacun par une grande griffe mobile, dentée ou pectinée d'un côté. (3)

Les pattes ambulatories sont seulement au nombre de trois paires; mais sous la queue l'on compte cinq paires de pattes lamelleuses ou natatoires, ce qui ferait les seize pattes naturelles aux crustacés. Cependant, à cause des deux derniers pieds-mâchoires qui forment les deux bras, on ne devrait trouver que quatre paires de pattes natatoires.

(1) Cette portion de la tête se compose ordinairement de deux anneaux distincts, dont l'un porte les yeux et l'autre les antennes internes. E.

(2) C'est cette portion du corps qui constitue la carapace des Stomapodes. E.

(3) Ces caractères et les suivans ne sont pas applicables à un grand nombre de crustacés que l'on range aujourd'hui dans l'ordre des Stomapodes, mais qui n'étaient que peu ou point connus à l'époque de la publication de cet ouvrage. E.

Les *Stomapodes* sont allongés comme les crustacés macroures ; leur queue se termine par des appendices qui accompagnent une pièce moyenne, à bord denté. Ils ont le test peu épais et peu solide, et se tiennent dans la mer à une certaine profondeur, dans les endroits à fond sablonneux ou fangeux ; ils nagent plus qu'ils ne se traînent avec leurs trois paires de pattes. On les divise en *Squilles* et en *Erichthes*.

[L'ordre des Stomapodes doit comprendre tous les crustacés podophthalmes qui sont dépourvus de branchies thoraciques logées dans des cavités intérieures du corps et se compose d'un nombre d'anneaux beaucoup plus considérable que dans la méthode de Lamarck. On le divise en trois familles, savoir : les Unicuirassés, les Bicuirassés et les Caridioïdes ; et le premier de ces groupes correspond à l'ordre entier des Stomapodes, tel que notre auteur le restreignait.

La FAMILLE DES UNICUIRASSÉS se compose, en effet, de tous les Stomapodes hétéropodes, tandis que les deux autres familles de cet ordre comprennent les espèces qui ont toutes les pattes similaires et natatoires. Chez les Unicuirassés, les membres qui chez les Edriophthalmes constituent les pattes-mâchoires, sont très allongés et ne paraissent pas appartenir à l'appareil buccal ; les membres qui correspondent aux pattes antérieures des Edriophthalmes et aux pattes-mâchoires de la seconde paire chez les Décapodes, constituent de grandes pattes ravisseuses ; les pattes des trois paires suivantes sont appliquées contre la bouche et terminées chacune par une petite main subchéliforme, et les pattes des trois dernières paires sont grêles et natatoires. La plupart des anneaux du thorax sont complets et distincts. Enfin l'abdomen est très développé. Cette famille, quoique peu nombreuse, doit être subdivisée en deux tribus qui correspondent à-peu-près aux deux genres que Lamarck y mentionne. E.

La famille des Bicuïrassés se compose des *Phyllosomes* et celle des *Caridoïdes* des Mysis, des Leucifères, des Thysanopodes, etc. E.

SQUILLE. (Squilla.)

Quatre antennes triarticulées : deux intermédiaires un peu plus longues, terminées par trois soies ; deux externes simples, ayant à leur base externe une écaille foliacée oblongue.

Corselet postérieur, divisé en trois segments étroits et pédigères.

Antennæ quatuor, triarticulatae : duabus intermediis sublongioribus, apice trisetis ; externis simplicibus squamâ foliaceâ oblongâ ad basim externam annexâ.

Thorax posticus segmentis tribus pedigeris.

OBSERVATIONS. — Les *Squilles* ou Mantes de mer constituent un genre fort remarquable par leur singulière conformation, et par la situation de leurs branchies. Les deux derniers pieds-mâchoires forment comme deux grands bras avancés, terminés chacun par une griffe mobile, dentée ou pectinée en son côté interne, ce qui leur donne l'aspect des insectes du genre des Mantes. Leur corselet antérieur ne s'avance point postérieurement jusqu'au dessus des trois paires de pattes ambulatoires, comme dans le genre des *Erichthes*, en sorte que les trois segments qui portent ces pattes ne semblent plus appartenir au corselet. Ils lui appartiennent cependant, puisqu'ils portent des pattes. La queue est grande, longue, composée de six segments, dont le dernier est garni d'appendices en éventail ; les trois segments pédifères ne sont point comptés.

[Cette division correspond au genre *Squilla* de Fabricius et à notre tribu des Squilliens, et comprend les trois groupes génériques établis par Latreille sous les noms de Squilles proprement dites, de Gonodactyles et de Coronis. Tous les crustacés dont elle se compose ont entre eux la plus grande ressemblance,

et les différences d'après lesquelles ces genres sont établis n'ont peut-être pas autant d'importance qu'on l'avait d'abord pensé. Ils se distinguent des Érychthiens par la structure de leur carapace qui est divisé longitudinalement, en trois lobes, par deux sillons, et porte sur son bord antérieur une plaque frontale mobile, par le grand développement des branchies et par plusieurs autres caractères. Chez les **SQUILLES** proprement dites, l'appendice latéral des pattes thoraciques des trois dernières paires est long, grêle et styloforme, et la griffe des pattes ravisseuses est lamelleuse, et fortement dentée sur le bord préhensile; chez les **GONODACTYLES**, cette griffe est au contraire, renflée à la base, et peu ou point dentelée en dedans; enfin, dans le genre **COXOMIS** de Latreille, l'appendice latéral des six dernières pattes thoraciques est lamelleux, membraneux, et presque orbiculaire. (Voyez Latreille. Règne animal. t. 4, et Encyclop. t. 10. p. 467; et notre Hist. nat. des Crustacés, t. 2.) E.

ESPÈCE.

1. Squille mante. *Squilla mantis*.

S. corpore supra lineis octo longitudinalibus elevatis; pollicibus falcatis, semi-pectinatis quinque ad octo dentatis.

Cancer mantis. Linn.

Squilla mantis. Fab.

Latr. Gen. 1. p. 55.

Herbst. canc. tab. 33. f. 1.

* *Squilla mantis*. Latreille. Encyclop. t. 10. p. 471. pl. 295. fig. 1. et pl. 324.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 250. pl. 41. fig. 2.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 520.

(B) *Var. major; pollicibus octo-dentatis.*

Squilla raphidea. Fab. Suppl. p. 416.

Squilla arenaria. Seba. mus. 8. tab. 20. f. 2.

* *Squilla raphidea*. Latreille. Encyclop. t. 10. p. 471. pl. 324.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 524.

Habite la Méditerranée et l'Océan Indien.

* L'auteur regarde comme de simples variétés deux espèces qui sont parfaitement distinctes.

2. Squille tachetée. *Squilla maculata*.

S. grandis; corpore suprà lævi; brachiorum pollice falcato hinc pectinato; segmento postico ultimo rotundato, submutico.

Squilla maculata. Fab. Syst. 2. p. 511.

Cancer arenarius. Rumph. Mus. tab. 3 f. E.

* Herbst. t. 2. p. 96. pl. 33. fig. 2.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470. pl. 323.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 250.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 518.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mus.

3. Squille queue-rude. *Squilla scabricauda*.

S. thorace brevi, subcordato quadrisulcato; corpore læviusculo; caudâ punctis numerosis scabrâ; brachiorum pollicibus octo-dentatis.

Mus. n°.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 471. pl. 325. fig. 1.

* Edw. op. cit. t. 2. p. 219.

Habite..... l'Océan Indien. Quatre des pieds-mâchoires ont les mains arrondies, comprimées, ciliées.

4. Squille glabriuscule. *Squilla glabriuscula*.

S. corpore suprâ læviusculo; caudâ glabrâ; brachiorum pollicibus quinque dentatis; maxilli-pedum manibus sex rotundato-compressis.

Mus. n°.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470.

Habite l'Océan Indien ? Espèce voisine de la précédente, mais distincte.

5. Squille de Desmarest. *Squilla Desmaresti*. R.

S. corpore dorso lævi; lineis utrinque duabus lateralibus longitudinalibus elevatis; pollicibus quinque-dentatis.

Squilla acanthura. Lam. Mus.

Squilla Desmaresti. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 114. pl. 2. fig. 8.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 251.

* Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 40.

* Edw. op. cit. t. 2. p. 523. pl. 1 fig. 1.

Habite la Méditerranée. Taille petite.

6. Squille scyllare. *Squilla scyllarus*.

S. corpore supra lævi ; caudæ segmento penultimo sexplicato ; pollicibus basi ventricosus subbidentatis.

Cancer scyllarus. Lin.

Squilla scyllarus. Fab.

Squilla chiragra. Ejusd. (1)

• Rumph. Mus. tab. 3. fig. F.

* *Gonodactylus scyllarus*. Latreille. Encyclop. t. 10. p. 473.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 529.

Habite l'Océan Indien et près de l'Île-de-France. Mus.

7. Squille stylifère. *Squilla stylifera*.

S. minor ; corpore supra lævi ; pollicibus angustis compressis bidentatis ; pedibus styliferis.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 472.

* Guérin. Iconographie du Règne anim. Crust. pl. 24. fig. 1.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 526.

Mus. n°.

Habite..... Le doigt des bras n'est nullement ventru.

Etc.

* On connaît plusieurs autres espèces de Squilles dont les caractères sont indiqués dans le 2^e volume de notre Histoire naturelle des Crustacés.

ÉRICHTHE. (Erichthus.)

Antennes, yeux et bouche comme dans les Squilles.

Corselet postérieur et pédifère non distinct de l'antérieur et point divisé en anneaux. (2)

Antennæ, oculi, os ut in squillis.

(1) Lamarck réunit ici deux espèces qui sont parfaitement distinctes. E.

(2) Notre auteur se trompe lorsqu'il dit que les trois derniers anneaux du thorax ne sont pas distincts ; leur disposition est la même que chez les Squilles, seulement la carapace étant en général plus développée, les recouvre en dessus. E.

Thorax posticus et pedifer à thorace antiquo non distinctus segmentisque non divisus.

OBSERVATIONS. — Ici le corselet antérieur s'avance postérieurement jusqu'au dessus des trois paires de pattes ambulatoires; ainsi ces pattes ne sont plus attachées à trois anneaux particuliers; ce qui montre que, dans les Squilles, les trois anneaux pédifères sont un corselet postérieur.

[Les Erichthes et deux genres nouveaux qui en sont très voisins, constituent une petite tribu de Stomapodes unicuïrassés qui se distingue de celles des Squilles par la forme de la carapace et par plusieurs autres caractères. Le bouclier dorsal n'est jamais divisé longitudinalement en trois lobes, comme dans le groupe précédent; il se termine antérieurement par un rostre grêle, allongé et immobile; et se prolonge postérieurement, plus ou moins loin, au-dessus des deux anneaux thoraciques, ou même des premiers anneaux de l'abdomen; les deux premiers anneaux de la tête sont moins distincts que chez les Squilles; les pattes thoraciques des trois dernières paires sont petites ou même rudimentaires, et les branchies fixées aux fausses pattes de l'abdomen, sont en général rudimentaires. Les Erichthes proprement dites se distinguent des autres crustacés de la même tribu par l'état rudimentaire de ces derniers organes, par la forme de la griffe des pattes ravisseuses qui est droite et non dentelée; et par le grand développement de la carapace qui recouvre l'anneau ophthalmique et la base des yeux en avant, et s'étend en arrière plus ou moins loin au-dessus de l'abdomen.

E.

ESPÈCE.

1. Érichthe vitré. *Erichthus vitreus*.

Squilla vitrea. Fab. Syst. ent. 2, p. 513.

* *Erichthus vitreus*. Latreille. Règne anim. de Cuv. 1^{re} édit. t. 3. p. 43. et 2^e édit. t. 4. p. ; Encyclop. t. 10. pl. 354. fig. 7.

* *Smerdis vulgaris*. Leach. Voy. du Cap. Tuckey. Appen. pl. 18. fig. 6; et Journ. de Physique. t. 96. p. 305, fig. 6.

* *Erichthus vitreus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 252 pl. 44. fig. 2.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 501.

Habite l'Océan Atlantique. La griffe des bras n'est point dentée au côté interne. Ce genre a été établi par Latreille, dans l'ouvrage qu'il a fait pour Cuvier.

[Nous avons donné le nom de **SQUILLERICHTHE** à une petite division générique de la tribu des Erichthiens qui est caractérisée par l'existence de branchies rameuses très développées, par la forme courbe et les dentelures de la griffe des pattes ravisseuses, la forme renflée de la carapace, etc.

Exemple. Squillerichthe type. *Squillerichthus typus*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 499. pl. 27. fig. 1-8.

Le genre **ALIME** de Leach est également très voisin des Erichthes dont il ne diffère guère que par quelques particularités dans la forme de la carapace; le bouclier est très allongé et ne recouvre ni l'anneau ophthalmique, ni la base des yeux et ne s'étend pas au dessus de l'abdomen.

ESRICHES. Alime hyalin. *Alima hyalina*. Leach. Expédition du capit. Tuckey au Zaire. Append. pl. 18. fig. 8. et Journ. de Physique. t. 18. p. 305. fig. 7. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 253 pl. 44. fig. 1. — Latreille. Encyclop. t. 10. p. 475. pl. 354. fig. 8: — Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 507.

Etc. etc.

† Genre **PHYLLOSOME**. *Phyllosoma*.

Le genre Phyllosome, établi par Leach, est un des plus remarquables que l'on connaisse. Il se compose d'animaux dont tout le corps est tellement aplati, qu'il existe à peine un intervalle entre les tégumens des surfaces supérieure et inférieure, et qu'on comprend difficilement comment des viscères peuvent s'y loger. Ce corps lamelleux se divise en trois parties distinctes : la tête, le thorax et l'abdomen.

La tête a la forme d'un disque mince ou d'une feuille ordinairement ovalaire, et n'adhère au thorax que par sa portion centrale, de façon que ses bords sont libres tout autour. Cette espèce de bouclier est large et horizontal; à son extrémité antérieure elle donne insertion aux yeux et aux antennes. Les yeux naissent près de la ligne médiane et sont globuleux; ils sont portés sur des pédoncules grêles, cylindriques et très longs. Les antennes internes naissent également du bord de la carapace, immédiatement en dehors des pédoncules oculaires; elles sont très petites et présentent un pédoncule composé de trois articles cylindriques, et deux petits filets terminaux. Les antennes de la seconde paire naissent en dehors des précédentes, et varient beaucoup par leur forme: tantôt elles sont très longues, grêles, cylindriques, et composées de plusieurs articles distincts; d'autres fois elles sont courtes, lamelleuses, sans divisions apparentes, et ne semblent être que des prolongemens de la carapace. La bouche est située vers le milieu ou même vers le tiers postérieur de la carapace, et ne se compose que d'un labre, d'une paire de mandibules, d'une lèvre inférieure et d'une paire de mâchoires. Les mandibules sont grandes, arrondies en dehors, et armées en dedans de deux bords tranchans et d'une petite dent. La lèvre inférieure est grande, très apparente et profondément bilobée; enfin, les mâchoires sont petites, membraneuses et terminées chacune par deux lobes ou lames dirigées en dedans, et armées de quelques épines vers leur sommet. Les appendices qui représentent les mâchoires de la seconde paire, et les premières pattes-mâchoires sont rudimentaires et n'entrent pas dans la composition de l'appareil buccal; on les trouve rejetées plus ou moins loin en arrière, et fixés au bord du bouclier thoracique comme les pattes. Les mâchoires de la seconde paire sont représentées par une lame qui est quel-

quefois assez grande et ovalaire, d'autres fois tout-à-fait rudimentaire. Enfin une paire de tubercules, situés un peu en arrière de ces derniers appendices, sont les seuls vestiges des membres qui d'ordinaire constituent les pattes-mâchoires de la première paire. Le thorax est lamelleux comme la carapace, et constitue un second bouclier, dont la portion antérieure seulement est couverte par le premier de ces disques foliacés. Il est en général plus large que long, et strié en travers, mais ne présente aucune trace de division en anneaux. Les pattes s'insèrent tout autour de ce disque. Celles de la première paire sont très petites et cachées sous la carapace; elles sont grêles, cylindriques et unguiculées au bout; tantôt elles sont dépourvues d'appendices, d'autres fois elles donnent naissance, par l'extrémité de leur premier article, à un palpe flabelliforme. Les pattes des cinq ou même des six paires suivantes sont très longues et assez semblables entre elles; de même que les précédentes, elles sont cylindriques et très grêles, et elles naissent chacune sur un prolongement cylindrique du bord de la grande lame thoracique. Leur premier article est très long, et porte à son extrémité un palpe flagelliforme, composé d'un article cylindrique et d'une tigelle multiarticulée, garnie de poils nombreux. Les articles suivans de la branche principale des pattes ne présentent rien de remarquable, mais se détachent très facilement, de façon qu'en général on ne les trouve pas, et que les pattes paraissent terminées par l'appendice cilié dont nous venons de parler. Les pattes de la première paire se terminent par un article grêle et allongé, tandis que celles des quatre ou cinq paires suivantes sont terminées par un ongle assez fort; celles de la dernière sont tantôt semblables aux précédentes, d'autres fois rudimentaires, et dépourvues de palpe flabelliforme. Enfin, on trouve souvent à la base des pattes antérieures, ou

même de tous ces organes , de petits appendices vésiculaires qui paraissent être des vestiges du fouet ou branche externe de ces membres. La disposition de l'abdomen varie : tantôt il est allongé , divisé en anneaux bien distincts , et parfaitement séparé du thorax, qui en recouvre la base; d'autres fois il est confondu avec ce bouclier, et semble n'en être qu'un prolongement. Dans ce dernier cas, il varie encore, car tantôt il est très large à sa base , et occupe tout l'espace compris entre les pattes postérieures ; tandis que d'autres fois il est rudimentaire et logé au fond de l'angle rentrant , formé par le bord de la lame thoracique. Presque toujours on peut y distinguer six ou sept anneaux , dont le dernier forme, avec les appendices du segment suivant, une nageoire caudale plus ou moins développée. Quant aux fausses pattes , fixées sous l'abdomen , leur nombre varie , et elles sont en général rudimentaires.

On connaît un assez grand nombre de ces crustacés singuliers et on les a rangés en trois sous-genres d'après la disposition de l'abdomen , des antennes externes , etc. On peut prendre comme exemples de ces subdivisions les espèces suivantes.

§ 1. PHYLLOSOMES ORDINAIRES.

Phyllosome commun. *Phyllosoma communis*.

Leach. Journal de physique. 1818. p. 307. fig. 11. et Appendice du voyage du capitaine Tuckey au Zaïre. p. 19. pl. 18. fig. 6. — Latreille. Nouv. Dict. d'Hist. nat. et Encyclop. méthod. t. X. p. 119. pl. 354. fig. 1. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 255. p. 44. fig. 5. — Guérin. Magasin zoologique. cl. VII. pl. 8. fig. 1. — Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 477.

§ 2. PHYLLOSOMES BUVICAUDES.

Phyllosome laticorne. *P. laticornis*.

Cancer cassideus. Forster. Nachricht von einem neuer Insekten, Naturforscher. n° 17. 1782. pl. 5. — *Phyllosoma laticornis*. Leach. Voyage du capitaine Tuckey. Suppl. p. 20. pl. 18. fig. 10.

et Journal de Physique. 1818. — Latreille. Encyclop. méthod. t. X. p. 119. pl. 354. fig. 4. — Desmarest. Considérations sur les Crustacés. p. 255. pl. 44. fig. 7. — Guérin. Voyage de la Coquille. Crustacés. pl. 5. fig. 1. et Magasin zoologique. cl. VII. pl. 9. fig. 2. — Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 481.

§ 3. PHYLOSOMES LATICAQUES.

Phyllosome de la Méditerranée. *P. Mediterranea*.

Chrysoma Mediterranea. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. V. p. 88. pl. 3. fig. 9. *Phyllosoma Mediterranea*. Guérin. Magasin zoologique. cl. VII. pl. 13. fig. 2. — Roux. Crustacés de la Méditerranée. pl. 25. — Edwards. op. cit. t. 2. p. 485.

Pour les autres espèces, voyez le mémoire déjà cité de M. Guérin, et le 2^e volume de notre Hist. nat. des Crustacés.

Le genre AMPHYON appartient comme les Phyllosomes à la famille des Stomapodes bicuirassés et a également toute la portion céphalothoracique du corps foliacée et les pattes natatoires, mais s'en distingue facilement par le développement de la carapace qui s'étend jusqu'à la base de l'abdomen, par la structure des antennes et des pièces de la bouche et par le grand développement de l'abdomen dont la conformation est la même que chez les Décapodes macroures.

Esr. Amphyon de Reynaud. *Amphyon Reynaudii*. Edwards. Ann. de la Soc. Entomol. de France. t. 1. p. 336. pl. 12. A. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 485. pl. 18. fig. 8.

La FAMILLE des CARIDIOÏDES qui, dans notre méthode de classification, doit prendre place dans l'ordre des Stomapodes, établit le passage entre les crustacés dont nous venons de parler et les Décapodes macroures; c'est donc ici que nous devrions en traiter, mais le genre Mysis qui constitue le type de ce groupe étant décrit plus loin par notre auteur, nous renverrons à l'article relatif à ce genre ce que nous avons à dire de la famille tout entière. E.

ORDRE SECOND.

CRUSTACÉS HOMOBANCHES.

Branchies cachées sous les bords latéraux d'une carapace couvrant le corps de l'animal, à l'exception de la queue. Mandibules toujours palpigères (1); les yeux pédiculés; la tête confondue avec le tronc; dix pattes propres à la locomotion. (2) .

Les *Crustacés homobanches*, que j'appelais *Cryptobanches* [*Extrait du cours*, etc. p. 89], embrassent les *Décapodes* de Latreille, et sont les plus nombreux et les plus connus de la classe. Ils comprennent les plus grands des crustacés, ceux qui sont les plus cuirassés, c'est-à-dire qui ont la peau la plus dure, la plus solide, ceux enfin qui ont l'organisation la plus perfectionnée; car c'est parmi eux seulement que l'organe de l'ouïe a pu être aperçu.

Leur corps ne paraît composé que de deux parties principales, le tronc et la queue; car la tête est intimement unie au tronc, et se confond avec lui, ou ne se montre qu'en partie et sans mouvement propre. Ce tronc, qui

(1) Ce caractère n'est pas constant et est loin d'avoir l'importance que notre auteur paraît y attacher. E.

(2) Chez quelques crustacés de cet ordre les pattes-mâchoires externes s'allongent au point de devenir des organes de locomotion, et chez d'autres, la dernière paire de pattes thoraciques manque complètement; néanmoins dans l'immense majorité des cas le nombre de ces organes est de cinq paires. E.

embrasse la poitrine et l'abdomen réunis (1) est recouvert par une carapace ou une sorte de cuirasse ; à laquelle on donne le nom de test. Or, la carapace dont il s'agit, est ordinairement très dure, d'une seule pièce, non divisée en segmens transverses, et paraît composée d'un mélange de matière cornée ou animale, et de molécules calcaires plus ou moins abondantes ; c'est une pièce particulière aux animaux de cet ordre (2). Cette même carapace a ses bords repliés en dessous, surtout en devant, pour former avec les hanches des pattes, qui sont réunies et soudées, l'enveloppe commune du corps, à l'exception de la queue. Aussi sait-on que le système musculaire de ces crustacés, se borne aux mouvemens de la queue, des pattes, des organes de la manducation, des antennes, et des pédicules qui portent les yeux (* et de l'estomac).

A l'extrémité antérieure du test, on aperçoit effectivement deux yeux situés chacun sur un pédicule mobile, qui s'insère en général dans une cavité particulière. L'espace supérieur compris entre les yeux s'avance tantôt en forme de chaperon, et tantôt en forme de bec, mais qui est immobile (3). Les antennes, presque toujours au nombre

(1) Les zoologistes s'accordent généralement à désigner sous le nom d'*abdomen* la portion du corps comprise entre le dernier anneau qui porte des pattes ambulatoires, et le segment dans lequel l'anais est situé (c'est-à-dire la queue, suivant Lamarck), et on appelle *thorax* la portion moyenne du corps comprise entre l'abdomen et la tête. E.

(2) Cette opinion n'est pas exacte; la carapace des Décapodes (ou Homobranches de Lamarck) est essentiellement la même que le bouclier dorsal des Stomapodes, et ne paraît être autre chose que l'anneau dorsal de l'un des anneaux de la tête développé au point d'avoir chevauché sur les anneaux voisins. Voyez à ce sujet mon *Hist. des Crust.* t. 1. p. 24. E.

(3) Excepté chez les Salicoques, dont nous avons formé le genre Rhyncocinète (Voyez Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 7. E.

de quatre, se montrent aussi à cette extrémité antérieure du tronc. Elles sont insérées au dessous des pédicules des yeux, tantôt sur une seule ligne, et tantôt sur deux. Les latérales sont ordinairement plus grandes que les intermédiaires; quelquefois celles-ci sont repliées et cachées dans des cavités propres à cet objet. En général, les antennes sont d'autant plus longues que le corps de l'animal est plus étroit et plus allongé.

Les branchies sont pyramidales, feuilletées ou en plume, et disposées sous les bords latéraux de la carapace ou du test. Elles ont de l'adhérence avec les derniers pieds mâchoires et avec les autres pattes. Ainsi chacun de ces pieds-mâchoires et chacune des vraies pattes adhère, par sa base externe, à une branchie cachée. (1)

La bouche est composée : 1° d'un labre représenté par une pièce charnue, saillante entre les mandibules; 2° de deux mandibules osseuses, transverses, élargies triangulairement ou en cuiller, plus ou moins dentées à leur extrémité antérieure, et portant (* presque toujours) un palpe inséré sur leur côté supérieur; 3° d'une languette entre laquelle et les mandibules, le pharynx se trouve placé; 4° de deux paires de mâchoires qui ressemblent à des feuillets et qui sont divisées ou ciliées à leurs bords; 5° de trois paires de pieds-mâchoires dont les deux antérieurs sont encore en feuillets divisés, leur lobe supérieur ayant la forme d'un palpe sétacé, et les quatre postérieurs adhérent chacun, par leur base externe, à une branchie.

Il y a donc en tout, pour former la bouche de ces crustacés, six paires de mâchoires, ou d'espèces de mâchoires; car les deux mandibules portant chacune un palpe flagelliforme, peuvent être considérées comme

(1) La plupart des branchies sont fixées au bord inférieur de la voûte des flancs ou même à des ouvertures particulières pratiquées dans cette cloison latérale. E.

deux mâchoires antérieures, plus fortes que les autres. Enfin les trois paires postérieures, qui ne sont que des mâchoires auxiliaires et qu'on a nommées *pieds-mâchoires*, ne paraissent, comme l'a dit M. Savigny, que les six pattes antérieures de l'animal, qui se trouvant avancées sur la bouche, ont été modifiées, et ne servent plus à la locomotion. En les ajoutant aux dix pattes vraies de l'animal, on retrouve les seize pattes qui sont propres aux crustacés.

Les Crustacés homobranches ont généralement dix pattes propres à la locomotion, indépendamment des fausses pattes que l'on trouve à la queue de certains de ces animaux (1). Dans la plupart, les deux pattes antérieures sont grandes et terminées en pince; quelquefois celles de la deuxième et de la troisième paires, quoique moins grandes, sont aussi terminées en pince. La pince dont il s'agit se compose de deux doigts en opposition, dont l'un est toujours fixe et sans mouvement propre, tandis que l'autre, auquel on donne le nom de pouce, est mobile.

Parmi ces crustacés, les uns ont les pattes antérieures en pince et propres à la préhension, tandis que leurs autres pattes ne sont qu'ambulatoires et se terminent par un ongle pointu. D'autres ont aussi des pattes à pince, et des pattes ambulatoires, mais en outre leurs pattes postérieures sont natatoires et terminées par une pièce aplatie en lame. Enfin il y en a dont toutes les pattes sont natatoires.

La queue de ces animaux est la deuxième partie distincte de leur corps; c'est celle qui n'est pas recouverte par la

(1) Chez tous ces Crustacés, il existe un certain nombre d'appendices abdominaux, mais leur forme varie, et ils ne ressemblent à des fausses pattes ordinaires que chez les Macroures

carapace. Elle ne contient point les viscères (1) mais seulement la partie postérieure du canal intestinal, et offre des segmens transverses, qui sont ordinairement au nombre de sept. Tantôt cette queue est au moins aussi longue que le tronc, étendue dans tous les temps, mais plus ou moins courbée à son extrémité; et tantôt elle est plus courte que le tronc, et on la voit ordinairement repliée et appliquée sous cette partie du corps, ne paraissant point postérieurement. Dans ceux en qui elle est grande, étendue ou découverte, la queue est presque toujours garnie au bout d'appendices ou de lames natatoires; mais dans les autres, elle est nue ou presque nue, et moins épaisse. Les femelles portent leurs œufs à nu, sous leur queue, attachés à des filets.

Ainsi, les Crustacés Homobanches sont très distingués de ceux du premier ordre, en ce que leur tronc embrasse la poitrine et l'abdomen réunis, contient tous les viscères, et qu'il est recouvert par une carapace d'une seule pièce, sous les bords latéraux de laquelle les branchies sont cachées. Quoique fort nombreux et diversifiés entre eux, leur plan d'organisation est dans tous évidemment analogue.

Je partage cet ordre en deux grandes sections qui, chacune, embrassent plusieurs familles, savoir :

1° Les Homobanches macroures;

2° Les Homobanches brachyures.

[La division des crustacée décapodes (ou Homobanches, Lamarck) en deux sections : les Macroures et les Brachyures, est celle adoptée par presque tous les zoologistes, mais elle ne nous paraît pas suffisante pour rendre la classification de ces animaux naturelle; et, d'après des considé-

(1) Le foie et les organes de la génération y sont souvent logés en partie.

rations anatomiques qu'il serait trop long d'énumérer ici, nous avons cru devoir proposer l'établissement d'une troisième division intermédiaire entre ces deux sections. Cette marche permet de rendre tous ces groupes bien plus homogènes et d'y assigner des caractères plus importants et plus précis. Nous réservons le nom de *Brachyures* aux Décapodes à abdomen rudimentaire, dont les orifices générateurs de la femelle sont situés sur le plastron sternal ; la section des *Macroures* comprend les Décapodes essentiellement nageurs, dont l'abdomen très développé se termine par une large nageoire caudale, composée de cinq lames disposées en éventail et porte en dessous une double série de fausses pattes natatoires ; enfin nous réunissons dans la section des *anomoures* les Décapodes dont les orifices générateurs femelles sont situés dans l'article basilaire des pattes de la troisième paire comme chez les macroures, et dont l'abdomen, moins bien conformé pour la natation que chez ces derniers, ne se termine point par une nageoire de cinq lames disposées en éventail ou ne porte pas en dessous une double série de fausses pattes natatoires. Un grand nombre d'autres caractères coïncident avec ces différences de structure et ne permettent pas de confondre nos Anomoures, soit avec les Brachyures, soit avec les Macroures parmi lesquels on les avait répartis. (Voyez recherches sur l'organisation et la classification naturelles des crustacés Décapodes. *Ann. des Sc. nat.* 1^{re} série, t. 25 et *Hist. nat. des Crust.* t. 1, p. 246, et t. 2, p. 163.) E.

Première Section,

HOMOBANCHES MACROURES.

Queue en général, aussi longue ou plus longue que le tronc, n'étant jamais entièrement repliée et cachée au-dessous dans l'état de repos, mais en partie ou totalement à découvert. Tantôt elle offre au bout une nageoire lamelleuse, en éventail, tantôt elle n'a que quelques appendices particuliers rejetés sur les côtés, et tantôt elle est nue, simplement ciliée.

Parmi les crustacés dont les branchies sont cachées sous les bords latéraux du test, ceux de cette première section sont très faciles à distinguer des crustacés brachyures qui composent notre seconde section, et l'ont toujours été effectivement. Ces *Crustacés Macroures*, ou à grande queue, sont en général plus allongés que les *Brachyures*, et n'ont jamais, comme ces derniers, le corps transverse, c'est-à-dire plus large que long. Leur test est presque toujours moins dur, moins calcaire, quoique véritablement crustacé; et, dans le plus grand nombre, leur queue, fort grande et terminée en nageoire, est toujours plus ou moins étendue, en partie ou tout-à-fait à découvert, même dans l'état de repos, et ne s'applique point exactement dans une cavité sous le tronc de l'animal.

La plupart de ces *macroures* sont remarquables par des antennes fort longues, surtout les extérieures; et le plus souvent ces antennes sont multiarticulées. Celles qui sont intermédiaires, quoique plus courtes que les autres, sont presque toujours saillantes et rarement cachées,

comme dans beaucoup de Brachyures. Leurs pieds-mâchoires extérieurs ou intérieurs sont généralement étroits et allongés. Enfin, leurs branchies sont des pyramides, comme celles des brachyures, mais munies des brosses ou des barbes de plumes. 1.

Comme, parmi les productions de la nature, convenablement rangées, tout se résume, au moins dans les classes ou les familles naturelles, les stomatopodes qui forment notre dernière section des Hétérobranches, présentent une transition évidente, par leur grande queue, aux Homébranches macrures, dont il s'agit ici. De même notre dernière famille de ceux-ci [les Paguriens] en offre aussi aux Brachyures : car ces crustacés singuliers, ayant leur queue plus courte que les autres macrures, et munie seulement de quelques appendices sans véritables nageoires, avoisinent de près en près les Brachyures, et sont effectivement les derniers macrures.

Les Homébranches Macrures sont fort nombreux en races diverses, ressemblent plus ou moins aux écrevisses par leur aspect général, et sont quelquefois d'une taille énorme. Dans la plupart, le dessous de la queue est muni de longues pattes, que nous ne citons point dans l'exposition des caractères des genres. Nous les diviserons en quatre familles de la manière suivante.

(1) Chez la plupart des Macrures, les branchies sont lamelleuses comme chez les Brachyures et les Anomoures : ces organes ne sont composés de cylindres disposés en brosse que chez les Écrevisses, les Langoustes, les Scyllares et quelques genres voisins.

DIVISION

DES HOMOBANCHES MACROURES.

§ Les pattes plus ou moins profondément bifides. (*Les fissipes.*)

Nébalie.

Mysis.

§§ Aucune patte véritablement bifide.

(a) Des lames natatoires accompagnant le bout de la queue, et s'ouvrant en éventail pendant la natation.

(b) Les quatre antennes insérées comme sur deux rangs, les latérales étant placées au-dessous des intermédiaires et ayant à leur base une grande écaille. (*Les salicoques.*)

Crangon.

Nika.

Pandale.

Alphée.

Pénée,

Palémon.

(bb) Les quatre antennes presque sur un seul rang. Point d'écailles la base des latérales. (*Les astaciens.*)

Langouste.

Scyllare.

Galathée.

Écrevisse.

Thalassine.

(aa) Point de lames natatoires formant un éventail avec le bout de la queue, celle-ci étant, soit nue, soit ciliée, soit garnie de quelques appendices rejetés sur les côtés. (*Les paguriens.*)

Hermite.

Hippe.

Rémiède.

Albunée.

Ranine.

Les crustacés que notre auteur range dans la division des Macroures Fissipes ne doivent pas rester dans l'ordre des Homobranches (ou Décapodes), et les genres dont il forme la division des Paguricus appartiennent au groupe des Décapodes anomoures; la section des Macroures, telle que nous avons cru devoir la restreindre (1), ne comprend donc que les Salicques et les Astaciens de Lamarck. Quant à la subdivision de ce groupe, nous avons adopté en partie la marche suivie par notre auteur et nous avons conservé sans changements la famille des Salicques, mais nous avons divisé les autres Macroures en trois familles. Voici le tableau de cette classification.

§. Les antennes externes portant au-dessus de leur pédoncule une lame mobile.

1. Cette lame très grande et ovale ou triangulaire : branchies lamelleuses.

FAMILLE DES SALICQUES.

(2), Antennes insérées sur deux rangs; point de mains subcylindriques; petites grêles et portant presque toujours à leur base un appendice lamelleux plus ou moins développé; celles de la troisième paire souvent didactyles.

* Rostre en général petit ou nul; abdomen extrêmement long et comprimé.

TRIBE DES PÉNÉENS.

Genres : Acète.
Sergeste.
Pasiphée.
Éphyre.
Oplophore.
Euphème.
Sicyonie.
Pénée.
Stélope.

(1) Voy. p. 336.

(bb) Pattes robustes et ne présentant presque jamais de vestiges d'appendice flabelliforme ni de palpes.

(c) Rostre grand et lamelleux, comprimé et dentelé; pattes des deux premières paires en général didactyles, mais de grosseur médiocre; celles des trois dernières paires toujours monodactyles.

TRIBU DES PALÉMONIENS.

Palémon.

Lysmate.

Pandale.

Rhynchocinète.

Hippolyte.

Gnathophyle.

(cc) Rostre très petit et plus ou moins aplati; pattes des trois dernières paires monodactyles, mais celles de l'une des trois premières paires très fortes.

TRIBU DES ALPHÉENS.

Hyménosome.

Caridine.

Atye.

Nika.

Automnée.

Pontonie.

Athanase.

Alphée.

(aa) Antennes internes insérées sur la même ligne que les externes; pattes de la première paire terminées par une main subchéliforme.

TRIBU DES CRANGONIENS.

Crangon.

AA. Cette lame très petite et hastiforme; branchies en brosse.

FAMILLE DES ASINACHES.

Eusima.

Eusima.

Euphyas.

§ Les antennes antérieures pas de leur moitié au dessus de leur pédoncule.

B. Deuxième paire; corps allongé; abdomen court et très long.

FAMILLE DES THALASSINIENS.

2. Ayant des appendices branchiaux antérieurs faisant forme pectiniforme.

TRIBE DES CANTHOCALANCHES.

Callinide, etc.

22. N'ayant pas d'appendices branchiaux antérieurs sous l'abdomen.

TRIBE DES CRYPTOCALANCHES.

Thalassine.

Gebi.

Arie.

Callinace.

Clausothoe.

23. Plastron court très long; corps déprimé; abdomen court ou médiocre.

FAMILLE DES MACROURES CUTRASSÉS.

c. pattes de la cinquième paire semblables aux précédentes, et non répliquées au dessus d'elles.

f. Toutes les pattes monodactyles; celles de la première paire quelquefois imparfaitement subchéliformes.

g. Antennes externes cylindriques et de forme ordinaire.

TRIBU DES LANGOUSTIENS.

Langoustes.

gg. Antennes externes très longues et foliacées.

TRIBU DES SCYLLARIDES.

Scyllare.

Ibacus.

Thène.

ff. pattes des trois premières paires terminées par une pince didactyle.

TRIBU DES ÉRYONS.

Éryons.

ee. Pattes de la cinquième paire très grêles, non ambulateuses, et repliées au-dessus de la base des précédentes.

TRIBU DES GALATHÉIDES.

Galathée.

Grimothée.

E.

LES FISSIPES.

Les *Fissipes*, ou les Schizopodes de Latreille, forment la première division des Macroures; ce sont de petits crustacés nageurs, à corps mou, allongé, et d'une forme analogue à celle des Salicoques. Ils offrent cette particularité remarquable d'avoir toutes les pattes ou plusieurs pattes plus ou moins profondément bifides. Ces pattes sont uniquement propres à la natation. Les femelles portent leurs œufs dans une capsule bivalve, à l'extrémité postérieure de la poitrine. On y rapporte les deux genres qui suivent.

NÉBALIE. (*Nebalia*.)

Quatre antennes : les deux latérales beaucoup plus longues, situées au-dessous des intermédiaires, abaissées et pédiformes. Deux yeux très rapprochés, sessiles, mais mobiles.

Un test couvrant le tronc; son extrémité antérieure offrant un bec avancé, pointu. Queue étendue, fourchue au bout; ses deux appendices terminés chacun par une soie. Quelques fausses pattes courtes, insérées sous la poitrine. Dix autres pattes parfaites, presque semi-bifides.

Antennæ quatuor lateralibus duabus multò longioribus, infra intermedias insertis, inflexis, pediformibus. Oculi duo, valè approximati, sessiles, mobiles.

Testa truncum obtegens : extremitate anticâ rostro acuto porrecto terminatâ. Cauda extensa, apice furcata; appendicibus setâ terminatis.

OBSERVATIONS. — Le genre *Nebalia*, établi par Leach, porte sur un crustacé qui a tout-à-fait l'aspect d'un Branchiopode, qui semblerait même avoisiner nos Limules (les *apus* pour d'autres); nous fondons le même genre d'après les caractères de l'espèce que Oth. Fabricius a décrite. Ses yeux mobiles, quoique paraissant sessiles, et n'étant point posés sur le test, nous semblent autoriser le rang de ces crustacés parmi les homobranches. L'animal a quelques pattes natatoires sous la queue. Il retient ses œufs à nu sous la poitrine, entre ses fausses pattes.

[Les Nébalies n'ont pas de branchies proprement dites, et ne doivent pas être placées dans l'ordre des Décapodes (ou Homobranches de Lamarck), mais se rapprochent des Apus, des Branchippes et des autres Branchiopodes. En arrière de l'appareil buccal, on trouve sous la carapace de ces petits crustacés, une série de huit paires de pattes lamellenses et branchiales qui sont serrées les unes contre les autres, et insérées à huit anneaux thoraciques parfaitement distincts et fixés sous le bouclier qui les recouvre; à la suite de ces anneaux thoraciques, on trouve

8 segmens plus développés, dont les 4 premiers portent chacun une paire de fausses pattes natatoires, analogues à celles fixées aux trois premiers anneaux abdominaux des Amphipodes; deux paires de membres se voient sur les cinquième et sixième anneaux abdominaux; le pénultième segment ne porte pas d'appendices; enfin, le dernier donne insertion à deux lames caudales triangulaires (voy. deux notes à ce sujet, insérées dans les *Annales des Sciences naturelles*, t. 13. p. 297, et 2^e série. t. 3. p. 309).

E.

ESPÈCES.

1. Nébalie glabre. *Nebalia glabra*.

N. antennis pedibus caudaque glabris.

Cancer bipes. Oth. Fabr. Fauna groenland. p. 246. t. 1. f. 2.

Habite les rives de l'Océan boréal, à l'embouchure des fleuves.

2. Nébalie ciliée. *Nebalia ciliata*.

N. antennis pedibus caudaque ciliatis.

Monoculus rostratus. Montag. Trans. Soc. Linn. vol. XI. p. 14. t. 2. f. 5.

Nebalia Herbstii. Leach. Trans. Linn. vol. XI. p. 351.

Habite l'Océan Européen.

* Ajoutez : *Nebalia Geoffroyi*. Edwards. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 13. p. 297. pl. 15. et 2^e série. t. 3. p. 309.

MYSES. (Mysis.)

Quatre antennes sétacées; les latérales plus longues, insérées au-dessous des intermédiaires, ayant une grande écaille à leur base; les intermédiaires bifides. Deux yeux pédiculés.

Corps allongé, mou; un test presque membraneux couvrant le tronc. Queue étendue, ayant à son extrémité des lames natatoires. Quatorze pattes, profondément bifides, paraissant former quatre rangées.

Antennæ quatuor setacæ: lateralibus longioribus infra

intermedias insertis; intermediis bifidis. Oculi duo pedunculati.

Corpus elongatum, molle. Testa submembranacea, truncum obtegens. Cauda extensa; extremitate lamellis aliquot natatoriis. Pedum paria septem: pedibus profunde bifidis, seriebus quatuor simulantibus.

OBSERVATIONS. — Le genre *Mysis*, établi par Latreille, est bien tranché et fort remarquable par la conformation des pattes des crustacés qui y appartiennent. Ces petits crustacés, à corps mou et allongé, n'ont que deux rangées de pattes, et semblent en avoir quatre, chaque patte étant profondément divisée en deux. Aucune de ces pattes n'est terminée en pince. Ils tiennent aux Crangons et à quelques autres crustacés macroures, par l'écaille oblongue et ciliée qui est à la base de leurs antennes latérales.

Les *Mysis* ressemblent beaucoup aux Salicoques par la forme générale de leur corps, mais manquent complètement de branchies et sont pourvus de six paires de pattes natatoires; ils établissent le passage entre les Salicoques et les Phyllosomes, et constituent le type d'une famille particulière qui prend place dans l'ordre des Stomapodes, et a été désignée sous le nom de *Caridioides*. (Voyez, pour plus de détails sur la structure de ces crustacés, un mémoire de M. Thompson imprimé à Cork, dans un recueil intitulé *Zoological Researches*, et le second volume de notre *Hist. nat. des Crustacés*.) ● E.

ESPÈCE.

1. *Mysis sauteur. Mysis saltatorius.*

M. caudā spinis duabus brevibus terminatā foliolisque duobus longioribus ciliatis incumbentibus.

Cancer pedatus. O. Fabr. Fauna groenl. p. 243.

Mysis saltatorius. Latr. Gen. 1. p. 56.

An mysis spinulosus? Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 350.

* *Mysis spinulosus.* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 242.

* *Mysis Leachii.* Thompson. Zoological Researches. t. p. 27.

* *M. spinulosus.* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 457.

Habite la mer du Groenland.

2. Mysis oculé. *Mysis oculatus*.

M. caudá flexuosá muticá tetraphyllá : lamellis duabus majoribus rotundatis ciliatis.

Cancer oculatus. O. Fabr. F. groenl. p. 245. tab. 1. f. 1. A. B.

Habite la mer du Groenland.

3. Mysis ondulé. *Mysis flexuosus*.

M. caudá flexuosá muticá apice hexaphyllá ; antennis longissimis.

Cancer flexuosus. Mull. Zool. Dan. p. 34. tab. 66.

Habite la mer du Nord. Muller ne dit point qu'il ait des pattes bifides.

† Ajoutez :

* *Mysis vulgaris*. Thompson. Zoological Researches. p. 30. pl. 4. fig. 1-12. — Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 459.

* *Mysis longicornis*. Edwards. loc. cit. pl. 26. fig. 7-9.

Etc.

[Le genre *CYNTHIA* de M. Thompson se rapproche extrêmement des *Mysis*, mais s'en distingue par l'existence d'un appendice branchial, fixé à la base des fausses pattes abdominales, et par la conformation des membres qui, d'ordinaire, constituent les pattes-mâchoires de la seconde paire et qui ici s'allongent de façon à devenir des pattes natatoires, ne différant que fort peu des suivantes; le nombre total de ces organes est, par conséquent, de sept paires.

Esp. *Cynthia Thompsonii*; *Cynthia*. Thompson. Zool. Researches. p. 57. pl. 6; Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 462.

Cynthia armata. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 463.

Notre genre *THYSANOPODE* se rapproche des *Cynthies* par la conformation générale du corps et par la structure des pattes; mais le nombre de ces organes est de huit paires, et il existe à la base de chacun d'eux une branchie rameuse qui ressemble à celles des Squilles et qui flotte à l'extérieur.

Esp. *Thysanopoda tricuspidata*. Edw. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 19. p. 336. pl. 19 et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 463. pl. 26. fig. 1.

Le genre *Podopsis* de M. Thompson paraît devoir appartenir aussi à la tribu des Mysiens, mais est trop imparfaitement connu pour que l'on puisse le caractériser. (Voyez Thompson, op. cit. pag. 59 et Edw. Hist. des crust. T. 2. p. 467.)

Enfin le genre *LUCIFER*, bien qu'il s'éloigne des *Mysis* par l'absence d'appendices analogues au palpe ou au fouet, appartenant aux pattes thoraciques, par le nombre de ces pattes qui est de quatre paires seulement et par la forme générale du corps, paraît devoir rentrer dans la même famille et y constituer le type d'une tribu particulière. L'un des traits les plus remarquables de l'organisation de ces Crustacés est la longueur excessive de la portion antérieure de la tête, la brièveté extrême de la partie du corps occupée par la bouche et constituant le thorax, et le grand développement de l'abdomen.

Esq. *Lucifer typus*, Thompson. Zool. Resear. pl. 7. fig. 2. — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 469.

Lucifer Reynaudii, Edwards. loc. cit. pl. 26. fig. 10.

LES SALICOQUES.

Ces crustacés macroures tiennent beaucoup aux Astaciens par leur aspect; mais ils en sont très distincts et constituent une famille naturelle, dont le caractère est d'avoir les quatre antennes disposées comme sur deux rangs (1), les latérales ou extérieures étant situées au dessous des intermédiaires, et ayant à leur base une écaille grande et oblongue, qui recouvre ou dépasse leur pédoncule. Ces antennes sont toujours avancées, les intermédiaires sont terminées par deux ou trois filets, et les latérales, toujours sétacées, sont fort longues.

(1) Excepté chez les Crangons où ces organes sont insérés à-peu-près sur la même ligne transversale. E.

Le corps des Salicoques est ordinairement arqué, comme bossu. Leur test a en général moins de solidité que celui des Astaciens, offre souvent, comme eux, antérieurement, un bec immobile, comprimé, caréné, plus ou moins long (1). Ceux des Salicoques qui ont des pinces, ne les ont jamais larges. On rapporte à cette famille les six genres qui suivent. (* Voyez pour les caractères et les subdivisions de cette famille les additions de la page 340.)

CRANGON. (Crangon.)

Quatre antennes: deux intermédiaires supérieures, courtes, bifides; deux latérales inférieures, longues, sétacées, ayant une écaille oblongue adhérente à leur base. Saillie antérieure du test fort courte.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes onguiculées; les deux antérieures à pince submonodactyle: le doigt immobile étant très court.

Antennæ quatuor: intermediis duabus superioribus brevibus bifidis; lateralibus inferis longis setaceis: squamâ oblongâ pedunculo annexâ. Processus anticus testæ brevissimus.

Corpus caudaque astacorum. Pedes decem unguiculati. Antici duo chelâ submonodactylâ; digito immobili brevissimo.

OBSERVATIONS. — Les *Crangons* ont le corps subcylindrique, atténué en cône postérieurement, et sont remarquables tant par leur rostre fort court, que par les pinces presque monodactyles de la première paire de leurs pattes. On n'en connaît encore qu'un petit nombre.

(1) C'est ce prolongement qu'on désigne sous le nom de *Rostre*. E.

ESPÈCES.

1. Crangon boréal. *Crangon boreas*.

C. thoracis lateribus dorsique carinat aculeatis.

Cancer boreas. Philippi. It. bor. p. 194. pl. XI. f. 1.

Herbst. canc. tab. 29. f. 2.

Crangon boreas. Fab. Suppl. p. 409.

* Latreille. Hist. des Crust. t. 6. p. 267. Règne anim., etc.

* Sabine. Append. au voyage du cap. Parry. p. 57.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 342.

Habite l'Océan boréal.

2. Crangon vulgaire. *Crangon vulgaris*.

C. testis laevi; rostro brevi adentulo. Lat.

Crangon vulgaris. Fab. Suppl. p. 410.

Latr. Gen. 1. p. 54. et Hist. nat., etc., 6. p. 267! pl. 55. f. 1. 2.

Herbst. Canc. tab. 29. fig. 3. 4.

* *Astacus crangon*. Pennant. Brit. Zool. t. 4. pl. 15. fig. 30.

* Olivier. Encyclop. t. 6. p. 348. pl. 294. fig. 4 à 7.

* *Crangon vulgaris*. Leach. Edinb. Encyc. sup. t. 7. pl. 221. et Malacos. Pod. Brit. pl. 37. B.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 218. pl. 38. fig. 1.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 341.

Habite l'Océan européen, près des côtes.

3. Crangon épineux. *Crangon spinosus*.

C. thorace tricarinato : carinis trispinosis.

* *Cancer catapractus*. Oliv. Zool. Adriat. pl. 3. fig. 1.

Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 346.

* *Egeon loricatus*. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. pl. 1. fig. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 219.

* *Crangon catapractus*. Edw. op. cit. p. 343.

Habite les côtes méridionales de l'Angleterre.

[M. Eudes Deslongchamps a découvert dans le calcaire jurassique des environs de Caen deux crustacés fossiles qui paraissent être très voisins des Crangons. (Voyez Deslongch. mémoire de la Soc. Linéenne de Normandie t. 5 p. 42. pl. 2 fig. 1-3 et Edw. Histoire des Crust. t. 2 p. 345.)

Un des Crustacés fossiles dont Germar a formé le genre *Mecochirus*, paraît établir le passage entre les précédents et les écrevisses; il est caractérisé principalement par les pattes antérieures d'une longueur excessive et terminées par une pince didactyle très grêle, et par les pattes des deux paires suivantes qui sont courtes et terminées par une petite main subchéliforme, aplatie, et très semblable à celle des Crangons (Voyez Brown. *Lethæa*, p. 476, pl. 27, fig. 16). Cet auteur rapporte à la même division générique le Crustacé fossile figuré par Bajer (*Oryctogr. Norica*. tab. 8, fig. 4, 9; reproduit par M. Desmarest, *Crust. foss.* pl. 5, fig. 10; et par Brown. *op. cit.* pl. 27, fig. 1), et plusieurs autres espèces. (Voyez *Lethæa*, p. 475.)

+ Genre **ATYÆ** (*Atya*).

Les Crustacés, dont Leach a formé le genre *Atya*, sont très remarquables par la grosseur des pattes des trois dernières paires, et la conformation singulière de celles des deux paires antérieures. Leur forme générale est à-peu-près la même que celle des écrevisses (aux pinces près), la carapace est un peu comprimée et armée d'un petit rostre horizontal; les yeux sont très courts, mais ne sont pas recouverts par la carapace, comme cela a lieu dans le genre *Alphée*. Les pattes thoraciques des deux premières paires qui sont très courtes, et terminées par une petite main ovale didactyle, qui est fendue dans toute sa longueur, et articulée avec le carpe par le milieu de son bord inférieur. Les pattes de la troisième paire sont grandes et extrêmement grosses jusqu'au haut; le tarse qui les termine est fort, mais excessivement court, et loge entre deux épines de l'article précédent. Les pattes des deux paires suivantes ont la même forme, mais sont plus courtes et moins grosses. Toutes, à l'exception de celles de la 5^e paire,

portent au côté externe de leur article basilaire un petit appendice lamelleux. Enfin l'abdomen est gros et trapu.

On ne connaît qu'une espèce.

L'ATYB ÉPINEUSE. *Atya scabra*.

Athys scabra. Leach. Trans. of the Linn. Soc. v. XI. p. 345.

Atya scabra. Ejusd. Zool. Miscel. v. III. pl. 131.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 217. pl. 37. fig. 2.

Roux. Salicoques. p. 27.

Edw. Hist. nat. des Crus. t. 2. p. 378. pl. 24. fig. 15-19.

Habite les côtes du Mexique.

E.

NIKA. (Nika.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bifides ; deux latérales inférieures simples , très longues , ayant une écaille étroite à leur base. Saillie antérieure du test courte , à trois pointes.

Corps et queue comme dans les écrevisses. Dix pattes : une seule de la première paire didactyle.

Antennæ quatuor : intermediis duabus superis bifidis ; lateralibus inferis simplicibus longissimis : squamâ angustâ basi annexâ. Processus anticus testæ brevis, tricuspidatus.

Corpus et cauda ut in Astacis. Pedes decem ; primi paris unico didactylo.

OBSERVATIONS. — Les *Nikas*, publiés par M. Risso, sont singuliers en ce qu'ils n'ont qu'une seule des deux pattes antérieures qui soit terminée en pince. Leach donne au même genre le nom de *Processe*, et cependant ne l'a point inséré dans sa distribution des crustacés publiée dans le XI^e volume des *Transactions de la Société linéenne*. Il paraît que l'anomalie des deux pattes antérieures des *Nikas* est constante , et appartient à des habitudes particulières de ces crustacés.

ESPÈCE.

1. *Nika comestible. Nika edulis.*

N. glaberrima, *rubro carnea*, *luteo punctata*; *manibus brevibus compressis : unica didactyla.*

Nika edulis. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 85. pl. 3. f. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 230.

* *Processa edulis.* Latr. Règne anim. t. 4. p. 95.

* *Nika edulis.* Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 43.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 364.

Habite la Méditerranée, près des rivages.

Etc.

Voyez les *N. variegata* et *N. sinuolata* du même auteur.

PANDALE. (Pandalus.)

Antennes et corps comme dans les Alphées. Dix pattes; la deuxième paire seulement didactyle.

Antennæ, corpus ut in Alpheis. Pedes decem; pari secundo chelato.

OBSERVATIONS. — Il paraît que les Pandales avoisinent beaucoup les Alphées par leurs rapports, et que, pour les pattes qui sont chélifères, l'article qui précède la pince est aussi muni de ligues transverses et composé de plusieurs autres petits articles.

[Les Pandales se rapprochent des Palémons bien plus que des Alphées ou d'aucun autre Salicoque. La forme générale de leur corps, la disposition de leur rostre, et d'autres caractères ne permettent pas de les éloigner des premiers, mais ils s'en distinguent par le nombre de filets terminaux des antennes supérieures qui est de deux seulement, et par la conformation de leurs pattes dont les deux antérieures sont monodactyles; celles de la seconde paire se terminent par une petite main didactyle, mais sont filiformes et ont le carpe multi-articulé. E.

ESPÈCES.

1. Pandale annulicorne. *Pandalus annulicornis*.

P. rostro multidentato ascendente apice emarginato ; antennis inferis rubro annulatis , internè spinulosis.

Pandalus annulicornis, Leach. Trans. Soc. Linn. XI, p. 346.

Ejnsd. Malacostr. Ped. Britan, tab. 40.

* Latr. Encyclop. Ins. t. 10, pl. 322. fig. 1 à 4.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 220. pl. 38. fig. 2.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 384.

Habite la mer Britannique et nos côtes.

Etc.

Voyez *Cancer narval*. Herbst, cancr. pl. 28. f. 2.

ALPHÉE (Alpheus.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bifides ; deux latérales inférieures sétacées, ayant une grande écaille annexée à leur base. Saillie antérieure du test avancée en bec.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes ; les quatre antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor : intermediis duabus superioribus bifidis , lateralibus inferis setaceis ; squamâ magnâ basi annexâ. Processus anticus testæ in rostrum prorectus.

Corpus caudaque Astacorum. Pedes decem : quatuor anticis chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Alphées* ont le corps cylindracé-conique et un rostre comme les Palémons. Ce qui les distingue des Pénées, c'est principalement parce qu'ils n'ont que les quatre pattes antérieures qui soient munies de pinces. Le carpe ou l'article qui précède immédiatement la pince, est, dit M. Latreille, strié transversalement et comme divisé en plusieurs petits articles.

[Les *Alphées* n'ont que fort peu d'analogie avec les Pénées, et

se rapprochent davantage des Crangons. Un caractère qui les distingue de tous les autres Macroures consiste dans la manière dont la carapace se prolonge au-delà des yeux, et constitue au-dessus de chacun de ces organes une petite voûte. Leur rostre ne ressemble pas à celui des Palémons, mais est très petit et droit; les pattes de la première paire sont grosses et terminées par une forte main didactyle; celles de la deuxième paire, également didactyles, sont au contraire grêles et filiformes. E.

ESPÈCES.

1. Alphée avare. *Alpheus avarus*.

A. chelis inæqualibus, difformibus; rostro brevi subulato. F.

Alpheus avarus. Fab. Suppl. p. 404. Lat. Gen. 1. p. 53.

Habite aux Indes orientales, dans les mers.

* Cette Alphée nous paraît devoir appartenir à la même espèce que l'Alphée brévirostre décrit par Olivier sous le nom de Palémon.

Voyez notre Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 350.

2. Alphée monopode. *Alpheus monopodium*.

A. testa lævi; pruni paris pedibus inæqualissimis: manu dextrâ maximâ.

Crangon monopodium. Bosc. Hist. nat. des Crust. 2. p. 98. pl. 13. fig. 2.

Habite la mer des Indes. Cet animal paraît avoir beaucoup de rapports avec l'Alphée avare.

3. Alphée marbré. *Alpheus marmoratus*.

A. rostro ascendente, apice fisso, suprâ sexdentato, subtus quadridentato, hirto; palpis posticis porrectis, chelis longioribus.

Palæmon marmoratus. Oliv. Encycl. no 22.

* *Hippolyte marmoratus*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 379. pl. 25. fig. 8.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Péron. Mus. n°

Etc.

Voyez d'autres espèces dans Fabricius. Latreille rapporte à ce genre l'*Hippolyte* de M. Leach. (1)

(1) Le genre HIPPOLYTE de Leach se rapproche beaucoup
23.

Ajoutez :

- * *Palemon bidens*. Olivier. Encycl. t. 8. p. 663; *Alpheus bidens*.
Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 353. pl. 24. fig. 11 et 12.
 - * *Alpheus dentipes*. Guérin. Expéd. scient. de Morée par M. Bory
St-Vincent. p. 39. pl. 27. fig. 3.
- Etc., etc.

+ Genre PONTONIE. *Pontonia*.

Les Salicoques, dont Latreille a formé cette division générique, ressemblent aux Alphées par la forme générale de leur corps, mais n'ont pas les yeux cuirassés comme chez ces animaux, et les grosses pattes didactyles qu'on leur remarque sont celles de la seconde paire au lieu d'être celles de la première paire. Les antennes supérieures sont terminées par deux filets multi-articulés. Par divers détails de leur organisation, ils se rapprochent aussi beaucoup des Palémons.

Exemple Pontonie : *Cancer custos*? Forskael. Descript. anim. p. 94.
Astacus tyrrhenus. Petagna. Ent. pl. 5. fig. 5. (Cité d'après M. Risso.)

des Palémons, et se compose de Salicoques qui ont également le front armé d'un grand rostre lamelleux, relevé et dentelé, et les pattes des deux premières paires didactyles, mais qui, de même que les Alphées, ont les antennes supérieures terminées seulement par deux filets multi-articulés, distincts; les pattes de la première paire sont courtes et assez grosses, et celles de la seconde paire filiformes, et à carpe multi-articulé. On connaît un grand nombre d'espèces appartenant à ce genre. (Voyez pour plus de détails le second volume de notre Hist. nat. des Crustacés).

Le genre *Rhynchocinetes* ne diffère des Hippolytes que par la conformation anormale du rostre qui est articulé par ginglyme sur le front, et peut s'élever ou s'abaisser. On n'en connaît qu'une espèce, le *Rhynchocinetes typus*. Edwards. Ann. des Sc. nat. 2. série. t. 7. pl. 4 C. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 383).

E.

Alpheus tyrrhenus Risso. Crust. de Nice. pl. 2. fig. 2.

Gnatophyllum tyrrhenus. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 229.

Alpheus pinnophylax. Otto. Mém. de l'Acad. des cur. de la nat. de Bonn. t. XIV. pl. 21, fig. 1. et 2.

Pontonia tyrrhena. Latreille. Encycl. pl. 326. fig. 10. (d'après Risso) et Règne anim. de Cuvier. 2^e édit. t. 4. p. 96.

Callianassa tyrrhenus. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. 54.

Pontonia custos. Guérin. Expéd. de Morée de M. Bory de Saint-Vincent. partie zool. p. 36. pl. 27. fig. 1.

Pontonia tyrrhena. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 360.

Etc.

[Le genre **AUTONOMÉE**, établi par M. Risso, et adopté par Latreille et par M. Desmarest, paraît avoir beaucoup d'analogie avec les Pontonies, dont il se distingue par l'absence de pinces aux pattes de la seconde paire. (Voyez Risso. Crust. de Nice, p. 166; Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 231, etc.)

+ Genre **CARIDINE**. *Caridina*.

Cette petite division générique établit le passage entre les Pontonies et les Atyes, et paraît avoir de l'analogie avec les Hyménocères. Par l'ensemble de leur organisation, ces Crustacés ressemblent extrêmement aux Pontonies, mais ils en diffèrent par la conformation anormale de leurs mains. Les pattes antérieures sont très courtes, et leur carpe à-peu-près triangulaire se termine antérieurement par un bord concave, qui reçoit la base de la main fixée à son angle inférieur; enfin la main est courte, et terminée par deux *doigts* lamelleux profondément creusés en cuiller. Les pattes de la seconde paire sont plus longues et plus grêles; la carpe est de forme ordinaire, mais la main est conformée comme celle de la patte précédente. Enfin

les pattes des trois dernières paires sont grêles et à-peu-près de même longueur.

ESP. *Caridina typus*. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 363. pl. 25 bis. fig. 4 et 5.

† Genre HYMÉNOCÈRE *Hymenocera*.

Le genre HYMÉNOCÈRE de Latreille paraît se rapprocher aussi des Alphées, mais ne nous est que très imparfaitement connu. Le caractère le plus remarquable de cette division est tiré de la conformation des pieds; ceux de la première paire sont terminés par un long crochet, bifide au bout, et à divisions très courtes; les deux suivans sont fort grands: leurs mains et leur doigt mobile sont dilatés, membraneux et comme foliacés. Les pattes-mâchoires externes sont pareillement foliacées et recouvrent la bouche. Enfin les antennes supérieures se terminent par deux filamens, dont le supérieur est membraneux, dilaté et foliacé. (Voyez Règne anim. de Cuvier, t. 4, p. 95, etc.)

† Genre GNATHOPHYLLE. *Gnathophyllum*.

Le genre Gnathophylle de Latreille ou *Drimo* de M. Risso se compose de Salicoques qui ressemblent aux Hippolytes par la forme générale de leur corps, la structure des antennes, et l'existence de deux paires de pattes didactyles, mais qui n'ont pas le carpe des pattes de la seconde paire multi-articulé, et qui se distinguent de tous les autres Palémoniens par les pattes-mâchoires qui, au lieu d'être allongées, grêles et subpédiformes, sont foliacées et operculiformes à-peu-près comme chez les Callianasses.

ESP. *Gnathophile élégante*.

Alpheus elegans. Risso. Crust. de Nice. pl. 2. fig. 4.

Gnathophyllum elegans. Latreille. Règne anim. t. IV. p. 96.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 228.

Drima elegans, Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. 71. pl. 2. fig. 4.

Roux. Salicoques. p. 28.

Gnathophyllum elegans. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 369. E.

PÉNÉE. (*Penæus*.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bifides ; deux latérales inférieures simples, ayant une écaille annexée à leur base. Saillie antérieure du test avancée en bec.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes : les six antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor : intermediis duabus superioribus bifidis ; lateralibus inferis simplicibus : squamâ basi annexâ. Processus anticus testæ rostriformis.

Corpus caudaque astacorum. Pedes decem : anticis sex didactylis.

OBSERVATIONS. — Les *Pénées* ressemblent aux *Alphées* et aux *Palémons* par la forme de leur corps, par la saillie de leur rostre, etc. ; mais ils ont les six pattes antérieures terminées en pince, et leurs antennes intermédiaires n'ont que deux filets.

[Les *Pénées* sont remarquables par la longueur et l'aplatissement latéral de leur abdomen, et par le petit appendice lamelleux qui est fixé à la base de leurs pattes, et qui représente le palpe ou branche moyenne des membres thoraciques des *Mysis*, etc. Du reste, les pattes et les fausses pattes sont conformées de la manière ordinaire. E.

ESPÈCES.1. *Pénée monodon. Penæus monodon.*

P. rostro porrecto ascendente, suprâ serrato, subtus tridentato.

Penæus monodon. Fab. Supp. p. 408.

Lat. Gen. 1. p. 54.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 225.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 416.

Habite l'Océan Indien.

2. *Pénée sillonné. Penæus sulcatus.*

P. thorace trisulcato ; rostro serrato, subtus subtridentato, antenarum squamis brevioris.

Palæmon sulcatus. Oliv. Encycl. n. 7.

Squilla. Roud. de pisc. lib. 18. cap. 2. p. 547.

* *Cancer herathurus*. Forskael. Descrip. anim. quæ in itinere observ. p. 95.

* *Palæmon sulcatus*. Oliv. Encycl. t. VIII. p. 661.

* *Penæus sulcatus*. Latreille. Encycl. t. X. p. 51. et Règne anim. de Cuv. t. IV. p. 92.

* *Alpheus caramote*. Risso. Crust. de Nice. p. 90.

* *Penæus caramote*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 225.

* Risso. Hist. nat. de l'Eur. t. V. p. 57.

* Edwards. Règne anim. de Cuvier. atlas Crust. pl. 50. fig. 1. e Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 413. pl. 25. fig. 1.

Habite la Méditerranée.

Etc.

(* Voyez pour les autres espèces notre Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 413. , etc.)

† Genre **SICYONIE**. *Sicyonia*.

Le genre que nous avons établi sous le nom de Sicyonie est très voisin des Pénées auxquels il ressemble par la conformation générale du corps, par la structure des antennes et des pattes, etc. Mais il s'en distingue par l'existence d'une seule lame natatoire à chacune des fausses pattes, fixées aux 5 premiers anneaux de l'abdomen, par l'absence d'appendices lamelleux à la base des pattes thoraciques, par le nombre des branchies, etc. Il est aussi à noter que les tégumens de ces crustacés sont plus durs que chez la plupart des Salicoques.

Esp. Sicyonie sculpté. *S. sculpta*.

Edwards. Ann. des Sc. nat. 1^{re} série. t. 19. p. 339. pl. 9. fig. 1-8 ; et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 409. — *Cancer carinatus* ? Oliv. Zool. Adriat. pl. 3. fig. 2.

SICYONIE CARÉNÉ.

Palæmon carinatus. Olivier. Encyclop. t. VIII. p. 667.

Sicyonia carinata. Edwards. Annales des Sc. nat. 1^{re} série. t. XIX. p. 344. pl. 9. fig. 44. et Hist. des Crust. t. 2. p. 410.

Etc.

Le Crustacé fossile, désigné par Schlotheim sous le nom de *Macrourites fuciformis* (Petrefacten Nachtr. pl. 2. fig. 2), nous paraît être intermédiaire entre les Sicyonies, les Palémons et les Hippolytes, mais devoir prendre place dans la tribu des Pénéens. La carapace est très courte, et surmontée d'une crête médiane dentelée qui en occupe toute la longueur, et qui se termine antérieurement par un petit rostre infléchi et dentelé en dessus. L'abdomen paraît être également caréné en dessus : enfin, les pattes des trois premières paires sont grêles, tandis que celles de la seconde paire sont très grosses, quoique de longueur médiocre. Il devra probablement former le type d'un genre particulier.

† Genre **STENOPE**. *Stenopus*.

Les Sténopes ressemblent aussi aux Pénéés par l'existence de pinces didactyles aux pattes des trois premières paires; mais s'en distinguent par la forme moins aplatie de leur corps; par le grand développement des pattes de la troisième paire, par la structure multi-articulée des deux derniers articles des pattes de la quatrième et de la cinquième paire qui sont filiformes, par la longueur extrême des filets antennaires et par l'absence d'appendices lamelleux à la base des pattes.

Esp. Stenope hispide. *S. hispidus*.

Squilla groenlandica. Seba. Mus. t. III. pl. 21. fig. 6 et 7. (individu mutilé.)

Cancer astacus longipes. Herbst. Krabben. t. 2. pl. 31. fig. 2.

Palemon hispidus. Olivier. Encyclop. t. VIII. p. 666.

Stenopus hispidus. Latreille. Règne anim. de Cuvier. 2^e édit. t. 4. p. 93.

Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 227.

Roux. Salicoques. p. 23.

Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. 3^e édit. Crust. pl. 50. fig. 2

† Genre **PASIPHÉE**. *Pasiphæa*.

Le genre Pasiphée, fondé par M. Savigny, comprend des Crustacés qui établissent à plusieurs égards le passage entre les Pénéés et les Sergestes, et qui sont remarquables par l'aplatissement latéral de leur corps. Leur rostre est très court ou même rudimentaire, et la carapace beaucoup plus étroite en avant qu'en arrière. Les mandibules sont fortement dentées et dépourvues de tige palpiforme. Les pattes-mâchoires externes sont très longues, grêles et pédiformes; à leur base se trouve un palpe lamelleux et cilié, semblable à celui des Pénéés. Les pattes thoraciques portent aussi suspendu au côté externe de leur article basilaire un appendice lamelleux assez long et de même forme, mais membraneux et peu ou point cilié. Les pattes des deux premières paires sont assez grosses, à-peu-près de même longueur, armées d'épines sur leur troisième article, et terminées par une main didactyle, dont les pinces sont grêles et garnies d'une série d'épines acérées sur le bord préhensile. Les pattes des trois paires suivantes sont très grêles, monodactyles, et plus ou moins natatoires; en général, sinon toujours celles de l'avant-dernière paire, sont de beaucoup les plus courtes. Enfin, l'abdomen est très long et fort comprimé.

Esr. Pasiphée Sivado.

Alpheus sivado. Risso. Crust. de Nice. p. 94. pl. 3. fig. 4.

Pasiphæa sivado. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 240.

Latreille. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. 99.

Risso. Hist. nat. de l'Europe méridionale. t. 5. p. 81.

Roux. Salicoques.

Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 426.

Etc.

† Genre. **SERGESTE**. *Sergestes*.

Les Sergestes sont remarquables par l'état presque rudimentaire de leurs pattes postérieures, et le grand déve-

loppement de leurs pattes-mâchoires externes qui constituent de véritables pattes ambulatoires. Le corps de ces Crustacés est grêle et un peu aplati; la carapace présente antérieurement une petite épine qui tient lieu de rostre. Les yeux sont fort saillans, et les antennes sont extrêmement longues; les supérieures portent, outre le filet terminal principal, deux filamens rudimentaires. Les pattes-mâchoires de la seconde paire sont presque pédiformes, et ne portent ni palpe ni appendice flabelliforme; elles sont longues, grêles, reployées sur elles-mêmes, et appliquées sur la bouche. Les appendices qui correspondent aux pattes-mâchoires externes n'offrent rien qui puisse les faire distinguer des pattes thoraciques ordinaires; elles sont minces, très longues, ciliées et terminées par un article styliforme très grêle. Les pattes des quatre paires suivantes ont la même forme générale; elles sont grêles, filiformes, garnies de beaucoup de poils, et ne présentent à leur base ni appendice flabelliforme, ni vestige de palpe; celles de la seconde et de la troisième paire sont pourvues à leur extrémité d'un article rudimentaire, mais mobile, et disposé de manière à constituer une pince microscopique. Les pattes de l'avant-dernière paire sont très courtes, et celles de la dernière paire sont presque rudimentaires. L'abdomen ne présente rien de remarquable, si ce n'est que les lames latérales des anneaux ne descendent pas de façon à encaisser la base des fausses pattes comme chez les Salicoques ordinaires.

ESP. Sergeste atlantique. *Sergestes atlanticus*. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 19. pl. 10. fig. 1-9. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 428.

† Genre **ACETE**. *Acetes*.

Nous avons établi ce genre d'après un Crustacé fort singulier, qui par l'ensemble de sa conformation a la plus grande analogie avec les Sergestes, mais qui s'éloigne de

tous les animaux du même ordre par l'absence des deux dernières paires de pattes. Les pattes thoraciques ne sont, par conséquent, qu'au nombre de trois paires; mais, de même que chez les Sergestes, les pattes-mâchoires externes acquièrent une longueur excessive, et remplissent les mêmes usages que les pattes ordinaires.

Esp. Acète indien. *Acetes indicus*. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 16. p. 350. pl. 11. et Hist. des Crust. t. 2. p. 430.

† Genre **OPLOPHORE**. *Oplophorus*.

Ce genre se rapproche beaucoup des Pasiphées par divers détails de l'organisation, mais ressemble davantage par le *facies* aux Palémons. Le corps est arrondi en dessus et armé en avant d'un rostre long, styloforme et dentile sur les deux bords; la lame qui recouvre la base des antennes externes est triangulaire, allongée et épineuse en dehors comme en dedans; les pattes des deux premières paires sont courtes et terminées par une petite main didactyle, tandis que celles des trois paires suivantes sont monodactyles; toutes portent à leur base un palpe lamelleux plus ou moins allongé et un petit appendice flabelliforme qui remonte entre les branchies; enfin l'abdomen est médiocre, armé en dessus de fortes épines et du reste assez semblable à celui des Hippolytes.

Oplophore type. *Oplophorus typus*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 424. pl. 25. fig. 6.

Le genre **EPHYRE** de Roux paraît être très voisin du précédent, mais a le corps très comprimé, l'abdomen très long et caréné; du reste, il n'est encore qu'imparfaitement connu. (Voyez Roux. Mém. sur les Salicoques, p. 24; et Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 422.)

+ Genre **EUPHÈME**. *Euphema*.

Pattes des trois premières paires didactyles; celles des deux paires suivantes monodactyles et natatoires; toutes garnies à leur base d'un palpe lamelleux très allongé, et d'un petit appendice flabelliforme; à-peu-près comme chez les Palémons.

Esr. Euphème armé. *Euphema armata*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 421. E.

PALÉMON. (Palæmon.)

Quatre antennes: deux intermédiaires supérieures, à trois filets, deux latérales inférieures, simples, plus longues, ayant une écaille oblongue attachée à leur base.

Port des écrevisses. Corps subcylindrique, courbe. Test terminé antérieurement par un bec caréné, denté, très saillant. Des lames natatoires à la queue. Dix pattes onguiculées; les quatre antérieures terminées en pince. (* Celles de la seconde paire plus longues et plus fortes que celles de la première paire et n'ayant pas le carpe multi-articulé.)

Antennæ quatuor: intermediis duabus superis, trisetis; lateralibus inferis, longioribus, simplicibus; earum basi squamâ oblongâ affixâ.

Habitus Astacorum. Corpus subcylindricum, incurvum. Testa anticè rostro carinato serrato productoque terminata. Lamellæ natatoriæ ad caudam. Pedes decem unguiculati; anticis quatuor apice chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Palémons* avoisinent les *Alphées* et sont assez nombreux en espèces. On les distingue facilement des autres *Salicoques*, en ce que leurs antennes intermédiaires sont terminées par trois filets. Ils ont antérieurement un bec très saillant, caréné en crête, denté en scie, décurrent sur le dos du test.

ESPÈCES.

1. Palémon carcin. *Palæmon carcinus*.

P. rostro ascendente, suprâ subiusque serrato, antennarum squamis longiore.

Cancer carcinus. Lin.

Palæmon carcinus. Fab. Suppl. p. 402.

Rumph. Mus. tab. 1. fig. B.

Herbst. cane. t. 28. fig. 1.

Palæmon carcinus. Oliv. Encycl. n°

* Latreille. Hist. nat. des Crust. et des Ins. t. 6. p. 260.

* Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 237.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 395.

Habite la mer des Indes.

2. Palémon de la Jamaïque. *Palæmon Jamaicensis*.

P. rostro suprâ serrato, subtus tridentato, antennarum squamis æquante.

Palæmon jamaicensis. Oliv. Encycl. n° 2.

Sloan. Jam. 2. tab. 245. f. 2.

Seba. mus. 3. t. 21. f. 4.

Herbst. canc. tab. 27. fig. 2.

* Leach. Zool. Miscel. t. 2. pl. 92.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 237.

* Edwards. op. cit. p. 398.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles, dans les fleuves.

3. Palémon squille. *Palæmon squilla*.

P. rostro suprâ serrato, subtus tridentato, antennarum squamis longiore.

Cancer squilla. Lin.

Palæmon squilla. Fab. Suppl. p. 403.

Squilla fusca. Bast. op. subs. 2. tab. 3. f. 5.

* Crevette? Belon. de la nat. des poissons. p. 364.

* Caramot ou *Squilla gibba*? Rondelet. t. II. p. 395.

* Klein. Obs. sur les Crust. p. 66. fig. A.

* *C. squilla*? Othon Fabricius. Fauna groenlandica. p. 237.

* *Astacus squilla*. Fabricius. Entom. syst. t. 2. p. 485.

* *Palæmon squilla*. Bosc. t. II. p. 105.

* Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. t. VI. p. 257. et Règne anim. de Cuv. t. IV. p. 98, etc.

- * Oliv. Encycl. méth. t. VIII. p. 662.
- * Leach. Malacostr. pod. Britan. pl. 43. fig. 11-13.
- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 235.
- * Roux. Salicoques. p. 15.
- * Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 22.
- * Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 390.

Habite l'Océan Européen, sur les côtes. Espèce commune, vulgairement appelée la *Salicoque*.

4. Palémon hirtimane. *Palæmon hirtimanus*.

P. rostro porrecto, brevi, supra serrato, subius bidentato; chelis muricatis: sinistrâ majore. Oliv.

Palæmon hirtimanus. Oliv. Encycl. n° 14. (pl. 318. fig. 2.)

- * Edwards. op. cit. t. 2. p. 400.

Habite la mer des Indes. *Péron*.

Etc. Voyez le Palémon orné. Oliv. Encycl. n° 5. Il a beaucoup de rapport avec le Palémon de la Jamaïque.

- * Ajoutez un grand nombre d'autres espèces dont les caractères sont indiqués dans le deuxième volume de notre Hist. nat. des Crust.

+ Genre **LYSMATE**. *Lysmata*. Risso.

Les *Lysmates* ressemblent beaucoup aux *Palémons*, et établissent le passage entre ces *Salicoques* et les *Hippolytes*. Ils ont un rostre long, relevé et dentelé, les antennes supérieures terminées par trois filets sétacés comme les *Palémons*, et les pattes des deux premières paires terminées par une main didactyle; mais de même que chez les *Hippolytes* la dernière de ces deux paires est filiforme et a le carpe multi-articulé.

Esr. *Lysmate* queue soyeuse. *Lysmata seticauda*.

Melicerta seticaudata et *Lysmata seticaudata*. Risso. Crust. de Nice. p. 110. pl. 2. fig. 1.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 239.

Latreille. Règne anim. t. 4. p. 98.

Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 37. et Mém. sur les *Salicoques* p. 17.

Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 386. pl. 25. fig. 10.

+ Genre **ATHANASE**. *Athanas*. Leach.

Par leur forme générale, les *Athanas* ressemblent assez à de petites écrevisses; mais, par leur organisation elles se rapprochent davantage des *Lysmates*, dont elles ne diffèrent guère que par la petitesse de leur rostre, la grosseur de leurs pattes antérieures et la conformation de leurs mandibules. La carapace de ces petits Crustacés ne s'élève pas en carène à la base du rostre, comme chez les précédens, et ce prolongement n'est pas dentelé sur les bords; mais les antennes internes se terminent par trois filets multi-articulés, disposés comme chez les *Palémons*. Comme chez ces derniers Crustacés, les pattes-mâchoires externes sont grêles et courtes. Les pattes de la première paire sont au contraire longues et très fortes; elles sont inégales entre elles, et se terminent par une grosse main didactyle, dont les pinces sont courtes et robustes. Les pattes de la seconde paire sont filiformes, et ordinairement reployées en deux; leur carpe est très allongé et multiarticulé, et elles se terminent par une main didactyle très petite et très faible. Les pieds des trois paires suivantes sont monodactyles, et ne présentent rien de remarquable. On ne connaît qu'une espèce de ce genre.

L'*Athanas* luisant, *A. nitescens*. Leach. Malacostr. Podoph. Brit. tab. 44.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p.

Latreille. Règne anim. t. IV. p. 99.

Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 366.

E.

LES ASTACIENS.

Les *Astaciens*, ainsi nommés parce qu'ils embrassent le genre des écrevisses, ont effectivement avec elles des rapports très marqués; ce sont les plus éminens des Ma-

croures, et c'est parmi eux que se trouvent les crustacés de plus grande taille.

Ils sont bien distingués des *Salicoques* en ce que leurs quatre antennes sont insérées presque sur un seul et même rang, que les latérales sont réellement extérieures et non situées sous les intermédiaires, et qu'elles n'ont point à leur base une grande écaille allongée, qui couvre ou dépasse leur pédoncule.

Le corps des *Astaciens* est allongé, à test en général solide, quelquefois même fort dur, scabre ou raboteux; à queue grande, plus longue que le test, articulée, toujours découverte, ayant à l'extrémité une nageoire en éventail, formée par des lames latérales qui accompagnent le bout. On divise ces crustacés en deux sections, savoir :

1° Ceux dont les pattes, presque semblables, n'ont point de bras avancés, point de véritables pinces : les Langoustes, les Scyllares; 2° ceux qui ont deux grands bras avancés, terminés chacun par de grandes pinces : les Galathées, les Écrevisses, les Thalassines.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle, et les caractères que notre auteur assigne à ses *Astaciens* ne sont pas toujours applicables à ces Crustacés. (Voyez pour la distribution des genres le tableau, page 342.) E.

LANGOUSTE. (*Palinurus*.)

Quatre antennes inégales : deux intermédiaires plus courtes, à dernier article bifide; les externes très longues, subulées, hérissées inférieurement. Les yeux disposés sur une éminence commune transverse.

Corps grand, oblong, subcylindrique; à test muriqué. Queue des écrevisses. Dix pattes, presque semblables, on-

général, sans pinceaux profonds; la femelle sans des pattes antérieures à doigt mobile, très petit.

Antennae quatuor, imparibus : intermedium duplex brevissimum, articulo ultimo bifido; antennae longioribus subulatis, inferius hirsuta. Oculi in antennis communi transverso dispositi.

Corpus magnum, elongatum, subcylindricum; tota armata. Cauda setaceorum. Pedes decem, subsimiles, angulati; chelis perfectis nullis; manusque pedum anteriorum digito mobili minime.

OBSERVATIONS. — Le genre des *Langoustes* est naturel, très beau, bien diversifié en espèces, comprend de grands crustacés, dont quelques-uns acquièrent une taille énorme, et qui, en général, ressemblent assez aux écrevisses par leur aspect; mais leurs pattes sont dépourvues de pinceaux, quoique dans quelques-uns, les antérieures soient terminées par une femelle main, ayant entre l'ongle terminal, un doigt mobile, écarté, fort court, et comme avorté. Dans quelques espèces, le dernier article des pattes est muni de poils serrés qui imitent des brosses.

Le test des *Langoustes* est plus ou moins hérissé de tubercules épineux. Il y en a surtout deux constamment placés derrière les yeux et au-dessus, ayant leur pointe arquée et dirigée en devant.

Ces beaux crustacés ont la plupart des couleurs brillantes assez vives, habitent dans la mer, entre les rochers, et sont assez recherchés sur nos tables : citons-en quelques espèces.

ESPÈCES.

Segmens de la queue divisés par un sillon transversal.

1. Langouste commune. *Palinurus vulgaris*.

P. rufus ; testé oculatè ; caudè albo-maculatè ; spinis ocellaribus subtilis dentatis.

Καρίδης, Aristote. — *Locusta*, Sœtône. (voyez Cuvier. Dissertation critique sur les espèces d'Ecrevisses connues des anciens.)

^a *Locusta*. Belon. Poiss. p. 354 et 356. fig. 1.

^b *Rondelst*. Poiss. t. II. p. 365.

- * Aldrovande. De Crust. p. 102.
- * *Astacus elephas*? Fabricius. Entom. syst. t. II. p. 479.
- Palinurus vulgaris*. Lat. Gen. 2. p. 48.
- Palinurus quadricornis*. Fab.
- Cancer astacus elephas*. Herbst. Canc. tab. 29. f. 1.
- Palinurus locusta*. Oliv. Encycl.
- Penn. Zool. brit. 4. t. 11. f. 22.
- * *Palinurus quadricornis*. Latreille. Hist. des Crust. t. 6. p. 193. pl. 52. fig. 3. (sous le nom de Langouste ordinaire.)
- * *Palinurus locusta*. Olivier. Encycl. t. 8. p. 672.
- * *Palinurus vulgaris*. Latr. Annales du Muséum. t. III. p. 391. et Règne anim. de Cuvier. t. IV. p. 8.
- * Leach. Malac. Pod. Brit. pl. 30.
- * Desmarests. Consid. sur les Crust. p. 185, pl. 2. fig. 1.
- * Risso. Crustacés de Nice. p. 64. et Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. 45.
- * Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 46. fig. 1. et Hist. des Crust. t. 2. p. 292.

Habite la Méditerranée et l'Océan européen. Sa chair est estimée
Le sillon qui divise chaque segment de la queue, est interrompu
au milieu par une saillie quelquefois incomplète.

2. Langouste mouchetée. *Palinurus guttatus*.

P. viridis; testâ muricatâ; caudâ maculis albis rotundis sparsis ornatâ; spinis frontalibus binis.

- * *Squilla crango americana altera*. Seba. t. 3. p. 54. pl. 21. fig. 5.

Palinurus homarus. Fab. Suppl. p. 400.

Palinurus guttatus. Lat. Ann. du Mus. 3. p. 392.

Oliv. Encycl. Palinure. n° 2.

- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 185.
- * Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 297. pl. 23. fig. 1.

Habite les mers de l'Ile-de-France, l'Océan Asiatique; ses taches sont petites.

3. Langouste argus. *Palinurus argus*.

P. rubescens aut cœrulescens; thorace aculeato; spinis frontalibus quaternis; caudâ maculis ocellaribus albis raris serialibus.

Palinurus argus. Latr. Ann. du Mus. 3. p. 393.

Palinurus argus. Oliv. Encycl. n° 5.

- * Desmarest. op. cit. p. 185.
- * Edwards. op. cit. t. 2. p. 300.

Habite l'Océan du Brésil. Lalande

Segmens de la queue non divisés ou sans sillon transversal.

4. Langouste ornée. *Palinurus ornatus*.

P. viridis; testâ granulât aculeatâque; caudæ segmentis lævibus maculâ fuscâ transversâ notatis; pedibus viridi et albo variis.

Palinurus ornatus. Fab. Suppl. p. 400.

Palinurus ornatus. Oliv. Encycl. n° 3. (* pl. 316.)

* *P. Homarus*. Herbst. Krabben. pl. 31. fig. 1.

* *P. ornatus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 185.

* Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 296.

Habite l'Océan indien et près de l'Île-de-France. M. Mathieu. L'individu du Muséum est d'une taille énorme.

5. Langouste versicolore. *Palinurus versicolor*.

P. viridis albido-maculatus; testâ granulât, subaculeatâ; segmentis caudæ lævibus immaculatis; pedibus longitudinaliter lineatis.

Palinurus versicolor. Mus. n°

(b) Var? *Astacus penicillatus*. Oliv. Encycl. n. 3.

Habite les mers de l'Île-de-France. M. Mathieu. Voyez le *palinurus penicillatus*. Oliv. Encycl. n. 7. La variété B. que je possédais, est passée dans la collection de M. Leach. Sa taille est très grande, et ses pattes sont remarquables par les brosses de leur sommet.

6. Langouste rubanée. *Palinurus taeniatus*.

P. subfulvus; testâ fusco-maculatâ, tuberculât et muricatâ; segmentorum caudæ margine postico taeniato.

Palinurus versicolor. Lat. Annal. du Mus. 3. p. 394.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n° Les individus sont de petite taille, mais probablement il en existe de plus grands.

Etc.

* Ajoutez quelques autres espèces dont les caractères sont indiqués dans le second volume de notre Hist. nat. des Crust.

[On a trouvé, dans le calcaire marneux du Monte-Bolca, un grand Crustacé fossile qui appartient évidemment à ce genre, et qui est à-peu-près de la taille de la

Langouste commune, mais qui n'a pas été rencontré en assez bon état de conservation pour qu'il soit possible d'y assigner des caractères précis (Voy. Desmarest. Crust. foss. p. 131.)

M. Desmarest rapporte aussi à ce genre deux autres espèces de Crustacés fossiles ; mais nous ne partageons pas l'opinion de ce zoologiste relativement aux affinités naturelles de ces animaux. Le *Palinurus reglianus* (Desmarest, Foss. pl. 11. fig. 3) nous paraît avoir plus d'analogie avec les Néphrops qu'avec tout autre Macroure, et constitue le type du genre GLYPHBA de M. Meyer, groupe auquel se rapportent plusieurs autres espèces fossiles. (Voyez Lethæa geognostica de Bronn. p. 177.

Le *Palinurus Suerii* de M. Desmarest diffère aussi des Langoustes par la disposition des régions de la carapace, par la forme du rostre, et l'existence de pinces ; M. Meyer en a formé le genre PEMPHIX. Il se trouve dans le Muschelkalk (Voy. Desmarests. op. cit. p. 132. pl. 10. fig. 8 et 9. — Meyer, Nova acta Physico-medica acad. Cæsar. Leopoldino-Carolinæ natur. curios. Bonnæ, 1833, t. XVI, pl. 2. p. 517. pl. 38. Bronn. Lethæa geognostica, p. 184. pl. 13. fig. 12.)

Nous croyons devoir ranger aussi dans la famille des Macroures cuirassés le *Macrourites pseudoscyllarus*, de Schlotheim, Petref. Nachtr. pl. 12. fig. 5. Crustacé fossile, dont la structure paraît avoir été très singulière. La carapace est courte, épineuse, et terminée en avant par un petit rostre aplati ; les antennes sont grêles et à pédoncule allongé. Les pattes de la première paire sont très grosses et épineuses dans les deux tiers de leur longueur, mais paraissent terminées par une petite main didactyle presque filiforme. Les pattes suivantes sont courtes, grêles et monodactyles. Enfin l'abdomen est grand, et conformé à-peu-près comme chez les Langoustes. M. le comte de Munster a proposé de

donner à ce fossile le nom générique d'ORPHEA (Bronn, Lethæa, page 477). Un des Macroures fossiles figurés par Bajer, Oryctogr. Norica. pl. 8. fig. 7. se rapproche beaucoup du précédent. E.

SCYLLARE. (Scyllarus.)

Quatre antennes très dissemblables. Les deux intermédiaires filiformes, à dernier article bifide. Les latérales sans filament; leur pédoncule ayant ses articles dilatés, aplatis, en crête. Les yeux très écartés.

Corps oblong. Test grand, large, un peu convexe. Queue étendue, demi cylindrique, un peu courbée vers le bout, terminée par une nageoire lamelleuse, en éventail. Dix pattes onguiculées, presque semblables, sans pince.

Antennæ quatuor, dissimillimæ. Intermediæ duæ filiformes; articulo ultimo bifido. Laterales filamentum nullo; pedunculo articulis dilatatis, planis, cristatis. Oculi remotissimi.

Corpus oblongum. Testa magna, lata, convexiuscula. Cauda extensa, semi-cylindrica, versùs extremitatem subincurva; pinnâ natatoriâ lamellosâ flabelliformi terminali. Pedes decem, ferè consimiles, unguiculati, chelis nullis.

OBSERVATIONS.—Les *Scyllares*, parmi les crustacés macroures, constituent un genre des plus remarquables, surtout par la singularité des antennes extérieures de ces animaux. On croirait que ces crustacés n'ont que deux antennes, savoir : les deux intermédiaires. En effet, les deux latérales ou extérieures, manquant de filament, n'ont plus que leur pédoncule dont les articulations forment des lames foliacées, en crête, et ne ressemblent nullement à des antennes. Leur corps est gros, peu allongé, plus ou moins scabre; leurs pattes sont sans pinces. On les appelle vulgairement Cigales de mer.

[D'après la position des yeux , la forme générale du corps et quelques autres caractères, on a divisé ce groupe en trois genres : les Scyllares, les Ibacus et les Thènes. E.

ESPÈCES.

1. Scyllare ours. *Scyllarus arctus*.

S. testâ anticè trifario dentatâ; antennarum externarum squamis crenatis ciliatis.

Cancer arctus. Lin.

Scyllarus arctus. Fab. Suppl. p. 398.

Lat. Gen. 1. p. 47.

* Encyclop. pl. 287. p. 5.

Herbst. canc. t. 30. f. 3.

* Desmarest. Consid. p. 182.

* Risso. Crust. de Nice. p. 61. et Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5. pl. 3.

* Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. XI.

* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 45. fig. 1. et Hist. des Crust. t. 2. p. 282.

Habite l'Océan de l'Europe, la Méditerranée. Cigale de mer. Rondelet.

2. Scyllare orchette. *Scyllarus latus*.

S. antennarum externarum squamis superioribus rotundatis : margine subintegro.

Scyllarus latus. Latr. Gen. 1. p. 47.

L'orchetta. Rond. Hist. des Poissons. liv. 18. chap. 5.

Gesn. Hist. anim. 3. p. 1097.

* Savigny. Egypte. Crust. pl. 8. fig. 1.

* Desmarest. op. cit. p. 182.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 17. fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 284.

Habite la Méditerranée. Il est peu acabre, et devient assez grand.

3. Scyllare antarctique. *Scyllarus antarcticus*.

S. pilosus, thorace antennarumque squamis serrato-ciliatis. E.

Scyllarus antarcticus. Fab. Suppl. p. 399.

Seba. Mus. 3. tab. 20. f. 1.

Rumph. Mus. tab. 2. f. C.

- * *Cancer ursus major*. Herbst. t. 2 p. 82. pl. 30. fig. 2.
 - * *Scyllarus antarcticus*. Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. t. 6. p. 181.
 - * *Ibacus antarcticus*. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 287.
- Habite l'Océan Indien.

4. Scyllare incisée. *Scyllarus incisus*.

S. abbreviatus, subglaber; testâ latâ, depressâ, margine serratâ, utroque latere profundè incisâ.

Scyllarus incisus. Péron.

- * *Ibacus Peronii*. Leach. Zool. Miscel. t. 2. pl. 119.
- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 183. pl. 31. fig. 2.
- * Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 287.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Espèce remarquable et très distincte. Ses yeux sont médiocrement écartés.

Etc.

Ajoutez le *S. orientalis*. (* Fabr. Supplem. p. 399. — Latr. Encyclop. p. 314. — Desmarest. op. cit. pl. 31. fig. 1. — *Thenus orientalis*. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 286, et atlas du Règne anim. Crust. pl. 45. fig. 2.) et quelques autres.

† Genre **ERYON**. *Eryon*.

On a trouvé à l'état fossile un Crustacé très singulier qui ne peut rentrer dans aucune des tribus naturelles, formées par les espèces actuelles, mais qui, à plusieurs égards, se rapproche des Scyllares, et semble devoir prendre place auprès de ces animaux. Ce fossile, dont M. Desmarest a formé le genre **ERYON**, se fait remarquer par sa carapace très élargie, presque carrée, plus longue que l'abdomen, et fortement dentée en avant. Les antennes internes sont petites et terminées par deux filets multiarticulés, grêles et filiformes; les externes sont courtes, et leur pédoncule est cylindrique et recouvert, suivant M. Desmarest, par une écaille assez large, ovoïde et fortement échancrée. Le cadre buccal paraît être étroit. Les pattes de la première paire sont aussi longues que la carapace, de grosseur médiocre, et terminées par une

pince à doigts grêles et arqués. Les pattes des deux paires suivantes sont plus grêles, beaucoup plus courtes, et également terminées en pince; celles des deux dernières paires paraissent être monodactyles. Enfin l'abdomen est aplati et terminé par une nageoire caudale, dont la lame médiane est pointue et les quatre lames latérales moins longues que la médiane et hastiformes,

M. Desmarest a donné à ce Crustacé fossile le nom spécifique d'ERYON DE CUVIER. On le trouve dans le calcaire de Pappenheim, de Solenhofen et d'Aichstedt. (Voyez Desm. Crust. fossiles. p. 129. pl. 10. fig. 4. — Bronn. Lethæa. p. 473; etc.)

Le Crustacé fossile, figuré par Schlotheim sous le nom de *Macrourites propinquus* (1), paraît appartenir au même genre que le précédent, dont il se distingue par la forme circulaire de la carapace.

Enfin M. Mayer vient de publier dans les Mémoires des Curieux de la Nature de Bonn, la description de deux espèces nouvelles du même genre, savoir : l'*Eryon Hartmannii* (Mayer. Acta acad. Cæs. Leop. Carol. Nat. Cur. v. XVIII. p. 263. pl. 11. fig. 1. et pl. 12. fig. 2 et 4.), et l'*Eryon Schuberti* (ejusd. op. cit. p. 271. pl. 12. fig. 3, 6.).
E.

GALATHÉE. (Galathea.)

Quatre antennes: les deux intermédiaires courtes, à dernier article bifide; les latérales longues, sétacées, simples. Rostre court, épineux ou denté.

(1) Schloteim. op. cit. p. 35. pl. 3. fig. 2. — *Eryon arctiformis*. Bonn. Lethæa. p. 474. pl. 27. fig. 2. — *Eryon Schlotheimii*. Holl. Pefref. t. 2. p. 150. — Mayer, Mém. de l'ac. des Cur. de la Nat. de Bonn, t. 18. p. 280.

Corps oblong. Queue étendue, quelquefois courbée, ayant à son extrémité une nageoire lamelleuse. Dix pattes : les deux antérieures très grandes, chélfères; les autres graduellement plus courtes.

Antennæ quatuor : intermediis duabus brevibus , articulo ultimo bifidis ; lateralibus longis setaceis simplicibus. Rostrum breve , spinosum aut dentatum.

Corpus oblongum. Cauda extensa , interdum curva ; pinna lamellosa natatoria ad apicem. Pedes decem ; anticis duobus maximis chelatis ; aliis gradatim brevioribus.

OBSERVATIONS. — Comme dans les Ecrevisses, les antennes des *Galathées* sont presque sur le même rang, et les latérales ne sont pas munies d'une lame à leur base. Mais les *Galathées* n'ont qu'une paire de pattes didactyles; ce sont les antérieures; et elles sont très grandes. Ces crustacés sont souvent chargés d'une multitude de petites écailles, principalement sur leurs pattes antérieures.

[Il est aussi à noter que les pattes de la cinquième paire sont extrêmement grêles et reployées au-dessus des autres, ou même dans la cavité branchiale. E.

ESPÈCE.

1. Galathée striée. *Galathea strigosa*.

G. testâ antrosum rugosâ , spinis ciliatâ ; rostro acuto septem dentato.

Cancer strigosus. Lin.

* *Ecrevisse striée*. Deger. Mém. pour servir à l'hist. des Ina. t. 7. pl. 23. fig. 1.

* Herbst. t. 2. p. 50. pl. 26. fig. 2.

Galathea strigosa. Fab. Suppl. p. 414.

Galathea strigosa. Lat. Gen. 1. p. 50. (* Encyclop. pl. 294. fig. 1. et pl. 326. fig. 1.

Penn. Zool. brit. 4. tab. 14. f. 26.

* *Galathea spinigera*. Leach. Molec. Pod. Brit. pl. 28.

* Desmarest. Mém. sur les Crust. p. 189. pl. 33. fig. 1.

* Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 16.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 17. fig. 3.

* Edwards. Atlas du Règne animal de Cuvier. Crust. pl. 47. fig. 1.
et Hist. des Crust. t. 2. p. 273.

Habite l'Océan de l'Europe.

2. Galathée longipède. *Galathea rugosa*.

G. pedibus anticis longissimis, squamulosis; rostro spinosa.

* Leo. Rondelet. Poissons. t. 2. p. 390.

Galathea rugosa. Fab. Suppl. p. 415.

Galathea longipeda. Syst. des anim. sans vert. p. 158.

Cancer bamfius. Penn. Zool. brit. 4. t. 13. f. 25.

Herbst. t. 2. p. 58. pl. 27. fig. 3.

* *Manida rugosa*. Leach. Malac. Pod. Brit. pl. 29.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 192.

* *Galathea rugosa*. Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 274.

Habite l'Océan d'Europe et la Méditerranée.

Etc.

[Le genre GRIMOTHÉE, *Grimothea*, de Leach, ne diffère que fort peu du précédent et pourrait ne pas en être séparé. En effet, la forme générale des Grimothées est essentiellement la même que celle des Galathées, seulement l'article basilaire de leurs antennes internes est claviforme et à peine denté, à son extrémité, et les pattes-mâchoires externe sont très longues et ont leurs trois derniers articles élargis et foliacés, tandis que chez les Galathées le premier article de ces antennes est cylindrique et armé à son extrémité de plusieurs fortes épines; enfin les pattes-mâchoires externes sont médiocres et sans élargissement vers le bout. Le type de ce genre est la *Galathea gregaria* de Fabricius (Supplém. Ent. Syst. p. 415. — *Grimothea gregaria* Leach. Dict. du Sien. Nat. t. XVIII; p. 50. — Desmarest. op. cit. p. 188; Edw. Hist. des Crust. t. 2 p. 277 et atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 47. fig. 2). E.

ÉCREVISSE. (Astac.)

Quatre antennes inégales, disposées presque sur une même ligne transverse: deux intermédiaires plus courtes, profondément bifides, multiarticulées; les latérales simples, plus longues, à pédoncule muni de quelques dents squamiformes.

Corps oblong, subcylindrique; le test ayant antérieurement un bec saillant. Queue un peu grande, terminée par une nageoire en éventail; les lames latérales divisées en deux. Dix pattes; les six antérieures chélifères; les pinces de la première paire fort grandes.

Antennæ quatuor, inæquales, in eâdem fere lineâ transversâ insertæ: intermediis duabus brevioribus, profundè bifidis, multiarticulatis; lateralibus longioribus, simplicibus: pedunculo dentibus aliquot squamiformibus instructo.

Corpus oblongum, subcylindricum; testâ anticè rostro porrecto terminatâ. Cauda majuscula: pinnâ natatoriâ flabelliformi ad apicem. Pinnæ lamellæ laterales bipartitæ. Pedes decem; anticis sex didactylis; chelis primi paris magnis.

OBSERVATIONS. — Ce genre intéresse, parce que deux de ces principales espèces sont très connues et recherchées sur nos tables. Les *Ecrevisses* sont distinguées de tous les crustacés macroures de la famille des Salicoques, par la disposition de leurs antennes presque sur un même rang, et parce que les antennes latérales ou extérieures n'ont plus à leur base une grande lame allongée, attachée à leur pédoncule (1) Sous cette considération, ces crustacés appartiennent à une famille particulière que nous nommons *Astaciens*. On divise cette famille en deux sections, savoir : 1^o celle dont les races ont les deux pattes antérieures plus fortes et terminées par une grande pince [les *Ecrevisses*

(1) Cette lame mobile existe, seulement elle est moins grande que chez les Salicoques. E.

sont de ce nombre]; 2° celle qui comprend des Astaciens dont toutes les pattes sont presque semblables, et point véritablement chélifères.

Tout ce qui concerne les *Ecrevisses*, comme leurs caractères, leurs habitudes, les faits d'organisation qu'elles présentent, a sans doute beaucoup d'intérêt; mais se trouvant exposé dans différens ouvrages de zoologie, nous sommes obligé, par notre plan, d'y renvoyer le lecteur (1). Nous dirons seulement que ce sont des animaux carnassiers et voraces; que les uns vivent dans les eaux douces, se cachant dans des trous, sous les rives; et que les autres vivent dans la mer.

[Ce groupe, qui correspond à la famille des Astaciens dans la méthode de classification exposée p. 342, a été subdivisé en trois genres : les Ecrevisses proprement dites, les Homards et les Néphrops. (Voy. notre Hist. des Crust. t. 2. p. 328).

ESPÈCES.

1. Ecrevisse homard. *Astacus marinus*.

A. rostro utroque latere subtridentato ; manibus interno latere dentibus crassis.

Cancer gammarus. Lin.

Astacus marinus. Fab. Suppl. p. 406.

Herbst. Canc. tab. 25.

Astacus marinus. Lat. Gen. p. 51.

Penn. Zool. Brit. vol. 4. tab. 10. fig. 21.

* *Astacus marinus*. Belon. De Aquatilibus. p. 356.

* *Astacus verus*. Aldrovande. de Crust. p. 112 et 121.

* *Cancer gammarus*. Herbst. t. II. p. 42. pl. 25.

* *Astacus marinus*. Olivier. Encyclop. p. 342.

* Latreille. Encyclop. pl. 287. fig. 2; Règne anim. de Cuv. t. IV. p. 89, etc.

* Bosc. t. 2. p. 62. pl. 11. fig. 1.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 211. pl. 41. fig. 1.

* *Homarus vulgaris*. Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 334.

Habite l'Océan Européen. Espèce fort grande, non rare, et que l'on sert fréquemment sur nos tables.

(1) Voy. Latreille, Hist. des Crust. et des Insectes. t. 6.
— Desmarest, Considérations sur les Crustacés, et notre Hist. nat. des Crustacés.

2. Ecrevisse de rivière, *Astacus fluviatilis*.

A. rostro utroque latere subunidentato ; manibus interno latere muticis, obsolete granulatis..

Cancer astacus. Linn.

Astacus fluviatilis. Fabr. Suppl. p. 406.

L'écrevisse. Geoff. 2, p. 666. n° 1.

Penn. Zool. Brit. 4. t. 15. f. 27.

Astacus fluviatilis. Lat. Gen. 1, p. 51.

* *Cancer fluviatilis*. Rondelet. Poissons. t. II. p. 210.

* *Astacus fluviatilis*. Gessner. Aquatil. p. 104.

* Baster. opus. subs. t. 2. pl. 1.

* Aldrovande. Crust. p. 129 et 130.

* Jonston. Exsan. tab. 3 et 4. fig. 1.

* Rossel. Ins. t. 3. tab. 54 et 61.

* Sulzer. tab. 23. fig. 151.

* *Cancer astacus*. Degeer. Mém. pour servir à l'Hist. des Ins. t. VII. pl. 20. fig. 1.

* *Astacus fluviatilis*. Olivier. Encyclop. t. VII. p. 342.

* Bosc. t. II. p. 62.

* Ejusd. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 235 ; Encyclop. pl. 286. p. 1, 2, 3. et pl. 28. fig. 8 ; Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 90.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 211.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 19. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 330.

Habite les rivières de l'Europe. Commune. On la sert souvent sur nos tables.

L'*Astacus Bartonii*, Fab. p. 407, vit dans les eaux douces de l'Amérique septentrionale, et paraît se rapprocher beaucoup de la nôtre.

3. Ecrevisse de Norwège. *Astacus Norwegicus*.

A. thorace antrorsum aculeato ; manibus prismaticis : angulis spinosis.

* *Astacus mediæ magnitudinis prior*. Aldrovande. op. cit. p. 113. — Pontopidan. Histoire de Norwège, t. 2. pl. 25.

Cancer norwegicus. Linn.

Astacus norwegicus. Fab. Suppl. 407.

* Herbst. canc. tab. 26. f. 3.

Penn. Zool. Brit. 4. t. 12. f. 24.

Séba. Mus. 3. tab. 21. fig. 3.

* Degeer. Mém. Ins. t. 7. p. 398. pl. 24. fig. 1.

* Oliv. Encyclop. t. 7. p. 347.

- * Latreille. Hist. des Crust. t. 6. p. 241 ; Encyc. pl. 294. fig. 1;
Règne anim. de Cuv. t. 4. p. 189, etc.
- * Bosc. Hist. des Crust. t. 2. p. 62.
- * *Nephrops norvegicus*. Leach.
- * Malac. Pod. Brit. pl. 36.
- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 213. pl. 37. fig. 1.
- * Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 336.
- Habite la mer de Norwège.
- Etc.

THALASSINE. (Thalamina.)

Antennes comme dans les Écrevisses ; mais le pédoncule des latérales mutique. Bec du test fort court.

Corps allongé. Queue longue, étroite, subcylindrique, presque nue ; à nageoire terminale petite, ayant ses lames latérales étroites, non divisées. Dix pattes : les quatre antérieures didactyles. La première paire fort grande.

Antennæ ut in astacis ; at peduncululus lateralium muticus. Testæ rostrum anticum breve.

Corpus elongatum. Cauda longa, angusta, subcylindrica, nudiuscula, pinnâ natatoria terminali parvâ ; lamellis lateralibus angustis, indivisis. Pedes decem : anticis quatuor didactylis, primi paris majoribus.

OBSERVATIONS. — Quoique la *Thalassine* soit très voisine des Écrevisses par ses rapports, sa queue longue, étroite et presque nue, la rend si singulière, que M. Latreille l'en a distinguée comme genre, surtout n'ayant que quatre pattes didactyles ; elle semble faire la transition aux paguriens. M. Latreille rapporte à ce genre, ceux que M. Leach a désignés sous les noms de *Gebia*, *Callianassa*, et *Axius*.

ESPÈCE.

1. *Thalassine scorpionide. Thalassina scorpionides.*

Latr. Gen. 1. p. 52. (* Et Encyclop. pl. 317. fig. 1.

An Astacus scaber ? Fab. Suppl. p. 407.

* *Cancer anomalus*. Herbst. t. 3. p. 62.

Thalassina scorpionoides. Leach. Zool. Misc. t. 3. pl. 130.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 203. pl. 35. fig. 1.

* Guérin. Encyclop. t. 10. p. 613. et Iconogr. Crust. pl. 18. fig. 4.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 48. fig. 1. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 316.

Habite (* les côtes du Chili.) Se trouve dans la collection du Muséum.

[Les Thalassines, les Gébies, les Callianasses et quelques autres Crustacés Macroures dont notre auteur n'avait pas connaissance, constituent une petite famille naturelle qui est intermédiaire entre les Ecrevisses et les Paguriens, et qui est remarquable par le développement de l'abdomen, la mollesse des tégumens et la conformation particulière des pattes. Ces Crustacés n'ont pas de lame ou d'écaille mobile à la base des antennes externes, comme les Salicoques et les Ecrevisses; et leur sternum est presque linéaire dans toute sa longueur et ne constitue pas de plastron, comme chez les Langoustes, les Scyllares, etc. Ceux dont on connaît les mœurs vivent enfouis dans le sable:

† Genre **GÉBIE**. *Gebia*.

Les Gébies ressemblent beaucoup aux Thalassines, mais s'en distinguent par la conformation de la nageoire caudale, dont les quatre lames latérales, au lieu d'être linéaires, sont foliacées et très larges.

La carapace se termine intérieurement par un rostre triangulaire, et assez large pour recouvrir presque entièrement les yeux. Les antennes internes sont très courtes, mais cependant leurs deux filets terminaux sont plus longs que leur pédoncule. Les pattes-mâchoires externes sont pédiformes. Les pattes antérieures sont étroites, et terminées par une main allongée et imparfaitement subchéli-

forme; leur doigt mobile est très grand, et, en se repliant en bas, sa base s'applique contre le bord antérieur de la main, dont l'angle inférieur se prolonge de manière à constituer une dent tenant lieu de doigt immobile. Les pattes suivantes sont comprimées et monodactyles; celles de la deuxième paire ont leur pénultième article grand, élargi et cilié en dessous; celles des paires suivantes sont plus grêles. Enfin les branchies sont en brosse et fixées sur deux rangs.

Esr. Gébie riverain. *Gebia littoralis*.

Thalassina littoralis. Risso. Crust. de Nice. p. 76. pl. 3. fig. 2.

Gebia littoralis. Desm. Consid. sur les Crust. p. 204.

Gebios littoralis. Risso. Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5. p. 51.

Gebia littoralis. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 313.

Gébie étoilée. *G. stellata*.

C. astacus stellatus. Montagu. Trans. Lin. Soc. t. 9. p. 89. pl. 3. fig. 5.

Gebia stellata. Leach. Malac. Pod. Brit. pl. 31.

Desm. op. cit. p. 204. pl. 35. fig. 2.

Edw. loc. cit.

+ Genre **AXIE**. *Axia*.

Les Axies ressemblent beaucoup aux Gébies, par la forme générale de leur corps, et surtout de leur carapace, qui est très comprimée et terminée antérieurement par un petit rostre triangulaire. Mais les pattes des deux premières paires sont terminées par une pince didactyle bien formée; celles de la troisième paire sont grêles et point élargies vers le bout, et celles de la dernière paire sont, comme d'ordinaire, relevées contre les côtés de l'abdomen. On n'en connaît qu'une espèce.

L'Axie stirhynque. *Axia stirhynchus*. Leach. Trans. of the Lin. Soc. vol. XI. p. 343. et Malac. Brit. tab. 33.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 207. pl. 36. fig. 1.

Latreille. Règne anim. t. IV. p. 88.

Guérin. Iconogr. Crust. pl. 18. fig. 5.

Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 311. et Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 48. fig. 2.

†⁵ Genre **CALLIANASSE**. *Callianassa*.

Les Callianasses sont des Crustacés dont les tégumens de toutes les parties du corps, à l'exception des pattes antérieures, sont d'une mollesse très grande. La carapace de ces Macroures est très petite et dépourvue de rostre. Les pédoncules oculaires sont remarquables par leur forme : au lieu d'être cylindriques, comme d'ordinaire, ils sont presque lamelleux, et portent, vers le tiers antérieur de leur face supérieure, une petite cornée transparente, circulaire et presque plate. Les pattes-mâchoires externes sont operculiformes ; leur deuxième et troisième articles sont très larges, et constituent, par leur réunion, un grand disque ovalaire, à l'extrémité antérieure duquel se trouve une petite tige formée par les trois derniers articles ; enfin ces organes manquent de palpe. Les pattes antérieures sont grandes et presque lamelleuses ; celle du côté droit est extrêmement grande ; ses trois premiers articles sont peu élargis, mais le carpe et la main sont très développés, et offrent à-peu-près les mêmes dimensions et la même forme. Les pattes de la seconde paire sont petites et se terminent par une pince didactyle comme chez les Axies ; mais celles de la troisième paire sont très élargies vers le bout ; leur pénultième article surtout est presque ovalaire et constitue une sorte de bêche, à l'aide de laquelle ces Crustacés creusent le sable et s'y enfouissent. Les pattes de la quatrième paire sont aplaties, mais ne présentent rien de remarquable, et celles de la cinquième paire sont grêles et terminées par une main didactyle rudimentaire. L'abdomen est très grand et un peu déprimé ; il s'élargit beaucoup vers son tiers antérieur et ne descend pas latéralement de manière à encaisser la base des fausses pattes. Enfin la nageoire caudale est très large ; sa lame médiane est presque carrée, et les quatre lames latérales

sont triangulaires et presque aussi larges que la pièce médiane.

Var. *Callianassa* souterraine *Callianassa subterranea*.

Cancer subterranea. Montagu, Trans. of the Lin. Soc. vol. IX. pl. 3 fig. 1 et 2.

Callianassa subterranea. Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 32.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 205. pl. 36. fig. 2.

Latreille. Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. 87.

Guérin. Iconogr. Crust. pl. 29. fig. 4.

Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 309. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 48. fig. 3.

Etc.

C'est à ce genre que paraît devoir être rapporté le Crustacé fossile Maestricht, auquel M. Desmarest a donné le nom de *Pagurus Faujasii*. (Desm. Crust. foss. p. 127. pl. 11. fig. 2.)

+ Genre **GLAUCOTHÔÉ**. *Glaucothoe*.

Le genre Glaucothôé établit le passage entre les Paguriens, et les Callianasses. Sa carapace est presque ovoïde et ne présente pas de prolongement rostriforme. Les yeux sont saillans, grands et à-peu-près pyriformes. Les antennes internes sont courtes, coudées comme chez les Pagures, et terminées par deux petits appendices multiarticulés, très courts, dont l'un est garni de beaucoup de longs poils. Les antennes externes s'insèrent plus bas que les précédentes; leur pédoncule est coudé, et présente en dessus une petite écaille, vestige d'un palpe. Les pattes antérieures sont terminées par une grosse main didactyle bien formée, et sont de grandeurs très différentes. Les pattes de la deuxième et de la troisième paire sont grêles et très longues; celles des deux dernières paires sont, au contraire, courtes et relevées contre les côtés du corps, comme chez les Pagures; celles de la quatrième paire sont aplaties, assez larges, et imparfaitement didactyles; le doigt immobile de leur main n'étant formé que par un tubercule peu saillant; enfin les pattes postérieures, encore plus petites que ces

dernières, sont terminées par une petite main didactyle assez bien formée. L'abdomen est étroit, allongé et parfaitement symétrique; le premier anneau est beaucoup plus étroit que les suivans, et ne porte pas d'appendices; les quatre segmens suivans, au contraire, donnent attache chacun à une paire de fausses pattes natatoires assez grandes, formées par un article basilaire, cylindrique et deux lames terminales; enfin, la nageoire caudale est grande et foliacée.

On n'en connaît qu'une espèce.

Le Glaucothoé de Péron. *Glaucothoe Peronii*. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 19. pl. 8, et Hist. des Crust. t. 2. p. 307.

† Genre **CALLIANIDE**. *Callianidea*.

Ces crustacés ressemblent beaucoup aux Callianasses et appartiennent, comme les précédens, à la famille des Thalassiniens ou Macroures fouisseurs, mais doivent être rangés dans une tribu particulière, à cause de la structure remarquable de leurs fausses pattes abdominales, dont les lames terminales sont garnies tout autour de franges branchiales, bien qu'il existe, comme d'ordinaire, des branches thoraciques logées sous la carapace. Leur corps est grêle et très allongé; la carapace n'a guère plus du tiers de la longueur de l'abdomen, et ne recouvre pas le dernier anneau thoracique. Il n'y a point de rostre, et le bord antérieur de la carapace est échancré de chaque côté de la ligne médiane pour recevoir la base des yeux, dont les pédoncules sont très courts, et conformés de la même manière que chez les Callianasses. Les quatre antennes sont grêles, et s'insèrent à-peu-près sur la même ligne transversale; celles de la première paire se terminent par deux filets à-peu-près égaux en longueur, mais dont l'un est plus gros et légèrement renflé vers le bout. Les pattes de la première paire sont longues, et l'une d'elles est très

grosse; la main qui termine celle-ci est très grande, et à-peu-près de même forme que chez les Callianasses, si ce n'est que le carpe est plus petit. Les pattes des deux paires suivantes sont petites et aplaties; celles de la quatrième paire sont presque cylindriques, et leur article basilaire est très élargi. Les pattes de la cinquième paire sont presque aussi grandes que ces dernières, et se terminent par une pince imparfaite et rudimentaire. L'abdomen, composé comme d'ordinaire de sept segmens, est à-peu-près de même largeur partout, et porte en dessous cinq paires de fausses pattes; celles de la première paire sont réduites à une simple lame étroite, mais celles des quatre paires suivantes sont très développées et conformées de la manière déjà indiquée. Enfin, la nageoire caudale est disposée comme chez les Callianasses.

ESP. Callianide type. *Callianidea typus*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 320. pl. 25 bis. fig. 8-14.

Le genre *ISEA*, de M. Guérin, ne paraît devoir différer que fort peu du précédent. (Voyez Annales de la soc. Entomol. de France. t. 1. p. 295, et notre Hist. nat. des Crust. t. II. p. 321). E.

LES PAGURIENS.

Queue nue ou presque nue, sans nageoire au bout, garnie seulement de quelques appendices latéraux : elle n'est point entièrement appliquée sous le ventre, dans le repos de l'animal.

Ces crustacés sont singuliers, offrent des anomalies remarquables, et font en quelque sorte le passage des macroures aux brachyures. Néanmoins, ils appartiennent encore aux premiers, et terminent la première section des crustacés homobranches.

Effectivement, le corps des *paguriens* est encore plus long que large, et leur queue, quoique assez grande ou longue, l'est beaucoup moins que dans les autres macroures dont l'extrémité de la queue offre une nageoire lamelleuse, en éventail.

Parmi les *paguriens*, les uns [les hermites] ne sont point du tout nageurs, et n'ont, en effet, aucune patte terminée en lame, tandis que les autres sont de mauvais nageurs, quoiqu'ils aient quelques pattes ou plusieurs paires de pattes terminées en lames, puisque leur queue n'est point propre à la natation. Voici les genres que je rapporte à cette division.

(1) Aucune patte terminée en lame. La queue molle, non crustacée.

Hermite.

(2) Des pattes (quelques-unes ou la plupart) terminées en lames.
Tous les tégumens crustacés.

Hippe.

Rémipède.

Albunée.

Ranine.

[Cette division rentre dans la section des Décapodes Anomoures telle que nous l'avons caractérisée page 336 ; mais elle n'est pas naturelle et il faut ranger ces Crustacés dans trois tribus distinctes, les Pagures d'une part, les Hippes etc., d'une autre part, et enfin les Ranines. E.

HERMITE. (Pagurus.)

Quatre antennes inégales : les deux intermédiaires bi- ou triarticulées ; à dernier article bifide ; les extérieures plus longues, sétacées. Deux yeux pédonculés.

Corps oblong, à test légèrement crustacé. Queue allon-

gée, molle, presque nue, rarement divisée en segmens, et munie à son extrémité de quelques appendices latéraux. Dix pattes : les deux antérieures inégales, terminées en pince ; les quatre postérieures fort petites.

Antennæ quatuor, inæquales : intermediis duabus bi seu triarticulatis ; articulo ultimo bifido ; externis longioribus setaceis. Oculi duo pedunculati.

Corpus oblongum ; testâ subcrustaceâ. Cauda elongata , mollis, subnuda, rarè segmentis divisa, appendicibus aliquot sublateralibus, apice instructa. Pedes decem : antiois duobus inæqualibus chelatis ; posticis quatuor ultimis parvis.

OBSERVATIONS. — Les *Hermites* ou *Pagures* vivent en quelque sorte en solitaires, et ont pris l'habitude, les uns de s'enfoncer dans des coquilles univalves vides, et d'y établir leur domicile, les traînant avec eux lorsqu'ils veulent se déplacer ; les autres de se loger dans des trous, des *Alcyons*, etc. Tous changent de demeure lorsqu'ils s'y trouvent trop à l'étroit par l'effet de leur accroissement. La partie postérieure de leur corps, et surtout la queue, se trouvant sans cesse à couvert et à l'abri des frottemens, a réduit les tégumens de ces parties cachées à un état presque membraneux, et a fait avorter les lames natatoires qui n'avaient plus d'usage. Dans ceux qui vivent dans des coquilles, la queue a conservé, vers son extrémité, quelques crochets (1) ou appendices latéraux qui servent à fixer l'animal aux parois intérieures de la coquille. Leur test est divisé transversalement en deux parties inégales.

(1) Les parties dont il est ici question sont les mêmes organes qui, chez les *Macroures* constituent la nageoire caudale, savoir : le dernier segment de l'abdomen et les appendices de l'anneau précédent ; seulement, les deux articles qui terminent chacun de ces appendices, au lieu d'avoir la forme de grandes lames horizontales, sont réduits à l'état de crochets gros et courts, dont l'animal se sert ordinairement pour se cramponner dans sa demeure.

On sent que les *Hermites* tiennent encore beaucoup aux Ecrevisses, et surtout aux Thalassines, et qu'ils servent de transition aux Paguriens, raccourcis et plus crustacés, qui eux-mêmes conduisent aux Brachyures.

Les *Hermites* sont nombreux en espèces, principalement ceux qui vivent dans des coquilles.

[Le genre *PAGURUS* de Fabricius, tel que Lamarck l'adopte correspond à la tribu des Paguriens de Latreille et des autres entomologistes les plus récents. Dans ce groupe, l'abdomen, toujours en partie membraneux porte à son extrémité une paire d'appendices mobiles qui ne sont jamais lamelleux, et en général ne sont pas symétriques; les autres appendices abdominaux manquent quelquefois complètement, et lorsqu'ils existent, la plupart sinon tous ne se voient que d'un seul côté (à gauche). Le plastron sternal est linéaire, et les pattes des deux dernières paires sont très courtes, tandis que celles des deux paires précédentes sont très longues.

Cette tribu a été divisé en quatre genres : les Pagures proprement dits, les Cancellés, les Cénobites et les Birgus. On a réservé le nom de Pagures aux espèces dont l'abdomen est contourné sur lui-même, et porte à son extrémité une paire d'appendices non symétriques, et dont les antennes internes sont courtes, ne dépassent que peu le pédoncule des antennes externes, et sont terminées par deux tiges multi-articulées, très courtes. Le nombre de ces crustacés est très considérable comme on pourra le voir par le mémoire sur leur classification que nous avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles, 2^e série. t. 6.

E.

ESPÈCES.

1. Hermite Bernard. *Pagurus Bernhardus*.

P. parasiticus ; *chelis scabris* , *submuricatis* : *dextrâ majore*.

Cancer bernhardus. Lin.

Pagurus bernhardus. Fab. Suppl. p. 411.

Pagurus bernhardus. Oliv. Encyclop. no 10.

Penn. Zool. Brit. 4. t. 17. f. 38.

* Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. t. 6. p. 160. ; Encyclop. pl. 309. fig. 3.

- * *Pagurus streblonyx*. Leach. Malacostr. Pod. Brit. pl. 26. fig. 1-4.
- * *P. Bernhardus*. Desm. Consid. sur les Crust. p. 173. pl. 30. fig. 2.
- * Edwards. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 6. p. 266; Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 215; et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 44. fig. 2.

Habite l'Océan d'Europe, dans les coquilles univalves.

2. Hermite incisé. *Pagurus incisus*.

P. parasiticus; *pedibus manibusque rugis transversis denticulatis*; *chela sinistrâ majore*.

Pagurus incisus. Oliv. Encycl. n° 8.

- * *P. striatus*. Latr. Hist. des Crust. et des Ins. t. 6. p. 163.
- * *P. incisus*. Ejusdem. Encycl. pl. 310.
- * *P. striatus*. Risso. Crust. de Nice. p. 54.
- * Desmarest. op. cit. p. 178.
- * Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 10.
- * Edw. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 6. p. 270. et Hist. des Crust. t. 2. p. 219.

Habite.... Mus. n° Grande espèce.

3. Hermite granulé. *Pagurus granulatus*.

P. parasiticus; *chelis subæqualibus gregatim tuberculatis*, *interstitiis hispidis*.

Pagurus granulatus. Oliv. Encycl. n° 5.

- * Edw. Ann. des Sc. nat. 2^e série. t. 6. p. 275. et Hist. des Crust. t. 2. p. 225.

Habite la mer de l'Inde. Mus. n. Grande espèce.

4. Hermite larron. *Pagurus latro*.

P. rubens; *testæ parte posticâ suturis quadrifidâ*; *caudâ latâ*, *subtius ventricosâ*.

Cancer latro. Lin.

Pagurus latro. Fab. Suppl. p. 411.

Oliv. Encycl. n° 2.

Séba. mus. 3. t. 21. f. 1. 2.

Birgus latro. (1) Leach. (* Trans. of the Linnean society vol. XI.)

(1) Le genre *Birgus* de M. Leach diffère des *Pagures* proprement dits, par plusieurs caractères, dont les plus remarquables consistent dans le mode de conformation de l'abdomen; la pres-

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 180. pl. 30. fig. 3.

* Quoy et Gaimard. Voyage de l'Uranie. pl. 80.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 246, et atlas du Règne anim. de Cuvier, Crust. pl. 43. fig. 2.

Habite la mer des Indes, dans les cavités des rochers.

Etc. Voyez, pour ce genre, Fabricius, suppl. et Olivier, Encyclopédie.

Nous avons donné le nom générique de **CANCELLE** (*cancellus*) à une petite division de la tribu des Paguriens, très voisine des Pagures proprement dite, mais dans laquelle l'abdomen n'est pas contourné sur lui-même et a ses appendices terminaux symétriques. (Voy. Ann. des Sc. nat. 2^e série t. vi. p., pl. xiv, fig. iii. et notre Hist. des Crust. t. 2. p. 243).

Le genre **CÉNOBITES**, de Latreille, établit le passage entre les Pagures proprement dits et les Birgus ; l'abdomen est conformé comme chez les premiers, et les Antennes internes, comme chez les derniers ; c'est-à-dire, très longues (leur deuxième article dépassant de beaucoup le pédoncule des antennes externes) et terminées par deux tigelles multiarticulées, dont l'une est assez longue. La conformation des pédoncules oculaires et des pattes antérieures, est également caractéristique chez les Cénobites. Le type de ce genre est le *Pagurus Clypeatus* de Fabricius

que totalité de cette portion du corps est recouverte par de grandes plaques cornéo-calcaires qui chevauchent les unes sur les autres, comme chez les Macroures. Il existe aussi chez ces crustacés une disposition très singulière de l'appareil respiratoire qui a été signalée par M. Geoffroy-Saint-Hilaire, et qui paraît destinée à permettre à ces animaux de rester très longtemps hors de l'eau ; la cavité branchiale est très grande, et sa voûte est tapissée par une multitude de végétations vasculaires qui naissent à la surface du chorion, et sont presque entièrement dépourvues d'épiderme. E.

(Supplém. p. 413. — *Cancer Chypentus* Herbst. pl. 23. fig. 2. — *Canobita Chypentus* Latreille, Règne Anim. de Cuv. 2^e édit. t. 4. p. 77; — Edwards, Hist. des Crust. t. 2. p. 239). On en connaît plusieurs espèces, qui vivent toutes dans les mers de l'Inde ou de l'Amérique. E.

HIPPE. (Hippa.)

Quatre antennes, inégales, ciliées : les deux intermédiaires courtes, bifides au sommet ; les deux extérieures plus longues, roulées en dehors. Les yeux écartés, portés sur des pédoncules menus.

Test ovale-oblong, convexe, un peu rétréci en devant où il est tronqué, échancré, à 2 ou 3 dents. Queue courte, munie de chaque côté, à sa base, d'un appendice : à lobe terminal oblong. Pattes dépourvues de pinces : les deux antérieures terminées par une main lamelliforme, adactyle.

Antennæ quatuor, inæquales, ciliatæ : intermediis duabus brevibus, apice bifidis ; externis longioribus, revolutis. Oculi remoti ; pedunculis gracilibus.

Testa ovato-oblonga, convexa, anticè subattenuata, truncata, emarginata, bi seu tridentata. Cauda brevis, ad basim utrinque appendice instructa : lobo terminali oblongo. Pedes chelis nullis : antiqui duo manu lamelliformi, adactyla terminati.

OBSERVATIONS. — Les *Hippes* sont distinguées des *Albunées*, principalement par leurs antennes intermédiaires, qui sont bifides et plus courtes que les extérieures, et parce que la main aplatie des pattes antérieures n'a aucun doigt. Ils ont les antennes rapprochées à leur insertion.

[Les *Hippes*, les *Rémipèdes* et les *Albunées* forment une petite tribu très naturelle qui se compose de crustacés fouisseurs et appartient à la section des *Décapodes anomoures*. Chez tous ces animaux, la carapace moins large que longue, et très

convexe transversalement, se prolonge de chaque côté au-dessus des pattes, qui sont imparfaitement extensibles; celles de la première paire sont médiocres et monodactyles ou subchéli-formes celles des trois paires suivantes sont terminées par un article lamelleux, ordinairement hastiforme, et celles de la dernière paire sont filiformes et relevées au-dessus de la base des précédentes; la portion antérieure de l'abdomen est très large et semble compléter en arrière la carapace; enfin, le pénultième anneau abdominal porte une paire de fausses pattes terminées par deux lames ovalaires, à-peu-près comme chez les Macroures, mais qui sont reployées en avant, et le dernier segment de l'abdomen, est en général très grand. Les Hippes se distinguent des deux autres genres dont nous venons de parler, par la longueur de leurs antennes externes dont la tige terminale multi-articulée, est très grosse.]

E.

ESPÈCES.

1. Hippe émérite. *Hippa emeritus*.

H. testâ anticè tridentatâ.

Cancer emeritus. Linn.

Hippa emeritus. Fab. Suppl. p. 370.

Latr. Gen. 1. p. 45. et Hist. nat. 6. p. 176. pl. 52. fig. 1.

Herbst. Canc. tab. 22. fig. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 174. pl. 29. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 209. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 42. fig. 2.

* Habite les côtes du Brésil.

RÉMIPÈDE. (Remipes.)

Quatre antennes, peu allongées, ciliées; les intermédiaires recourbées au dessus des extérieures. Les yeux pédiculés, insérés dans les sinus antérieurs du test.

Test ovale. Queue des hippes, à lobe terminal allongé, cilié. Dix pattes toutes natatoires, et terminées par une lame oblongue, un peu en pointe, ciliée.

Antennæ quatuor, breviusculæ, ciliatæ; intermediis supra exteriores insertis. Oculi pedunculati, in sinibus antice testæ.

Testa ovata. Cauda Hipparum: lobo terminali elongato, ciliato. Pedes decem, omnes natatorii, laminâ oblongâ, subacutâ, ciliatâ, terminati.

OBSERVATIONS. — Les *Rémipèdes* ressemblent beaucoup aux *Hippes*; mais toutes leurs pattes, et conséquemment les plus postérieures sont terminées en lames ciliées. La lame des deux pattes antérieures finit un peu en pointe.

ESPÈCE.

1. Rémipède tortue. *Remipes testudinarius*.

Habite la mer des Indes. Mus. n.

Latr. Gen. 1. p. 45.

Cuv. Règne anim., etc. 3. p. 28. et vol. 4. t. 12. f. 2.

* Herbat. pl. 12. fig. 4.

* Latreille. Encyclop. pl. 308. fig. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 175. pl. 29. fig. 1.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 15. fig. 3.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 207. pl. 21. fig. 14-20. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 42. fig. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°

Obs. Latreille cite avec doute, dans son *Genera*, l'*Hippa adactyla* de Fabricius, suppl. p. 370. Je pense qu'il en est effectivement une variété, à corps moins gros, moins large, selon un des individus du Muséum.

ALBUNÉE. (Albunea.)

Deux antennes intermédiaires longues, sétacées, ciliées, avancées, insérées sous les yeux. Pédoncules des yeux squamiformes, contigus.

Test ovale, un peu plus étroit postérieurement, tronqué en devant, légèrement convexe, Queue courte, articulée, à lobe terminal ovoïde, ayant quelques appendices de

chaque côté. Deux pattes antérieures, à main comprimée, monodactyle : le doigt mobile, arqué en faux. Les autres suivantes terminées par une lame en faux. Les dernières très petites, filiformes.

Antennæ duæ intermediæ longæ, setaceæ, ciliatæ, porrectæ, infra oculos insertæ. Oculorum pedunculi squamiformes.

Testa ovalis, porticè subangustior, anticè truncata, convexiuscula. Cauda brevis, articulata, appendicibus aliquot utrinque instructa : lobo terminali ovato. Pedes duo anticæ manu compressâ monodactylâ; dactylo mobili falcato. Cæteri sequentes lamellâ falcatâ terminati. Postici ultimi filiformes, minimi.

OBSERVATIONS. — Dans les *Albunées*, ce sont les antennes intermédiaires qui sont les plus longues, les seules mêmes qu'on aperçoive au premier aspect. Elles ne sont point bifides à leur sommet. Quant à la main aplatie des deux pattes antérieures, elle a un doigt mobile, arqué en faux, qui n'existe point dans les Hippes.

ESPÈCES.

1. Albunée symniste. *Albunea symnista*.

Albunea symnista. Fab. Suppl. p. 397.

Cancer symnista. Lin.

Herbst. Canc. tab. 22. f. 2.

Albunea symnista. Latr. Gen. 1. p. 44.

* Desm. Consid. sur les Crust. p. 173. pl. 29. fig. 5.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 15. fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 203. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 42. fig. 3.

Habite l'Océan indien.

Etc.

L'*albunea scutellata* de Fab. suppl., paraît être aussi de ce genre (* *Albunea scutellata*. Desm. op. cit. p. 273. — Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 204. pl. 21. fig. 9-13). Latreille indique, en outre, le *cancer carabus*, Gmel. p. 2984, comme pouvant y appartenir.

RANINE. (Ranina.)

Quatre antennes courtes : les deux intermédiaires à dernier article bifide.

Test cunéiforme ou oblong, tronqué antérieurement. Queue petite, articulée, étendue, ciliée sur les bords. Dix pattes : les deux antérieures presque en pince, ayant un doigt mobile, arqué en faux ; les autres terminées par une lame natatoire.

Antennæ quatuor, breves, intermediis duabus articulo ultimo bifidis.

Testa cuneiformis vel oblonga, anticè truncata. Cauda parva, extensa, articulata, ad margines ciliata. Pedes decem : antici duo subchelati, digito mobili falcato instructi ; cæteri sequentes lamina natatoria terminati.

OBSERVATIONS. — Les *Ranimes* appartiennent évidemment aux Paguriens, et ont de grands rapports avec les Albunées ; mais elles en sont très distinguées par leurs antennes intermédiaires. Leurs pattes sont rapprochées à leur insertion, chevauchent en partie les unes sur les autres, et semblent tendre à se relever, comme le font plusieurs des pattes postérieures de l'Albunée et de l'Hippe. Ces crustacés forment une transition aux brachyures.

[Les Ranines ressemblent beaucoup aux Albunées par la forme générale de leur corps, mais s'en éloignent par la disposition de leur abdomen, de leurs branchies, de leur appareil buccal et de leur thorax. Chez ces animaux l'abdomen est très petit et complètement dépourvu d'appendices terminaux appartenant au pénultième anneau, les pattes de la cinquième paire sont à-peu-près de même forme que celles des trois paires précédentes ; les pattes-mâchoires sont conformées à-peu-près comme chez les Brachyures ; le plastron sternal est très large à sa partie antérieure ; enfin, les branchies sont disposées de la même manière que chez les Brachyures, mais la cavité qui les renferme est complètement fermée, si ce n'est à ses deux extrémités. En-

fin, les vulves occupent, comme d'ordinaire chez les Décapodes Anomoures, l'article basilaire des pattes de la troisième paire. Ces animaux forment le type d'une petite tribu que nous avons désignée sous le nom de Raniniens, et que nous avons divisée en trois genres : les *Ranines* proprement dites, les *Ranilies* et les *Raninoïdes* ; les premières se distinguent par la forme de leur plastron sternal qui devient linéaire entre la base des pattes de la seconde paire et de leurs antennes externes, dont le second article présente en dehors un grand prolongement auriculaire.] E.

ESPÈCE.

1. Ranine dentée. *Ranina serrata*.

R. testa cuneatim ovata, planiuscula, antice truncata, serrata; brachiis validè dentatis.

Cancer raninus. Linn.

Fab. Syst. 2. p. 438.

Albunea scabra ? Fab. Suppl. p. 398.

Ranina serrata. Lam. Syst. des anim. sans vert. p. 156.

Lat. Gen. 1. p. 43. et Hist. nat. 6. p. 133. pl. 51. f. 1.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. t. V.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 286.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 140.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 14. fig. 3.

* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 31 ; et Hist. des Crust. t. 2. p. 194. pl. 21. fig. 1.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mus. n° Espèce d'une grande taille.

2. Ranine dorsipède. *Ranina dorsipes*.

R. testa ovato-oblonga, subcylindrica, glabra; margine antico septem aut novem-dentato.

Cancer dorsipes. Lin.

Albunea dorsipes. Fab. Suppl.

Ranina dorsipes. Latr. Gen. 1. p. 43.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 140. pl. 19. fig. 2.

* *Ranina lævis*. Latr. Encycl. t. 10. p. 268.

* *Raninoïdes lævis*. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 197. (1)

(1) Dans le genre *RANINOÏDE*, la portion antérieure du sternum est conformée comme chez les *Ranines*, mais au lieu de de-

Habite l'Océan indien et austral. Mus. n° Rumphius (mus. t. 10: fig. 3.) en a donné une figure mauvaise. (* Cette figure ne paraît pas y appartenir.)

* Ajoutez la *Ranina Aldrovandi* (Ranzani. Mem. de storia natural. p. 73. tab. 5. — Desmarest. Crust. fossiles. pl. 10. fig. 5-7. pl. 11. fig. 1. — Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 195) espèce qui n'existe qu'à l'état fossile; et la *Ranina maresiana* (Konig. Icones fossilium select. p. 2. pl. 1. fig. 14.) qui pourrait bien n'être qu'une variété de la précédente.

Dans notre genre **RANILIE** la forme générale du corps est la même que chez les Ranines, mais les antennes externes ne présentent pas de prolongement auriculiforme; la disposition des pattes-mâchoires est un peu différente et le plastron sternal, semblable à celui des Ranines dans sa partie antérieure, s'élargit entre les pattes de la 3^e et de la 4^e paire, de manière à y former un disque hexagonal un peu concave. L'espèce d'après laquelle ce genre est établi a reçu le nom de *Ranilia muricata* (Edw. Hist. des Crust. t. 2 p. 196). E.

DEUXIÈME SECTION.

HOMOBANCHES BRACHYURES.

Queue toujours plus courte que le tronc, entièrement repliée et cachée en dessous, dans l'état de repos, et en général nue, sans nageoires, et sans appendices dans presque tous.

Les *Homobanches brachyures*, ou à queue courte, nous

venir linéaire entre les pattes de la deuxième paire, ce bouclier ventral s'élargit entre ces pattes, et celles de la troisième paire qui sont très éloignées des précédentes, et il ne devient linéaire qu'entre les pattes de la quatrième paire. Il est aussi à noter que les pattes de la cinquième paire sont presque filiformes.

E.

paraissent les crustacés les plus perfectionnés, ceux conséquemment qui doivent terminer la classe (1). Ces crustacés sont remarquables par leur corps court, très souvent plus large que long; par leur test solide, quelquefois très dur; enfin par leur queue toujours plus courte que le test, peu épaisse, plus étroite et plus en pointe dans les mâles que dans les femelles, articulée et tout-à-fait repliée, dans l'état de repos, sous le ventre de l'animal, s'y appliquant dans une cavité propre à la recevoir. Cette queue est nue sur les bords ainsi qu'au sommet, dans la presque totalité des *Brachyures*; dans quelques-uns, néanmoins, elle est ciliée; quelquefois même elle offre, à son extrémité, quelques appendices latéraux peu développés, qui appartiennent à une nageoire peu employée. (2)

Ainsi, sous le rapport de la forme raccourcie de l'animal, et sous celui de sa queue très courte, presque généralement nue, et tout-à-fait repliée sous le ventre, dans l'état de repos, les *Brachyures* sont bien distingués des *Macroures*, et se reconnaissent effectivement au premier aspect. Leur forme générale rappelle celle de l'araignée.

(1) C'est effectivement chez ces Crustacés que la centralisation du système nerveux est portée au maximum (Voyez Rech. sur le système nerveux des Crustacés par MM. Audouin et Milne Edwards, insérées dans les annales des sc. nat. 1^{re} série, t. 1)
E.

(2) Si l'on assigne à cette section les limites que nous avons indiquées (page), on n'y comprendra que les Décapodes dont l'abdomen est complètement dépourvu d'appendices fixés à son pénultième anneau. Chez tous ces Crustacés, les ouvertures génitales de la femelle sont situées sur le plastron-sternal, et il existe une poche copulatrice, tandis que chez les Anomoures et les Macroures, cette poche manque, et les vulves sont creusées dans l'article basilaire des pattes de la troisième paire.

Comme dans les autres Homobanches, leurs branchies sont cachées sous les bords latéraux du test, et chacune d'elles forme une pyramide à deux rangées de feuillets vésiculeux. (1)

Le test, d'une seule pièce (2) qui couvre le tronc, porte les yeux, les antennes et les parties supérieures de la bouche. Les antennes, et surtout les intermédiaires, sont petites en général. Celles-ci sont ordinairement repliées et logées dans deux fossettes, sous le bord antérieur du test; elles ont trois articles et sont terminées par des filets courts. Les antennes extérieures sont plus longues, sétacées, en général quadriarticulées; elles s'insèrent, le plus souvent, près du côté interne des yeux. Les pieds-mâchoires inférieurs sont, en général, courts, larges, comprimés, et les extérieurs recouvrent la bouche comme une lèvre inférieure.

Quoique ces crustacés aient, pour la locomotion, dix pattes comme les Macroures, il n'y a guère chez eux que les deux pattes antérieures qui soient munies de pinces. Elles forment ordinairement deux bras avancés, propres à la préhension.

Les *Brachyures* étant nombreux en genres divers, je les diviserai en cinq groupes particuliers, de la manière suivante.

(1) Chez tous les *Brachyures* proprement dits, les branchies sont insérées sur un seul rang, et il n'en existe jamais sur les deux derniers anneaux du thorax; leur nombre est presque toujours de neuf de chaque côté, dont deux rudimentaires fixées aux pattes-mâchoires de la deuxième et troisième paires; quelquefois il y en a moins, mais jamais davantage. E.

(2) Ce bouclier céphalothoracique se compose de trois pièces (Voyez mon *Hist. des Crust.* t. 1. p. 47.) 41.

DIVISION DES HOMOBRANCHES BRACHYURES.

- (1) Point de pattes terminées en nageoires. Test presque orbiculaire, ou elliptique.

Les Orbiculés.

- (2) Point de pattes terminées en nageoire. Test subtriangulaire, plus large dans sa partie postérieure, rétréci en pointe antérieurement.

Les Trigonés.

- (3) Point de pattes terminées en nageoire. Test tronqué antérieurement ou ayant son bord antérieur en ligne droite transverse.

Les Plaquettes.

- (4) Des pattes natatoires, c'est-à-dire, terminées par une lame propre à la natation. La forme du test n'est point considérée.

Les Nageurs.

- (5) Point de pattes natatoires. Le bord antérieur du test étant simplement arqué, sans être tronqué ni en pointe.

Les Cancérides.

[Le groupe des Brachyures (dont il faut exclure les Porcellanes, les Dromies et les autres Décapodes dont les vulves sont placées sur l'article basilaire des pattes de la troisième paire au lieu d'occuper le plastron sternal) nous paraît devoir être divisé en quatre familles naturelles qui ont reçu les noms d'Oxystomes, de Catométopes, de Cyclo-métopes et d'Oxyrhynques. Cette dernière famille correspond à la division des Trigonés de Lamarck et comprend les Brachyures à front rostriforme, à épistome très développé et à cadre buccal élargi antérieurement. Les Cyclo-métopes et les Catométopes ont aussi le cadre buccal large antérieurement, mais leur épistome est presque linéaire et leur front est en général très large et tronqué. Chez les Cyclo-métopes les ouvertures de l'appareil générateur du mâle sont creusées dans l'article basilaire des pattes postérieures

et sont disposées comme d'ordinaire, tandis que chez les *Catometopes* ces ouvertures sont pratiquées dans le plastron sternal ou bien se continuent chacune avec un canal transversal, creusé dans ce même plastron. Enfin les *Oxystomes* sont caractérisés par la forme plus ou moins triangulaire du cadre buccal et par plusieurs autres particularités de structure. (Voyez notre histoire des Crustacés t. 1.)

E.

LES ORBICULÉS.

Test presque orbiculaire ou elliptique. Point de pattes terminées en nageoire, ni relevées sur le dos.

Ces Brachyures nous paraissent les plus voisins des *Macroures*, et surtout des *Macroures paguriens*. Ils ont à la vérité la queue plus courte que le tronc et tout-à-fait repliée en dessous, au moins dans l'inaction, comme dans tous les autres Brachyures; mais cette queue, souvent, est ciliée en ses bords, ou munie de quelques appendices, paraissant presque natatoires dans certains d'entre eux; plusieurs même ont encore les antennes extérieures fort longues, sétacées, multiarticulées, ce qu'on ne voit plus dans les autres Brachyures.

Nous rapportons à cette coupe, les genres *Porcellane*, *Pinnothère*, *Leucosie* et *Coryste*, dont l'exposition suit.

PORCELLANE. (*Porcellana*.)

Quatre antennes : les extérieures fort longues, sétacées, insérées en dehors derrière les yeux; les intermédiaires cachées dans des fossettes.

Corps orbiculaire, presque carré, un peu aplati. Queue

recourbée en dessous, à bord très cilié, rarement munie de quelques appendices au sommet. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pinces ; les deux postérieures très petites.

Antennae quatuor : externae praelongae setaceae, pectus extrinsecus insertae ; internediae in furcillis receptae.

Corpus orbiculato-quadratum, depressiusculum. Cauda subtus inflexa, margine ciliata, appendicibus aliquot ad apicem raro instructa. Pedes decem : anticis duobus chelatis ; ultimis duobus minimis.

OBSERVATIONS. — Les *Porcellanes* sont de petits crustacés qui semblent sur la limite qui sépare les Macroures des Brachyures ; néanmoins, ils nous paraissent appartenir plutôt à ces derniers. Leur genre est bien tranché, ces crustacés ayant les antennes extérieures fort longues, sétacées, et insérées en dehors derrière les yeux.

[La plupart des auteurs, au lieu de ranger les *Porcellanes* parmi les Brachyures, comme le fait Lamarck, les placent dans la section des Macroures : mais dans une classification naturelle, elles ne peuvent entrer ni dans l'un, ni dans l'autre de ces groupes, et doivent faire partie d'une division intermédiaire. En effet, la conformation de l'abdomen et la disposition des branchies et des organes de la génération, éloignent les *Porcellanes* des Brachyures proprement dits, et d'un autre côté la forme générale du corps, la structure du thorax, celle des appendices abdominaux et plusieurs autres caractères, les séparent des véritables Macroures, tandis que toutes ces particularités de structure les rapprochent des genres dont nous avons formé la section des Anomoures. Quoi qu'il en soit, Lamarck réunit dans le genre *Porcellane* des espèces qui diffèrent trop entre elles pour qu'on puisse les laisser dans une même division, et on ne doit conserver dans ce groupe que celles dont l'abdomen est terminé par une nageoire en éventail. E.]

ESPÈCES.

1. Porcellane hérissée. *Porcellana hirta*.

*P. testâ subovata, anticiâ attenuatâ, hirtâ; chelis latîs compressis
superiâ marginâque hirtis.*

Porcellana hirta. Mus. n°

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 295.

* *Lomis hirta*. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 188.

Habite... du Voyage de Péron et Lesueur.

(* Ce crustacé, dont nous avons formé le genre *Lomis*, diffère des Porcellanes proprement dites par l'absence complète des appendices du pénultième anneau abdominal, par la disposition des antennes et par plusieurs autres caractères).

2 Porcellane large-pince. *Porcellana platycheles*.

*P. testâ suborbiculatâ, glabrâ; chelis oblongis compressis, margine
externo ciliatis.*

Cancer platycheles. Oliv. Enc. n° 19.

Porcellana platycheles. Latr. Gen. 1. p. 49.

Pennant. Zool. brit. 4. tab. 6. fig. 12.

* Leach. Dict. des Sc. nat. t. 18. p. 55.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 195. pl. 34. fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 255.

Habite les mers d'Europe.

3. Porcellane longicorne. *Porcellana longicornis*.

P. testâ suborbiculatâ, glabrâ; chelis elongatis glabris.

Cancer longicornis. Oliv. Encyc. n° 25.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. 1 f. 3.

* *Pisidia longicornis*. Leach.

* Desmarest. op. cit.

* *Porcellana longicornis*. Edw. op. cit. p. 257.

Habite l'Océan d'Europe. Ce n'est peut-être qu'une variété du *P. hexapus*. Latr.

4. Porcellane verdâtre. *Porcellana virescens*.

P. minima, glabra, viridis; testâ orbiculata convexa; chelis brevibus.

Porcellana virescens. Péron. Mus. n°

Habite.... du Voyage de Péron et Lesueur.

Éta. Voyen le *P. galathina* de Rose, Hist. nat. des Crust. 1. pl. 6.
fig. 2.

[Le genre *Hyménosome* de Leach a été rangé, par la plupart des auteurs, auprès des *Inachus*, mais doit prendre place à côté des *Pinnothères* dans notre famille des *Catométopes*. De même que chez ces crustacés, les orifices de l'appareil générateur du mâle sont situés sur le plastron sternal. La carapace, très aplatie en dessus, est presque circulaire, mais se termine antérieurement par un rostre étroit et pointu. Les fossettes antennaires sont longitudinales et se continuent, sans interruption, avec les orbites près de l'angle externe desquels s'insèrent les antennes externes; les pattes-mâchoires externes sont longues et étroites; enfin l'abdomen du mâle est très petit et n'occupe pas, à beaucoup près, tout l'espace compris entre la base des pattes postérieures. On ne connaît qu'une seule espèce appartenant à ce genre, c'est l'*Hymenosoma orbiculare* Leach; Desmarest, op. cit. pl. 26, fig. 1; Latreille, Règne anim. t. 4, p. 63. — Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. 36.

[Nous avons donné le nom générique d'*ELAMÈNE* à un petit crustacé de la mer Rouge, qui paraît établir le passage entre les *Hyménosomes* et les *Inachus*, et qui avait été jusque alors réuni aux premiers sous le nom de *Hymenosoma Mathœi* (Desm. op. cit. p. 63; Ruppell Krabben, pl. 5, fig. 1. — Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. 35). E.

† Genre **MYCTIRE**. *Myctiris*.

Les *Myctires*, que Latreille a le premier fait connaître, établissent, à plusieurs égards, le passage entre les *Pinnothères* et les *Ocypodes*. Leur carapace, extrêmement mince, est presque circulaire et très bombée en dessus. Le front est disposé à-peu-près comme chez les *Ocypodes*; mais les yeux, qui sont courts et gros, n'ont point de

cavité orbitaire pour se cacher et restent toujours saillans. Les antennes internes sont très petites et placées comme chez les Ocypodes; les externes sont plus longues. La disposition de la bouche est très remarquable. Les pattes-mâchoires externes, au lieu de s'appliquer horizontalement dans le cadre buccal, restent presque verticales et forment, par leur réunion, un cône renversé, court et large, dont le sommet, dirigé en bas est ouvert et garni de poils; leur portion lamelleuse (formée par les deuxième et troisième articles) est très large, et porte l'article suivant à son extrémité antérieure; au-devant de l'apophyse située à la base de ces pattes-mâchoires, et dirigée en dehors pour supporter le fouet, la carapace présente une grande échancrure, de façon que l'ouverture afférente de l'appareil respiratoire est toujours béante. Les pattes de la première paire sont très longues, et se reploient longitudinalement sur la bouche; les pattes suivantes sont longues, grêles et aplaties; enfin l'abdomen a la même forme dans les deux sexes, et s'élargit vers le bout.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre :

Le *M. longicarpis*. Latr. Encyclop. Atlas. pl. 297. fig. 3. — Desm.

op. cit. p. 11. fig. 2. — Guérin. Iconog. Crust. pl. 4. fig. 4. —

Edw. op. cit. t. 2. p. 37.

Le genre Doro de M. Dehaan (1) est aussi intermédiaire entre les Pinnothères et les Ocypodes, mais se distingue par la conformation des pattes-mâchoires externes; il ne comprend que le *Cancer sulcatus* de Forskael, dont M. Savigny a donné de très belles figures dans le grand ouvrage de l'Égypte (Crust. pl. 1, fig. 3).

(1) Fauna Japonica, 1. livraison, — Edw. Hist. du Crust., t. 2. p. 38. E.

PINNOTHÈRE. (Pinnotheres.)

Quatre antennes très courtes, insérées entre les yeux. Ceux-ci sont écartés, à pédicules courts.

Corps orbiculaire, rétus antérieurement et postérieurement. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince.

Antennae quatuor, brevissimae, intra oculos insertae. Oculi remoti; pedunculis brevibus.

Corpus orbiculare, anticè posticèque retusum. Pedes decem : anticis duobus chelatis.

OBSERVATIONS. Les *Pinnothères* sont de très petits crustacés orbiculaires, à test presque membraneux, et qui vivent dans l'intérieur de certaines coquilles bivalves, telles que les moules et quelques autres, quoique l'animal de la coquille l'habite encore. Ils s'y tiennent à l'abri de tout danger. Leurs antennes sont insérées dans l'espace qui sépare les yeux. Ces petits crustacés sont glabres.

[La disposition de la bouche est également caractéristique chez les *Pinnothères*; le cadre buccal est très large en arrière et décrit un demi-cercle en avant, et la portion élargie et valvulaire des pattes-mâchoires externes, est formée en entier par le troisième article de ces organes. Les orifices de l'appareil générateur du mâle, sont creusés dans le dernier segment du plastron sternal, au lieu d'occuper l'article basilaire des pattes postérieures comme chez la plupart des *Brachyures*. Enfin, il paraîtrait, d'après les observations récentes de M. Thompson, que dans les premiers temps de la vie, ces Crustacés ont l'abdomen très long et terminé par une nageoire, la carapace armée de pointes, les yeux très gros et les pattes natatoires, en un mot qu'ils ressemblent extrêmement à des Zoés.

E.

ESPÈCES.

1. Pinnothère pois. *Pinnotheres pisum*.

P. testâ orbiculato-quadrata, lævi, molliusculâ; caudâ corporis latitudine.

Cancer pisum. Lin. Fab. Suppl. p. 343.

Pinnotheres pisum. Latr. Gen. 1. p. 35.

Herbst. Canc. tab. 2. f. 21.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. 1. f. 1.

* Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 14. fig. 2 et 3 (la femelle) ;

P. varians. Ejusdem. op. cit. pl. 14. fig. 10-11 (le mâle) et

P. Latreillii. Ejusdem. op. cit. pl. 14. fig. 7 et 8 (jeune femelle).

* *P. pisum*. Desm. Consid. sur les Crust. p. 118, pl. 11. fig. 3.

* Thompson. Entomological magazine. n° X. p. 93. fig. 3.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 31.

Habite les mers d'Europe. Comparez avec le *Pinnotheres cranchii*.

Leach. Crust. annulosa. pl. 21.

2. Pinnothère des moules. *Pinnotheres mytilorum*.

P. ovato-arbiculata, convexa, albida; manibus ovatis : digitis arcuatis.

• *Pinnotheres mytilorum*. Latr. Gen. 1. p. 35.

Ejusd. Hist. nat., etc. 6. p. 83. pl. 48. fig. 1.

Herbst. Canc. t. 2. f. 24.

Habite les mers d'Europe, dans les moules.

* Ce Pinnothère n'est pas une espèce distincte de la précédente, mais seulement la femelle du *P. Poia*.

Etc.

LEUCOSIE. (Leucosia.)

Antennes très petites, rapprochées, insérées entre les yeux, cachées dans des fossettes. Les yeux très petits.

Test arrondi-ovale, très convexe, solide, glabre, à bord antérieur étroit, un peu saillant. Dix pattes; les deux antérieures terminées en pinces; les deux dernières fort petites.

Antennæ minimæ, approximæ, intra oculos insertæ, in foveolis occultatæ. Oculi minuti.

Testa rotundato-ovata, valde convexa, solida, glabra; antico margine brevi, subproducto. Pedes decem : duobus anticis chelatis; posticis minimis.

OBSERVATIONS. — Les *Leucosies* ont un aspect qui les fait aisément reconnaître. Elles sont remarquables par leur test arrondi-ovale, bombé ou très convexe en dessus, presque globuleux, solide, glabre, et qui offre antérieurement une saillie courte, dont le bord est étroit et transverse. Les antennes et les yeux sont très petits, et ne paraissent point lorsqu'on regarde le dessus de l'animal. Les deux pieds-mâchoires extérieurs, dit Latreille, sont pointus et forment ensemble un grand triangle, dont la pointe est en avant.

Les bras des *Leucosies* sont longs, à pinces assez étroites; les quatre autres paires de pattes sont onguiculées. Ces animaux neagent point, se tiennent au fond de la mer, vers les rives, et ont peu de vivacité dans leurs mouvements.

[Les *Leucosies* de Fabricius ou *Leucosiens* des auteurs les plus récents, constituent une tribu particulière dans la famille des *Oxystomes*, et se reconnaissent à la forme de leur carapace, à l'absence d'ouvertures respiratoires au devant de la base des pattes antérieures, à l'état rudimentaire des antennes externes et à quelques autres caractères. Ils sont assez nombreux et ont été subdivisés en douze petits genres, savoir : les *Leucosies* proprement dites, les *Ilia*, les *Guaia*, les *Myra*, les *Phyllires*, les *Mursies*, les *Ebalies*, les *Oréophores*, les *Iphis* et les *Ixa*.
E.

ESPÈCES.

1. *Leucosie* ponctuée. *Leucosia punctata*.

L. testá ovato-globosá, punctis minimis adpersá; posticè dentibus tribus.

Leucosia punctata. Fab. Suppl. p. 350.

Cancer punctatus. Brown. Jam. p. 422. tab. 42. f. 2.

* *Ilia punctata*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 125. (1)

Habite l'océan des Antilles. Mus. n° C'est l'espèce la plus grande.

(1) Le genre *ILIA* de M. Leach se compose des *Leucosiens* à

2. Leucosie craniolaire. *Leucosia craniolaris*.

L. testâ orbiculato-globosâ , anticè productiusculâ , posticè integrâ ; brachiis crassis , breviusculis.

Leucosia craniolaris. Fab. Supp. p. 350.

Cancer craniolaris. Lin.

Herbst. Canc. t. 2. f. 17.

Rumph. Mus. t. 10. fig. B. A.

Seba. Mus. 3. t. 19. f. 10.

* Lichtenstein. Berlin magasin. 1816. p. 141.

* Leach. Zool. Miscel. vol. 3. p. 21.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 107. pl. 27. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 122.

Habite l'Océan indien.

* Cette espèce appartient à la division générique des *Leucosies proprement dites*, qui se reconnaissent à la forme circulaire de leur carapace, à leur cadre buccal, très étroit antérieurement, et terminé en dehors par un bord droit, et à leurs pattes antérieures courtes et grosses.

3. Leucosie noyau. *Leucosia nucleus*.

L. testâ orbiculato-globosâ , anticè bidentatâ , posticè quadridentatâ brachiis elongatis gracilibus.

Cancer nucleus. Lin.

Herbst. Canc. t. 2. f. 14.

Leucosia nucleus. Latr. Gen. 1. p. 36.

* *Ilia nucleus*. Leach. Zool. Miscel. t. 3. p. 24.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 169. pl. 27. fig. 3.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 124 et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 25. fig. 2.

Habite la Méditerranée. Mus. n°

* Cette espèce appartient au genre *ILIA* de Leach, qui diffère des autres *Leucosiens* à carapace globuleuse et à cadre buccal triangulaire par la forme grêle et allongée des pattes antérieures, et surtout des pinces qui sont presque filiformes.

Etc.

Ajoutez : *Leuc. porcellana* (1), *L. fugax* (2), *L. cylindrus*, (*Ixa* (3), Leach.) *L. septemspinosa* (4), et quelques autres (5).

carapace circulaire et à cadre buccal très étroit antérieurement, dont les pattes antérieures sont très longues et terminées par des doigts presque filiformes. E.

(1) Cette espèce, figurée par Herbst, t. 1, pl. 2, fig. 18, et

Le petit crustacé fossile décrit par M. Desmarest, sous le nom de *Leucosia sub-rhomboidale* (Crust. foss. p. 114, pl. 9, fig. 13). appartient à cette subdivision des Leucosies proprement dites, et se rapproche beaucoup par sa forme générale de la Leucosie craniolaire ; il a cependant

fréquemment confondue avec la *Leucosia globulosa*, appartient comme cette dernière au genre *PHYLÆ* de Leach, petite division composée de Leucosiens à carapace circulaire et déprimé, dont le cadre buccal est presque aussi large en avant qu'en arrière, et dont les fossettes antennaires sont très étroites et transversales (Voyez notre Hist. nat. des Crust. t. 2, p. 131, et l'atlas de la nouvelle édition du Règne animal. Crust. pl. 24, fig. 4). C'est à ce genre que paraît appartenir le crustacé fossile décrit par M. Desmarest sous le nom de *Leucosia cranium*. (Crust. foss. p. 113. pl. 9. fig. 10. 11 et 12.)

(2) Cette espèce, figurée par Rumph (Amb. pl. 10, fig. 6), par M. Desmarest (Consid. sur les Crust. pl. 28, fig. 2), et par nous (Atlas du Règne animal. Crust. pl. 25, fig. 3), constitue le type du genre *MYXA* de Leach, division qui est extrêmement voisine des *Ilias* dont elle se distingue par la courbure que décrit le bord externe des palpes ou branche externe des pattes-mâchoires externes.

Notre genre *GUAIA* se rapproche beaucoup du précédent, mais la forme des pattes-mâchoires est la même que chez les *Ilias*, et les pattes antérieures sont longues, mais les pinces sont courtes et grosses. Le type de ce genre est le *Guaia* de Marcgrave (Brésil, p. 182. *Cancer punctatus*. Brown, civil and nat. Hist. of Jamaica, t. 1, pl. 42, fig. 3. — *Cangrejo tortuga*. Parra, Descripcion de diferentes piezas di storia natural, pl. 51, fig. 2. — *Cancer mediterraneus*. Herbst., t. 1, pl. 37, fig. 2. — *Guaia punctata*. Edwards, Hist. des Crust. t. 2, p. 127.)

(3) Les singuliers Crustacés, dont Leach a formé le genre *IXA*, se distinguent au premier coup-d'œil par la forme de leur carapace, dont la portion moyenne est à-peu-près sphérique, et se continue de chaque côté avec une portion cylindrique, triple de sa longueur, qui se porte horizontalement en dehors jusqu'au

le rostre plus court et la carapace allongée. Son gisement est inconnu.

La *Leucosia prevostiana* du même auteur (Desm. Crust. foss. p. 114, pl. 9, fig. 14) est aussi une espèce fossile, mais elle est trop imparfaitement connue pour pouvoir être classée avec certitude.

dela de l'extrémité des pattes (Voyez le *Cancer cylindricus*. Herbst., pl. 2, fig. 30 et 31. — *Ixa canaliculata*. Leach, Zool. Miscel. t. 3, pl. 129, fig. 1. — Desmarest, Consid. sur les Crust. pl. 28, fig. 3. — Edwards, atlas du Règne anim. Crust. pl. 24, fig. 1). M. König a figuré une espèce fossile de ce genre sous le nom d'*Ixa tuberculata* (Icones fossilium selectæ pl. 2. fig. 24. K. E.

(4) Leach a établi, d'après cette espèce, son genre *Irnis* qui tient des *Ilias* par la forme grêle et allongée des pattes, et des *Ebalies* par la forme générale de la carapace, mais qui n'est encore que très imparfaitement connu.

(5) Savoir :

1° Le genre *ARCANIE* qui se rapproche des *Philyres* par la disposition de l'appareil buccal, dont le cadre est presque aussi large en avant qu'en arrière, mais qui a la carapace globuleuse et hérissée d'épines, le front relevé, les fossettes antennaires grandes et longitudinales et les pattes grêles et allongées.

Esr. Arcanie hérisson. *Arcania erinaceus*. (*Cancer erinaceus*.)

Herbst fig. pl. 20. 3.

Leucosia erinaceus. Fab. Sup. p. 352.

Arcania erinaceus. Leach. Zool. Miscel. t. 3. p. 24.

Desmarest. Consid. pl. 28. fig. 1.

Edw. Atlas du Règne anim. Crust. pl. 24. fig. 2.

2° Le genre *EBALIE* qui se rapproche beaucoup des *Leucosites* proprement dites, mais qui a la carapace à-peu-près carrée ou plutôt hexagonale, avec les angles tronqués et disposés sur les lignes médiane et transversale; le front est assez large, beaucoup plus avancé que chez la

+ Genre **ORÉOPHORE**. *Oreophorus*.

Le genre Oréophore, nouvellement établi par M. Ruppell, est très remarquable en ce que les Crustacés dont il se compose, tout en ayant le mode de conformation de la bouche ordinaire chez les Leucosiens, se rapprochent des Calappes par l'élargissement postérieur de la carapace qui constitue de chaque côté, au-dessus de la base des pattes, un prolongement clypéiforme. Sa forme générale est à-peu-près subtriangulaire, avec ses côtés latéraux arrondis, et sa substance est épaisse et rugueuse, presque comme chez les Parthénopes. Le front est étroit et sail-

plupart des Leucosiens, et terminé par un bord à-peu-près droit; les fossettes antennaires, complètement cachées sous le front, assez grandes et dirigées très obliquement en dehors; le cadre buccal triangulaire; les pattes antérieures grosses et courtes; la main renflée et les pinces courtes; enfin; les pattes suivantes beaucoup plus courtes encore, mais assez grosses, et se terminant par un article styliforme assez gros.

ESP. *Ebalia Pennantii*. Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 25. fig. 1-6.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 165. pl. 27. fig. 1.

Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 129.

Etc.

3^o Le genre **MURSIE** qui a beaucoup d'analogie avec les Ébalies, mais qui s'en distingue par les pattes-mâchoires externes dilatées en dehors comme chez les Philýres. (Voyez Leach. Zool. mis. t. 3, p. 20. Desmarest. op. cit. p. 166. — Edw. op. cit. t. 2, p. 137.)

4^o Le genre **PERSÉPHORE** qui n'est que très imparfaitement connu et a la carapace arrondie, déprimée et dilatée de chaque côté; le cadre buccal triangulaire, etc. (Voyez Leach. Zool. mis. t. 3, p. 22; etc.)

lant ; les bords latéraux de la carapace sont très dilatés et ondulés ; les antennes internes se reploient très obliquement sous le front. La disposition du cadre buccal et des pattes-mâchoires est à-peu-près la même que dans le genre *Guaia*, mais les régions ptérygostomiennes sont larges et renflées. Les pattes antérieures sont courtes et renflées ; la pince est comprimée et finement dentelée. Enfin les pattes suivantes sont très courtes, et leur tarse est styloforme et extrêmement petit.

On n'en connaît qu'une espèce.

L'Oreophorus horridus. Ruppell, Beschreibung und Abbildung von 24 arten Kurzschwanzigen Krabben als Beitrag zur Naturgeschichte des Rothen Meeres. — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 131. E.

CORYSTE. [(Corystes.)]

Quatre antennes : les deux extérieures rapprochées, sétacées, ciliées, fort longues ; les yeux pédonculés, un peu écartés.

Test ovale, plus long que large. Queue repliée sous le tronc dans le repos. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince ; les autres terminées par un ongle allongé pointu.

Antennæ quatuor : externis duabus approximatis, setaceis, ciliatis, longissimis. Oculi remoti, pedunculati.

Testa ovalis, longitudine latitudinem superante. Cauda, in quiete, sub trunco replicata. Pedes decem : anticis duobus chelatis, aliis ungue elongato acuto terminatis.

OBSERVATIONS. — Ce genre, établi par M. Latreille, semble tenir aux Macroures paguriens, et se rapprocher des Albinés et des Hippes. Il appartient néanmoins aux Brachyures, et malgré les deux longues antennes de l'animal, il paraît avoisiner les Leucosies par ses rapports.

Probablement les *Corystes* ne sont pas plus agiles que les *Leucosies*; leur test est moins bombé; leur queue est un peu ciliée; les deux bras antérieurs sont plus longs dans les mâles que dans les femelles.

2. *Coryste dentata*, *Corystes dentata*.

Albunea dentata, Fabr. Suppl. p. 788.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. 3. fig. 1. et 2.

* *Corystes castrolanus*, Leach. Molec. Fed. Brit. pl. 1.

* *C. dentata*, Dehaan. Hist. des Crust. t. 2, p. 140, pl. 5, fig. 2.

* *Corystes parvicornis*, Gyllenhal. Mus. Linn. t. 2, p. 8.

* *Corystes dentata*, Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. 140.

Habite l'Océan d'Europe, les côtes de France et d'Angleterre.

[Nous avons donné le nom générique de *NAUTILOCORYSTES* à des crustacés qui ressemblent aux *Corystes* par leur conformation générale, mais qui ont les pattes de la cinquième paire terminées par un article lamelleux très large et en forme de nageoire comme chez les *Portuniens*; le tarse des pattes des trois paires précédentes est également plus ou moins lamelleux. Cette division ne comprend encore qu'une seule espèce, le *Nautilocoryste ocellatus*, (Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. 140.)

Notre genre *PSEUDOCORYSTES* se rapproche beaucoup du précédent, mais s'en distingue, ainsi que des *Corystes*, par la forme des pattes-mâchoires externes. (Voyez notre Hist. des Crust. t. 2, p. 150.)

Le genre *OXIDIA* de M. Dehaan doit prendre place à côté des *Pseudocorystes* dont il se distingue par la forme des pattes mâchoires-externes, et par quelques autres caractères. (Voyez Fauna japonica. Crust. p. 15, pl. 2, fig. 5, etc.)

+ Genre ~~POLYDECTE~~. *Polydectus*.

Le genre **POLYDECTE** se compose de petits Crustacés, que Latreille rangeait dans le genre *Pilumnus*, mais qui s'éloignaient beaucoup de tous les Cancériens par leur forme générale. Leur carapace presque hexagonale est très bombée; elle se rétrécit plus en avant qu'en arrière; mais est notablement plus large que longue; enfin ses bords sont très obtus. Le front est avancé, lamelleux, droit; les orbites, dirigées très obliquement en dehors, sont incomplètes antérieurement; les antennes internes se reploient transversalement en dehors; l'article basilaire des antennes externes est cylindrique, et placé entre la fossette antennaire et l'orbite; il arrive jusqu'au front, mais ne s'y soude pas; le cadre buccal est rétréci antérieurement, mais sans être triangulaire, et son bord antérieur est très saillant et en forme de W; les pattes mâchoires externes sont allongées, leur troisième article est à-peu-près de même forme que chez les Atélécyclopes. Les pattes de la première paire sont grêles et très courtes chez la femelle, la main très petite et les pinces cylindriques. Les pattes suivantes sont à-peu-près cylindriques, et terminées par un article court et pointu; enfin leur longueur augmente jusqu'à la quatrième paire, et celles de la cinquième paire sont plus longues que les secondes.

On ne connaît que la femelle d'une seule espèce de ce genre; c'est un petit crustacé remarquable à cause de trois gros tubercules cupuliformes qui entourent chaque orbite, et qui lui ont valu le nom de ~~POLYDECTE~~ CUPULIFÈRE, *Pilumnus cupulifer* Latreille. Encyclop. t. 10, p. 124; *Polydectus cupulifer* Edwards, His. nat. des crust. pl. 2, p. 146.)

LES TRIGONÉS.

Test triangulaire ou trigono-conique , plus large postérieurement. Point de pattes terminées en nageoires, ni relevées sur le dos.

Les *Trigonés* ou *Oxyrinques* ont le test rétréci en pointe antérieurement, et plus large dans sa partie postérieure; il est ovale-trigone, ou en triangle allongé, presque conique, d'une consistance solide, et en général rude, raboteux, tuberculeux ou hérissé d'épines. Les antennes de ces crustacés sont petites; à trois ou quatre articles, paraissant assez souvent toutes les quatre; mais, souvent aussi, les deux intermédiaires sont repliées et cachés dans des fossettes. Le troisième article de ces antennes intermédiaires est terminé par deux filets très courts.

Ces crustacés, qu'on nomme vulgairement *araignées marines*, constituent évidemment une famille particulière, dont plusieurs des genres qu'elle comprend sont nombreux en espèces. J'ai cru qu'il était convenable de me borner à y rapporter ceux qui suivent, savoir: *Leptope*, *Sténorynque*, *Parthénope*, *Lithode*, *Maia*.

[Cette division correspond à-peu-près à la famille des *Oxyrhinques* (Voyez page 404), qui se subdivise en trois tribus: les *Macropodiens*, les *Maiens* et les *Parthenopiens* (Voyez le premier vol. de notre Hist. des Crust.) E.

LEPTOPE (*Leptopus*.)

Quatre antennes, courtes. Les yeux globuleux, non éloignés de la bouche, séparés par un front subdenté; à pédoncules courts.

Corps petit. Test arrondi-trigonoïde; à rostre nul ou

très court. Dix pattes onguiculées: les deux antérieures chéelifères, plus courtes; les autres fort longues, très grêles, subfiliformes.

Antennæ quatuor, breves. Oculi globosi, ab ore non remoti, fronte subdentato separati; pedunculis brevibus.

Corpus parvum. Testa rotundato-trigonoidea: rostro nullo aut brevissimo. Pedes decem unguiculati: anticis duobus brevioribus chelatis: aliis longissimis, gracilissimis, subfiliformibus.

OBSERVATIONS.— Les *Leptopes* ont, comme les Sténorynques, l'aspect des faucheurs, par leur corps petit, muni de pattes très longues et très menues; mais ils n'offrent point un rostre allongé, portant les yeux et les éloignant de la bouche. Le pédoncule de leurs yeux est droit, et non perpendiculaire à l'axe longitudinal du corps.

[Les genres établis sous les noms d'*Egeria* par Latreille, et de *Leptopus* par Lamarck, ne nous paraissent pas devoir être séparés et forment un petit groupe qui se distingue des autres Décapodes brachyures de la famille des Oxyrhinques, par la longueur extrême de leurs pattes, par la forme de leurs pattes-mâchoires externes, dont le troisième article est presque carré, et donne insertion à l'article suivant à son angle interne, par leurs yeux parfaitement rétractiles, par leur carapace presque cylindrique et par quelques autres caractères.] E.

ESPÈCES.

1. Leptope longipède. *Leptopus longipes*.

L. testâ rotundatâ, tuberculis subspinosi adpersâ; chelis parvis; secundi paris pedibus longissimis.

Cancer longipes. Lin.

Inachus longipes. Fah. Suppl. p. 358.

(* *Cancer arachnoides*.) Rumph. Mus. tab. 8. f. 4.

* *Macropus longipes*. Latreille. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 111.

* *Egeria arachnoides*. Latreille. Encyclop. Atlas. pl. 281. fig. 1.

* *Leptopus longipes*. Latreille. Règne anim. 2^e édit. t. 4. p. 62.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 9. fig. 3.

* *Egeria arachnoides*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 294.
Habite l'Océan Indien.

Etc. L'Araignée de mer. Seba. Mus. 3. tab. 171 f. 4. est de ce genre.

[Le genre *Doclées*, *Doclea*, établi par M. Leach, a la plus grande analogie avec les *Leptopes* de Lamarck et forme le passage entre ce groupe et le genre *Libinia*. Leurs pattes-mâchoires sont conformées de la même manière; leurs yeux sont également rétractiles et la forme de leur carapace est essentiellement la même que chez les *Egéries* ou *Leptopes*, mais leurs pattes sont beaucoup moins longues; chez les *Egéries* celles de la seconde paire ont plus de six fois la longueur de la portion postfrontale de la carapace, tandis que chez les *Doclées* elles n'ont qu'environ trois fois cette longueur.

On en connaît les quatre espèces suivantes :

1. La *Doclée brebis*, *Doclea ovis*. (*Cancer ovis*. Herbst. t. 1. p. 210. pl. 13. fig. 82; *Inachus ovis*. Fab. Suppl. p. 355; *Maia ovis*. Bosc. op. cit. t. 1. p. 256; Latreille. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 100; *Doclea ovis*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 294. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 33. fig. 2.)
2. La *Doclée hybride*. *Doclea hybrida*. (*Inachus hybridus*. Fabricius. Suppl. p. 355; *Maia hybrida*. Bosc. loc. cit.; Latreille. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 99; *Doclea hybrida*. Edw. op. cit. t. 1. p. 294.)
3. La *Doclée de Risso*. *Doclea Rissonii*. (*Cancer araneus*. Herbst. pl. 13. fig. 81; *Doclea Rissonii*. Leach. Zool. Miscel. t. 2. pl. 74; Edwards. op. cit. t. 1. p. 295.)
4. La *Doclée hérissée*. *Doclea muricata*. (*Cancer muricatus*. Herbst. t. 1. pl. 14. fig. 83; *Inachus muricatus*. Fabricius. Suppl. p. 355; *Maia muricata*. Bosc. op. cit. t. 1. p. 255; *Doclea muricata*. Edw. t. 1. p. 295.) E.

† Genre **LIBINIE**. *Libinia*.

Les **LIBINIES** ont les plus grands rapports avec les **Doclées** et les **Pises** et établissent le passage entre ces deux genres ; elles diffèrent des premières par le peu de longueur de leurs pattes et des dernières par leur carapace presque circulaire et armée en avant d'un petit rostre situé, ainsi que les orbites, notablement au dessus du niveau du bord latéral du test ; elles se rapprochent aussi des **Pises** par la conformation de leurs antennes externes, de leurs pinces, etc.

Esp. **Libinie cannelée**. *Libinia canaliculata*. Say. Journal of the Acad. of Sc. of Philadelphia. vol. 1. pl. 4. fig. 1 ; Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 300. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 33 fig. 1.

Etc.

E.

STÉNORYNQUE. (*Stenorynchus*.)

Quatre antennes : les deux extérieures plus longues. Les yeux globuleux , éloignés de la bouche , insérés sur le rostre et rapprochés dans leur opposition.

Corps petit. Test subtriangulaire, se terminant antérieurement par un rostre long, entier ou bifide. Dix pattes onguiculées : les deux antérieures plus courtes, chélifères ; les autres longues , très grêles , filiformes : la deuxième paire étant plus longue.

Antennæ quatuor : externis longioribus. Oculi globosi , ab ore distantes, rostro inserti , oppositè approximati.

Corpus parvum. Testa subtriangularis , rostro longo integro aut bifido anticè terminata. Pedes decem, unguiculati : anticis duobus brevioribus chelatis ; aliis longis , gracilissimis , filiformibus : pari secundo longiore.

OBSERVATIONS. — Les **Sténorynques**, qu'on a aussi nommés **Macropes**, **Macropodes** et **Leptopodes**, ont, ainsi que les **Léptopes**, l'aspect des **Faucheurs**. Ce sont des crustacés brachyures à pattes longues et très grêles, attachées à un petit corps, ce

qui les rend fort remarquables. Mais les *Sténorynques* offrent antérieurement un rostre allongé, quelquefois menu et très long, qui les distingue éminemment des *Leptopes*. Leurs yeux sont globuleux, éloignés de la bouche, insérés sur le rostre; et leur pédoncule, qui est court, semble perpendiculaire à l'axe de ce rostre. Leurs palpes externes sont menus, saillans.

[Le genre *Sténorhynque* se distingue facilement des autres *Oxyrhynques* par les caractères suivans : yeux courts et non rétractiles; troisième article des pattes-mâchoires externes à-peu-près ovalaire, et plus d'une fois et demie aussi long que large; tige mobile des antennes externes insérée au devant du niveau des yeux; pattes de la seconde paire notablement plus longues que les autres.

E.

ESPECES.

1. *Sténorynque faucheur. Stenorynchus phalangium.*

St. testa rotundato-conica, pubescente; tuberculis raris sub-spinosis; rostro bifido; pedibus anticis crassiusculis, lateribus spinulosis.

Inachus phalangium. Fab. Supp. p. 358.

Pennant. Zool. Brit. 4. pl. 9. f. 17.

Macropus longirostris. Latr. Gen. 1. p. 39.

* *Macropus phalangium.* Latreille. Hist. nat. des Crust., etc. t. 6. p. 110.

* *Macropodia phalangium.* Leach. Zool. Miscel. t. 2. pl. 18. et Malacostr. Pod. Brit. pl. 23. fig. 6.

* Latreille. Encyclop. Atlas. pl. 278. fig. 2. et pl. 298. fig. 6.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 23. fig. 3.

* Guérin. Iconog. Crust. pl. 21. fig. 2.

* Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 279.

Habite la Méditerranée. Mus. n°

2. *Sténorynque séticorne. Stenorynchus seticornis.*

St. testa cordato-conica; rostro longissimo setiformi; manibus pedibusque longissimis.

Cancer seticornis. Oliv. Encyc. n° 119.

Herbst. Canc. tab. 15. f. 91.

Macropus seticornis. Latr.

Habite la Méditerranée, (* Voyez notre *Hist. des Crust.* t. 1. p. 278.)

Etc.

Voyez l'*Inachus sagittarius* de Fabricius (1), et le *Macropodia tenuirostris* de Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 331. (* *Inachus longirostris*. Fab. Suppl. p. 358 ; *Macropodia tenuirostris*. Leach. Malacost. pl. 23. fig. 1-5 ; Latreille. Encyclop. pl. 298. fig. 1-5. Desmarest. op. cit. p. 154 ; *M. longirostris*. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. 27 ; Blainville. Faune française. Pl. 8. fig. 1 ; *Stenorhynchus longirostris*. Milne Edwards. op. cit. t. 1. p. 280.)

† Ajouter aussi le *Stenorhynchus egyptius*. Milne Edwards. op. cit. t. 1. p. 280 ; Savigny. Egypte. pl. 6. fig. 6.

† Genre ACHÉE. *Achoëus*.

Leach a désigné, sous ce nom, de petits crustacés de la tribu des Macropodiens, qui ressemblent beaucoup aux Sténorynques, mais qui se distinguent de tous les autres genres de la même famille par la disposition des tarses des pattes des deux dernières paires qui sont presque falci-

(1) Ce crustacé constitue le type d'un petit genre très remarquable établi par M. Leach sous le nom de *Leptopodia* *Leptopodia* ; on le reconnaît, au premier abord, par la forme particulière du corps et la longueur excessive de ses pattes ; le rostre est extrêmement long et recouvre l'insertion de la tige mobile des antennes externes ; les pédoncules oculaires sont courts et non retractiles ; enfin, le troisième article des pattes-mâchoires externes est presque triangulaire, fortement tronqué en avant, et articulé avec la pièce suivante par son angle externe. On connaît deux espèces de ce genre :

La Leptopodie sagittaire. *Leptopodia sagittaria*. (*Inachus sagittarius*. Fabricius. Suppl. p. 359 ; — *Cancer seticornis*. Herbst. pl. 55. fig. 2 ; — *Leptopodia sagittaria*. Leach. Zool. Miscel. t. 2. pl. 67 ; — Latreille. Encyclop. p. 299. fig. 1 ; — Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 16. fig. 1 ; — Guérin. Iconog. Crust. pl. 11. fig. 4 ; — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 16. fig. 4 ; — Edwards. Hist. des Crust. t. 1. p. 276.)

Et la Leptopodie à éperons. *Leptopodia calcarata*. Say. Journal de l'Acad. de Philadelphie. t. 1. p. 455 ; Edwards. op. cit. t. 1. p. 276.

E.

formes; leur rostre est presque nul et laisse à découvert le point d'insertion de la tige mobile des antennes externes; de même que dans les divisions précédentes, les yeux ne sont pas rétractiles, mais le troisième article des pattes-mâchoires est presque triangulaire.

Esr. Achée de Cranch. *Achæus Cranchii*. Leach. Malacostr. Pod. Brit. pl. 22. C. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 154. — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 281. E.

† Genre **CAMPOSCIE**. *Campascia*.

Ce genre, établi par Leach, se rapproche du précédent par l'existence d'yeux non rétractiles et par l'état rudimentaire du rostre, mais s'en distingue par la forme ovale du troisième article des pattes-mâchoires externes, la longueur considérable des pattes, et par plusieurs autres caractères.

Esr. Camposcie rétuse. *Campascia retusa*. Latreille. Règne anim. 2^e édit. t. 4. p. 60. — Guérin. Iconog. Crust. pl. 9. fig. 1. — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 283. pl. 15. fig. 15 et 16. — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 11. fig. 1.

† Genre **LATREILLIE**. *Latreillia*.

Le genre Latreillie de Roux a pour type un crustacé de la Méditerranée, à pattes longues et filiformes, ressemblant assez à une Létopodie qui serait privée de son rostre, et qui serait munie de pédoncules oculaires d'une longueur extrême; la carapace, de forme triangulaire, n'atteint pas le niveau du bord postérieur du thorax, et se termine antérieurement par deux grandes cornes divergentes. Le troisième article des pattes-mâchoires externes est ovale, et la tige mobile des antennes externes s'insère en arrière du niveau des yeux.

Esr. Latreillie élégante. *Latreillia elegans*. Roux. Crust. de la Méditerranée. 5^e livraison. pl. 22. — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 277. E.

† Genre **INACHUS**. *Inachus*.

Le genre *Inachus*, tel que Fabricius l'avait établi, comprenait presque tous les crustacés rangés par Lamarck dans sa division des Trigonés; mais aujourd'hui il a des limites plus restreintes, et ne se compose plus que d'un petit nombre de Macropodiens dont les yeux sont parfaitement rétractiles et susceptibles de se reposer en arrière pour se loger en entier dans des cavités orbitaires; dont le troisième article des pattes-mâchoires externes est triangulaire et s'articule avec le quatrième article par son angle externe, dont les pattes sont longues, grêles et cylindriques, le rostre court, etc.

Esr. 1° *Inachus scorpion*. *Inachus scorio*.

Cancer scorio. Fabricius. Entom. Syst. t. 2. p. 462.

Cancer Dorsettensis. Pennant. Brit. Zool. t. 4. pl. 94. fig. 18.

Inachus scorio. Fab. Supp. p. 358.

Inachus Dorsettensis. Leach. Malac. Ped. Brit. pl. 22. fig. 1-6.

Latreille. Encyclop. pl. 281. fig. 3. et pl. 300. fig. 1.

I. scorio. Desm. Consid. sur les Crust. pl. 24. fig. 1.

Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 288.

2° *Inachus doringus*, *Inachus doringus*, Leach. Malacost. pl. 22. fig. 7-8.

Latreille. Encyclop. pl. 300. fig. 7-8.

Desmarest. op. cit. pl. 24. fig. 2.

Edw. op. cit. t. 1. p. 288.

Etc.

E.

† Genre **AMATHIE**. *Amathia*.

Les Amathies sont des Macropodiens à yeux non rétractiles qui ont le troisième article des pattes-mâchoires externes presque carré et donnant insertion au quatrième article par son angle interne; la carapace triangulaire, et épineuse; les pattes des quatre dernières paires grêles, filiformes et sans élargissement vers le bout. On n'en connaît qu'une espèce.

L'Amathie de Risso. *Amathia Rissoana*. Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 3; Edwards, Hist. des Crust. t. 1. p. 286. E.

† Genre **EURYPODE**. *Eurypodius*.

Le genre Eurypode de M. Guérin se rapproche des précédens par la disposition des yeux qui sont petits et non rétractiles, par la forme de la carapace, et par la forme des pattes-mâchoires externes, mais s'en distingue par les pattes des quatre dernières paires qui sont comprimées et élargies en dessous, vers le bout et presque subchéliforme. Ces crustacés se rapprochent aussi des Maïens appartenant au genre Halime.

Esr. Eurypode de Latreille. *Eurypodius Latreillii*. Guérin: Mém. du Muséum. t. 16. pl. 14. et Iconog. Crust. pl. 11. fig. 1; — Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 284; — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 16. fig. 1. E.

PARTHENOPE. (Parthenope.)

Quatre antennes presque égales : les extérieures sétacées, insérées sous les yeux.

Test trigone, court, subrostré antérieurement, très scabre, inégal, muriqué. Dix pattes onguiculées : les deux antérieures longues, étendues à angle droit de chaque côté; leurs mains étant inclinées presque parallèlement sur le côté antérieur du bras.

Antennæ quatuor subæquales : externis infrà oculos insertis, setaceis.

Testa trigona, brevis, anticè subrostrata, inæqualis, scaberrima, muricata. Pedes decem unguiculati : anticis duobus longis, chelatis, ad angulum rectum extensis, illorum manibus lateri antico brachii subparallele incumbentibus.

OBSERVATIONS. — Les *Parthénopes*, établies comme genre par Fabricius, ne sont guère distinguées des Maïas que par des caractères de port : néanmoins, ces caractères sont vraiment sin-

guliers. Leur première paire de pattes forme deux grands bras, dont la moitié inférieure ne se dirige point en avant, mais est étendue à angle droit de chaque côté du test, tandis que l'autre moitié se replie sur le côté antérieur du bras. Les deux doigts de leur pince sont courbés en dedans. Leur test trigone n'est pas plus long que large, comme dans les Maïas; il est dur, raboteux, noueux, souvent épineux, et comme horrible à voir.

[Le genre Parthénopé de Fabricius a été divisé par M. Leach en deux genres, dont l'un conserve son nom primitif, et l'autre a reçu le nom de LAMBRE; ces deux groupes se distinguent entre eux par le port et par plusieurs caractères, tels que la disposition des antennes externes; chez les Parthénopes proprement dites, l'article basilaire de ces appendices est assez long et atteint presque le front, tandis que le second article, plus de moitié plus court que le précédent, se loge dans l'hiatus de l'angle interne de l'orbite. Chez les Lambres, au contraire, le premier article des antennes externes est extrêmement petit et guère plus long que large; le second, quoique plus allongé, n'atteint presque jamais le front; mais se loge entre l'article basilaire de l'antenne interne et le bord interne de la paroi orbitaire inférieure; enfin, le troisième article naît dans l'hiatus qui occupe l'angle interne de l'orbite, et le quatrième article, ou filet terminal, est très court (voy. l'atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 26, fig. 1 a et fig. 2 a). Chez les Parthénopes, l'abdomen se compose de sept segmens distincts dans les deux sexes; tandis que chez les Lambres, on n'en compte quelquefois que six chez la femelle, et on n'en trouve que cinq ou même quatre chez le mâle.

Chez les uns et les autres l'article basilaire de ces antennes ne se soude pas aux parties voisines du test, et ne concourt pas à former la paroi orbitaire inférieure comme chez les Maïas; son extrémité n'atteint pas le front, et la tige mobile de ces appendices prend naissance dans un hiatus de l'angle orbitaire interne.

E.

ESPÈCES.

1. Parthénopé horrible. *Parthenope horrida*.

P. testâ aculeata, nodosa; manibus ovalis; cauda cariosa,
Cancer horridus. Lin.

large et très avancé ; les yeux très courts , remplissent en entier l'orbite et ne sont pas rétractiles ; enfin les mains sont renflées sans être ni triangulaires ni épineuses, et les pattes sont courtes et comprimées. Le type de cette division générique est l'*Eumedonus niger*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1, p. 350, pl. 15, fig. 17. E.

LITHODE. (Lithodes.)

Quatre antennes presque égales , insérées entre les yeux. Palpes extérieurs longs et étroits. Yeux peu écartés.

Test subtrigone, postérieurement plus large et arrondi, rostré antérieurement, très scabre. Dix pattes : les deux antérieures avancées et terminées en pinces, les deux dernières très petites, comme fausses sans ongllet.

Antennæ quatuor subæquales, intrà oculos insertæ. Palpi [maxilli pedes] externi longi, angusti. Oculi parum distantes.

Testa subtrigona, posticè latior et rotundatu, anticè rostrata, scaberrima. Pedes decem : anticis duobus chelatis, porrectis ; duobus ultimis minimis subspuriis unguiculo nullo.

OBSERVATIONS. — Les *Lithodes*, très voisines des *Maïas*, par leur aspect et leur forme, s'en distinguent par leurs pieds-mâchoires extérieurs, longs et étroits, presque comme ceux des crustacés macroûres, et par les deux pattes postérieures, très petites, qui sont sans ongllet. Latreille, qui les indique comme genre, ne cite que l'espèce qui suit.

[Les *Lithodes* diffèrent des *Maïas* et des autres *Oxyrhynques* (ou *Trigones* de Lamarck) par une foule de caractères de la plus haute importance, et c'est à tort que tous les zoologistes les ont rangées dans cette famille ; elles s'en éloignent évidemment beaucoup, et se rapprochent des *Hémoules* plus que de tout autre

décapode, mais établissent à quelques égards le passage entre ces crustacés et les Birgus; aussi dans notre méthode de classification prennent-elles place dans la section des Anomoures. Les branchies, au lieu d'être disposées sur un seul rang comme chez les Brachyures proprement dits, sont groupées par faisceaux comme chez les Homoles, et la plupart des Macroures; les orifices de l'appareil générateur femelle occupent l'article basilaire des pattes de la troisième paire, disposition qui n'existe jamais chez les Brachyures proprement dits; la conformation de l'abdomen est anormale, et chez la femelle, il ne paraît exister de filets ovifères que d'un seul côté; enfin la structure des antennes, de l'appareil buccal et du thorax éloigne aussi les Lithodes des véritables Brachyures, et les rapproche de nos Anomoures. E.

ESPÈCE.

1. Lithode arctique. *Lithodes arctica*.

Cancer maja. Lin.

Inachus maja. Fab. Suppl. p. 358.

Herbst. Canc. tab. 15. f. 87.

Seba. Mus. 3. tab. 18. n. 10. et tab. 22. f. 1.

Lithodes arctica. Latr. Gen. 1. p. 40.

EjUSD. Hist. nat., etc., 6. pl. 48. f. 2.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 160. pl. 25.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 1. fig. 1.

* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 12. fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 186, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 57. fig. 1.

Habite l'Océan de la Norvège.

MAÏA. (Maia.)

Quatre antennes petites : les extérieures sétacées, insérées sous le coin interne des yeux; les intérieures palpi-formes. Les yeux écartés, pédunculés.

Test subtrigone, ovale-conique, plus long que large,

arrondi et plus large inférieurement, rétréci en avant, scabre ou épineux. Dix pattes onguiculées : les deux intérieures dirigées en avant et terminées en pince.

Antennæ quatuor parvula : externis setaceis, in oculorum cantho insertis; internis palpiformibus. Oculi intervallo majusculo distantes, pedunculati.

Testa subtrigona, ovato-conica, longitudinalis, posticè latior rotunda, anticè angustata, subrostrata, scabra aut spinosa. Pedes decem unguiculati : anticis duobus chelatis, parvioribus.

OBSERVATIONS. — Les *Maïas* sont nombreuses en espèces; plusieurs d'entre elles deviennent très grandes, et beaucoup d'autres sont de taille moyenne ou même petite. Elles sont remarquables par la forme presque conique de leur corps, qui, plus large postérieurement, se rétrécit vers sa partie antérieure, où il se termine par deux ou quatre dents, plus ou moins séparées, sans former un bec aussi marqué que dans les *Sténorhynques*. La plupart de ces crustacés ont le test dur, raboteux, tuberculeux ou épineux. Les deux pattes antérieures sont ordinairement les plus grandes et toujours avancées, terminées en pinces. Les autres vont en diminuant progressivement de grandeur, et se terminent par un ongle.

[Tous les auteurs récents s'accordent à restreindre davantage les limites de ce genre, et à n'y laisser que les espèces dont les yeux sont rétractiles, la tige mobile des antennes externes insérée dans l'angle intérieur de l'orbite et à découvert, et les pattes cylindriques. Les autres crustacés qui, dans la méthode de Lamarck, prendraient également place ici, constituent divers genres dont nous exposerons plus bas les principaux caractères.

E.

ESPÈCES.

1. *Maïa* bord-d'épines. *Maia spini-cincta*.

M. testâ rotundato-trigona, in ambitu aculeatâ : dorso mutico; carpis hemisphæricis chelisque magnis lævibus.

(* *Cancer Hispidus*.) Herbat. Canc. tab. 18. f. 100.

* *Mithrax spinicinctus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 150. pl. 23. fig. 1.

* *Mithrax hispidus*. Edwards. Mag. Zool. de Guérin, et Hist. des Crust. t. 1. p. 319.

Habite aux Antilles. Mus. n° Il devient fort grand, et a le doigt mobile de sa pince arqué. Tous les bras ont des tubercules sub-épineux.

2. Maïa hérissonnée. *Maia spinosissima*.

M. testâ trigonâ, undiquè aculeis muricatâ; pedibus omnibus aculeatis; manibus partim lævibus.

Cancer aculeatus. Herbst. Canc. tab. 19. f. 104. (1)

* *Cangrejo Denton*. Parra. Descrip. de differ. pièces de Hist. nat. pl. 51. fig. 1.

* *Mithrax spinosissimus*. Edw. Mag. de Zool. de Guérin. 1831. cl. 7. pl. 2 et 3, et Hist. des Crust. t. 1. p. 321.

Habite l'Île-de-France. M. Mathieu. Mus. n° Il devient aussi fort grand.

3. Maïa squinado. *Maia squinado*.

M. testâ ovatâ, granulâ aculeisque asperatâ; spinis peripheriâ validioribus; manibus lævibus cylindricis.

Inachus cornutus. Fab. Suppl. p. 356.

Maia squinado. Latr. Gen. 1. p. 37.

Herbst. Canc. tab. 14. f. 84. 85.

Seba. Mus. 3. tab. 18. f. 2. 3.

* Latreille. Encyclop. pl. 277. fig. 1 et 2.

* Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 18.

* Desm. Consid. sur les Crust. pl. 21.

* Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 327, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 30. fig. 1.

* Cette espèce constitue le type du genre *Maia* proprement dit.

Habite (* l'Océan et peut-être aussi) la Méditerranée. Mus. n°

Il devient très grand; son test est terminé antérieurement par deux épines plus fortes que les autres.

4. Maïa taureau. *Maia taurus*.

M. testâ ovatâ, ad peripheriam aculeatâ: dorso inaequali submutico; spinis duabus frontalibus validissimis.

Mus. n° Herbst. Canc. tab. 59. f. 6.

(1) Cette figure se rapporte à une autre espèce; le *Mithrax aculeatus*. Edw. op. cit. t. 2. p. 321.

- * *Pericaris cornuta*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 335, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 3a. fig. 2.

Habite . . . la Méditerranée? (* les mers des Antilles et pas la Méditerranée). Ses deux pattes antérieures sont grandes, à cuisses hérissées de tubercules : à mains longues, assez étroites, en partie tuberculeuses ; à doigts courts, un peu arqués.

5. Maia à crête. *Maia cristata*.

M. testâ ovato-ellipticâ, ad peripheriam aculeatâ ; dorso granulis tuberculisque scabro ; fronte inflexa.

Cancer cristatus. Lin.

Rumph. Mts. tab. 8. f. 2.

- * *Cancer bilobus*. Herbst. pl. 18. fig. 98.

- * *Maia cristata*. Latreille. Encyclop. pl. 28. fig. 1.

- * *Micippa cristata*. Leach. Zool. Miscel. t. 3. pl. 128.

- * Desmarest. op. cit. p. 149.

- * Edw. op. cit. t. 1. p. 330.

Habite la mer des Indes. Péron. Pattes non épineuses : les deux antérieures à peine aussi longues que les deux suivantes.

6. Maia cervicorne. *Maia cervicornis*.

M. testâ ovato-oblongâ, tuberculis crassis subacutis dorso asperatâ ; fronte spinis quatuor elongatis ; oculorum pedunculis longissimis.

Herbst. Canc. tab. 58. f. 2.

- * *Stanocionops cervicornis*. Latr. Règne anim. 2^e édit. t. 4. p. 59.

- * Guérin. Iconog. Crust. pl. 3 bis. fig. 3.

- * M. Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 336.

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu.

7. Maia gravée. *Maia sculpta*.

M. minima ; testâ rotundato-trigondâ, muticâ, dorso rugis variis sulcatâ ; carpis orbiculatis manibusque glabris.

- * *Cancer rugosus*. Petiver. Perigr. Amer. tab. 20. fig. 6.

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. 22. 23.

- * *Mithrax sculptus*. Edwards. Magasin Zoologique de M. Guérin. 1831. Crust. pl. 5. et Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 322.

Habite . . . Mus. n^o Cette espèce semble avoir des rapports avec notre *Maia spinicincta* ; ses pinces, en petit, sont semblables ; mais elle est mutique, élégamment sculptée en dessus, et ses quatre paires de pattes postérieures sont velues.

Etc.

Ajoutez beaucoup d'autres espèces communes.

[Cette division ; extrêmement nombreuse en espèces , correspond à-peu-près à la tribu des Maïens telle que nous l'avons circonscrite dans notre Méthode de classification et a été subdivisée, comme nous l'avons déjà dit, en un grand nombre de genres dont nous nous bornerons à rapporter ici les principaux caractères.

§ 1. *Maïens* dont les yeux peuvent se reposer en arrière et se cacher dans une fossette orbitaire post-foraminaire plus ou moins complète.

Genre LIBINIE. Voyez p. 423.

Genre HERBSTIE (*Herbstia* Edw.). Rostre horizontal ; petit, très étroit et divisé jusqu'à sa base en deux cornes lamelleuses ; tige mobile des antennes externes cylindrique, insérée tout-à-fait hors de l'orbite, et à découvert en dessus ; pinces assez fortes, s'amincissant vers le bout et laissant entre elles un vide lorsqu'elles sont fermées ; tarses à peine épineux en dessous.

Exemple. HERBSTIE NOURUE. *Cancer condyliatus*. Herbst. pl. 18. fig. 99. A. — *Inachus condyliatus*. Fab. Sup. — *Maia condyliata*. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 95. — Risso. Crust. de Nice. p. 42. *Mithrax Herbsti*. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. 25. — *Herbstia condyliata*. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2 p. 302.

Genre THOÉ (*Thoea* Bell.). Mêmes caractères que dans le genre précédent, si ce n'est que le rostre est tout-à-fait rudimentaire et que les pattes des quatre dernières paires sont aplaties en dessus et élargies par des crêtes marginales ; carapace très déprimée.

Exemple. THOÉ NOURUE. *Thoea crosa*. Bell. Trans. of the Zoo Soc. of London. t. 2. pl. 9. fig. 4.

Genre RHODIE (*Rhodia* Bell.). Mêmes caractères que chez les Herbsties, si ce n'est que les pinces sont grêles, finement dentelées et se touchent dans toute leur longueur.

Exemple. RHODIE PYRIFORME. *Rhodia pyriformis*. Bell. loc. cit. pl. 9. fig. 1.

Genre PISE (*Pisa* Leach). Carapace triangulaire et allongée; rostre horizontal large et divisé en deux grandes cornes coniques très longues; tige mobile des antennes externes insérée sous le front, tout-à-fait en dehors de l'orbite, et à découvert en dessus; bord orbitaire supérieur se prolongeant antérieurement sous la forme d'une grosse dent; pinces tranchantes, pointues et finement dentelées dans leur moitié terminale; tarses presque toujours garnis en dessous d'une ou deux rangées de petites pointes.

Exemple. PISE TETRAODON. *C. héracleotique*. Rondelet. t. 2. p. 403; — Aldrov. 185. — *C. pagurus fem.* Jonston. Hæc. pl. 5. fig. 13. — *Cancer tetraodon*. Pennant Br. Zool. t. 4, pl. 8. fig. 15. — *G. prædo*. Herbst. pl. 42. — *Maia tetraodon*. et *M. prædo*. Boac. t. II. p. 254 et 256; — *Blatus tetraodon*. Leach. Edimb. Encyc. t. 7. p. 431; — *Pisa tetraodon*. Ejusd. Malac. pl. 20. — Desm. op. cit. pl. 22. fig. 1. — Latr. Encycl. t. 10 p. 142; — *Maia hirticorne*. Blainville. Faune française. pl. 9. — Risso. Crust. de Nice, p. 46. — *Pisa tetraodon*. Edw. Hist. des Crust. t. 1, p. 305.

Genre PÉLIE (*Pelia* Bell.). Mêmes caractères que chez les Pises, si ce n'est que l'angle intérieur de l'orbite est obtus, que l'article basilaire des antennes externes s'avance beaucoup au-delà de l'orbite, etc.

Exemple. PÉLIE MIGNONNE. *Pelia pulchella*. Bell. loc. cit. pl. 9. fig. 2.

Genre LISSA (*Lissa* Leach). Même conformation que chez les Pises, si ce n'est que les cornes du rostre sont lamelleuses, très larges et tronquées au bout, et que les tarses sont dépourvus d'épines.

Exemple. LISSA GOUTTEUSE. — *C. chiragra*. Herbst. pl. 17. fig. 96. — *Inachus chiragra*. Fabr. Sup. p. 357. — *Lissa chiragra*. Leach. Zool. Misc. t. 1. pl. 83. — Desm. p. 47. — Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. — *Pisa chiragra*. Latr. Encyc. t. 10. p. 143. — *Lissa chiragra*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 310. et Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 29. fig. 1.

Genre HYANE (*Hyas* Leach). Mêmes caractères que les Pises et les Lissas, si ce n'est que le bord orbitaire

supérieur est voûté en avant et ne forme sur les côtés du rostre ni épines, ni dents, que le premier article de la tige mobile des antennes externes est aplati et élargi en dehors; et que les cornes du rostre sont aplaties, médiocres, pointues et convergentes.

Exemple. HYADE ARAGNÉE. *C. araneus*. Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 439; — Penn. op. cit. t. 4. pl. 9. fig. 16; — *E. Boffe*. Herb. pl. 17. fig. 95. — *Inachus araneus*. Fabr. Sup. p. 356. — *Hyas araneus*. Leach. Malac. pl. 21. A; — Desm. p. 148. — Latr. Encyc. pl. 278. fig. 3 (copiée d'après Pennant.) — Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 312.

Genre NAXIA (*Naxia* Edwards). Mêmes caractères que chez les Pises, si ce n'est que la tige mobile des antennes externes est insérée sous le rostre et en majeure partie cachée par ce prolongement, que les cornes du rostre sont longues et tronquées au bout; et que les orbites sont presque circulaires et sans hiatus à leur bord inférieur.

Exemple. NAXIE SERPULIFÈRE. *Naxia serpulifera*. Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 313. — *Pisa serpulifera*. Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 8. fig. 2. — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 1. fig. 2.

Genre CHORINE (*Chorinus* Leach). Mêmes caractères que chez les Naxies, si ce n'est que le rostre est conformé comme chez les Pises et que les orbites sont très incomplètes, leur paroi inférieure étant presque nulle ou interrompue par un large hiatus.

Exemple. CHORINE HÉROS. — *Cancer heros*. Herb. pl. 42. fig. 31. — *Maia heros*. Bosc. t. 1. p. 251. — *Pisa heros*. Latr. Encyc. t. 10. p. 139; — *Chorinus heros*. Leach. Latr. loc. cit. — Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 315, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 29. fig. 1.

Genre MITHRAX (*Mithrax* Leach). Carapace très large presque circulaire; rostre horizontal très large, mais très court et divisé en deux cornes arrondies; tige mobile des antennes externes insérée sous le front, mais pas recou-

verte par le rostre ; pinces élargies vers le bout , arrondies et profondément creusées en cuiller.

Exemples :

MAIA BORDS ÉPINEUX. (ci-dessus , page 434 n° 1.)

MAIA HÉRISSEMENT. (ci-dessus , page 435 n° 2.)

MAIA GRAVÉE. (ci-dessus , page 436 n° 7.)

Genre **PARAMITHRAX** (*Paramithrax* Edw.) Rostre horizontal large et composé de deux grosses cornes de ongueur médiocre ; tige mobile des antennes externes cylindriques et disposées comme chez les Pises ; bord orbitaire supérieur, voûté en avant et ne formant pas de cornes sur les côtés du rostre ; pinces pointues , arrondies et ne présentant ni dentelures ni cuiller.

Exemple. **PARAMITHRAX BARBICORNE.** — *Pisa barbicornis* : Latreille.

Encyc. t. 10. p. 141. — *Paramithrax barbicornis*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 324.

Genre **MAIA** proprement dit. Rostre horizontal composé de deux cornes arrondies ; tige mobile des antennes externes insérée dans le canthus interne des orbites et à découvert ; pinces pointues et ne présentant ni dents , ni cuiller.

Exemple. **MAIA SQUINADE.** (ci-dessus page 435 n° 3.)

Genre **MICIPPE** (*Micippe* Leach). Rostre presque perpendiculaire repley en bas et formant avec l'axe du corps un angle presque droit ; pédoncules oculaires de longueur ordinaire ; orbites complètes.

Exemple. **MICIPPE A CRÊTE.** (ci-dessus page 436 n° 5.)

Genre **CRIOCARCIN** (*Criocarcinus* Guérin). Rostre comme dans les Micippes ; pédoncules oculaires extrêmement longs ; orbite sans paroi inférieure.

Exemple. **CRIOCARCIN A SOURCILS.** — *Cancer superciliosus*. Herbst. pl. 14. fig. 89. — *Criocarcinus superciliosus*. Guérin. Collect. du Muséum. — Edw. op. cit. t. 1. p. 332.

§ 2. *Maiens* dont les yeux sont peu ou point mobiles et ne peuvent se reposer en arrière ; point de portion postforaminaire de l'orbite.

Genre **PARAMICIPPE** (*Paramicippa* Edw.). Yeux très saillans, dépassant de beaucoup les bords de l'orbite ; rostre repley en bas, presque vertical.

Exemple. **PARAMICIPPE PLATIPÈDE**. — *Micippa platipes*. Ruppell. Crust. de la mer Rouge. pl. 1. fig. 4. — *Paramicippa platipes*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 333.

Genre **OTHONIE** (*Othonia* Bell). Yeux très saillans et dirigés en avant ; rostre horizontal et rudimentaire ; tige mobile des antennes externes insérée sur le bord du front et ayant son premier article très élargi ; carapace presque circulaire.

Exemple. **OTHONIE A SIX DENTS**. *Othonia sex dentata*. Bell. Trans. of the Zool. Soc. of London. t. 2. pl. 12. fig. 1.

Genre **STÉNOCIONOPS** (*Stenocionops* Latreille). Pédoncules oculaires excessivement longs et dépassant de beaucoup les bords de l'orbite ; rostre composé de deux grandes cornes horizontales.

Exemple. **MAÏA CERVICORNE**. (ci-dessus, page 436 n° 6.)

Genre **TYCHE** (*Tiche* Bell). Yeux ne dépassant que peu le bord orbitaire supérieur, mais à découvert en dessous dans une longueur considérable ; rostre horizontal et composé de deux cornes médiocres ; antennes externes, ayant leur article basilaire très étroit et leur tige mobile grêle et à découvert. Carapace très élargie antérieurement ; pattes grêles et cylindriques.

Exemple. **TYCHE FRONT LAMELLEUX**. *Tiche lamellifrons*. Bell. loc. cit. pl. 12. fig.

Genre **PERICÈRE** (*Pericera*. Lat.). Yeux dépassant à peine les bords de l'orbite qui est circulaire ; article basi-

laire des antennes externes extrêmement large antérieurement; rostre composé de deux grandes cornes horizontales.

Exemple. MAIA TAUREAU. (ci-dessus, page 435 n° 4.)

Genre MÉNOETHIE (*Menæthia* Edw.). Yeux dépassant à peine les bords orbitaires; antennes externes ayant leur article basilaire très étroit en avant et leur tige mobile à découvert sur les côtés du rostre qui est long, simple et très étroit; pattes des quatre dernières paires cylindriques.

Exemple. MÉNOETHIE LICORNE. — *Pisa monoceros*. Latreille. Encycl. t. 10. p. 139. — *Inachus arabicus*. Ruppell. Crust. de la mer Rouge. pl. 5. fig. 4. — *Menæthia monoceros*. Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 339.

Genre HALIME (*Halimus* Latr.). Yeux et antennes externes comme chez les Ménoéthies; rostre large et composé de deux cornes divergentes, pattes des quatre dernières paires comprimées et élargies en dessous vers le bout; leur avant-dernier article tronqué en dessous près de son extrémité, mais ne portant près de son extrémité aucun tubercule ou autre vestige d'un doigt immobile.

Exemple. HALIME BÉLIER, *Halimus aries*. Latreille. — Guérin. Icon. Crust. pl. 9. fig. 2. — Edw. op. cit. t. 1. p. 341.

Genre ACANTHONYX (*Acanthonyx* Latreille). Mêmes caractères que chez les Halimes, si ce n'est que les pattes, très courtes, ont leur pénultième article échancré en dessous vers le bout et armé d'une dent pilifère contre lequel le tarse vient se replier en manière de pince.

Exemple. ACANTHONYX LUNULÉ. — *Maia lunata*. Risso Crust. de Nice. pl. 1. fig. 4. — *Acanthonyx lunatus*. Latreille. Règne anim. 2^e éd. t. 4. p. 58. — Guérin. Iconog. Crust. pl. 8. fig. 1; — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 2. fig. 1; — Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 342. et Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 27 fig. 2.

Genre EPIALTE (*Epialtus* Edw.). Yeux peu saillans; antennes externes ayant leur article basilaire très étroit en

avant et leur tige mobile insérée sous le rostre; rostre court et très étroit; pattes des quatre dernières paires sans crête en dessus et présentant vers le bout de leur pénultième article sur leur bord inférieur un petit tubercule.

Exemples. **EPIALTE DENTÉ.** *Epialtus dentatus*. Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 345.

EPIALTE MARGINÉ. *Epialtus marginatus*. Bell. Trans. of the Zool. Societ. vol. 2. pl. 11. fig. 4. et pl. 13.

Genre **LEUCIPPE** (*Leucippa* Edw.). Yeux à peine saillans et un peu mobiles, antennes comme chez les Epialtes; rostre très large; des vestiges d'une portion post-foraminaire de l'orbite; pattes armées en dessus d'une crête lamelleuse longitudinale.

Exemple. **LEUCIPPE PENTAGONE.** *Leucippa pentagona*. Edw. Ann. de la Soc. Entomol. t. 2. pl. 188. et Hist. des Crust. t. 1. p. 347. pl. 15. fig. 9 et 10. E.

LES PLAQUETTES.

Test carré ou en cœur, en général aplati, ayant toujours son bord antérieur tronqué ou en ligne droite transverse. Point de pattes terminées en nageoire.

La plupart des crustacés qui constituent cette coupe sont remarquables par leur test plat, quelquefois peu épais, comme dans les Plagusies et les Grapses, rarement hérissé d'épines, souvent même d'une consistance assez peu solide et orné, dans plusieurs, de couleurs très vives.

Les *Plaquettes* sont fort nombreuses, et paraissent former une famille particulière. Les yeux de ces crustacés occupent toujours les angles latéraux du front ou du chaperon, lequel très souvent est infléchi ou incliné en bas. Tantôt le chaperon occupe une grande partie du

bord antérieur du test, et alors les pédicules des yeux sont courts; et tantôt ce chaperon est petit et n'occupe qu'une petite portion du bord, celle du milieu, et dans ce cas, les yeux ont de longs pédicules.

Ceux de ces crustacés qui ont le corps bien aplati se tiennent ordinairement sous les pierres; d'autres se cachent en partie sous le sable; enfin d'autres se retirent dans des terriers. Ces derniers sont des coureurs, vont sur la terre, grimpent quelquefois sur les arbres, et parmi eux, il s'en trouve qui vivent habituellement sur la terre. Nous divisons cette famille de la manière suivante.

- * Les deux ou les quatre pattes postérieures relevées sur le dos. Point de chaperon incliné.

Doripe.

- ** Aucune patte postérieure relevée sur le dos. Le bord antérieur du test ou le chaperon incliné en bas.

(1) Pédicules des yeux courts, se logeant dans les fossettes circonscrites.

(a) Test carré, bien aplati.

Plagusie.

Grapse.

(b) Test cordiforme, souvent épais et renflé antérieurement.

Tournalourou.

(2) Pédicules des yeux fort allongés, se logeant dans une gouttière frontale.

(a) Les yeux latéraux sur leur pédicule. Antennes intermédiaires cachées sous le test.

Ocypode.

(b) Les yeux terminaux ou au bout de leur pédicule. Les quatre antennes apparentes.

Rhombille.

[Cette division correspond à-peu-près à notre famille des Brachyures Catométopes; les Doripes seuls nous parais-

sent devoir en être retirés et rapprochés des Oxystomes. Un des caractères les plus remarquables de cette famille est la disposition anormale des organes copulateurs du mâle qui, au lieu de sortir par un trou creusé dans l'article basilaire des pattes postérieures, naissent presque toujours du plastron sternal, ou du moins se logent dans une gouttière transversale creusée dans ce plastron, lorsqu'ils sortent comme d'ordinaire de la base des pattes ; il est aussi à remarquer que la base de l'abdomen du mâle est en général beaucoup plus étroite que le bord postérieur du thorax, que la carapace est plus ou moins quadrilatère ou ovalaire et n'est rétrécie ni en avant comme chez les Oxyrhynques, ni en arrière comme chez les Cyclo-métopes, que le front est en général très large et très incliné, que l'épistome est très étroit, etc.

Cette famille nous paraît devoir être divisée en six tribus, savoir : les Grapsoïdiens, les Ocypodiens, les Gonoplaciens, les Gécarciniens, les Thelphusiens et les Pinnothériens.

E.

DORIPÆ. (Doripe.)

Quatre antennes toutes apparentes : les extérieures plus longues, sétacées ; les intermédiaires pliées, à dernier article bifide. Les yeux écartés, pédonculés ; les pieds-mâchoires extérieurs étroits, allongés.

Test en cœur renversé, déprimé, inégal, à front tronqué et denté. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince ; les quatre postérieures dorsales, relevées, prenantes.

Antennæ quatuor, conspicuæ : externis longioribus, setaceis ; internis plicatilibus, articulo ultimo bifidis. Oculi remoti, pedunculati. Maxilli-pedes exteriores angustè elongati.

Testa obversa cordata, depressa; dorso inaequali; fronte truncatâ, dentatâ. Pedes decem: antiois duobus chelatis; posticis quatuor dorsalibus, sublatiis, prehensilibus.

OBSERVATIONS. — Les *Doripes* semblent tenir encore un peu des Trigonés, car plusieurs d'entre elles ont le corps plus long que large, se rétrécissant un peu antérieurement; mais leur test est tronqué en devant, ce qui les en distingue. L'aplatissement de leur corps, la troncation de leur bord antérieur, et l'écartement des yeux, les font placer parmi les Plaguettes, malgré leur singularité. Les divisions de leur bord antérieur semblent annoncer le voisinage des Plagusies.

Il paraît que ces crustacés ont des habitudes particulières. On croit qu'ils cachent leur corps dans le sable; et comme leurs pattes postérieures sont dorsales, relevées et terminées par un crochet, on suppose qu'ils saisissent, par leur moyen, soit leur proie, soit quelques corps propres à les garantir des dangers.

[Les *Doripes* ressemblent assez aux Plagusies par la forme générale de leur corps, mais s'en éloignent par la position des verges, la structure de l'appareil buccal, et plusieurs autres caractères qui les rapprochent des Orythies, des Calappes, etc., et qui nous ont porté à les ranger dans la famille des Oxystomes, où elles constituent le type d'une tribu particulière caractérisée par la grandeur des antennes externes, la petitesse et la disposition anormale des pattes postérieures, la forme circulaire du plastron sternal, etc. Le caractère le plus remarquable des *Doripes* consiste dans la disposition des ouvertures afférentes des cavités branchiales, qui sont formées par une grande échancrure de la région ptérygostomienne de la carapace, et séparées de la base des pattes antérieures par un prolongement de cette région, tandis que chez les autres Doripiens, et même chez tous les autres crustacés, les ouvertures, ainsi placées, sont bornées en arrière par la base des pattes antérieures. E.

ESPECE.

1. *Doripe laineuse. Doripe lanata.*

D. testâ trigonâ, utroque latere unidentatâ; fronte quadridentatâ; pedibus hirsutis.

Cancer lanatus. Lin. Planch. conch. p. 36. tab. 5. f. r.

Cancer hirsutus, etc. Aldrov. Crust. 2. cap. 19.

* Herbst. t. 1. pl. 11. fig. 61.

* *Cancer facchino*. Ejusd. pl. 11. fig. 68 (le mâle).

* *Dorippe lanata*. Latr. Encycl. pl. 306. fig. 2.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 17. fig. 2.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 155.

Habite la Méditerranée. Test jaunâtre, pubescent.

2. Doripe noduleuse. *Doripe nodulosa*.

D. testâ oblongo-ovata, anticè truncato-dentatâ ; dorso eminentiùs variis inæqualibus ; brachiis tuberculis asperatis.*

Doripe nodulosa. Per. Mus. n°.

An doripe quadridens ? Fab. Suppl. p. 361.

* *Cancer frascone*. Herbst. pl. 11. fig. 70.

* *Doripe quadridentata*. Latreille. Encyc. pl. 306. fig. 1.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 135.

* *D. nodulosa*. Guérin. Iconog. Crust. pl. 13. fig. 2.

* *Doripe quadridentata*. Edw. op. cit. t. 2. p. 156.

Habite les mers Australes. Péron. Voyez Herbst. tab. XI. f. 70.

3. Doripe atropos. *Doripe atropos*.

D. testâ oblongo-ovata, anticè truncatâ, dorso subnoduloso ; brachiis pedibusque muticis glabris.

Doripe facchino. Mus. n°.

An Inachus mascaronius ? Roemer. Gen. Ins. t. 31. f. 1. (1)

Habite.... l'Océan Indien ?

* Cette Doripe n'est pas une espèce distincte de la précédente, mais seulement un individu femelle.

(1) Cette figure se rapporte à un crustacé qui ne doit même pas rester dans le genre Doripe, et qui constitue le type du genre *Etrusa* de Roux. Ce genre se distingue facilement des Doripes par le mode de conformation des ouvertures afférentes de la cavité respiratoire, lesquelles présentent ici la disposition normale. La carapace est à-peu-près quadrilatère; les yeux sont portés sur des pédoncules très longs et non rétractiles; le cadre buccal est triangulaire, comme chez les autres Oxystomes; les pattes de la seconde et de la troisième paires sont très longues; enfin celles des deux dernières paires sont très courtes, iné-

4. Doripe front-épineux. *Doripe spinifrons*.

D. testis oblongus, antici tuberculis spinosis ciliatis; postici libratis: femoribus spinosis.

Doripe fronticornis. Maa. 2°

Cancer barbatus. Fab. Syst. Ent. p. 480.

Homola. Leach. Lat. (1)

* *Homola spinifrons.* Leach. Zool. Illustr. t. 2. pl. 86.

* Latreille. Encyclop. pl. 277. fig. 4.

* Desmarest. op. cit. pl. 17. fig. 1.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 183. pl. 22. fig. 1.

Habite la Méditerranée.

† Genre ~~exanomalus~~. *Cynopolia*.

M. Roux, naturaliste distingué de Marseille, mort pendant un voyage scientifique dans l'Inde, a fait connaître sous ce nom un Crustacé très remarquable, qui semble établir un passage entre les Doripes et les Grapsoidiens, et qui se trouve dans la Méditerranée. Il se rapproche des premières par la forme générale du corps, la petitesse et la disposition des pattes postérieures et la structure de la bouche, mais s'en distingue par la conformation des ouvertures afférentes de la cavité respiratoire, lesquelles

sont au-dessus des précédentes, et terminées par un tarse très court, crochu et subchéliforme.

L'Éthuse mascarone (*Cancer mascarone*. Herbst. t. 1. p. 192. pl. 11. fig. 69. — *Doripe calida?* Latr. Encycl. pl. 278. fig. 4. — *D. mascarone*. Roux. loc. cit. — *Ethusa mascarone*. Roux. Crust. de la Méditerranée. pl. 11. — Edw. op. cit. t. 2. p. 162) est la seule espèce connue de ce genre. E.

(1) Les Homolæ sont des Décapodes Anomoures qui se rapprochent assez des Dromies, mais s'en distinguent par leur carapace quadrilatère, leurs longs pédoncules oculaires, leurs antennes internes non rétractiles et dépourvues de fossettes, leurs antennes externes très longues, leurs pattes-mâchoires externes subpédiformes, etc. E.

sont placées, comme d'ordinaire, immédiatement devant la base des pattes antérieures. La carapace de cet animal est déprimée, plus large que longue, quadrilatère et très inégale. Le front est très large et dentelé; les yeux se reploient dans les orbites; les antennes externes se reploient transversalement sous le front, et les fossettes qui les logent sont séparées des orbites par l'article basilaire des antennes externes; le second et le troisième article de ces derniers organes sont longs et cylindriques, et supportent une tige pluriarticulée assez longue. Le cadre buccal est presque carré, mais est incomplet en avant, et les pattes-mâchoires internes paraissent devoir dépasser les externes et se prolonger jusqu'aux fossettes antennaires. Les pattes-mâchoires externes sont beaucoup trop courtes pour clore en entier le cadre buccal; leur troisième article est très petit, et fortement tronqué à sa partie antérieure et interne pour l'insertion de l'article suivant, qui est assez grand. Les pattes antérieures sont inégales et la main est petite et renflée. Les pattes des trois paires suivantes sont aplaties, et successivement de plus en plus longues; leur tarse est étroit, mais aplati et de forme un peu lancéolée. Les pattes de la cinquième paire sont presque rudimentaires; elles naissent au dessus des quatrièmes, et n'atteignent pas l'extrémité de leur troisième article. Le tarse de ces organes est grêle, styliforme et presque droit. Enfin, l'abdomen se recourbe en bas immédiatement derrière le bord postérieur de la carapace, et se compose de sept articles distincts dans les deux sexes.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre.

La Cympolie de Caron. *Cymopolia Caronii*. Roux. Crust. de la Médit. pl. 21. — Edw. op. cit. t. 2. p. 159. E.

+ Genre ~~CAPHYRE~~ *Caphyra*.

Ce genre, établi par M. Guérin, paraît se rapprocher encore davantage des Grapsoïdiens par la conformation de la bouche. La forme générale est à-peu-près la même que chez les Doripes et les pattes des deux dernières paires sont relevées sur le dos; mais il diffère des précédens en ce que la conformation de ces pattes est la même que celle des pattes de la deuxième et de la troisième paire.

On n'en connaît qu'une espèce.

Le Caphyre de Roux. *Caphyra Rouxi*. Guérin. Ann. des Sc. nat. t. 26. p. 286. pl. 8. A. — Edw. op. cit. t. 2. p. 160. E

PLAGUSIE. (*Plagusia*.)

Quatre antennes courtes : les deux intérieures sortant souvent par les fentes du chaperon. Les yeux à pédicules courts, écartés, situés aux extrémités latérales du chaperon dans un sinus.

Test aplati, presque carré, un peu rétréci en devant. Chaperon entaillé de deux fentes. Dix pattes : les deux antérieures plus courtes, terminées en pincés.

Antennæ quatuor, breves : internis duabus per fissuras clypei sæpe exsertis. Oculi remoti, pedunculis brevibus, extremitatibus lateralibus clypei in sinu inserti.

Testa depressa, subquadrata, anticè subangustata : clypeo fissuris binis inciso. Pedes decem : anticis duobus brevioribus, chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Plagusies* tiennent de très près aux Grapses; c'est, de part et d'autre, un corps très aplati, presque carré, émoussé ou arrondi aux angles, à test peu épais, écail-

leux ou granuleux, le plus souvent denté sur les côtés, comme antérieurement. Mais elles en sont éminemment distinguées par leur chaperon entaillé, tandis que celui des Grapses est rabattu et entier.

[Les Plagusies constituent un genre très naturel qui doit prendre place dans la tribu des Grapsoïdiens. E.]

ESPÈCES.

1. Plagusie écailleuse. *Plagusia squamosa*.

P. testæ tuberculis inæqualibus, depressis, ad interstitia ciliatis adspersa, manibus angustis.

Cancer. Petiv. Gaz. tab. 75. f. 11. Bona.

An cancer depressus ? Fab. Suppl. p. 343.

Herbst. Canc. tab. 20. f. 113.

Plagusia squamosa. Latr.

* Ejusd. Encyclop. t. 10. p. 73.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 94.

Habite.... probablement l'Océan Indien,

2. Plagusie sans taches. *Plagusia immaculata*.

P. unicolor, pallide albida; tuberculis testæ inæqualibus depressis, nudis, sparsis; pedibus angulatis, ad angulos crenulatis.

Plagusia depressa. Mus. n°.

* *Grapus depressus*. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 56.

* *Plagusia depressa*. Ejusd. Encyc. t. 10. p. 147.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 126.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 93.

Habite.... la Méditerranée ? Je la crois de l'Océan indien.

3. Plagusie serripède. *Plagusia serripes*.

P. albida rubro maculata; pedibus compressis; femoribus hinc serrato-spinosis.

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. 21.

Mus. n°.

Habite les mers australes. Péron. Elle est très aplatie, à son front un peu épineux.

* Cette Plagusie ne me paraît pas différer spécifiquement de la suivante.

4. Plagusie clavimane. *Plagusia clavimana*.

P. spadicea; testæ dotis litaris hieroglyphicis; pallidi femoribus serrato-spinosis; chela valida.

* *Cancer platissimus*. Herbst. pl. 59. fig. 3.

Plagusia clavimana. Latr. Gen. 1. p. 34.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 14. fig. 2.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 92.

Habite les mers australes. Péron. Mus. no. Elle a les pattes rayées de blanc.

5. Plagusie tuberculée. *Plagusia tuberculata*.

P. rubro albidogue varia; testâ punctatâ, tuberculis subacervatis instructâ; manibus angustis.

Mus. n°.

Habite les mers de l'Île-de-France. M. Mathien. Grande et belle espèce, voisine de la Plagusie écailluse, mais distincte.

* Cette Plagusie ne me paraît pas être une espèce distincte de la *P. écailluse*.

GRAPSE. (Grapsus.)

Quatre antennes courtes, cachées sous le chaperon. Les yeux aux angles latéraux du chaperon, à pédoncules courts.

est aplati, presque carré, souvent arrondi aux angles. Chaperon transversal, rabattu en devant, non divisé. Dix pattes; les deux antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor, breves, sub clypeo absconditæ. Oculi ad angulos laterales clypei: pedunculis brevibus.

Testa depressa, subquadrata, ad angulos sæpe rotundata: clypeo transverso integro subtus inflexo. Pedes decem: duobus anticis chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Grapses* constituent un genre très naturel, très beau et fort nombreux en espèces, parmi lesquelles il y en a qui sont agréablement et très vivement colorées. Ils sont remarquables par leur corps aplati, leur front souvent un peu plissé, et leur chaperon entier, abaissé ou rabattu au-devant. Ils diffèrent des *Plagusies* par leur chaperon non entaillé, et parce que leur test n'est point rétréci en devant. Ces crustacés se tiennent, en général, sous les pierres.

[Le genre *Grapse* a été établi par Lamarck pour recevoir une

partie du genre Cancer, tel que Fabricius l'avait circonscrit, et a été adopté par tous ses successeurs; mais la plupart des auteurs y ont rangé des espèces que nous ne croyons pas devoir y laisser. Celles auxquelles nous conservons ce nom sont pour la plupart remarquables par l'aplatissement extrême de leur corps, et ont la carapace notablement plus large que longue, et à bords minces et presque droits. Leurs pattes-mâchoires externes sont fortement échancrées en dedans, de façon à laisser entre elles un espace vide en forme de losange, et ont leur troisième article fortement tronqué en avant, sans crête saillante, plus court, ou à-peu-près de la longueur du second et à-peu-près aussi large que long. Les tarse des pattes des quatre dernières paires sont gros et épineux. Enfin, le front est très large et incliné, et les régions ptrygostomiennes ne sont pas réticulées, et ne sont pas creusées sous le bord latéral de la carapace, d'une gouttière horizontale en communication avec les orbites. Les Grapsoïdiens qui ne présentent pas ces caractères constituent les genres Sésarme, Pseudograpse, Cyclograpse, Nautilograpse et Varune.

E.

ESPECES.

1. Grapse peint. *Grapsus pictus*.

G. testâ pedibusque rubro et albo variegatis; fronte plicis quatuor anticè dentatis; testæ lateribus posticis obliquè striatis.

Herbst. Canc. tab. 3. f. 33.

Seba. Mus. 3. t. 18. f. 5. 6.

Cancer grapsus. Lin. Fab. Suppl. p. 342.

Grapsus pictus. Latr. Gen. 1. p. 33.

* *Pagurus maculatus*. Catesby. Hist. nat. de la Caroline. t. 2. pl. 36. fig. 1.

* *Cangrejo de arrecife*. Parra. Descripcion de diferentes piezas de Historia natural. tab. 48. fig. 3.

Grapsus pictus. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 69; Encycl. t. 10. p. 147, etc.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 130. pl. 16. fig. 1.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 22. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 86.

Habite les mers de l'Amérique méridionale.

2. Grapse ensanglanté. *Grapsus cruentatus*.

G. albida-fulvus, maculis rubro-sanguineis variegatus; testis lateribus oblique striatis, fronte plicis quatuor edentulis.

Grapsus cruentatus. Latr. Gen. 1. p. 33.

* *Cancer ruficola*. Degeer. Mém. pour servir à l'Hist. des In. t. 7. p. 417. pl. 25.

* *Grapsus cruentatus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 132.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 85.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mus. n°.

3. Grapse raies-blanches. *Grapsus albo-lineatus*.

G. testâ tetragono-orbiculatâ, rubrâ, albo-maculatâ; fronte plicis quatuor asperis; pedibus fulvis immaculatis.

Mus. n°.

Habite les mers de l'Île-de-France. M. Mathieu. Les côtés postérieurs de son test sont rayés de blanc, à raies obliques.

* Cette espèce me paraît être le *Grapsus strigosus* de Latreille. (Voyez mon Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 87.)

4. Grapse masqué. *Grapsus personatus*.

G. testâ albidâ, lævi, pone frontem tuberiulis granulatâ; dorso striis transversis subobliquis; pedibus rubrofuscis.

Mus. n°.

* *Cancer variegatus*. Fab. Suppl. p. 343.

* *Grapsus variegatus*. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 71.

* *G. personatus*. Ejsd. Encyclop. t. 10. p. 147.

* *G. variegatus*. Guérin. Iconog. Crust. pl. 6. fig. 1.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 15. fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 87.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Péron. Grande et belle espèce, dont les pattes seules sont fortement colorées.

5. Grapse porte-pinceau. *Grapsus penicilliger*.

G. albido-cinereus, immaculatus; brachiis crassis; chellis penicillatim barbatis.

Mus. n°.

Cuv. le Règne animal, etc. vol. 4. pl. 12. f. 1.

Bumph. Mus. tab. 10. f. 2.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 248.

* Desm. Consid. sur les Crust. pl. 25. fig. 1.

* *Pseudograpsus penicilliger*. Edw. op. cit. t. 2. p. 82. (1)

Habite l'Océan Asiatique.

Etc.

[La petite division générique à laquelle nous avons donné le nom de NAUTILOGRAPSE, est extrêmement voisine des Grapses proprement dits, mais s'en distingue par la forme de la carapace qui est plus longue que large, et bombée en dessus; le front au lieu d'être recourbé en bas, est avancé, lamelleux et simplement incliné; les pattes sont courtes, etc.

Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre qui se voit dans presque tous les parages et se rencontre en haute mer, souvent flottant sur le *fucus natans* ou sur de grands animaux marins, c'est le :

Nautilograpse minime. *Nautilograpsus minutus*.

(*Cancellus marinus minimus quadratus*. Sloane Jamaica. vol. 11. pl. 245. fig. 1. — *Turte crabbe*. Brown. Jamaica. p. 421. pl. 42. fig. 1. — *Cancer minutus*. Fabricius. Ent. Syst. v. 2. p. 443. et Suppl. p. 343. — Linneus. Mus. Ad. Fred. 1, 8, 91; et Itin. W. Goth. tab. 3. fig. 1-2. — Herbst. t. 1. pl. 2. fig. 32. — *Grapsus minutus*. Latreille. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 68. — *Grapsus cinereus*. Say. op. cit. p. 99. — *Grapse uni*. Lamarck. Galerie du Muséum. — *Nautilograpsus minutus*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 90.)

Nous ne voyons aucune raison suffisante pour distinguer de cette espèce le *Grapsus testudinum* de Roux (Crust. de la Méditerranée. pl. 6. fig. 1-6).

(1) Notre genre PSEUDOGRAPSE se distingue facilement de tous les autres Grapsoïdiens par la conformation des pattes-mâchoires externes qui se terminent en dedans par un bord droit, et se touchent presque de façon qu'elles ne laissent pas entre elles un grand espace vide en forme de losange, comme chez les Grapses, les Sésarmes, etc. Il est aussi à noter qu'ici le corps est épais et la carapace convexe en dessus, et assez régulièrement arrondie sur les côtés.

E.

Le genre **SÉSARME** (*Sesarma* Say) comprend dans notre distribution méthodique des Crustacés les Grapsoïdiens qui ont la carapace quadrilatère et très élevée en avant; le front très large et brusquement reployé en bas; les orbites profondément échancrés au dessous de leur angle externe et se continuant ainsi avec une gouttière horizontale creusée sous le bord latéral de la carapace; les régions ptérygostomiennes granulées ou réticulées d'une manière ordinairement très remarquable; les pattes-mâchoires disposées comme chez les Grapses, mais ayant leur troisième article plus long que le second, plus long que large, ovulaire, peu ou point tronqué antérieurement et garni sur sa face externe d'une crête oblique; enfin les tarsi styliformes, garnis de duvet et presque toujours complètement dépourvus d'épines.

Exemple. **SÉSARME TETRAGONE.** *Sesarma tetragona*.

Cancer tetragonus? Fab. Suppl. p. 341. — *C. fascicularis*, Herbst. pl. 47. fig. 5. — *Ocypode tetragone*. Olivier Encyclop. t. 8. p. 418. — *Grapsus tetragonus*. Latreille, Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 71. — *Sesarma tetragona*?. Edwards, Hist. des Crust. t. 2. p. 73.

Le genre **CYCLOGRAPSE** (*Cyclograpsus* Edw.) se compose de Grapsoïdiens, dont la carapace est plutôt ovulaire que quadrilatère, et beaucoup moins aplatie que chez les Grapses, auxquels il ressemble par la conformation des pattes-mâchoires externes, si ce n'est qu'on voit d'ordinaire une crête oblique, sur le troisième article de ces organes. Presque toujours les orbites se continuent en dehors avec une gouttière située sous le bord latéral de la carapace, comme chez les Sésarmes, et les régions ptérygostomiennes sont ordinairement granulées ou même presque réticulées. Enfin les tarsi sont styliformes et presque toujours complètement dépourvus d'épines.

Exemple. **CYCLOGRAPSE PONCTUÉ.** *Cyclograpsus punctatus*.

Edw. op. cit. t. 2. p. 78.

Enfin nous avons établi le genre VARUNE (*Varuna* Edw.) pour recevoir un Crustacé, confondu jusque alors avec les Grapses, mais qui se distingue de tous les autres animaux de la même famille, par l'existence de pattes natatoires. Dans la méthode adoptée par Lamarck ce genre devrait par conséquent prendre place dans la division des Nageurs à côté des Portunes et des Matutes; mais, par l'ensemble de l'organisation, il se rapproche tellement des Grapses, qu'on ne peut l'en éloigner sans violer les principes des classifications naturelles.

Le type de ce genre est la VARUNE LETTRÉE.

Cancer litteratus. Fabr. Suppl. p. 342.

Herbst. t. 3. p. 58. pl. 48. fig. 4.

Grapsus litteratus. Bosc. t. 1. p. 203.

Varuna litterata. Edwards. Dict. class. d'hist. nat. t. 16. p. 511. et
Hist. nat. des crust. t. 2. p. 94. E.

TOURLOUROU. (*Gecarcinus*.)

Quatre antennes courtes; les deux intermédiaires rarement apparentes. Pédoncules des yeux courts, un peu épais, écartés à leur insertion, se logeant dans des fossettes arrondies ou elliptiques; les yeux subterminaux.

Test cordiforme, plus large et plus renflé antérieurement; à chaperon obtus, rabattu. Dix pattes: les deux antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor, breves: intermediis duabus raro conspicuis. Oculorum pedunculi breves, crassiusculi, insertione distantes, in fossulis, cavis rotundatis vel ellipticis recepti: oculis subterminalibus.

Testa cordiformis anticè latior sæpeque turgidior: clypeo obtuso, deflexo. Pedes decem: anticis duobus chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Tourlourous*, séparés récemment des *Ocypodes*, en sont effectivement bien distingués; mais il ne

Il faut pas trop particulariser les caractères de leur genre, vraiment naturel, car on le démembrerait sans utilité, et l'on en séparerait des espèces qui lui appartiennent réellement, quoique on puisse les distinguer. Ici, le chaperon, rabattu, est toujours un peu large, plus ou moins, et c'est à ses extrémités latérales que sont situées les fossettes dans lesquelles se logent les yeux. On serait donc exposé à confondre plusieurs des espèces de ce genre avec celles des Grapes, si leur forme non arrondie, mais en cœur un peu renflé, ne dirigeait leur détermination. Dans les uns, les pieds-mâchoires extérieurs s'écartent et ne recouvrent pas entièrement la bouche ; dans quelques autres, que nous n'en séparons pas, ces pieds-mâchoires la recouvrent tout-à-fait.

Les *Toulourous* vont souvent à terre et respirant l'air avec leurs branchies sans inconvénient pour eux ; quelques espèces même vivent habituellement sur la terre, se cachant le jour dans des terriers, et sortant le soir pour chasser ou chercher leur nourriture. Ils vont seulement une fois l'année, faire leur ponte à la mer, et reviennent ensuite. Ces animaux carnassiers courent très vite, saisissent souvent le gibier tué par des chasseurs, et l'emportent dans leur terrier. Il y en a qui vivent dans des cimetières.

[Les *Toulourous* proprement dits ou *GÉCARCINIENS*, forment une tribu très naturelle et fort remarquable tant par leur structure que par leurs mœurs. Les cavités branchiales sont très développées, et s'élèvent en une voûte très haute, ce qui donne à la carapace beaucoup de largeur, en renfle les parties latérales, et en rend la forme ovalaire ; le front est presque aussi large que le cadre buccal et fortement recourbé en bas ; les orbites sont ovalaires et les fossettes antennaires transversales et presque linéaires ; la conformation des pattes-mâchoires varie, mais toujours leur tige terminale s'insère à l'angle externe du troisième article, ou est cachée sous sa face interne ; les pattes sont longues et terminées par une tarse pointue et quadrilatère ; enfin, l'abdomen du mâle atteint presque toujours la base des pattes postérieures et les verges prennent naissance sur le plastron sternal.

On a divisé cette tribu en quatre genres, savoir.

1^o Les *Gécarcins* proprement dits, qui ont la tige terminale

des pattes-mâchoires externes insérée sur la face interne du troisième article près de son sommet, et complètement cachée sous lui, tandis que dans les autres genres, cette tige est toujours complètement à découvert.

2° Les GÉCARCINOÏDES, chez lesquels cette tigelle s'insère dans une échancrure profonde du troisième article de ces organes.

3° Les CARDISOMES, chez lesquels cette même tigelle s'insère à l'angle externe du troisième article, et chez lesquels la portion operculaire de ces organes est fortement échancrée sur le bord interne, de façon que les deux pattes-mâchoires laissent toujours entre elles un espace vide en forme de losange, disposition qui se voit aussi dans les genres précédens.

4° Les UCAS, chez lesquels la tigelle terminale des pattes-mâchoires s'insère aussi sur l'angle externe du troisième article, mais chez lesquels le bord interne de la portion élargie de ces organes est droit et se joint exactement à celui du côté opposé, de façon à fermer complètement la bouche. E.

ESPÈGES.

1. Turlourou ruricole. *Gecarcinus ruricola*.

G. testa laevi rubro tincta, turgida; marginibus rotundatis; oculorum fossulis rotundatis.

Cancer ruricola. Lin. Fab. Suppl. p. 339.

Ocipode turlourou. Latr. Gen. 1. p. 31.

Seba. Mus. 3. pl. 20. f. 5.

Herbst. Canc. tab. 3. f. 36. tab. 49. f. 1.

* *Cancer terrestris*. Sloane. Voyage to Madera, Jamaica, etc. t. I. pl. 2.

* *Crabe violet*. Labat. Nouv. voyage aux îles d'Amérique, t. II, p. 175.

* *Black or mountain Crab*. Brown. Hist. of. Jamaica, p. 123.

* *Cangrejos ajaes terrestres*. Parra. op. cit. pl. 58.

* *Gecarcinus ruricola*. Latr. Règ. anim. 1^{re} éd. t. III. p. 17; ejusd. Encycl. t. X. p. 685. pl. 296. fig. 2.

* Desmarest. op. cit. 113. pl. 12. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des crust. t. II, p. 26, et Atlas du Règne anim. de Cuvier, crust. pl. 21. fig. 1.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles. Les carpes et les ternes des pattes sont dentées en scie sur leurs angles.

2. Turlourou des fanges. *Gecarcinus uca*.

G. testa laevi, turgida: lateribus marginatis; dorso liliato in-presso; oculorum fossulis oblongis.

* *Uca una*. Margrave. Hist. nat. Brésil. p. 184.

Cancer uca, Lin.

* *Cancer uca*. Lin. Syst. nat. 12^e éd. t. II. p. 1041. n^o 13.

* *Cancer cordatus*. Ejusdem loc. cit. p. 1039. n^o 4, et Amon. Acad. t. 6. p. 414.

Ocypode uca. Lat. Gen. 1. p. 31.

Ocypode fossor. Mus.

Seba. Mus. 3. pl. 20. f. 4.

Herbst. Tab. 6. f. 38.

* *Cangrejo ajass terrestres*. Parra. op. cit. p. 164. pl. 58.

* *Ocypode cordata*. Latr. Hist. nat. des crust. et insect. t. VI. p. 37. pl. 46. fig. 3 (d'après Seba).

Uca una. Latr. Encycl. méth. t. X. p. 685. pl. 269. fig. 4 (d'après Seba).

* Guérin. Iconogr. Crust. pl. 5. fig. 5.

* Edwards, op. cit. t. II. p. 22.

Habite l'Amérique méridionale, aux endroits vaseux ou fangeux des bords de la mer. Ses pattes sont velues, mais ses tarsi ne sont point dentés.

3. Tourlourou fluviatile. *Gecarcinus fluviatilis*. (1)

G. testâ cordiformi; lateribus anticis marginalis, crenulatis, sub-tuberculatis; dorso lævi.

* *Cancer fluviatilis*. Belon. De Aquatilibus, l. II. p. 372.

* Rondelet. Hist. des poissons, 2^e part. p. 153. pl. 30. fig. 2.

* Crabe de rivière. Oliv. Voyage, etc. pl. 30. f. 22.

* *Crabe fluviatile*. Bosc. t. I. p. 177.

* *Ocypode fluviatilis*. Latr. Hist. des crust. et ins. t. VI. p. 39.

Potamophile. Latr. Cuv. Règne anim. 3. p. 18.

(1) Le genre *THELPHUSE*, auquel cette espèce appartient, diffère beaucoup des *Gécarciens*, et établit à plusieurs égards le passage entre ces animaux et les *Capcérimens*. La disposition des organes de la génération, est la même que chez ces derniers, ainsi que la forme des pattes-mâchoires; enfin la forme générale de plusieurs *Thelphuses* diffère peu de celles des *Eriphies*; mais la structure de leur appareil respiratoire, et d'autres caractères que le zoologiste ne peut négliger, les éloignent de ces groupes naturels, et ne permettent pas de les séparer des autres *Catométopes*. Dans notre distribution méthodique des crustacés, ils forment

- Savigny. Egypte, Crustacés, pl. 2. fig. 5.
- *Potamophilus edulis*. Latr. Encyc. atlas. pl. 297. fig. 4.
- *Thelphusa fluviatilis*. Latr. Encycl. méth. t. X. p. 563. pl. 13 fig. 2: etc.
- Desmarest. Considérations sur les crustacés, p. 128. pl. 15. fig. 2.
- Edwards. Hist. nat. des crust. t. II. p. 12, et Atlas du Règne Anim. Crust. pl. 15. fig. 1.

Mus. n°

Habite les lacs et les rivières de l'Europe méridionale, de l'Italie.

le type d'une division particulière de cette famille que nous avons désigné sous le nom de tribu des Thelphusiens.

Le genre *Boscia* (Edw.) ou *Potamix* (Latr.) appartient aussi à la tribu des Thelphusiens, et se distingue du précédent par la disposition du front qui est brusquement repley en bas et par la forme des pattes-mâchoires externes, dont le troisième article, au lieu d'être carré et échancré à son angle interne pour l'insertion du quatrième article, est rétréci antérieurement et porte l'article suivant au milieu de son bord antérieur. Le type de ce genre est :

La *Boscia dentée*.

Cancer fluviatilis. Herbst. t. I. p. 183. pl. 10. fig. 61.

Bosc. op. cit. t. I. p. 177.

Thelphusa dentata. Latr. Encycl. t. X. p. 564.

T. serrata. Desmarest. Consid. sur les crust. p. 128.

Boscia dentata. Edwards. Hist. nat. des crust. t. II, p. 15. pl. 18. fig. 14-16.

Le genre *Trichodactyle* de Latreille se compose d'un Thelphusien qui établit le passage entre les genres précédents et la tribu des Grapsoïdiens. La carapace, presque horizontale en dessus, est beaucoup moins large que chez les Thelphuses. Le front est large, lamelleux, et simplement incliné; les orbites sont presque circulaires; les bords latéraux de la carapace courbes. Les antennes sont disposées à-peu-près comme chez les Thelphuses; mais la forme des pattes-mâchoires externes est très différente; leur troisième article est presque triangulaire, avec son sommet dirigé en dedans, et il s'articule avec l'article suivant par son angle antérieur et externe. Les pattes ont à-

• **Tourlourou pattes-velues. *Gecarcinus hirtipes*.**

G. testâ cordiformi; lateribus anticis granulatis subspinosis, clypeo denticulato; pedibus hispidis.

Ocypode hirtipes. Muz. n.

Habite à l'Île-de-France. M. Mathieu, et du Voyage de Péron. Il avoisine le précédent par ses rapports. (* Nous paraît être le *Cardisoma Carnifex*. Voyez notre Hist. des crust. t. II. p. 23.)

OCYPODE. (*Ocypoda*)

Quatre antennes courtes: les intermédiaires cachées sous le test. Les yeux latéraux sur leurs pédoncules, étant situés au dessous de leur sommet qui quelquefois les dépasse; les pédoncules longs, se longeant dans une fossette allongée.

Test carré, un peu aplati; à chaperon étroit, rabattu. Dix pattes: les deux antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor, breves: intermediis sub testæ absconditis. Oculi in pedunculis laterales infra illorum apices adnati; pedunculis longis, in canali aut fossulæ elongatæ receptis, apicibus interdum productis.

Testa quadrata, subdepressa; clypeo angusto deflexo. Pedes decem: anticis duobus chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Ocypodes* avoisinent beaucoup les Rhombilles par leurs rapports. On les en distingue néanmoins

peu-près la même forme que chez les précédens. On ne connaît encore qu'une espèce de ce genre.

Le TRICHODACEYLE CARRÉ.

T. quadrata. Latr. Coll. du Mus.

T. fluviatilis. Ejust. Encyclop. t. X. p. 705.

T. quadrata. Edw. Hist. nat. des crust. t. II. p. 16, et Atlas du

Régis Anim. Crust. pl. 16. fig. 2.

II.

en ce que les yeux ne terminent point véritablement leurs pédoncules, mais sont latéraux et adnés, sous leur sommet, à une portion de leur longueur. Ces pédoncules sont moins grêles que dans le genre des Rhombilles, et quelquefois leur pointe dépasse l'œil. Ces crustacés forment une transition aux Tournourous.

ESPÈCES.

1. Ocypode chevalier. *Ocypodeippeus*.

O. testâ quadratâ, scabrâ, anticâ utrinque angulatâ; oculis pericillo terminatis.

Ocypodeippeus. Oliv. Encycl. p. 410. no 1.

Crabe chevalier. Oliv. Voy. dans l'Emp. ottom. 2. p. 234. tab. 30. f. 1.

Belon. de la Nat. des pois. liv. 2. p. 367.

* Savigny. Egypte. Crust. pl. 2. fig. 1.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 121.

* Edwards. Hist. des crust. t. 2. p. 47.

Habite les côtes de Syrie, d'Égypte. Il court très vite, de côté, et va à terre.

2. Ocypode cératophthalme. *Ocypodeceratophthalmus*.

O. testâ quadratâ, anticâ utrinque angulatâ; oculis spinâ terminatis; manibus inæqualibus punctato granulatis.

Cancer ceratophthalmus. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. p. 83. t. 5. f. 7.

Ocypodeceratophthalma. Fabr. Suppl. p. 347.

* Latreille. Encyclap. pl. 274. fig. 1.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 121. pl. 12 fig. 1.

* Edwards. Hist. nat. des crust. t. 2. p. 48 et Atlas du règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 17. fig. 1.

3. Ocypode blanc. *Ocypodealbicans*.

O. testâ quadratâ, anticâ sinuatâ; manibus tuberculatis ad margines dantatis, oculis spinâ terminatis.

Ocypodealbicans. Bosc. Hist. nat. des crust. 1. p. 196. pl. 4. f. 2.

* Cette espèce me paraît être la même que l'OCYPODE DES SABLES (*Cancer arenarius*. Catesby, Latr. Hist. of south Carolina. vol. 2. pl. 35. fig. — *Ocypode quadrata*. Bosc. t. 1. p. 194. pl. 4. fig. 91. — Fabr. Suppl. p. 347. — *O. albicans*. Latr. Encyc. pl. 285. fig. 1. (cop. d'après Catesby). — *Ocypode quadrata*. Latr. Hist. nat. des crust. t. 6. p. 49. — *O. arenaria*. Say. op. cit. p. 69. — Edwards. Hist. nat. des crust. t. 2. p. 44. pl. 19. fig. 13.)

Habite les côtes de la Caroline.

RHOMBILLES. (Gonoplar.)

Quatre antennes apparentes. Les yeux terminaux, posés d'une manière droite ou oblique au bout de leurs pédoncules; ces pédoncules étant longs, rapprochés à leur insertion, et se logeant dans une gouttière antérieure.

Test carré ou rhomboidal; déprimé, tronqué en avant; à chaperon très petit. Dix pattes: les deux antérieures terminées en pince.

Antennæ quatuor, conspicuæ. Oculi terminales, ad apicem pedunculorum rectè aut obliquè insidentes; pedunculis longis, insertione approximatis, in canali antico receptis.

Testa quadrata aut rhomboidalis, depressa, anticè truncata; clypeo minimo. Pedes decem: anticis duobus chelatis.

OBSERVATIONS. — Les *Rhombilles* sont un démembrement nouveau des Ocypodes, et s'en rapprochent effectivement. Néanmoins ils s'en distinguent: 1° parce que les yeux sont posés au sommet de pédoncules longs, grêles, et qui atteignent les angles antérieurs et externes du test; 2. parce que leur chaperon est si petit, qu'il permet aux antennes intermédiaires de se déployer et de se montrer.

[Lamarck réunit ici deux genres très distincts: les GONOPLACES ou Rhombilles proprement dits, et les GÉLASIMES. Ces derniers se rapprochent beaucoup des Ocypodes auxquels ils ressemblent par l'étroitesse de leur front, par la position verticale des antennes internes qui sont logées en grande partie dans l'angle orbitaire interne et par la conformation des pattes-mâchoires externes, dont le quatrième article s'insère à l'angle externe de l'article précédent; ils s'en distinguent par leurs pédoncules oculaires extrêmement grêles, et la petitesse de la cornée transparente; la grandeur et l'inégalité des pattes antérieures chez le mâle, etc. Les Gonoplaces ont le front large et avancé, les antennes internes horizontales, et logées sous le front; le quatrième article des pattes-mâchoires externes inséré à l'angle

interne du troisième article comme chez les Cancériens, etc. Ce dernier genre correspond à la seconde subdivision indiquée ci-dessous par notre auteur, et doit constituer le type d'une tribu particulière qui a reçu nom de Gonoplaciens, et qui renferme les genres *Macrophthalme*, *Cléistotome* et *Pseudorhombille*].

E.

ESPÈCES.

(Pinces très inégales.)

{ * Genre *Gélasime*.)1. Rhombille appelant. *Gonoplax vocans*.

G. testâ quadratâ integrâ; lineis impressis dorsalibus; brachio altero altero maximo : manibus lævibus.

* *Cicis* etc. Margrave. p. cit. op. 185.

Cancer vocans? Lin. Fab. Suppl. p. 340.

* *Cancer vocator*. Herbst. pl. 59. fig. 1, et *Cancer vocans minor*? pl. 1. fig. 10.

Ocypode vocans. Latr. Hist. nat. 6. p. 45.

Degeer. Ins. 7. pl. 26. f. 12.

* *Ocypode vocans* et *O. pugillator*? Bosc. op. cit. t. 1. p. 197 et 198.

* *Ocypode pugillator*. Say. jour. of the Acad. of Sc. of Philadelphia. vol. 1. p. 71.

* *Gelasimus vocans* et *G. pugillator*. Desmarest. Consid. p. 123.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 54.

Habite l'Océan indien.

2. Rhombille maracoan. *Gonoplax maracoani*.

G. testâ quadrato rhombâ; lineis impressis dorsalibus; brachio altero maximo : manibus granulatis digitis valdè compressis.

Ocypode maracoani. Latr. Hist. nat. 6. p. 46.

Pison. Bras. p. 77. t. 78.

Seba. Mus. 3. t. 78. f. 8.

* *Gelasima maracoani*. Latreille. Encyclop. pl. 296. fig. 1.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 51.

Habite l'Amérique méridionale.

Etc. *G. grandimanus*, *G. manhus*, *G. porrector* (espèces inédites).

(Bras longs, presque égaux.)

(* Genre Rhombille proprement dit.)

3. Rhombille anguleux. *Gonoplax angulatus*.

G. testâ rhombed, ad angulos anticos bidentatâ; manibus longissimis.

Cancer angulatus. Fab. Suppl. p. 341.

Ocypode angulata. Lat. Hist. nat. 6. p. 44.

Herbst. Canc. tab. 1. f. 12.

Pennant. Zool. Brit. 4. pl. 5. f. 10.

* *Gonoplax bispinosa*. Latr. Encyclop. t. 10. p. 293. pl. 273. fig. 5.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 293. pl. 273. fig. 5.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 125.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 62.

Habite dans la Manche, sur les côtes d'Angleterre.

4. Rhombille longimane. *Gonoplax longimana*.

G. testâ rhombed levî; angulis utriculis unispinosis; pedibus longissimis.

Cancer rhomboides. Linn. Fab. Suppl. p. 341.

Herbst. tab. 1. f. 12. (* et tab. 45. fig. 5.)

Ocypode longimana. Latr. Hist. nat. 6. pl. 45. f. 3.

* *G. bispinosa*. Latr. Encyclop. t. 10. p. 293. pl. 272. fig. 2.

* *Gonoplax rhomboides*. Desm. p. 125. pl. 18. fig. 2.

* Risso. Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5. p. 13.

* Roux. Crust. de la Méditer. pl. 9.

* Edwards. op. cit. t. 2. p. 62.

Habite la Méditerranée.

Ec.

[Parmi les Crustacés fossiles que M. Desmarest rapporte avec doute au genre *Gonoplax*, il en est un qui se rapproche des espèces récentes par la forme du front, et qui pourrait bien appartenir au même groupe; mais sa carapace est carrée, au lieu d'être trapézoïdale, et les bords latéraux en sont arquées. C'est le *GONOPLEX INCERTA* (Desm. Crust. foss. p. 104, pl. 8, fig. 9). E.]

Le genre *MACROPHTHALMÆ* a été établi par Latreille

pour recevoir quelques Crustacés qui ont le port des Gonoplates, mais qui s'en distinguent par la forme des pattes-mâchoires, et surtout par la longueur des pédoncules oculaires. Leur carapace est rhomboïdale et très large. Le front est recourbé en bas, très étroit et assez semblable à celui des Ocypodes; il n'occupe qu'environ le cinquième du diamètre transversal de la carapace et ne recouvre pas complètement la portion basilaire des pédoncules oculaires; ceux-ci sont très longs, grêles et terminés par une cornée ovale et très petite. Les orbites ont la forme d'une rainure transversale creusée sous le bord antérieur de la carapace et dirigée obliquement en haut; en dedans, leur bord inférieur est beaucoup plus saillant que leur bord supérieur, mais manque au-dessous de l'angle externe, de façon que dans ce point leur cavité n'est pas close. Les pattes-mâchoires externes ne se rencontrent pas tout-à-fait; leur deuxième article est très large, et le troisième, beaucoup moins grand, surtout en avant, porte à l'angle externe de son bord antérieur la tige terminale. Le plastron sternal est à-peu-près de la même forme que chez les Gonoplates, mais beaucoup plus large, et, chez le mâle, au lieu de présenter des gouttières transversales pour loger les verges qui, chez ces derniers, sortent par la base des pattes postérieures, il est lui-même perforé très loin du bord pour livrer directement passage à ces appendices terminaux des conduits spermatiques. Quant à la disposition des pattes, elle est à-peu-près la même que chez les Gonoplates.

Le type de ce genre est le :

MACROPTERUS TRANVERSAL. *Gonoplar transversus* Latr. Encyc. méth. atlas. pl. 297. fig. 2. et Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e édit. Desm. op. cit. p. 125.
 Edwards, Hist. nat. des crust. t. 2. p. 64. et Atlas du Règne animal de Cuvier. Crust. pl. 16. fig. 2.

La plupart des Gonoplaciens fossiles décrits par M. Desmarest nous paraissent devoir se rapporter à ce genre plutôt qu'à celui des Gonoplaces, car la forme de leur front et même celle de la carapace en général est tout-à-fait celle des Macrophthalmes, et diffère notablement de celle de ces derniers. Tels sont :

Le *MACROPTHALME INCISÉ*. (*Cancer lapidescens*, Rumph. Rarit. Kamer. tab. 60. fig. 1 et 2. — Knorr. Monum. du Déluge. t. 1. pl. 16. A, B. — *Gonoplax incisa*, Desmarest. Crust. fossiles. p. 100. pl. 9. fig. 5 et 6. — *Macrophthalmus incisus*, Edwards. Hist. des crust. t. 2. p. 66.)

Le *MACROPTHALME ÉMARGINÉ*. (*Gonoplax emarginata*, Desmarest. op. cit. p. 101. pl. 9. fig. 7 et 8. — *Macrophthalmus emarginatus*, Edw. op. cit. t. 2. p. 65.)

Le *MACROPTHALME DE LATREILLE*. (*Gonoplax Latreilli*, Desmar. op. cit. p. 99. pl. 9. fig. 1-4. — *Macrophth. Latreilli*, Edw. loc. cit.)

Le genre *CLÉISTOTOME* de M. Dehaan se compose de Crustacés très voisins des Macrophthalmes, mais qui ont le front très large et peu incliné, les pédoncules oculaires gros et de longueur médiocre et les pattes antérieures courtes dans les deux sexes. (Voyez *Fauna japonica* de Sieböld, 1^{re} livraison des Crustacés par M. Dehaan ; et notre Hist. nat. des Crust. t. 2, p. 67.)

Notre genre *PSEUDORHOMBILLE* tient le milieu entre les Crabes et les Gonoplaces. En effet, la forme de la carapace se rapproche de celle des Panopés et de quelques autres Cancériens, car elle est légèrement arquée en avant, et entre les orbites et les bords latéraux il existe une portion assez considérable de son contour qui se recourbe en arrière à la manière du bord latéro-antérieur de la carapace des Cyclométopes ; mais cependant sa forme générale est celle d'un rhombe, et son bord postérieur occupe plus du tiers de son diamètre. Le corps est très épais et très élevé antérieurement. Le front est presque horizontal et divisé en deux lobes tronqués très larges. Les yeux, les

antennes, l'épistome et les pattes-mâchoires externes présentent la même disposition que chez les Crabes. Le plastron sternal est beaucoup plus large que long et assez fortement courbé d'avant en arrière; à sa partie postérieure, qui est très large, on remarque de chaque côté, chez le mâle, un canal d'un calibre assez grand, qui loge les verges dont l'origine se voit à la base des pattes postérieures. Enfin les pattes antérieures sont très fortes et très longues chez le mâle; et les suivantes ne présentent rien de remarquable.

Ce genre ne renferme encore qu'une seule espèce.

Le PSEUDORHOMBILLE QUADRIDENTÉ. *P. quadridentata*.

Edw. Hist. nat. des crust. t. 2. p. 59. *Melia quadridentata*. Latr.

Encyclop. t. 10. p. 706.

E.

LES NAGEURS.

Des pattes natatoires, c'est-à-dire terminées par une lame propre à la natation. (1)

Les crustacés nageurs, parmi les brachyures, sont très voisins des Cancérides par leurs rapports, mais ils s'en distinguent parce qu'ils ont des pattes propres à la natation; aussi ne se rencontrent-ils pas constamment près des rivages et se tiennent-ils au large dans les mers. La plupart de ces crustacés ont le corps court, large, arqué

(1) L'existence d'un tarse lamelleux aux pattes de la dernière paire dont la forme est par conséquent natatoire, a été considéré par Latreille aussi bien que par Lamarck comme caractéristique d'une grande famille naturelle, mais n'a pas la valeur que ces zoologistes y attachaient, et se retrouve dans plusieurs types d'organisation très différens; ainsi les pattes postérieures sont natatoires dans deux genres nouveaux, très voisins des

antérieurement et souvent épineux sur les côtés. Outre leurs bras antérieurs terminés en pince, les uns n'ont que leur dernière paire de pattes qui soit propre à nager, tandis que les autres ont toutes leurs pattes terminées par une lame natatoire. Nous rapportons à cette division, avec M. Latreille, les quatre genres qui suivent, savoir : les Podophthalmes, les Portunes, les Orithyes, les Matutes.

PODOPHTHALME. (Podophthalmus.)

Quatre antennes inégales, articulées, simples : les deux intérieures pliées. Pédicules des yeux très longs, très rapprochés à leur insertion, s'étendant jusqu'aux angles latéraux du bord antérieur, et se logeant dans une gouttière frontale.

Test court, transverse, déprimé, biépineux de chaque côté : l'épine supérieure très grande. Bord antérieur arqué, entier, ayant au milieu un chaperon étroit, rabattu, terminé par deux branches ou lobes ouverts. Dix pattes : les deux supérieures terminées en pince, et les deux postérieures par une lame ovale.

Antennæ quatuor, inæquales, articulatae, simplices : internis duabus plicatis. Oculorum pedunculi longissimi,

Corystes, et dans un Grapsoïdien, dont j'ai formé le genre Varrone. D'un autre côté les Matutes et les Orythies réunies ici aux Portunes et aux Podophthalmes, s'en éloignent beaucoup et se rapprochent des Hépates et des Mariæ, etc. Nous regardons par conséquent cette division comme n'étant pas naturelle, et comme ne devant pas être conservée; mais les Podophthalmes et les Portunes de notre auteur forment, avec quelques autres brachyures dont il ne fait pas mention, un groupe qui nous semble très naturel, et que nous avons désigné sous le nom de *tribus des Portuniques*. E.

insertione proximâ, a medio marginis anticâ ad angulos laterales ejusdem usque producti, ac in canali antico recepti.

Testa brevis, transversa, depressa, utroque latere bispinosa; spinâ superiore maximâ. Margo anticus arcuatus integer, medio clypeo angusto, deflexo, lobis duobus patentibus terminato. Pedes decem: duobus anticis chelatis; posticis duobus lamellâ ovatâ terminatis.

OBSERVATIONS. — Les *Podophthalmes* ne sont que des Ocy-podes ou plutôt que des Rhombilles exagérées, et tiennent davantage à ces crustacés qu'aux Portunes, quoiqu'ils soient nageurs. Ainsi, c'est à tort qu'on a dit, qu'à l'exception des yeux, il n'y a pas de parties, dans les Podophthalmes, qui diffèrent essentiellement de celles des Portunes (1). Le bord antérieur entier, le chaperon rabattu, aux angles latéraux duquel s'insèrent les pédicules des yeux, et la gouttière qui reçoit ces pédicules, ne permettent point cette assertion. Néanmoins, quelques rapports qu'ils aient avec les Rhombilles, la forme particulière de leur test, et leurs pattes postérieures natatoires, en font le type d'un genre très distinct, parmi les crustacés nageurs, qu'ils lient avec les derniers genres des Plaquettes.

ESPÈCE.

1. Podophthalme épineux. *Podophthalmus spinosus*.

Syn. des Anim. sans vert. p. 152.

Podophthalmus spinosus Latr. Gen. n. p. 25. tab. 1. et tab. 2. f. 1.

* *Ejisd.* Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 54. pl. 46; — Règne animal, 2^e éd. t. 4. p. 33. — Encyclop. méthod. pl. 308. fig. 1; etc.

Portunus vigil Fab. Suppl. p. 363.

(1) Un caractère très important, la disposition des organes extérieurs de la génération du mâle, éloigne les Podophthalmes des Ocy-podes, des Rhombilles, et de nos autres Gatométopes, pour les rapprocher des Portunes avec lesquels ils ont une très grande analogie.

- * *Podophthalmus vigil*. Leach. Zool. Min. vol. 2. pl. 118.
 - * *Podophthalmus spinosus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 6. fig. 1.
 - * *Podophthalmus vigil*. Guérin, Iconogr. du règne anim. Crust. pl. 1. fig. 3.
 - * Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 12. fig. 3.
 - * Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 467, et Atlas du Règne anim. Crust. pl. 9. fig. 1.
- Habite l'Océan indien.
- Mus. n°
- + Ajoutez le *Podophthalmus Defussii* (Desmarest, Hist. nat. des Crust. foss. p. 88. pl. 5. fig. 6-8.)
- Espèce fossile dont on ignore le gisement.

PORTUNE. (Portunus.)

Quatre antennes inégales, médiocres, articulées : les extérieures sétacées, plus longues. Les yeux écartés, à pédicules courts, insérés dans des fossettes latérales, sous le front.

Test large, déprimé, tronqué postérieurement, à bord antérieur un peu arqué, denté en scie. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince, et les deux postérieures par une lame ovale.

Antennæ quatuor, inæquales, mediocres, articulatae : externis setaceis, longioribus. Oculi remoti; pedunculis brevibus, in fossulis lateralibus infra frontem receptis.

Testa lata, depressa, posticè truncata; margine antico subarcuato, serrato. Pedes decem : anticis duobus chelatis; duobus ultimis lamellâ ovatâ terminatis.

OBSERVATIONS. — Les *Portunes* constituent un genre nombreux en espèces, les unes indigènes de nos mers, et les autres exotiques. Ce sont des crustacés fort rapprochés de nos cancérides; mais qui tous sont nageurs, et s'éloignent plus aisément du rivage. Ils en sont effectivement distingués, parce qu'ils ont les deux pattes postérieures terminées par une lame plate et

ovale, qui leur sert à nager, et qui est toujours distincte de l'ongle pointu, plus ou moins plat, qui termine les autres pattes. Le bord antérieur du test est toujours divisé en un certain nombre de dents qui souvent s'étendent jusqu'au milieu des bords latéraux. Il y en a, surtout parmi les espèces exotiques, dont le test, très court, est fortement transversal, et dont chaque côté se termine par une pointe fort aiguë.

[Latreille et Leach ont établi aux dépens du genre Portune de Fabricius plusieurs divisions génériques nouvelles, qui nous paraissent devoir être adoptées, et qui peuvent être caractérisées de la manière suivante.

Le genre **PORTUNE**, ainsi circonscrit, ne renferme plus que les Portuniens à pédoncules oculaires courts, dont la suture médiane du sternum occupe les deux derniers segmens de ce plastron; dont la tige mobile des antennes externes ne se compose que de deux articles pédonculaires, leur article basilaire étant soudé au front, et séparant complètement l'orbite des fossettes antennaires; dont le tarse des pattes de la deuxième, troisième et quatrième paires sont styliformes, et dont la carapace peu élargie n'est armée latéralement que de 5 ou même de 4 dents.

Le genre **LUPÉE** (*Lupca* Leach) se distingue facilement par la longueur de la suture médiane du sternum, qui occupe les trois derniers segmens du plastron sternal, et par l'insertion de la tige mobile des antennes externes, sur le bord de leur article basilaire, de manière à occuper l'angle interne de l'orbite et à pouvoir se replier dans cette cavité. La carapace est aussi très élargie et armée de 9 dents latéro-antérieures.

Le genre **THALAMITE** (*Thalamita* Latreille) ressemble au genre Lupée par la disposition de la suture sternale, mais s'en distingue par celle de la tige mobile des antennes externes qui s'insère sur la face inférieure de l'article basilaire de ces organes sous le front et non sur le bord de l'orbite; la carapace est aussi très large, et armée latéralement de quatre à sept dents.

Le genre **PLATYONIQUE** (*Platyonichus* Latr.) est caractérisé par une suture sternale médiane semblable à celle des Portunes, par des antennes externes composées de trois articles pédonculaires mobiles et semblables entre eux, et par la forme des tarsi des

deuxième, troisième et quatrième paires qui ne sont pas unguiculées; la carapace est aussi presque circulaire, et l'orbite communiquée avec les fossettes antennaires, l'article basilaire des antennes externes n'étant pas séparé du front.

Enfin le genre *Portunus* (*Polydus* Leach.) ne diffère du genre *Platyoniscus* que par la forme notataire des tarses des pattes des quatre dernières paires. E...

ESPECES.

Quatre à six dents de chaque côté du test, au-delà des yeux, la dernière étant proportionnelle aux autres.

1. Portune étrille. *Portunus puber*.

P. testâ pubescentâ, pone oculos utrinque quinque denticulâ; fronte denticulatâ; manibus sulcatis; digitis apice nigris.

Cancer puber. Linn.

Portunus puber. Fab. Suppl. p. 363.

Penn. 4. pl. 4. f. 8.

Herbst. entom. tab. 7. f. 49.

Portunus puber. Latr. Gen. 1. p. 27.

* Leach. Malacoe. Pedeph. Brit. pl. 6.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 6. fig. 5.

* De Blainville. Faune franc. Crust. atlas.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 441.

Habite les mers d'Europe. On estime sa chair.

2. Portune froncé. *Portunus corrugatus*.

P. testâ transversâ plicato-rugosâ; dentibus lateralibus utrinque quinque; frontalibus tribus obtusis, basi latis.

Cancer corrugatus. Penn. Zool. brit. 4. pl. 5. f. 9.

* Herbst. pl. 7. f. 50.

* *Portunus corrugatus*. Leach. Malac. brit. pl. 7. f. 1. et 2.

* *Portunus puber*. Blainville. Faun. Franc. Atlas. Crust. pl. sans numéro. fig. 1.

* Edw. op. cit. t. 1. p. 443.

Habite les mers d'Europe. Mm. n°. Il est très différent de celui qui précède.

3. Portune dépurateur. *Portunus depurator*.

P. testâ lavi, utrinque quinquedentatâ; dentibus frontalibus acutis; manibus angulatis subcompressis.

Cancer depurator. Linn.

Portunus depurator: Fab.

Latr. Gen. 1. p. 26.

Penn. Zool. brit. 4. pl. 2. f. 6 (*A.)

* Deux espèces de Portuniens ont été confondus sous ce nom :

L'une est le PORTUNE PLISSÉ, *Portunus plicatus*. Risso Crust. de Nice.

P. depurator. Leach. Malac. p. 9. f. 1.

Latr. Encycl. t. 10. p. 193.

Edw. op. cit. p. 442.

L'autre est le PLATYONIQUE LATIPEDE. *Platyonichus latipes*.

Cancer latipes. Penn. t. 4. pl. 1. f. 1.

Herbst. pl. 21. f. 126.

Portunus variegatus. Leach. Malac. pl. 4.

Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 4. f. 2.

Platyonichus depurator. Latr. Encycl. t. 10. p. 151.

Platyonichus latipes. Edw. op. cit. t. 2. p. 436.

Habite l'Océan d'Europe.

* Le *Portunus marmoratus* de M. Leach (Malac. pl. 8. Encycl. pl. 304) ne paraît être qu'une variété de l'espèce précédente.

4. Portune doigts rouges. *Portunus erythrodictylus*.

P. testæ dentibus frontalibus octo acutis; lateralibus utrinque quinque (inæqualibus); manibus aculeatis; digitis rubris nigro tinctis.*

P. erythrodictylus. Péron.

* *Thalassidroma erythrodictyla*. Edw. op. cit. t. 1. p. 464.

Habite les mers australes. Mus. n° Il avoisine le *P. holosericeus*. Fab.; mais il en est distinct.

Etc.

Neuf dents de chaque côté du test, au-delà des yeux, la dernière, non proportionnelle, étant prolongée en épine.

5. Portune pélagique. *Portunus pelagicus*.

P. testæ utrinque novemdentata; rugis variis appressis margine denticulatis; manibus prismaticis: angulis granulatis.

Cancer pelagicus? Lin. *Portunus pelagicus*? Fab. Suppl. p. 367.

Latr. Gen. 1. p. 26.

Bumf. Mus. tab. 7. fig. B.

* Förskael. Descrip. anim. p. 89.

* *Cancer reticulatus*. Herbst. pl. 50. et *Cancer cedonulli*. Ejusdem. pl. 39.

* *Lupa pelagica*. Leach. Edinb. Encycl. art. Crustaceology.

- * Savigny. Descript. de l'Égypte. Crust. pl. 3. f. 1.
- * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 98. pl. 8. f. 2.
- * Edw. op. cit. t. 1. p. 450.

Habite l'Océan, surtout celui de l'Inde.

6. Portune cedo-nulli. *Portunus cedo-nulli*.

P. testâ rubente, maculis undatis albis variegata, punctis elevatis adspersa, utrinque novemdentata; manibus prismaticis nudis.

Mus. n° Herbst. Canc. tab. 39.

Habite l'Océan austral.

- * Ne me paraît pas différer spécifiquement du Portune pélagique.

7. Portune crible. *Portunus cribrarius*.

P. testâ utrinque novemdentata, levissima, rubente, maculis minimis albis cribrata; brachiorum maculis majoribus.

- * *Lupa cribraria*. Edw. op. cit. t. 1. p. 452. pl. 18. f. 1.

Mus. n°

Habite les mers du Brésil. M. Lalande. Espèce jolie, fort remarquable. Ses dents frontales sont petites, ses pattes ciliées, ses mains mutiques, subanguleuses.

8. Portune sanguinolent. *Portunus sanguinolentus*.

P. testâ lævi sanguineo albidoque tinctâ, utrinque novemdentata; brachiis lividis : manibus angulatis lævibus.

An portunus sanguinolentus? Fab. Suppl. p. 367.

- * Herbst. t. 1. p. 161. pl. 8. f. 56 et 57.

- * Latr. Encycl. t. 10. p. 190.

- * *Lupea sanguinolenta*. Edw. op. cit. t. 1. p. 451, et Atlas du Règne anim. Crust. pl. 10. fig. 1.

Habite l'Océan du Brésil. M. Lalande.

9. Portune rouge. *Portunus ruber*.

P. testâ subrubrâ, albido-punctulata; dentibus utrinque novem inæqualibus : postico mediocri; manibus aculeatis; digitis apice nigris.

- * *Ciri apoa*. Marggraf. Hist. rerum nat. Bras. p. 183.

- * *Lupa rubra*. Edw. op. cit. t. 1. p. 454.

Mus. n°

Habite l'Océan du Brésil. M. Lalande.

Etc. Ajoutez les *P. defensor*, *forceps* (* Herbst. pl. 12. fig. 1. *Lupa forceps*. Leach, Zool. misc. t. 1. pl. 64. Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 99. Edw. t. 1. 456. etc. de Fabricius.)

- * Voyez pour les autres espèces de Portuniens le premier volume de notre Hist. des Crustacés, et les Crustacés de la *Fauna japonica*, par M. Dehaan.

ORITHYÆ. (Orithya.)

Quatre antennes courtes, articulées, apparentes. Les yeux écartés, à pédoncules coniques.

Test ovale, un peu plus long que large, presque tronqué antérieurement, muriqué sur le front et sur les côtés. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince, et les deux dernières par une lame ovale.

Antennæ quatuor breves, articulatæ, distinctæ. Oculi remoti; pedunculis conicis.

Testa ovata, longitudine latitudinem paulò superans; anticè subtruncata; fronte lateribusque muricatis. Pedes decem : anticis duobus chelatis; duobus ultimis lamellâ ovatâ terminatis.

OBSERVATIONS. — Par sa forme, le test de l'*Orithye* semble tenir de celui des Leucosies ou des Doripes; mais il est moins aplati que dans ces derniers, et n'a point de pattes dorsales. Au reste, c'est un crustacé nageur, ayant, comme les Portunes, les deux pattes postérieures natatoires.

[Les Orithyes nous paraissent devoir prendre place entre les genres *Matute* et *Mursie*, dans la tribu des Calappiens, famille des Oxystomes. E.

ESPÈCE.

1. *Orithye* mamelonnée. *Orithya mamillaris*.

Orithya mamillaris. Fab. Suppl. p. 363.

Latr. Gen. 1. p. 42. et Hist. nat. 6. p. 130. pl. 50. f. 3.

Herbst. Canc. t. 18. f. 101.

* Latr. Encycl. t. 8. p. 537. pl. 306. fig. 4; Règne anim. etc.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 143. pl. 19. f. 1.

* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 1. f. 2.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 12. fig. 2.

* Edw. Règne anim. de Cuvier, Crust. pl. 8. f. 1. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 112.

Habite les mers de la Chine.

Mus. n°

tenons beaucoup à ne pas trop multiplier les genres sans une véritable nécessité, nous nous bornons à présenter ici les cinq genres suivans, savoir : Dromie, OËthre, Calappe, Hépaté et Crabe.

DROMIE. (Dromia.)

Quatre antennes : deux extérieures, sétacées plus longues ; deux intermédiaires à sommet bifide. Les yeux à pédoncules courts.

Test ovale-arrondi, bombé, velu ou hérissé. Dix pattes onguiculées : les deux antérieures terminées en pince : les quatre postérieures relevées sur le dos, ayant un double crochet, et prenantes.

Antennæ quatuor : externis setaceis longioribus ; intermediis apice bifidis. Oculi pedunculis brevibus.

Testa ovato-rotundata, valdè convexa, villosa aut hirta. Pedes decem unguiculati : anticis duobus magnis chelatis ; posticis quatuor dorsalibus biunguiculatis prehensilibus.

OBSERVATIONS. — Quoique les *Dromies* aient des pattes postérieures dorsales, relevées et prenantes, comme les *Doripes* et quelques autres, elles nous paraissent néanmoins appartenir à la division des *Cancérides*. Leur corps est convexe ou bombé, velu, plus large et arqué antérieurement, et leurs pattes dorsales leur servent à saisir, soit des *Alcyons*, soit des valves de coquilles ou d'autres corps, dont elles se couvrent, et qu'elles transportent avec elles, pour se cacher à leurs ennemis. Les doigts de leurs pinces ont, à leur face interne, des dents qui s'engrènent. Les femelles ont sous la queue des lanières longues et ciliées d'un côté.

[La conformation des organes de la génération, des branchies, du thorax, des antennes, etc. ne permet pas de laisser les *Dromies* parmi les *Cancérides* ni même dans la division des *Brachyures* ; dans une classification naturelle, elles doivent pren-

dre place à côté des Homoles et nous les rangeons dans la section des Anomoures. Dans le jeune âge, leur abdomen est terminé par une nageoire comme chez les Macroures.] E.

ESPÈCES.

1. Dromie de Rumphe. *Dromia Rumphii*.

D. testâ subgibbâ, hirtâ, utrinque quinquedentatâ; brachiis pedibusque enodibus.

Cancer dromia. Linn.

Dromia Rumphii. Fab. Suppl. p. 359.

Dromia Rumphii. Latr. 1. p. 27.

Herbst. t. 18. f. 103.

Rumph. Mus. tab. 11. f. 1.

Seba. Mus. 3. t. 18. f. 1.

* Latr. Encycl. pl. 278. f. 1.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 174. et Atlas du Règne anim. Crust. pl. 40. fig. 1.

Habite l'Océan indien, et la Méditerranée. Elle se couvre souvent de l'Alcyon domuncule. C'est la plus grosse connue de ce genre.

2. Dromie très velue. *Dromia hirsutissima*.

D. pilis longis rufis hirsutissima; testâ rotundatâ, turgidâ, anticâ subtrilobâ, utrinque quinquedentatâ.

Dromia hirsutissima. Mus. n°

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 137. pl. 18. f. 1.

* Edw. op. cit. t. 2. p. 176.

Habite les mers du Cap de Bonne-Espérance. Elle a un sinus large de chaque côté, qui sépare le front des bords latéraux antérieurs et qui fait paraître le test trilobé. Elle est plus bombée que la *D. de Rumphe*.

3. Dromie globuleuse. *Dromia globosa*.

D. tomento brevissimo obducta; testâ globulosâ: marginibus deflexis.

Dromia globosa. Mus. n°

Au cancer caput mortuum? Linn.

Habite.....

Etc. le *D. nodipes* du Mus. paraît être le *D. agagropila* de Fab.; le *D. fallax* du Mus. est une petite espèce qui vient de l'île de France; enfin le faux Bernard-l'Hermite de Nicolson, Hist. nat. de St-Domingue, p. 338. pl. 6. f. 3. et 4, est une espèce nouvelle, à test submembraneux qui se couvre d'une valve de coquille.

[Notre genre *DROMIITE* se rapproche beaucoup des *Dromies*, et se compose d'un Crustacé fossile de l'argile tertiaire de l'île de Sheppy, qui a la carapace plus carrée que les *Dromies* et les régions branchiales divisées en deux par un sillon transversal.

Le genre *DYNAMÈNE* (*Dynamena*) de Latreille est extrêmement voisin des *Dromies*, mais s'en distingue facilement en ce que les pattes de la quatrième paire sont semblables aux précédentes, et que celles de la cinquième paire seules sont petites et relevées sur les côtés du corps.

On n'en connaît qu'une espèce :

Le *DYNAMÈNE NISPIDA*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 133.
pl. 18. f. 2.

Latr. Règne anim. 2^e édit. t. 41 p. 69.

Guérin. Iconogr. Crust. pl. 14. f. 2.

Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 180. et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 40 f. 2.

Nous avons donné le nom générique d'*OCTODROMITE* à un petit Crustacé fossile du terrain jurassique, trouvé aux environs de Verdun par M. Moreau. Ce Crustacé appartient à la tribu des *Dromiens*, et paraît se rapprocher des *Dynamènes* plus que de tous les autres *Décapopes*, mais s'en distingue par quelques particularités dans la disposition des régions de la carapace, des orbites, etc. E.

OETHRE. (*Oethra*.)

Antennes les yeux séparés par la saillie du front et à pédicules courts, comme dans les *Calappes*. Le second article des palpes extérieurs presque carré.

Test aplati, clypéiforme, transversal, noueux ou très raboteux sur le dos. Les deux pattes antérieures se terminant en pince, à mains comprimées et en crête ; les autres courtes se retirant sous le test dans le repos.

Antennæ oculi pedunculis brevibus, eminentiâ frontali separati ut in Calappis. Palporum externorum articulus secundus subquadratus.

Testa planulata, clypeiformis, transversa; dorsa nodoso, scaberrimo. Pedes duo antici chelati: manibus compressis, cristatis; alii posteriores breves, in quiete, sub testâ repliati.

OBSERVATIONS. — Quoique je ne connaisse qu'une espèce de ce genre, que M. Leach a établi, sa forme est trop particulière, pour ne pas la distinguer des Calappes. Le test, au moins dans cette espèce, n'est plus trigone, ni bombé; il est aplati, sans abaissement d'aucun bord, et semble un bouclier en ellipse transverse, à bords latéraux arrondis, libres, relevés même.

Les OETHRES s'éloignent beaucoup des Dromies et des Calappes par leur structure, et semblent établir le passage entre les Cancériens ordinaires et les Parthénopiens. E.

ESPÈCE.

1. OETHRE déprimé. *OETHRA depressa*.

OE. testâ alba, depressâ, elliptico-transversâ; marginibus lateralibus rotundatis, plicato-dentatis.

Calappa depressa.

Mus. no

(* *Cancer polynome*.) Herbst., Can. tab. 53. f. 4. 5.

* *OETHRA depressa*. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 110. pl. 10. fig. 2.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 371. et Atlas du Règne anim. Crust. 38. fig. 2.

* Griffith, Anim. King. Crust. pl. 1. fig. 3.

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu.

Etc. Ajoutez le *Parthenope fornicata* de Fabricius (1), et comparez avec l'espèce no 1, le *Cancer scruposus* de Linné.

(1) Ce singulier Crustacé établit le passage entre les OETHRES et les Lambres, et constitue un genre particulier auquel nous avons donné le nom de CRYPTOPODIE (*Cryptopodia*). Voyez notre Histoire naturelle des Crustacés, t. 1, p. 360. E.

CALAPPE. (*Calappa*.)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes : les deux intérieures pliées sous le chaperon.

Test court, convexe, plus large postérieurement, ayant ses côtés postérieurs creusés en-dessous en demi-voûte et leur bord tranchant. Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince, à mains très grandes, comprimées, en crête sur le dos ; les autres pattes retirées, dans le repos, sous les bords postérieurs du test.

Antennæ quatuor, antennis Cancerum similibus ; internis sub clypeo plicatis.

Testa brevis, convexa, posticè latior ; lateribus posticis subtus excavatis, semi-fornicatis, margine acutis. Pedes decem : anticis duobus chelatis ; manibus maximis compressis, dorso cristatis ; aliis infra latera postica in quiete contractis.

OBSERVATIONS. — Les *Calappes* constituent un genre tranché et très distinct, par la forme de leur test et des mains qui terminent leurs bras ; ils sont d'ailleurs remarquables par la manière dont ils contractent leurs parties lorsqu'ils sont dans le repos. Alors, ils appliquent leurs bras sur la face antérieure du corps, et couvrent avec leurs larges mains, leur bouche, comme avec un bouclier ; en même temps, ils resserrent toutes leurs autres pattes sous les deux voûtes postérieures de leur test. Comme ils ont ce test assez dur, ils craignent moins leurs ennemis dans cet état de contraction.

[Les *Calappes* nous paraissent devoir être rapprochés des *Matutes* et des *Orithyes*, et prendre place avec ces crustacés dans la famille des *Oxystomes*. E.]

ESPÈCES.

1. *Calappe migrane. Calappa granulata.*

C. testâ tuberculis inæqualibus dorsalibus obtusis ; lateribus posticis crenato-dentatis ; postico margine subsexdentato.

* Crabe Migrane. Rondelet. Poissons. 2^e partie. p. 403.

Cancer granulatus. Lin.

Calappa granulata. Fab. Suppl. p. 346.

* Herbst. t. 1. p. 200. pl. 12. f. 75 et 76.

Calappa granulata. Latr. Gen. 1. p. 28.

* Latr. Hist. nat. des Crust. et des Insectes. t. 5. p. 392. pl. 43. f. 2 et 3; et Règne anim. 2. édit. t. 4. p. 66.

* Desmarest. op. cit. p. 109.

* De Blainville. Faune française. Crust. pl. 3.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 103 et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 38. f. 1.

Habite la Méditerranée.

Mus. n°

2. Calappe tuberculé. *Calappa tuberculata*.

C. testâ verrucosa. margine dentatâ; lateribus posticis abruptè prominulis.

Calappa tuberculata. Fab. Suppl. 345.

Herbst. Tab. 13. f. 78.

* Latr. Hist. des Crust. etc. t. 5. p. 393.

* Desmarest. op. cit. p. 109. pl. 10. f. 1.

* Guérin, Iconogr. Crust. pl. 12. f. 2.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 106.

Habite l'Océan asiatique.

Mus. n°

3. Calappe marbré. *Calappa marmorata*.

C. testâ granulis minimis arenulatâ, flammis roseis pictâ; lateribus posticis dentibus tribus majusculis.

Calappa marmorata. Fab. Suppl. 346.

Herbst. Canc. t. 40. f. 2.

* *C. chelis crassissimis*. Catesby. op. cit. t. 2. t. 36. f. 2.

* *Calappa flammea*. Bosc. op. cit. t. 1. p. 185.

* *Calappa marmorata*. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 5. p. 393 et Encycl. Méthod. pl. 270. fig. 1 (copiées d'après Catesby).

* Desmarest. op. cit. p. 109.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 104.

Habite les mers d'Amérique, à la Trinité. M. Robin.

Etc. Ajoutez le *C. fornicata* et quelques autres.

† Genre **MURSIE**. *Mursia*.

Les Mursies de Leach ont la plus grande analogie avec les Calappes, mais s'en distinguent facilement par la forme de leur carapace, qui est presque circulaire, et ne se prolonge pas en manière de bouclier au-dessus des pattes ambulatoires; sa surface supérieure est bombée et inégale, et vers le milieu du bord latéral se trouve une longue dent spiniforme. Le front est triangulaire, et les orbites presque circulaires à-peu-près comme chez les Calappes; la disposition des antennes est aussi à-peu-près la même, ainsi que celle du cadre buccal. Les pattes antérieures ont aussi à-peu-près la même forme que chez ces derniers, et les mains; garnies en dessus d'une crête élevée, s'appliquent aussi contre la bouche, de façon à se cacher sous la partie antérieure du corps. Les pattes suivantes sont longues et de force médiocre; le tarse qui les termine est styloforme, cannelé et très long. Enfin l'abdomen du mâle ne présente que cinq segmens mobiles.

On n'en connaît qu'une espèce.

La MURSIE A CRÊTE. — *M. cristimanus*, Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 108. pl. 9. f. 3.

Latr. Règ. anim. 2^e éd. t. 4. p. 39.

Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 13. f. 1 et 1a, et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 109.

† Genre **PLATYMÈRE**. *Platymera*.

Nous avons établi cette nouvelle division générique pour un Crustacé très remarquable qui lie entre eux les Calappes et les Mursies, d'une part, et se rapproche aussi par d'autres caractères de la tribu des Cancériens.

La carapace est très large, et assez régulièrement ellip-

tique, seulement de chaque côté, elle se prolonge en une forte dent spiniforme; ses bords latéro-postérieurs ne se prolongent pas au-dessus des pattes comme chez les Calappes. Le front est triangulaire et disposé de même que dans les genres précédens. Les orbites sont ovalaires, profonds, et de grandeur médiocre; on remarque une fissure au milieu de leur bord inférieur. Les antennes internes et externes sont disposées à-peu-près comme chez les Mursies. Le cadre buccal est beaucoup plus large antérieurement que dans les autres genres de la tribu des Calappiens, et la petite portion de l'espace prélabial qui dépasse les pattes-mâchoires externes n'est pas divisée par une cloison médiane, et n'est qu'imparfaitement recouverte par les prolongemens lamelleux des pattes-mâchoires internes. Les pattes-mâchoires externes sont très larges antérieurement; leur troisième article, de la longueur du second, se termine par un bord antérieur assez large, et présente, au-dessous de son angle antérieur et interne, une grande et profonde échancrure, dans laquelle s'insère le quatrième article; ce dernier est à découvert et très grand, mais n'arrive pas au niveau de l'extrémité antérieure du troisième article; enfin l'appendice basilaire de ces organes, qui sert de valvule pour boucher les ouvertures afférentes des cavités branchiales, est lamelleux, très grande et semilunaire. Le plastron sternal est ovalaire. Les pattes de la première paire ont à-peu-près la même forme et la même disposition que chez les Calappes, mais les mains sont plus longues et moins élevées. Les pattes suivantes sont très longues et très comprimées; leur troisième article ou cuisse est remarquablement large et presque lamelleux; les tarsi sont longs et styliformes; les pattes de la troisième paire sont un peu plus longues que les secondes et les quatrièmes; enfin les cinquièmes sont beaucoup plus courtes que toutes les autres. L'abdomen du mâle se compose

de cinq articles distincts, dont le troisième présente en arrière une crête transversale très forte.

Le type de ce genre est :

LE PLATYNÈRE DE GAUDICHAUD. — *P. Gaudichaudii*. Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 108. E.

HÉPATE. (*Hepathus*.)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes. Le second article des palpes extérieurs pointu au sommet.

Test, comme dans les Crabes, n'ayant point ses côtés postérieurs voûtés en dessous. Les pinces des bras comprimées et en crêtes.

Antennæ quatuor, antennis Cancerum similes. Palporum externorum articulus secundus apice acutus.

Testa ut in Canceribus; lateribus posticis subtus non fornicatis. Brachiorum chelæ supernè compresso-cristatæ.

OBSERVATIONS.—Les *Hépates* ne forment point un genre bien remarquable, et tiennent de très près aux Crabes. Néanmoins, on les en distingue assez facilement, parce qu'ils ont les mains des deux pattes antérieures dilatées en dessus et en forme de crête, presque comme celles des Calappes; parce que le bord antérieur du test est finement dentelé; enfin, parce que le second article de leurs pieds-mâchoires extérieurs est terminé en pointe.

[Les *Hépates* de même que les genres précédens, appartiennent à la famille des Oxystomes, tribu des Calappiens. E.]

ESPÈCE.

1. Hépate calappoïde. *Hepathus calappoides*.

H. testâ planulatâ, anticè latissimâ, arcuatâ, tenuissimè denticulatâ; pedibus fasciatis.

Calappa angustata. Fab. Suppl. p. 347.

Cancer princeps. Herbst. Canc. t. 38. f. 2.

Hepathus fasciatus. Latr. Gen. 1. p. 29.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 107. pl. 9. f. 2.

* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier, Crust. pl. 15. f. 2 et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 117.

Habite l'Océan des Antilles. *Canc. calappoides*.

Mus. no

Etc.

CRABE. (Cancer.)

Quatre antennes petites : les extérieures sétacées, insérées près du coin interne de la fossette des yeux ; les intermédiaires pliées, reçues dans des fossettes sous le front. Second article des palpes extérieurs presque carré, avec une échancrure à l'angle interne de son sommet.

Test court, transverse, planiuscule, se rétrécissant postérieurement, à bord antérieur arqué. Dix pattes onguiculées : les deux antérieures plus grandes, terminées en pince.

Antennæ quatuor, parvulæ : externis setaceis, oculorum propè canthum internum insertis ; intermediis complicatis, in foveolis sub frontè receptis. Palporum externorum articulus secundus subquadratus, apice interno emarginatus.

Testa brevis, transversa, planiuscula, posticè angustata ; antico margine arcuato. Pedes decem unguiculati : anticis duobus majoribus chelatis.

OBSERVATIONS. — Le genre des *Crabes*, malgré les réductions qu'on lui a fait subir, est encore un des plus beaux et des plus nombreux en espèces, parmi les crustacés ; il est dans notre méthode, celui qui termine les *homobranches brachyures*, et par suite la classe même. Linné, en traçant sa magnifique esquisse d'un *Systema naturæ*, ne put indiquer que des masses principales, et son grand génie fit en cela tout ce qu'on en pouvait attendre. Son genre *Cancer* embrassa donc tous nos crustacés *homobranches*, et une grande partie des *hétérobranchés*. Par la suite, à mesure que l'on fit des études plus particulières de ces

masses, on sentit la nécessité de multiplier les divisions et les genres, en sorte que celui des *Crabes* a été successivement réduit. Ce genre, tel que nous le présentons ici, est à-peu-près le même que celui qu'a institué M. *Latraille*, et nous croyons qu'il est convenable maintenant de le conserver sans le réduire davantage. Là, comme ailleurs, un excès serait un tort, et nuisible à la science.

Les *Crabes* sont des crustacés marins, ayant une sorte de ressemblance avec l'Araignée, par leur forme extérieure. Ils ont la tête, le corselet et l'abdomen confondus (1), et la réunion de ces parties se trouve couverte, enveloppée même, par une carapace dure, presque osseuse, à laquelle on donne le nom de test. Ici, ce test est court, plus large que long, arqué ou arrondi antérieurement, se rétrécissant vers sa partie postérieure. Il est déprimé en dessus, avec des bords tantôt arrondis, tantôt tranchans, et souvent dentés.

Tous les *Crabes* vivent dans la mer, près des rivages, entre ou sur les rochers. Ils se trouvent ordinairement par bandes, et aucun d'eux ne saurait nager comme les *Portunes*, etc., aucun n'ayant de pattes véritablement natatoires. Ils marchent avec agilité sur le fond de la mer, sur le sable des rivages, ou même sur les rochers, tant en avant que de côté ou à reculons.

Ces animaux, ainsi que tous les autres crustacés, changent de peau ou de test une fois chaque année : c'est au printemps qu'ils se dépouillent de leur vieille robe : on les appelle encore *Crabes boursiers*, et ils se tiennent cachés dans le sable jusqu'à ce qu'ils aient recouvré assez de consistance dans leur nouveau vêtement, pour se garantir contre divers dangers. Ils sont très voraces, mangent les animaux marins qu'ils peuvent saisir, et surtout les cadavres, autour desquels ils se réunissent en grand nombre. Les *Crabes* sont beaucoup plus nombreux et plus variés dans les mers des climats chauds, que dans celles des autres régions. On y en trouve qui sont d'une taille quelquefois énorme. On en mange différentes espèces, mais il y en a qui ont la chair très coriace et difficile à digérer.

(1) L'abdomen est distinct du thorax et simplement replié sous le plastron, comme chez tous les brachyures. E.

[Depuis la publication de cet ouvrage, le nombre d'espèces appartenant au groupe des Cancériens, a beaucoup augmenté, et en étudiant avec plus de soin qu'on ne l'avait fait jusque alors la conformation de ces crustacés, on a été conduit à les subdiviser beaucoup. Voici le résumé des caractères qui distinguent entre eux ces divers genres nouveaux, tels que nous avons proposé de les circonscrire dans notre Hist. nat. des Crustacés.

§. CANCERIENS ARQUÉS.

Carapace beaucoup plus large que longue, arquée en avant et tronquée en arrière; bord fronto-orbitaire étroit; point de prolongement clypéiforme au-dessous des pattes.

+ Troisième article des pattes-mâchoires externes portant l'article suivant à son angle interne, ne le dépassant pas notablement, et s'appliquant exactement contre le bord antérieur du cadre buccal.

A. Bord inférieur de l'orbite ne se joignant pas au front et laissant sous l'angle interne de cette cavité un hiatus rempli par la portion basilaire de l'antenne externe.

B. Tige mobile des antennes externes naissant de l'angle interne de l'orbite dont elle n'est séparée par rien; antennes internes transversales.

C. Bord antérieur du 3^e article des pattes-mâchoires externes entier.

D. Premier article des antennes externes grand, 2 ou 3 fois aussi long que le second et se joignant au front.

E. Espace prélabial sans crêtes ni gouttières notables.

F. Carapace très élevée vers le milieu; fortement bombée dans tous les sens, très large et en général presque ovoïde.

G. Pinces point creusées en cuiller.

H. Pattes courtes comprimées et garnies d'une crête élevée et d'une série d'épines. Tarse très court.

Cancer.

HH. Pattes assez longues et cylindriques, sans crête ni épines en dessus; tarse grêle et allongé.

Carpillus.

HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

GG. Pinces creusées en cuiller; pattes en général courtes.

Zosymus.

FF. Carapace peu ou point élevée au milieu, presque plane transversalement, peu bombée d'avant en arrière et fortement tronquée en arrière.

f. Pinces tranchantes ou arrondies.

f.' Point d'hiatus au-dessous de l'angle orbitaire externe.

Xanthus.

f.'' Un hiatus au-dessous de l'angle orbitaire externe.

Panopeus.

ff. Pinces élargies vers le bout, arrondies et profondément creusées en cuiller.

Chlorodius.

EE. Espace prélabial divisé longitudinalement par deux crêtes tranchantes et obliques.

Ozius.

DD. Premier article des antennes externes petit ou médiocre et ne se joignant pas au front; le second presque aussi long que le premier et occupant presque toute son extrémité antérieure.

d. Second article des antennes externes logé dans la fossette antennaire comme le premier et atteignant à peine le front.

Pseudocarcinus.

dd. Second article des antennes externes logé dans le canthus orbitaire externe et dépassant le front.

Pilumnus.

CC. Bord antérieur du 3. article des pattes-mâchoires externes profondément échancré.

Lagostoma.

BB. Tige mobile des antennes externes naissant sous le front et complètement hors de l'orbite dont elle est séparée par un prolongement de l'article basilaire de ces mêmes antennes, lequel se soude au front et remplit l'hiatus orbitaire interne.

b. Pinces profondément creusées en cuiller.

Etisus.

bb. Pincés obtuses ou pointues et jamais creusées en cuiller.

Platycarcinus.

AA. Bord inférieur de l'orbite se joignant au front de façon à exclure complètement de cette cavité l'antenne externe.

Ruppellia.

†† Troisième article des pattes-mâchoires externes donnant insertion à l'article suivant par son bord interne, se prolongeant beaucoup au-devant de lui et s'avancant notablement sur l'épistome.

Perimela.

§§. CANCÉRIENS QUADRILATÈRES.

Carapace peu ou point arquée sur les côtés, à peine tronquée en arrière et médiocrement large; bord fronto-orbitaire très large; point de prolongement clypéiforme au-dessus des pattes.

a. Bord inférieur de l'orbite se joignant au front de manière à exclure de cette cavité l'antenne externe.

a'. Front rabattu; bord orbitaire inférieur à-peu-près sur la même ligne que le front.

Eriphia.

a''. Front horizontal; bord orbitaire inférieur dépassant à peine le niveau de l'épistome.

Trapezia.

aa. Bord inférieur de l'orbite ne se joignant pas au front et laissant un hiatus rempli par l'antenne externe.

Melia.

C'est aussi dans la tribu des Cancériens qui nous semblent devoir prendre place les Oéthres. Ils y forment une troisième division, celle des CANCÉRIENS CRYPTOPODES, reconnaissable aux prolongemens latéraux de la carapace au-dessus des pattes.

E.

ESPÈCES.

1. Crabe tourteau. *Cancer pagurus*.

C. testá læviusculá, utrinque novemplicatá; manibus apice nigris.

* *C. manas.* Rondelet. t. 2. p. 400.

Cancer pagurus. Lin.

* Mus. Adol. Fréd. t. 1. p. 85, etc.

Fab. Suppl. p. 334.

Latr. Gen. 1. p. 29.

Herbst. Canc. tab. 9. f. 59.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. 3. f. 7.

- * *Cancer fabriatus*. Oliv. Zool. Adriat. pl.
 - * *C. pagurus*. Leach. Malac. pl. 10.
 - * Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 103. pl. 8. f. 1.
 - * *Platycarcinus pagurus* (1). Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 413.
- Habite l'Océan d'Europe. Le front offre cinq dents entre les yeux. Ce crabe devient quelquefois fort grand.

2. Crabe ménade. *Cancer mænas*.

C. testâ leviusculâ, utrinque quinque dentatâ; fronte trilobâ.

Cancer mænas. Linn.

Fab. Suppl. p. 334.

Latr. Gen. 1. p. 30.

Herbst. Canc. tab. 7. f. 46. 47.

* Pennant. Brit. Zool. t. 4. pl. 2. f. 3.

* Latr. Encycl. pl. 273. f. 1.

* *Carcinus mænas*. Leach. Malac. Pod. Brit. pl. 5. (2)

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p.

* Edw. op. cit. t. 1. p. 434.

Habite l'Océan d'Europe et la Méditerranée. Il est commun, moins grand que le *C. tourteau* et bon à manger.

3. Crabe front-épineux. *Cancer spinifrons*.

C. testâ lævi, utrinque quinquedentatâ : dente secundo tertioque bifidis; fronte manibusque multispinosis.

Cancer spinifrons. Fab. Suppl. p. 339.

Lat. Gen. 1. p. 31. Eriphie. Lat.

(1) Ce genre établi par Latreille sous le nom de **TOURTEAU**, puis désigné par le même auteur sous le nom de **PLATYCARCIN**, diffère essentiellement des Crabes proprement dits, par la disposition des antennes. M. Bell propose d'y conserver le nom générique de *Cancer*, et de désigner par un autre nom le groupe qui le porte maintenant. E.

(2) Ce crustacé qui est l'unique espèce appartenant au genre **CARCIN**, *Carcinus*, de M. Leach, diffère beaucoup des Crabes, et se rapproche davantage des Portuniens. On reconnaît cette petite division générique aux caractères suivans : tarse des pattes postérieures lamelleuse et de forme lancéolée mais étroit; carapace presque aussi longue que large, et armée de chaque côté de cinq dents; front avancé. E.

Herbst. Canc. tab. xi. f. 65..

* Savigny. Egypte. Crust. pl. 4. fig. 7.

* *Eriphia spinifrons*. Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 14. fig. 1.

* Edw. op. cit. p. 426.

Habite l'Océan d'Europe, la Méditerranée. Ses antennes externes sont distantes des pédicules oculaires.

* Cette espèce est le type du genre *Eriphia* qui a, par la forme générale, établi le passage entre les Crabes et les Thelphuses.

4. Crabe bronzé. *Cancer æneus*.

C. testâ utrinque quadrilobâ, fronte obtusâ; dorso rugis inæqualibus, variis curvis sculpto; manibus tuberculato-rugosis.

Cancer æneus. Lin. Fab. Suppl. p. 335.

Cancer floridus. Mus. n°

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. 18.

* *C. floridus*. Herbst. pl. 3. fig. 39. et pl. 21. fig. 120.

* *C. amphitrite*. Ejusdem. pl. 58. fig. 1.

* *C. æneus*. Latreille. Hist. nat. des crust. t. 5. p. 375, etc.

* Desmarest. op. cit. p. 104.

* Quoy et Gaymard. Voyage de l'*Uranie*. pl. 76. fig. 1.

* *Zozymus æneus*. Edw. op. cit. t. 1. p. 385.

Habite les mers des Indes Orientales. Il est blanchâtre ou roussâtre, quelquefois tacheté de rouge, et a son test comme ciselé sur le dos, avec deux lobes obtus au front. Il a quelques variétés assez remarquables.

5. Crabe vermoulu. *Cancer vermiculatus*.

C. testâ pedibusque rugis variis lateribus denticulatis; pedibus ciliatis.

Cancer vermiculatus. Mus. n°

* *Xanthus vermiculatus*. Edw. op. cit. t. 1. p. 391.

Habite. Comparez avec le Crabe d'Herbst. tab. 52. f. 2.
Taille médiocre.

6. Crabe miliaire. *Cancer miliaris*.

C. rubro maculatus; testâ pedibusque rugis crassis variis brevibus: granulis minimis adpersis.

Cancer miliaris. Mus. n°

Bosc. Hist. nat. des crust. 1. p. 179.

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu. Taille médiocre.

7. Crabe denté. *Cancer dentatus*.

C. fulvo-rubens; testâ dentibus utrinque inæqualibus subseptem; chelarum digitis aduncis spatulatis; pedibus aliis echinulatis.

Cancer dentatus. Herbst. t. 1. p. 186; pl. 11. fig. 66.

Mus. n°

* *Eticus dentatus*. Edwards. op. cit. t. 1. p. 411.

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu. Quatre dents au front, dont les deux du milieu sont larges et tronquées.

8. Crabe livide. *Cancer lividus*.

C. testâ variegatâ, lividâ, utrinque quadridentatâ; dentes primo secundoque obtusis; pedibus ciliatis.

* *Xanthus lividus*. Edwards. op. cit. t. 1. p. 393.

Mus. n°

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Front presque comme dans le précédent.

9. Crabe imprimé. *Cancer impressus*.

C. albe luteoque variis; testâ irregulari impressâ; utrinque lobis quatuor obtusis; pedibus glabris.

Mus. n°

* *Xanthus impressus*. Edwards. op. cit. t. 1. p. 393.

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Les doigts des pinces très noirs.

10. Crabe corallin. *Cancer corallinus*.

C. testâ lævi, utrinque unidentatâ; fronte trilobâ.

Cancer corallinus. Fab. Suppl. 337.

Herbst. tab. 5. f. 40.

Seba. Mus. 3. t. 19. f. 2. 3.

* *C. maculatus*. Latreille. Hist. nat. des crust. t. 6. p.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.

* *Carpilius corallinus*. Milne Edw. op. cit. t. 1. p. 381.

Habite l'Océan Indien. Il est jaunâtre, avec une large tache rouge et de petites taches blanches.

11. Crabe maculé. *Cancer maculatus*.

C. testâ lævi, utrinque unidentatâ; dorso maculis sanguineis rotundis fronte trilobâ.

Cancer maculatus. Lin. Fab. Suppl. 338.

Rumph. Mus. t. 19. f. 1.

Seba. Mus. 3. t. 19. f. 12.

* Herbst. pl. 6. fig. 41.; pl. 21. fig. 118 et pl. 60. fig. 2.

* Latreille. Hist. nat. des crust. t. 5. p.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.

* *Carpilius maculatus*. Milne Edw. t. 1. p. 382.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Ses pattes sont lisses.

12. Crabe très entier. *Cancer integerrimus*.

C. testâ lævi ; lateribus integerrimis ; pedibus muticis ; digitis chelarum fuscis.

Cancer integerrimus. Péron. Mus. n°

* Edwards. op. cit. t. 1. p. 374.

Habite les mers Australes. Péron et Lesueur.

13. Crabe géant. *Cancer gigas*.

C. maximus, crassissimus, luteo-aurantius ; testâ gibbosulâ, utrinque decemdentatâ : dentibus parvis inæqualibus ; carpis brachiorum bidentatis.

Cancer gigas. Mus. n°

* *Pseudocarcinus gigas*. Edw. op. cit. t. 1. p. 409.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande au port Jackson. Péron et Lesueur. Le test de l'individu entier, a dix pouces de largeur ; mais d'après une patte antérieure rapportée, et qui est de la grosseur des bras d'un homme, il devient d'une grandeur énorme. Le front du test a quatre petites dents. Ses côtés postérieurs ont de petits tubercules épars. Les articulations inférieures des pattes sont un peu épineuses.

Etc. Ajoutez le *C. undecimdentatus* de Fabricius (1). Il est dans la collection du Muséum, qui en possède beaucoup d'autres espèces encore inédites.

(1) Ce crustacé appartient au genre ATÉLÉCYCLE de Leach, division qui établit le passage entre les Eriphies et les Corystes, et qui se reconnaît à sa carapace arquée en avant comme chez les Crabes, mais beaucoup moins large, son front étroit armé de cinq dents et recouvrant des fossettes antennaires longitudinales, ses antennes externes disposées à-peu-près comme chez les Platycarcins, et ses pattes-mâchoires externes qui s'avancent jusque sur l'article basilaire des antennes internes, et ont leur trois articles tronqués obliquement en avant, et échancrés vers le milieu de son bord interne pour l'insertion de l'article suivant. Il est aussi à noter que la disposition des pattes se rapproche un peu de celle des Hépatés.

Le type de ce genre est l'ATÉLÉCYCLE HÉTÉRODON. *Cancer hippa septemdentatus*. Montagu Trans. of the Lin. soc. vol. 9. pl. 1, fig. 1.—*Atelecyclus heterodon*. Leach. Malacostr. Pod. Brit. pl. 2.

† Genre ~~Thia~~. (*Thia*.)

Le genre *Thia* de Leach devait, dans la méthode de Lamarck, prendre place à côté des Crâbes dont il se rapproche par la forme arquée de la carapace; mais dans la réalité il a plus d'affinité avec les *Corystes* et les *Atelecyclés*, et il doit être considéré comme établissant le passage entre ces crustacés et les Cancériens. La carapace est horizontale d'avant en arrière, mais fortement courbée transversalement et sans sillons indiquant des régions; le front est large et lamelleux; les orbites sont très petites; les antennes internes se replient transversalement sous le front, et les externes insérées dans l'hiatus de l'angle orbitaire interne, sont grandes et ciliées; le troisième article des pattes-mâchoires externes s'avance jusqu'à la base des antennes internes, et donne insertion à l'article suivant par une large échancrure de son angle interne; le plastron sternal est extrêmement étroit; enfin, les pattes sont très courtes, celle de la première paire assez grosses et comprimées, les suivantes terminées par un article droit et très aigu.

Les *Thies* sont de petite taille et vivent enfoncés dans le sable; on n'en connaît avec quelque certitude qu'une espèce, la

Thia polita. Leach. Zool. Mescal. t. 2. pl. 103. — Latreille. Encyclop. pl. 303. fig. 6. — Guérin. Iconogr. Crust. pl. 2. fig. 3. — Edw. op. cit. t. 2. p. 144.

— Latreille. Encyclop. pl. 303, fig. 1 et 2. — *Atelecyclus septemdentatus*. Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 4. fig. 1. *A. hétérodon*. Edw. op. cit. t. 2, p. 143.

M. Desmarest a fait connaître sous le nom d'*Atelecyclus rugosus*, une espèce fossile qui se trouve dans le calcaire tertiaire de Montpellier (Crust. foss. pl. 111. pl. 9 fig. 9).

CLASSE NEUVIÈME.

LES ANNÉLIDES (Annelides.)

Animaux mollasses, allongés, vermiformes, nus ou habitant dans des tubes : ayant le corps muni, soit de segments, soit de rides transverses; souvent sans tête, sans yeux et sans antennes; dépourvus de pattes articulées; mais la plupart ayant à leur place des mamelons sétifères rétractiles, disposés par rangées latérales. Bouche subterminale, soit simple, orbiculaire ou labiée, soit en trompe souvent maxillifère.

Une moelle longitudinale noueuse et des nerfs pour le sentiment et le mouvement; le sang rouge (1), circulant par des artères et des veines; respiration par des branchies, soit internes, soit externes, quelquefois incon-
nues.

Animalia mollia, elongata, vermiformia, nuda, vel tubos habitantia : corpore segmentis rugisve transversis instructo ; capite oculis antennisque sæpe destituto; pedi-

(1.) L'existence de sang rouge ne paraît pas être un caractère aussi important que l'avaient pensé Lamarck, Cuvier et plusieurs autres naturalistes. M. de Blainville a fait remarquer que chez l'Aphrodite, le liquide nourricier est jaune, et nous avons observé la même exception chez les Polynés, les Sigaliotes et les Phyllocécés; enfin, d'autres zoologistes ont trouvé ce liquide transparent et incolore chez les Olépomes et les Hémocares. D'un autre côté, j'ai trouvé dans la Méditerranée un animal très voisin des Planaires, mais dont le sang était rouge.

E.

bus articulatis nullis, at in plurimis pedum loco mammillis setiferis retractilibus per series laterales ordinatis. Os subterminale, vel simplex, orbiculare aut labiatum, vel proboscideum sæpe maxilliferum.

Medulla longitudinalis nodosa nervique pro sensu et motu; sanguis ruber arteriis venisque circulans, respiratio branchiis vel internis vel externis, interdum ignotis.

OBSERVATIONS. — Les *Annelides* paraissent provenir originellement des vers; mais elles en diffèrent par une organisation beaucoup plus avancée dans sa composition. En considérant leur forme générale, on sent que ces animaux ne proviennent nullement des crustacés, et qu'ils ont pris leur origine dans une autre source. Ils semblent même, à certains égards, plus imparfaits que les crustacés, les arachnides et même les insectes; puisqu'un grand nombre, parmi eux, paraît comme sans tête et sans yeux; que beaucoup d'entre eux sont dépourvus d'antennes, qu'aucun d'eux n'est muni de pattes articulées, qu'ils semblent même n'avoir point de cœur bien distinct pour effectuer la circulation de leurs fluides. Ils appartiennent néanmoins à la branche des *animaux articulés*, en ont effectivement le système nerveux, et, quant à leur ordre de formation, nous les considérons comme un rameau latéral provenant des vers, qu'il a fallu placer convenablement dans notre distribution générale des animaux.

Pour les mettre en ligne dans la série, nous avons trouvé des motifs qui nous autorisent à les placer après les crustacés, quoiqu'ils interrompent les rapports que ces derniers ont avec les *Cirrhipèdes*, parce qu'il eût été très inconvenable de les ranger ailleurs.

Sans doute les *Annelides* ne l'emportent pas sur les crustacés en perfectionnement d'organisation, et néanmoins elles sont réellement supérieures aux insectes sous ce point de vue, ayant une circulation pour leurs fluides, et respirant par des branchies locales. Assurément la série qui embrasse les insectes, les arachnides et les crustacés, ne saurait être raisonnablement interrompue par l'intercalation des *Annelides*; ne pouvant donc placer ces dernières avant les insectes, il faut bien les ranger après

les crustacés. Qui ne sent ici l'inconvénient d'être obligé de former une série simple, lorsque la nature n'en a pu faire une semblable dans l'ordre de ses productions ! Voyez à la page 431 du premier volume, le *Supplément* à la distribution générale des animaux, concernant l'ordre réel de leur formation. (1)

L'organisation des *annelides* nous paraît donc la suite du plan commencé dans les *vers*, plan que la cause modifiante a partagé en deux branches, savoir : celle des épizoaires, qui a amené les trois classes d'animaux munis de pattes articulées, et celle des *annelides*, que nous n'observons encore qu'après une lacune assez considérable.

Ce qui a effectivement paru très singulier, ce fut de trouver que les *annelides*, quoique moins perfectionnées en organisation que les mollusques, avaient cependant le sang véritablement rouge, tandis que celui des mollusques, des crustacés, etc., n'a pas encore cette couleur qui dépend de son état et de sa composition, et qui est celle du sang de tous les animaux vertébrés. On sent bien que, parmi les animaux que nous rapportons à notre classe des Annelides, ceux qui se trouveraient n'avoir pas, dans leur organisation, le caractère classique, n'infirmement point ce caractère, et ne sont ici placés qu'en attendant que leur organisation nous soit mieux connue.

C'est aux observations de M. Cuvier que l'on est redevable du principal de ce que l'on sait sur l'organisation intérieure des Annelides. Ne considérant auparavant que leur forme générale, on les confondait avec les vers, et dans mon *Système des animaux sans vertèbres*, je ne les distinguais que comme des vers externes ; en cela, au moins, très différens des vers intestins.

Cependant, par un ouvrage dont j'ignorais l'existence, et qui est de M. Thomas, anatomiste distingué de Montpellier, on connaissait déjà, pour la sangsue, l'existence de trois vaisseaux

(1) C'est avec beaucoup de raison que Lamarck fait observer que les Annelides ont d'étroites liaisons avec les Helminthes, et paraissent être inférieures en organisation aux crustacés et aux arachnides ; mais nous ne partageons pas son opinion, lorsqu'il considère ces animaux comme étant supérieurs aux insectes. E.

sanguins, lesquels communiquent ensemble par des branches latérales, savoir : un de chaque côté, et le troisième tout-à-fait dorsal. On savait, que le sang se meut, dans ces vaisseaux, par des contractions de systole et de diastole; on savait, en outre, par les observations du même auteur, qu'il y a, sur les côtés de la sangsue, des espèces de sacs membranés, renflés comme des vessies, qui ne paraissent contenir que de l'air, et qui viennent s'ouvrir au-dehors par de petits trous à la peau. Ces poches ou vessies particulières sont, sans doute, les organes respiratoires de l'animal, quoiqu'on l'ait contesté, et par conséquent analogues à celles que l'on trouve dans les ascarides et les aranéides. Aussi, sur les parois internes de ces vessies, trouve-t-on des vaisseaux capillaires sanguins qui y viennent se ramifier en quantité innombrable. Ces mêmes vessies, ou poches branchiales ne communiquent point entre elles, et occupant de chaque côté, presque toute la longueur de l'animal. Enfin, l'on savait, par la même voie, qu'un cordon médullaire nerveux s'étend de la bouche jusqu'à l'extrémité postérieure, et que de chacun de ses nombreux ganglions partent des filets nerveux qui se divisent ensuite en d'autres filets plus petits.

Néanmoins, M. Cuvier rectifia et perfectionna, depuis nos connaissances sur l'organisation intérieure de la sangsue et de la plupart des autres *annelides*. Il nous apprend que, dans la sangsue, un système vasculaire, composé de quatre vaisseaux sanguins, et non de trois, s'étend d'une extrémité à l'autre de l'animal; que ces quatre vaisseaux sont disposés de manière que deux sont latéraux et fournissent des ramifications latérales qui s'anastomosent; tandis que les deux autres sont, l'un dorsal et l'autre ventral, et paraissent, par leur nature et leurs dispositions différentes, faire les fonctions de veines. Ainsi, M. *Thomson* n'avait manqué que l'observation du vaisseau ventral. (1)

(1) Voyez pour plus de détails sur la circulation des *Annélides*, le Mémoire de M. Dugès, inséré dans le quinzième volume des *Annales des Sciences naturelles*, et des observations nouvelles que nous avons communiquées à l'Académie des Sciences, le 23 septembre 1827, et qui sont mentionnées dans les comptes rendus.

M. Cuvier nous ayant fait connaître les faits d'organisation qui concernent la sangsue, les Néréides, l'animal des Serpules, etc., assigna à ces animaux le nom de *vers à sang rouge*. Mais, reconnaissant la nécessité de les écarter considérablement des vers, et de leur assigner un rang plus élevé qu'aux insectes (1), j'en formai de suite une classe particulière que je présentai dans mes cours, à laquelle je donnai le nom d'*annelides*, que je plaçai à la suite des crustacés, et dont je n'eus occasion de consigner les déterminations, par l'impression, que dans l'*Extrait* de mon Cours, qui parut en 1812.

Depuis que nous avons acquis de M. Montègre des détails intéressans sur le lombric terrestre, détails qui sont consignés dans le premier volume des Mémoires du Muséum; et nous en trouvons d'autres, sur le même animal, exposés par M. Spix, dans les actes de l'Académie royale des Sciences de Munich, année 1813.

Enfin, récemment, M. Savigny, dont l'extrême sagacité dans l'observation est bien connue, a présenté à l'Académie royale des Sciences de l'Institut de France, un Mémoire plein d'intérêt sur les généralités des *annelides*, et particulièrement sur la division de celles qu'il nomme *serpulées*. Plus récemment encore, ce savant vient de lui offrir un second mémoire, traitant non-seulement des généralités des *annelides*; mais, en outre, plus particulièrement de celles qui ont des antennes qu'il nomme *annelides néréidées*. Dans ces deux ouvrages, M. Savigny ne s'est presque point occupé de l'organisation intérieure des animaux de cette classe, nos connaissances à cet égard étant déjà fort avancées; mais il a donné une attention particulière aux organes extérieurs de ceux de ces animaux qui en offrent, organes variés, compliqués même, qui, en général, servent aux mouvemens de ces annelides, indiquent leurs habitudes, et qui étaient mal connus. Il les a déterminés et caractérisés avec une précision admirable, et maintenant, la classe des Annelides

(1) Les Annelides nous paraissent au contraire devoir prendre place dans la partie inférieure de la série des animaux articulés.

n'est plus en arrière des autres, sous le rapport des vrais caractères des objets qu'on y rapporte. Mais, parmi les objets observés et mentionnés dans les ouvrages des naturalistes, il y en a beaucoup qui exigent actuellement des observations nouvelles, non-seulement pour décider la classe à laquelle ils appartiennent, comme les Naiades, les Thalassèmes, etc., mais encore pour fixer leur genre, leur ordre, en un mot, leur rang dans la classe.

Comme les travaux de M. Savigny nous paraissent importants, qu'ils sont, à nos yeux, un modèle de la manière d'observer, et qu'ils nous offrent, sur les annelides et leurs caractères, les détails désirables, nous nous empresserons de mettre à profit ses observations. Néanmoins, la nature de notre ouvrage ne nous permet d'en donner qu'un extrait très resserré; nous nous permettrons même de diminuer le nombre des étres qu'il établit parmi les Annelides, et de les ranger selon notre manière et notre plan. (1)

Parmi les parties des Annelides, que M. Savigny a détermi-

(1) Depuis la publication des beaux travaux de M. Savigny, sur la structure extérieure et la classification des Annelides, l'histoire anatomique et zoologique de ces animaux a été étudiée par plusieurs naturalistes parmi lesquels nous devons surtout mentionner M. de Blainville (article Vers du Dict. des Sc. nat.) Treviranus (sur l'anatomie de l'Aphrodite, Vermis. Schriften fur. Physiologie. 3 Band.) Moquin-Tandon (Monog. des Hirudinées.) Dugès, sur les Annelides abranchez (Ann. des Sc. nat. t. 15). Morren (de Lumbrici terrest. hist. nat.) etc. et M. Dellechiaje (mém. sur les Anim. sans vert. de Naples.) M. Audouin et moi avons également publié un travail sur la classification et l'organisation extérieure de ces animaux (Ann. des Sc. nat. t. 27 à 30) et j'ai donné dans une Encyclopédie anglaise un résumé de nos connaissances sur leur anatomie et leur physiologie (Cyclopedia of Anatomy and Physiology, vol. 1. p. 164); enfin, au moment de mettre cette feuille sous presse, je viens d'adresser à l'Académie des Sciences des observations nouvelles sur le même sujet qui paraîtront dans un des prochains cahiers des annales des Sciences naturelles.

nées avec sa sagacité connue, nous définirons d'abord celles qui appartiennent à la tête de l'animal, ou à sa partie antérieure, comme les antennes, les tentacules, la trompe, les mâchoires, les yeux, observant que ces parties ne sont point générales, mais particulières à certaines races. Ces parties seront indiquées dans l'exposition des genres; ensuite nous dirons seulement un mot de celles que le corps des Annelides peut nous présenter.

Le resserrement que notre plan exige ne nous permettra pas de les détailler ailleurs.

La *tête*, dans les espèces qui en sont pourvues, est un petit renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux, et qui est distinct du premier segment.

Les *antennes* sont des filets articulés, quelquefois courts et épais, insérés sur la tête, et dont le nombre n'est pas au-delà de cinq.

Les *yeux*, au nombre de deux ou quatre, sont aussi insérés sur la tête, et placés derrière les antennes, entre celles-ci et le premier segment.

Les *tentacules* sont des filets inarticulés, qui s'insèrent sur la tête ou à la partie antérieure du corps, quelquefois ce sont des papilles plus ou moins allongées en filets, situées à l'orifice de la bouche.

La *trompe* est une partie charnue, contractile, constituant la bouche de l'animal. Elle est composée, tantôt d'un seul anneau, tantôt de deux anneaux distincts, renfermant souvent des mâchoires : elle est retirée dans l'inaction.

Les *mâchoires* sont des parties dures, circonscrites, cornées ou calcaires, enfermées dans la trompe, au moins au nombre de deux en opposition, et quelquefois au nombre de sept ou neuf, étant alors sur deux rangs, les unes au-dessus des autres, fixées sur les deux tiges.

Le corps des Annelides est tantôt nu, c'est-à-dire, sans soies quelconques, tantôt muni de soies, mais sans mamelons, et tantôt il offre, sur les côtés, des rangées de mamelons sétifères. Toutes les soies qui se trouvent sur un corps sans mamelons ne sont point rétractiles; mais tous les mamelons sétifères le sont généralement. Ces mamelons ne sont que des gaines charnues qui renferment chacune un paquet ou faisceau de soies subulées

et souvent, en outre, un acicule. Ces parties traversent le mamelon et pénètrent jusqu'aux muscles qui sont sous la peau, et auxquels elles s'unissent.

M. Sævig¹ donne le nom de pied à chaque paire de mamelons sétifères, et de là ; il divise chaque pied en deux rames : une supérieure ou dorsale : une inférieure ou ventrale. La rame ventrale est la plus saillante, la mieux organisée pour le mouvement progressif. On observe à chaque rame : 1° le cirre ; 2° les soies.

Les cirres sont des filets tubuleux, subarticulés, communément rétractiles, fort analogues aux antennes : ce sont les antennes du corps. Les cirres des rames dorsales, ou cirres supérieurs, sont en général plus longs que les cirres inférieurs.

Les soies de chaque rame, auxquelles on a donné le nom de soies subulées, sont des aiguilles assez dures, raides, opaques, et qui brillent d'un éclat métallique, communément celui de l'or. Elles forment, à chaque rame, un paquet ou faisceau mobile, que l'animal peut émettre ou faire rentrer avec son fourreau [le mamelon] dans l'intérieur du corps.

Les soies subulées dont il s'agit doivent être elles-mêmes distinguées en soies proprement dites et en acicules. Les soies proprement dites sont toujours grêles, nombreuses, rassemblées par rang ou par faisceaux qui ont chacun leur gaine, et sortent du sommet de chaque rame (1). La rame ventrale n'a communément qu'un seul de ces rangs ou faisceaux. La rame dorsale en a souvent deux ou davantage.

Les acicules sont des soies plus grosses que les autres, droites, coniques, très aiguës, contenues dans un fourreau particulier dont l'orifice se reconnaît à sa saillie. Il n'y en a ordinairement qu'un seul à chaque rame ; celui de la rame ventrale est constamment le plus fort. Dans quelques genres, les acicules manquent.

Outre les soies subulées, certaines Annelides en possèdent

(1) Ces soies varient beaucoup dans leur forme et dans leur structure, et servent souvent comme des armes offensives. (Voy. à ce sujet le Mémoire publié par M. Audouin et moi, dans les *Annales des Sc. nat.* t. 27. p. 367.) E.

d'une autre sorte, auxquelles M. Savigny donne le nom de *soies à crochets*. Ce sont des soies aplaties, armées en dessous de hampons très aigus. Elles sont aussi rétractiles, et restent contenues dans l'épaisseur de la peau, lorsque l'animal n'en fait pas usage; il n'y a que les Annélides sédentaires qui en soient munies.

Les *cirres tentaculaires* sont ceux de la première paire de pieds, ou même des deux ou trois paires suivantes qui souvent manquent de soies, et ne conservent que leurs cirres. Ces cirres alors acquièrent plus de développement, et prennent l'apparence de tentacules.

La dernière paire de pieds constitue, par une transformation analogue, les deux filets qui terminent postérieurement le corps de certaines annélides. (1)

Souvent le premier segment du corps, soit seul, soit réuni à quelques-uns des suivans, forme un anneau plus grand que les autres, plus apparent que la tête, et que l'on prend communément pour elle. Enfin, le dernier segment offre un anus plissé, tourné en dessus.

Telles sont les principales parties déterminées par M. Savigny, soit en parlant de ses Annélides nécréidées, soit en traitant de celles qu'il nomme *serpulées*, les mêmes que nos sédentaires.

D'après ce qui vient d'être exposé, l'on voit que les *annélides* sont des animaux tout-à-fait particuliers; car, quoique leur système nerveux soit le même que celui des animaux articulés, quoique leur corps soit aussi divisé en articulations, segments ou rides transverses, ceux de ces animaux qui ont des organes

(1) Les antennes, les cirres tentaculaires, les cirres proprement dits, et les styles ou filamens caudaux, sont des modifications d'un seul et même système appendiculaire qui, dans l'état normal, se montre sur chacun des anneaux dont le corps de l'Annélide se compose; quelquefois ces organes remplissent les fonctions des branchies dont ils diffèrent très peu par leur structure, et ils constituent avec elles un ensemble d'appendices que nous avons cru devoir désigner sous un nom collectif tel que celui d'*appendices dermoïdes* ou d'*appendices muqueux*. L.

extérieurs pour se déplacer, présentent, dans ces organes, des parties qui n'ont aucune analogie avec les pattes des insectes, des arachnides et des crustacés. Leurs mamelons sétifères, qui ne sont que des gaines rétractiles, et les soies qu'ils renferment, ne sont point comparables aux pattes des animaux que nous venons de citer, et ne sont point de véritables pattes, mais des organes d'une nouvelle sorte qui en tiennent lieu. Ce sont pour nous des mamelons pédiformes ou de fausses pattes [*pedes spurii*] et leur nombre n'est point borné. Ces animaux ne peuvent que ramper sur la terre ou sur les corps marins, ou que nager dans les eaux.

Toutes les Annelides respirent sans doute par des branchies; car toutes doivent respirer; aucune n'a de trachées; et elles vivent habituellement, soit dans les eaux, soit dans la vase, le sable ou la terre humide. Ainsi, quoique dans plusieurs les branchies soient encore inconnues ou indéterminées, on ne doit jamais dire qu'elles en manquent (1). Ces branchies varient beaucoup dans leur situation, leur taille et leur forme. Lorsqu'elles sont connues, on les voit néanmoins, tantôt distribuées dans la longueur du corps ou dans une partie de cette longueur, et tantôt situées seulement à l'une des extrémités du corps, au moins à l'antérieure.

Ce qu'on nomme *yeux* n'est, dans certaines Annelides, que des points oculaires qui ne leur donnent pas la faculté de voir. Je crois que l'on peut penser ainsi, tant qu'une *cornée* bien distincte ne sera pas observée à l'égard de ces points. (2)

(1) Chez un grand nombre de ces animaux, il ne paraît y avoir aucun organe particulier pour la respiration, et cette fonction paraît s'effectuer par la surface générale du corps, ou du moins par la peau de diverses parties où les vaisseaux capillaires sont le plus abondants. Les appendices que l'on désigne sous le nom de branchies ne sont souvent que de faibles auxiliaires de la peau des parties voisines. E.

(2) La structure de ces organes a été étudiée depuis peu par M. Muller de Berlin, et paraît être très simple; on n'y trouve ni cristallin, ni corps vitré analogue au cône vitré des Insectes et

Certaines *Annelides* vivent à nu, soit dans les eaux, soit dans la terre humide, soit dans le sable ou les fonds vaseux recouverts par les eaux. Mais beaucoup d'autres se construisent des fourreaux ou des tuyaux plus ou moins solides, dans lesquels elles habitent sans y être attachées. Ces fourreaux ou tuyaux sont, les uns membraneux ou cornés, le plus souvent incrustés, à l'extérieur, de grains de sable et de parcelles de coquillages; tandis que les autres sont solides, calcaires ou homogènes. Dans quelques familles, on croit que les habitans de ces fourreaux peuvent en sortir et y rentrer; mais il paraît que, dans d'autres familles, les habitans des fourreaux ou des tuyaux n'en sortent jamais. Enfin, il y a des *Annelides* qui habitent entre les pierres ou sous les pierres des rivages qui sont sous l'eau, entre les rochers ou dans leurs crevasses, et d'autres qui errent vaguement dans la mer.

La plupart des *Annelides* sont carnassières, sucent le sang des autres animaux. Quelques-unes néanmoins paraissent vivre de différens détritns qu'elles avalent. Ces animaux sont hermaphrodites, mais ont besoin d'un accouplement réciproque.

En instituant cette classe, j'entendis n'y rapporter que ceux des animaux vermiformes qui posséderaient un système de circulation pour leurs fluides. Je savais que l'existence de ce système dans une organisation, entraînait, pour les animaux sans vertèbres, celle d'une respiration par branchies, et celle encore d'un système pour les sensations. J'ai senti depuis que la classe ainsi fondée était exposée aux déterminations arbitraires des fonctions attribuées aux parties de l'organisation des animaux; que, par cette cause, il y aurait peu d'accord entre les auteurs à l'égard des objets qu'on devrait y rapporter; enfin, que je serais moi-même très embarrassé par l'imperfection de nos connaissances, relativement à l'organisation de certaines races.

Par exemple, M. Cuvier qui, dans son ouvrage intitulé le

des Crustacés, mais seulement un petit ganglion terminal du nerf optique, recouvert par un pigment ordinairement noir, et placé immédiatement sous la peau qui, dans ce point, est mince et transparente.

E.

disposées le plus souvent à une des extrémités du corps ou auprès. Toutes habitent dans des tubes dont elles ne sortent jamais entièrement.

Les Dorsalées.

Les Maldanies.

Les Amphitritées.

Les Serpulées.

[La classe des Annelides nous paraît devoir être divisée d'une manière un peu différente de celle indiquée par notre auteur. Ces animaux semblent conformés d'après deux types principaux, et par conséquent doivent être séparés d'abord en deux groupes ou sous-classe qu'on peut nommer les ANNÉLIDES CHÉTOPODES (1) et les ANNELIDES APODES ou SUCEURS. Les premiers se reconnaissent à l'existence de soies servant à la locomotion et ordinairement portées sur des tubercules pédiformes, garnis de divers appendices dermoïdes; les seconds, à l'absence complète de soies et à l'existence de deux cavités préhensiles terminales en forme de ventouse.

Les ANNELIDES APODES ou SUCEURS comprennent les Hirudinées et les Branchellions.

La division des ANNELIDES CHÉTOPODES est beaucoup plus nombreuse, et nous paraît devoir être subdivisée de la manière suivante.

1° Les ANNELIDES CÉPHALOBANCHES ou TUBICOLES.

Tronc terminé antérieurement par la bouche et dépourvu de tête,

(1) Ces noms ont été introduits dans la science par M. de Blainville, mais dans sa méthode de classification, la classe des Annelides n'existe pas, et chacun des groupes dont il est ici question, est élevé au rang de classe, et par conséquent séparé autant l'un de l'autre qu'ils le sont des Insectes ou des Arachnides; mode de distribution qui nous semble peu naturel. E.

d'yeux, ou de mâchoires, mais garni d'appendices dermoïdes rassemblés en totalité ou en majeure partie sur l'extrémité antérieure, et portant des soies presque toujours de deux sortes (subulées et à crochets), portées sur des tubercules pédiformes dépourvus de cirres ou n'en ayant qu'un seul.

Siphostomes.

Amphitrites.

Hermelles.

Terebelles.

Sabelles.

Serpules; etc.

2° Les ANNELIDES MÉSOBRANCHES.

Tronc dépassant en dessus l'ouverture orale et terminé presque toujours par une tête distincte, garnie fréquemment d'yeux et de mâchoires. Appendices dermoïdes nuls ou répartis dans toute la longueur du tronc, soies presque toujours d'une seule espèce.

FAMILLE DES TERRICOLES.

Tronc dépourvu d'appendices dermoïdes, et n'ayant ni tête bien distincte, ni yeux, ni antennes, ni mâchoires.

TRIBU DES THALASSÉMIENS.

Thalassèmes.

Sternapses.

TRIBU DES LOMBRICIENS.

Naïs.

Tubifex.

Lombric.

TRIBU DES CLYMÉNIENS.

Clymène.

FAMILLE DES ARÉNICOLIENS.

Tronc pourvu d'appendices dermoïdes branchiformes, tête peu ou point distincte, point de mâchoires, ni d'antennes, ni ordinairement de cirres tentaculaires.

HISTOIRE DES ANNÉLIDES.

TRIBU DES ARÉNICOLIDES.

Arénicoles.

Chétopère.

TRIBU DES ARICIENS.

Cirratule.

Ophélie.

Aricie.

Aonie.

FAMILLE DES CÉPHALÉES.

Tronc terminé par une tête bien distincte, garnie d'antennes plus ou moins développées, d'yeux, et presque toujours d'une trompe armée de mâchoires.

A. Point de cirres insérés vers la base des pieds.

TRIBU DES PÉRIPATIENS.

Péripates.

TRIBU DES CAMPONTIENS.

Camponties.

B. Pieds garnis de cirres.

TRIBU DES NÉRÉIDIENS.

Glycère.

Nephtys.

Phyllodoce.

Myriane.

Alciope.

Hésione.

Syllis.

Lyndloe.

Néréide, etc.

TRIBU DES EUNICIENS.

Ænone.

Aglaure.

Lombrinère,
Lysidie.
Diopâtre.
Onuphis.
Eunice.

TRIBU DES AMPHYNOMIENS.

Hiponoé.
Euphrosine.
Amphynome.
Chloé.

TRIBU DES APHRODISIENS

Sigalion.
Acoète.
Palmyre.
Polynoé.
Aphrodite, etc.

E.

ORDRE PREMIER.

ANNELIDES APODES.

*Point de pieds, c'est-à-dire, point de mamelons setifères et rétractiles. Point de tête antennifère. Les branchies, lorsqu'elles sont connues, disposées dans la longueur du corps, à l'intérieur (*ou à l'extérieur).*

Aucune Annelide n'a de véritables pattes, ou du moins n'en a point qui soient articulées et analogues à celles des animaux des trois classes précédentes; mais la plupart des Annelides sont munies, sur les côtés du corps, de mamelons sétifères, rétractiles, qui servent à la locomotion

de ces animaux, et que l'on peut considérer comme des espèces de pattes. Or, les animaux dont il s'agit ici sont les seuls de la classe qui n'aient ni mamelons sétifères, ni soies rétractiles : ce sont donc des *Annelides Apodes*.

C'est parmi ces Annelides qu'on a remarqué et reconnu, pour la première fois, une circulation dans ces animaux, ainsi que le sang rouge. Dès-lors il ne fut plus possible de les laisser parmi les vers, et il ne l'est pas de douter qu'ils ne respirent pas par des branchies. Mais ces mêmes animaux peuvent être considérés comme les plus imparfaits de leur classe, car ils sont sans tête, sans tentacules, sans antennes, sans mamelons pédiformes, sans vestiges de parties paires semblables ; aussi leurs branchies sont-elles intérieures, dans la peau ou sous la peau, et, dans certaines races, elles sont si petites que, jusqu'à présent, l'on n'a pu les distinguer ou les reconnaître. D'après cette dernière considération, je les avais nommés *Annelides Cryptobranches*, expression moins impropre que celles d'Annelides Abranches. Dans celles où l'on a cru apercevoir les branchies, on a pensé, avec raison, qu'elles se trouvaient dans de petites cavités vésiculaires et internes, qui s'ouvrent au dehors par des pores peu apparens et rangés longitudinalement au dessous du corps, en deux séries. On en connaît ailleurs d'analogues dans des animaux où la circulation, nouvellement établie, les distingue de plusieurs autres qui ne la possèdent pas, et néanmoins qui y tiennent par d'autres rapports.

Les *Annelides apodes* rappellent plus que toutes autres, la source dont elles proviennent. Ces animaux vermiformes sont nus, ou munis au dehors de spinules ou de soies non rétractiles. Ils sont vagans et vivent librement, les uns dans l'eau, les autres dans la vase ou la terre humide. Les genres que l'on rapporte à cet ordre sont en-

core en très petit nombre : je les partage en deux familles savoir :

1^o En *hirudinées*, ou celles qui n'ont point de soies quelconques en saillie au dehors.

2^o En *Échiurées*, ou celles qui ont des soies non rétractiles, en saillie au dehors.

[Les Echiurées diffèrent trop des Hirudinées pour que l'on puisse les laisser dans le même ordre, et se rapprochent beaucoup des annelides céphalées. E.

LES HIRUDINÉES.

Corps n'ayant point de soies quelconques en saillie au dehors.

Les *Hirudinées*, dont M. Savigny forme un ordre, dans son second mémoire sur les Annelides, ne sont considérées par nous que comme une famille; encore est-elle si voisine des *Échiurées* ou *Lombricinées* par ses rapports, qu'elle ne s'en distingue guère que parce que ces Annelides n'ont aucune soie véritable, saillante à l'extérieur. Ces animaux sont en général aquatiques; cependant on en a observé à Madagascar qui sont constamment terrestres, attachés aux herbes, et qui se fixent aux jambes, piquant très fort et suçant le sang. C'est aux dépens du genre *Hirudo* de Linné, que l'on a divisé en plusieurs genres particuliers, que nous composons cette famille. M. de Blainville, ayant bien voulu nous communiquer les caractères de ces genres, nous avons adopté les suivants :

1. Corps cylindracé ou cylindrique?

Sangsues?

Trochétie.

Piscicole.

2. Corps aplati.

Phylliné.

Erpobdelle.

[La division des Hirudinées de Lamarck correspond à l'ordre des Annelides suceuses dont les caractères ont été exposés dans le tableau général p. 312. Suivant M. de Blainville, ces animaux devraient être complètement séparés des Annelides ordinaires auxquelles il donne le nom de Chétopodes et devraient être réunis aux Vers intestinaux. Il existe en effet de grandes analogies entre les Annelides suceuses et certains Helminthes; cependant les premiers tiennent par des liens encore plus étroits aux Annelides chétopodes, et ne nous paraissent pas devoir en être distraits; mais, d'un autre côté, on ne peut dans une classification naturelle, les considérer comme une simple famille d'une division des Annelides qui comprendrait en même temps les Lombrics, les Cirratules, etc., et nous croyons qu'il faut en former un ordre distinct ou peut-être même une sous-classe qui servirait à établir le passage entre les Annelides ordinaires et les Planariées, etc.

Quoi qu'il en soit, ce groupe naturel doit se subdiviser en deux familles, savoir :

1. Les HIRUDINIENS,

dont le corps est complètement dépourvu d'appendices.

2. Les BRANCHELLIONIENS,

dont le corps est garni d'appendices membraneux.

La famille des *Branchellioniens* ne comprend encore qu'un seul genre celui des Branchellions.

La famille des Hirudinées se compose de plusieurs genres et a été subdivisée par M. Savigny en deux tribus qu'on peut désigner sous le nom de :

I ALBIONNIDES.

Ventouse orale d'une seule pièce, séparée du corps par un fort étranglement et l'orifice sensiblement longitudinal.

Pontobdelle ou Albione.

Pisicole ou Hæmocharis.

2^o Les BDELLÉOÏDES.

Ventouse orale de plusieurs pièces, peu ou point séparée du reste du corps; ouverture transverse comme à deux lèvres, dont l'inférieure rétrécie.

Sangsue.

Bdelles.

Erpobdelles ou Clépsines et Nephelis.

Pour plus de détails sur l'anatomie et la physiologie des Hirudinées, on peut consulter la monographie des Hirudinées par M. Moquin-Tandon, in-4°, Montpellier 1827; l'article Sangsue du Dictionnaire des sciences naturelles par M. de Blainville (t. 47) et l'article Vers du même (op. cit. t. 57); l'article Sangsue du Dictionnaire classique d'hist. naturelle par M. Audouin; un mémoire de M. Dugès sur les Annelides abranches, inséré dans le 15^e vol. des Annales des Sciences naturelles; un mémoire de M. Filippi sur les Sangsues, in-4°, Milan, 1837; etc. E.

SANGSUE. (Hirudo.)

Corps oblong, mutique, un peu déprimé, s'élargissant postérieurement, composé de segmens nombreux, très contractile, et ayant l'extrémité postérieure terminée par un disque large, préhensile. Bouche nue, dilatable, armée à l'intérieur de trois dents ou mâchoires cornées, longitudinales. Point d'yeux. Anus supérieur, près du disque postérieur.

Corpus oblongum, muticum, subdepressum, posterius laticescens, segmentis numerosis compositum, valdè contractile: extremitate posticâ disco lato, prehensili. Os nudum, dilatabile, intus dentibus seu maxillis tribus elongatis corneis armatum. Oculi nulli. Anus superus, propè extremitatem posticam.

OBSERVATIONS. — Les *Sangsues*, réduites aux espèces dont la bouche est armée de dents cartilagineuses ou cornées, sont de véritables Annelides. Elles ont le sang rouge, jouissent d'une circulation pour leurs fluides, et possèdent deux rangées de poches branchiales. Ce qu'on nomme leurs dents est plutôt des espèces de mâchoires, analogues à celles qui s'observent chez plusieurs annelides antennées. Leur corps est un peu déprimé, visqueux, très glissant et extrêmement contractile. Ayant postérieurement un disque propre à se fixer sur les corps, lorsque l'animal ne nage point, il se déplace en fixant alternativement chacune de ses extrémités.

Ces Annelides sont libres, vagabondes, vivent dans les eaux douces, et nagent à la manière des anguilles, par un mouvement onduleux. On sait qu'une espèce assez commune est utilement employée en médecine, pour faire des saignées locales.

[Les Hirudinées que notre auteur réunit ici ont la ventouse orale peu concave et la lèvre supérieure très avancée, presque lancéolée; les mâchoires grandes; dix yeux disposés sur une ligne courbe, les quatre postérieurs isolés; et la ventouse anale obliquement terminale. M. Savigny en a formé deux genres qui diffèrent principalement par la conformation des mâchoires; chez les unes, auxquelles ce naturaliste conserve le nom de *Sangsues*, ces organes sont très comprimés et armés de deux rangs de denticules nombreux et serrés, tandis que chez les autres qu'il nomme *Hæmopsis*, les mâchoires sont ovalaires, non comprimées, et armées de deux rangs de denticules peu nombreux; dans le système de nomenclature adopté par M. de Blainville, la première de ces divisions est désignée sous le nom d'*Iatrobdelle* et la seconde sous celui de *Hippobdelle*. E.

ESPÈCES.

1. Sangsue médicinale. *Hirudo medicinalis*.

H. elongata, nigricans : *suprà lineis versicoloribus; subtus maculis flavis*. Mull.

Hirudo medicinalis. Lin.

Leach. *Ferm. annulosa*. pl. 26.

- * *Hirudo medicinalis*. Leach. Encyclop. britan. Suppl. t. 1. pl. 26. fig. 2.
- * Carena. Monog. del gen. Hirudo. p. 282. pl. 11. fig. 1-3.
- * *Sanguisuga medicinalis*. Savigny. Syst. des annel. p. 114.
- * *Sanguisuga officinalis*. Moquin-Tandon. Monogr. des Hirudinees. p. 114. pl. 5. fig. 2.
- * Huzard. Journ. de pharmacie, 1825. pl. 3. fig. 18 à 20.
- * *Iatrobdella medicinalis*. De Blainville. Dictionnaire des Sc. nat. t. 47. p. 254. et. t. 57. p. 560. pl. 35. fig. 4.
- * *Hirudo medicinalis*. Filippi. Memoria Sulla Fam delle Sanguisughe. p. 26.

Habite en Europe, dans les marais, les étangs, les petites rivières peu courantes : c'est l'espèce employée.

2. Sangsue noire. *Hirudo sanguisorba*.

- H. elongata, nigra, subtilius cinereo-virens : maculis nigris*. Mull.
- Hirudo sanguisorba*. Linn. Mull. Hist. Verm. p. 38.
- * *Hæmopsis sanguisorba*. Savigny. Syst. des annel. p. 115.
- * *Hirudo sanguisuga*. Carena. Monogr. p. 286. pl. 10. fig. 8.
- * *Hirudo vorax* et *H. nigra*. Rawlin-Johnson. Treat. on the medical Leech. p. 132. fig. 5.
- * *Hirudo vorax*. Huzard. Journ. de pharmacie, 1825. p. 121.
- * *Hæmopsis vorax*. Moquin-Tandon. Monogr. p. 108. pl. 4. fig. 5.
- * *Hippobdella sanguisuga*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 252 et t. 57. p. 561.
- * *Hæmopsis vorax*. Filippi. op. cit. p. 25.

Habite en Europe, dans les étangs, les fossés aquatiques. Elle est plus grande que la précédente, et quelquefois dangereuse par les plaies qu'elle fait.

- * M. de Blainville pense que deux espèces ont été confondues ici ; l'une serait la véritable sangsue de cheval, qu'il range dans son genre *Hippobdella* ; l'autre la sangsue noire des environs de Paris (ou

(1) Le genre **PSUDOBDELLE** de M. de Blainville est caractérisé de la manière suivante : « Corps allongé, subcylindrique ou peu déprimé, composé d'anneaux nombreux, égaux, assez longs et bien réguliers ; tête peu distincte, à ventouse bilabée, et portant cinq paires de points pseudo-oculaires, dont trois très rapprochés sur le premier anneau, et deux latéraux plus isolés ; bouche très grande, pourvue à l'entrée de l'œsophage de trois plis bifides, un supérieur et deux latéraux inférieurs ; anus fort

Hemopsis sanguisuga. Sav.) qui rentre dans son genre *Pseudobdella* ¹.

[Le genre **BDELLÆ** de M. Savigny, ou *Limnatis* de M. Moquin-Tandon, et *Palæobdella* de M. de Blainville est extrêmement voisin de la division des Sanguées proprement dites; il est caractérisé de la manière suivante: Ventouse anale assez concave, à lèvre supérieure demi circulaire, creusée par dessous d'un canal en triangle; mâchoires grandes, ovales, sans denticules; huit yeux disposés sur une ligne courbe; les deux postérieurs un peu isolés; ventouse anale obliquement terminale.

On ne connaît qu'une espèce la
Bdelle du Nid. *Bdella nilotica*.

Savigny. Syst. des annel. p. 113, et Atlas de l'ouvrage sur l'Égypte.
Annel. pl. 5. fig. 4.

Limnatis Nilotica. Moquin. op. cit. p. 22.

Palæobdella Nilotica. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 59. p. 563.
pl. 35. fig. 3. E

TROCHÉTIE. (Trochetia.)

Corps oblong, cylindrique antérieurement, plus large et un peu déprimé postérieurement, et terminé à l'extrémité postérieure par un disque contractile. Un anneau circulaire, large, un peu relevé, au tiers antérieur du corps. Bouche bilabée, à lèvre supérieure plus grande, obtuse. Points de dents ou mâchoires. Point d'yeux. Anus supérieur, près du disque postérieur du corps.

grand, et semi-lunaire; orifice des organes de la génération situés, l'un entre le 24^e et le 25^e anneaux, l'autre entre le 29 et le 30^e. »

M. de Blainville pense que le genre *Aulastoma* de M. Moquin-Tandon ne diffère pas de celui-ci, et en effet, les caractères assignés à ces deux divisions sont à-peu-près les mêmes. E

Corpus oblongum, anticè cylindricum, posticè latius et subdepressum; disco contractili ad extremitatem posticam. Annulus circularis, latus, subprominulus ad corporis partem tertiam anticam. Os bilabiatum: labio superiore majore obtuso; dentibus seu maxillis nullis. Oculi nulli. Anus superior propè discum posticum.

OBSERVATIONS. — Les *Trochèties* avoisinent beaucoup les Sangsues, et elles en ont extérieurement l'aspect; mais elles en sont très distinguées, puisque leur bouche est bilabiée, et qu'elle n'offre aucune trace de dents ou de mâchoires. Elles ont d'ailleurs un anneau circulaire un peu protubérant, qui leur donne un rapport avec le lombric terrestre. Enfin, M. Dutrochet qui en a fait la découverte et qui a établi leur genre, nous apprend qu'elles périssent si on les tient dans l'eau, parce qu'elles ne peuvent respirer que l'air libre. On ne leur trouve point ces deux rangées de poches respiratoires qui existent dans les sangsues.

[Le genre n'est encore qu'imparfaitement connu, et n'a pas été adopté par MM. Savigny et Moquin, qui le réunissent au genre *Néphélie*, M. de Blainville, au contraire, l'admet et le désigne sous le nom nouveau de *Géobdelle*. E.]

ESPÈCE.

1. Trochètie verdâtre. *Trochetia subviridis*.

Trochetia subviridis. Dutroch. Mém. Mss. (*Bulletin de la Soc. Philomatique, 1817. p. 130.)

* *Nephele Trochetia*. Moquin. Monograph. p. 129.

* *Geobdella Trochetii*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 246. pl. 34. fig. 6.

Habite en France, près de Châteaurenaud, dans les lieux humides, les canaux souterrains, où elle poursuit les Lombrics, dont elle fait sa nourriture. Longueur huit centimètres. Elle a l'orifice de l'organe mâle percé dans l'anneau circulaire.

PONTOBELLA (Pontobdella)

Corps allongé, cylindrique, garni de verrues ou de tubercules épineux, à anneaux très distincts, ayant ses extrémités dilatées par un disque préhensile. Bouche dépourvue de dents, ou mâchoires. Point d'yeux. Anus supérieur, près du disque postérieur.

Corpus elongatum, cylindricum, verrucis aut tuberculis spiniformibus instructum: annulis distinctissimis; extremitatibus disco prehensili dilatatis. Os dentibus seu maxillis nullis. Anus superior, propè disco postérieur.

OBSERVATIONS. — Ce genre avait été d'abord établi par M. Oken, sous le nom allemand de *Gelbba*; nous lui avons préféré celui de *Pontobdella* de M. Leach, ainsi que les caractères déterminés par le naturaliste anglais, dont M. de Blainville nous a donné communication.

Les *Pontobelles* ayant le corps cylindrique, verruqueux ou tuberculeux, la bouche dépourvue de dents, et n'offrant point de *clitellum*; c'est-à-dire, cet anneau circulaire protubérant des Trochèries, constituent un genre bien distinct des deux qui précèdent. Ce sont d'ailleurs des Annelides marines.

ESPÈCES.**1. Pontobdelle verruqueuse. *Pontobdella muricata*.**

P. teras; *corpore verrucoso: verrucis in annulos digestis.*

Hirudo muricata. Lin.

Hirudo piscium. Bast. opusc. subs. 2. p. 95. t. 10. f. 2.

Encyclop. pl. 52. f. 5.

Pontobdella verrucosa. Leach.

* Ejerd. Zool. miscel. t. 2. p. 11. pl. 64. f. 1 et 2.

* *Albione verrucata*. Savigny. Syst. des Annel. p. 111.

* Moquin-Tandon. Monogr. p. 137. pl. 7. f. 8.

* *Pontobdella verrucata*. De Blainville. op. cit. t. 47. p. 242.

Habite l'Océan d'Europe.

2. Ponbdelle épineuse. *Pontobdella spinulosa*.

P. corpore spinuloso ; spinulis remotiusculis, subserialibus.

Pontobdella spinulosa. Leach. Miscel. Zool. 13. p. 12. t. 65.

EjUSD. Verm. annul. pl²⁶.

* *Hirudo marina*. Rondelet. Hist. des Poiss.

* *Hirudo muricata*. Linn. Syst. nat.

* Pennant. Brit. Zool. t. 4. pl. 20. f. 14.

* *Albione muricata*. Savigny. Syst. p. 110.

* Moquin-Tendon. op. cit. p. 136. pl. 7. f. 4.

* *Pontobdella spinulosa*. De Blainville. op. cit. t. 47. p. 242. pl. 34.
fig. 2.

Habite l'Océan boréal d'Europe : elle suce le sang des raies.

PISCICOLE. (Piscicola.)

Corps cylindrique, allongé, atténué antérieurement, ayant ses extrémités dilatées. Bouche dépourvue de dents. Quatre yeux.

Corpus teres, elongatum, anticè attenuatum; extremitatibus dilatatis. Os absque dentibus. Oculi seu puncti oculares quatuor.

OBSERVATIONS. — M. de Blainville donne à ce genre le nom de Piscicole que nous adoptons, et M. Ocken l'a établi sous le nom allemand de *Ihl*. La *Piscicole* nous semble tenir plus aux véritables Hirudinées que les deux genres qui suivent; cependant, il n'est pas certain qu'elle soit une Annelide. Ses deux extrémités dilatées par une membrane presque arrondie, et son corps cylindrique la caractérisent suffisamment.

ESPÈCE.

1. Piscicole des poissons. *Piscicola piscium*.

Hirudo piscium. Mull. Hist. Verm. 1. 2. p. 41. Gmel. p. 3097.

Hirudo geometra. Lin.

* Pennant. Brit. Zool. t. 4. pl. 20. f. B.

Hirudo plicata, Roca, Ins. t. 2, 32.

Encycl. pl. 52. f. 12-19.

* *Hamocharis plicata*, Savigny, Annul. p. 112.

* *Piscicola geometra*, Moquin-Tandon. Monogr. p. 131. pl. 7. f. 1.

* *Ichthyobdella geometra*, De Blainville, Dict. des Sc. nat. t. 47.
p. 244, pl. 34. fig. 5.

Habite en Europe, dans les eaux douces; elle se déplace comme les
Chenilles arpentées.

PHYLLINÉ. (Phyllina.)

Corps aplati, court presque ovale, gélatineux, terminé
postérieurement par un disque contractile, grand et armé
de crochets.

*Corpus complanatum, breve, subovale, gelatinosum, disco
contractili magno uncinis armato posticè terminatum.*

OBSERVATIONS. — Ce genre est établi par M. Oken, sous le
nom que nous lui conservons; et néanmoins, M. de Blainville
qui l'avait déjà reconnu, lui assigna celui d'*Entobdella*, dans ses
manuscrits. Il comprend des animaux parasites qui se fixent,
par leur disque postérieur, sur d'autres animaux marins. Nous
doutons que ce soient des Annelides, n'en ayant probablement
pas les caractères classiques; et nous les croyons voisins, par
leurs rapports, du Holystome de M. de la Roche, et des Pla-
naires. Ils nous confirment dans la nécessité d'établir une coupe
particulière d'animaux qui soient moyens entre les vers et les
Annelides. Ici nous les mentionnons, afin de ne pas les oublier.

ESPÈCE

1. Phylliné de l'hippoglosse. *Phylline hippoglossi*.

Ph. dilatata, albida; medio corporis oculo didymo candido.

Hirudo hippoglossi, Mull. Zool. dan. tab. 54. fol. 1-4.

Encycl. pl. 52. f. 11-14.

Bast. op. subs. 2. tab. 6, fol. 18.

- * *Epibdella hippoglossi*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 269. et t. 57. p. 567.

Habite sur le *Pleuronecte hippoglosse*.

Etc. Ajoutez l'*Hirudo grossa*. Mull. Zool. dan. tab. 21. Encycl. pl. 52. f. 6-9. (1)

ERPOBDELLÆ. (Erpobdella.)

Corps rampant, aplati, terminé postérieurement par un disque préhensile. Bouche dépourvue de dents ou mâchoires. Des points oculaires.

Corpus repens, complanatum, disco prehensili posticè terminatum. Os dentibus seu maxillis nullis. Puncti oculares.

OBSERVATIONS. — Ce genre fut établi par M. Ocken sous le nom de Helluo, que M. Blainville a changé en celui d'*Erpobdella*. Nous doutons fort que les espèces qui en font le sujet soient des Annelides. Elles ont évidemment beaucoup de rapports avec les Planaires, et certaines d'entre elles en sont peut-être réellement des espèces. Parmi les *Erpobdellæ*, nous citerons les suivantes.

[Notre auteur réunit ici des Hirudinées qui diffèrent beaucoup entre elles, et qui, de l'avis unanime des zoologistes plus récents, doivent être séparés en deux genres. L'un de ces groupes qui, dans la méthode de M. de Blainville, conserve le nom d'*Erpobdella*, correspond au genre *Nephelis* de M. Savigny et se distingue par les caractères suivans : ventouse orale peu concave, à lèvre supérieure avancée en demi-ellipse ; mâchoires réduites à trois plis saillans ; huit yeux, les quatre postérieurs rangés de chaque côté sur une ligne transverse ; ventouse anale obliquement terminale.

Le second groupe constitue le genre *Clepsine* de M. Savigny,

(1) Cette espèce, très imparfaitement connue par la figure de Muller, constitue le type du genre *Malacobdella* de M. de Blainville (Dic. des Sc. nat. t. 57. p. 466.)

ou *Glossobdella* de M. de Blainville, et se distinguer du précédent par les yeux au nombre de deux, quatre ou six seulement et disposés sur deux lignes longitudinales et par sa ventouse anale exactement inférieure. Il est aussi à noter que dans cette dernière division, le sang, au lieu d'être rouge, comme chez la plupart des Anélides, est incolore.

ESPÈCES.

1. Erpobdelle commune. *Erpobdella vulgaris*.

E. elongata, flavo-fusca; oculis octo: oculis laevia.

Müll. Hist. Verm. 1. 2. p. 40. n° 170.

Hirudo octoculata, Linn.

Hirudo vulgaris, Gmel. p. 3098.

* *Nephele tesselata*, Savigny. Syst. p. 119.

* *Nephele vulgaris*, Moquin-Tandon. Monogr. p. 126. pl. G. f. 4. et 8.

* *Erpobdella vulgaris*, De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 564. pl. 36. fig. 4.

Habite en Europe, sur les plantes aquatiques, dans les eaux douces.

2. Erpobdelle bioculée. *Erpobdella bioculata*.

E. elongata, cinerea; oculis duobus.

Hirudo bioculata, Müll. Hist. Verm. 1. 2. p. 41.

Hirudo bioculata, Gmel.

Hirudo stagnalis, Linn.

* *Glossiphonia perata*, R. Johnston. Medical leech. p. 26.

* *Glossopora punctata*, Ejust. Phil. Trans. 1817. pl. 17. f. 11-13.

* *Clepsina bioculata*, Savigny. Syst. p. 119.

* Moquin-Tandon. op. cit. p. 101. pl. 4. f. 2.

* *Erpobdella bioculata*, De Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 265.

* *Glossobdella bioculata*, Ejust. op. cit. t. 57. p. 565. pl. 37. fig. 3.

* *Clepsina bioculata*, Filippi. Monogr. p. 27.

Habite en Europe, dans les étangs, les fossés aquatiques.

3. Erpobdelle aplatie. *Erpobdella complanata*.

E. dilatata, cinerea; linea dorsi duplici tuberculata; margine serrato.

Müll. Hist. Verm. 1. 2. p. 47.

Hirudo complanata, Gmel. p. 3097.

Encycl. p. 51. f. 20 et 21.

* Carena. Monogr. p. 297. f. 17.

- * *Hirudocrenata*. Kirby. Trans. of the Linn. Soc. t. 2. p. 316. pl. 29.
- * *Clepsina complanata*. Savigny. Syst. p. 120.
- * *Glossopara tuberculata*. R. Johnston. Phil. Trans. 1817. pl. 17. f. 1-10. etc.
- * *Clepsina complanata*. Moquin. op. cit. p. 101. pl. 4. f. 1.
- * *Erpobdella complanata*. De Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 263.
- * *Glossobdella complanata*. Ejusd. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 565. pl. fig. 1 et 2.
- * *Clepsina complanata*. Filippi. op. cit. p. 27.

Habite en Europe, dans les rivières. Elle a six points oculaires sur deux rangs.

Etc. Ajoutez les *H. tessulata*, *hyalina*, *marginata* et *lineata*.

Voyez Sangsue pulligère et Sangsue bicolore. Daudin. Recueil de Mém. etc. p. 19. avec fig.

[Le genre **BRANCHIOBDELLE** (*Branchiobdella*) de M. Odier se rapproche des précédens, et a pour caractères distinctifs : corps très contractile, un peu aplati composé de 17 anneaux; tête oblongue garnie de deux lèvres; bouche armée de 2 mâchoires triangulaires; point d'yeux. Il ne renferme qu'une seule espèce, le *B. astaci*, qui vit sur les branchies de l'écrevisse commune. (Voy. Odier Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris. t. 1. p. 69. pl. 4.)

Genre **BRANCHELLION**. *Branchellion*.

Ce genre, établi par Rudolphi dans sa collection sous le nom de *Brancheobdellion* est extrêmement remarquable, et doit constituer le type d'une famille particulière dans l'ordre des Annelides suceurs; car son corps, au lieu d'être complètement dépourvu d'appendices comme chez les Hirudineés, porte en dessus une double rangée d'appendices branchiaux foliacés ou rameux très développés. Le corps est déprimé et formé de segmens nombreux, dont les premiers sont très petits et sans appendices, et les suivans plus grands et garnis chacun d'une paire

de branchies; la ventouse orale est petite, mais parfaitement distincte, et séparée du corps par un étranglement, la bouche est circulaire et dépourvue de mâchoires; enfin la ventouse anale est grande et très concave.

Le type de ce genre est le

BRANCHELLION DE LA TORPILLE. — *Branchellion torpedinis*. Savigny. Syst. p. 109.

Branchiobdella torpedinis. De Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 556. pl. 34. f. 1.

On y rapporte aussi le *Hirudo branchiata* de Menzies. Trans. of. the Linn. Soc. t. 1. p. 18n. pl. 1. fig. 3. *Branchellion pinnatum*. Savigny. Soc. cit. *Branchiobdella Menziesi*. De Blainv. loc. cit. 127 E.

LES ÉCHIURÉES.

Corps ayant des soies non rétractiles, en saillie au dehors.

Les *Echiurées* ou Lombricinés constituent la deuxième famille de nos Annelides apodes. Elles ont à la vérité des soies saillantes à l'extérieur; mais ces soies, rarement fasciculées, ne sont point rétractiles, n'ont point de gaine rentrante, et aucune en effet n'offre de mamelons pédiformes, servant de gaine à des faisceaux de soies rétractiles, comme dans toutes les Annelides des deux ordres qui suivent.

C'est aux dépens du genre *Lumbricus* de Linné, ou d'une partie de ce genre, que nous formons nos *Echiurées*. Mais comme l'organisation intérieure de beaucoup de ces animaux n'a pas encore été suffisamment examinée, notre travail est fort imparfait, et ne peut être considéré que comme provisoire.

Les *Echiurées* vivent dans la terre humide, ou dans les vases de la mer. Leurs branchies ne sont pas connues. Voici les trois genres que nous y rapportons.

LOMBRIG. (Lumbricus.)

Corps contractile, long, cylindrique, annelé; à anneaux garnis de très petites épines dirigées en arrière.

Bouche subterminale, nue, bilabiée; à lèvre supérieure plus grande, avancée. Point d'yeux. Anus à l'extrémité postérieure.

Corpus contractile, longum, cylindricum, annulatum: annulis spinulis minimis retrorsum versis.

Os subterminale, nudum, bilabiatum: labio superiore majore porrecto. Oculi nulli. Anus ad extremitatem posticam.

OBSERVATIONS. — Les *Lombrics*, dont une espèce, très commune, est connue de tout le monde sous le nom de *ver-de-terre*, sont des Annelides sans tête distincte, sans yeux, sans tentacules, en un mot, sans membres quelconques.

Le corps de ces animaux est composé d'un grand nombre d'anneaux étroits, fort rapprochés les uns des autres, et qui semblent n'être que des rides transverses que forment les muscles circulaires qui sont sous la peau, en la contractant.

Dans les *Lombrics* terrestres, on observe, vers le tiers de leur longueur, quelques anneaux serrés, plus colorés et protubérans, formant une ceinture qu'on a nommée le *bât* [*clitellum*] et qui sert à l'individu à se fixer contre un autre pendant la copulation. Dans l'accouplement, les individus sont disposés en sens contraire, et la ceinture de l'un ne s'applique point sur celle de l'autre. Les *Lombrics* sont hermaphrodites, paraissent se féconder eux-mêmes, et, selon les apparences, l'accouplement ne leur est nécessaire que comme excitant la fécondation.

Les *Lombrics* sont luisans, rougeâtres, et enduits d'une humeur visqueuse. Ils vivent dans la terre humide, se nourrissent de débris de végétaux et d'animaux, et viennent la nuit à la surface du sol pour s'accoupler. On ne connaît point leurs branchies; mais elles existent nécessairement, et sont sans doute intérieures et très petites.

[Dans ces dernières années. M. Dagès a donné d'intéressantes

observations sur la circulation et la génération de ces animaux, ainsi que sur la distinction des espèces dans le quinzième volume des Annales des Sciences naturelles, et M. Morren a publié un traité *ex professo* sur leur histoire (v. De Lumbrici terrestres Historia naturali nec non anatomia tractatus, in-4°, Bruxelles, 1829). On doit aussi à M. Léon Dufour des observations sur les œufs de ces animaux. (Voy. Ann. des Scienc. nat. 1^{re} série, t. 5. p. 17. et t. 14. p. 216.)

M. Savigny a proposé la division de ce groupe en trois genres d'après le nombre des rangées de soies, et quelques autres caractères de peu d'importance; il désigne ces genres nouveaux sous les noms d'*Enterion*, d'*Hypogean* et de *Clitelliv*. E.

ESPÈCES.

1. Lombric terrestre. *Lumbricus terrestris*.

L. ruber, octofariam aculeatus, clitello cinctus.

Lumbricus terrestris. Lin. Mull. Hist. verm. p. 24.

Montègre. Mém. du Mus. 1. p. 242. pl. 12.

* *Enterion terrestre*. Savigny. Syst. p. 103.

* *Lumbricus terrestris*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 495. pl. 22. f. 1.

* Morren. op. cit. pl. 1. f. 1. 2. 3. etc.

Habite en Europe, dans la terre humide des jardins, etc. Très commun.

2. Lombric armé. *Lumbricus armiger*.

L. ruber; lamellis ventris lanceolatis, geminatis, anticæ nullis.

Lumbricus armiger. Mull. Zool. dan. p. 22. tab. 22. f. 4. 5.

* Encyclop. vers. pl. 34. fig. 4 et 5.

* *Scoiopus armiger*. Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 493. pl. 25. fig. 1.

Habite les fonds vaseux de la mer de Norwège. Il n'a point de ceinture. (* Cette annelide ne peut rester dans cette famille et nous paraît devoir prendre place dans le genre *Aricie* de M. Savigny. (1)

(1) Le genre *ARICIE* se compose d'Annelides à corps cylindrique, dont la tête est très petite, conique et dépourvue d'antennes et de mâchoires, et dont les pieds sont de deux sortes, et

3. Lombric nain. *Lumbricus minutus*.

L. rubicundus ; cingulo e levato pallido ferè medio ; ventre bifariant aculeato.

Lumbricus minutus. Oth. Fabr. Faun. Groën. p. 281. f. 4.

* *Clitellio minutus*. Savigny. op. cit. f. 104.

• *Lumbricus minutus*. Blainv. Dict. des Scienc. nat. t. 57. p. 495.

Habite les côtes de la mer du Groënland, entre les pierres et les racines des fucus.

Etc.

THALASSÈME. (Thalassema.)

Corps mou, allongé, subcylindrique, annelé, obtus postérieurement; les derniers anneaux postérieurs garnis

relevés sur le dos; ceux de la partie antérieure du corps composés de deux rames écartées, dont la supérieure, petite, et pourvue d'un tubercule sétifère et d'un cirre lamelleux, et l'inférieure très grande, comprimée et armée d'une rangée de grosses soies courtes à-peu-près comme dans les pieds portant des soies à crochets; les pieds de la partie moyenne et postérieure du corps sont composés de deux rames semblables entre elles, et analogues à la rame dorsale des pieds antérieurs; il existe aussi sur la plupart de ces derniers organes un ou deux petits appendices branchiaux; enfin, il n'y a point de cirres tentaculaires:

Exemple *Aricia Cuvierii*. Audouin et Edwards. Ann. des Scienc. nat. t. 29. p. 397. et t. 27. pl. 15. fig. 5-13.

Le genre *Aonix* établit le passage entre les *Aricies* et les *Phylodocés*, etc., et a pour caractères principaux: tête très petite, mais distincte et surmonté d'un petit tubercule impair (qu'on peut considérer comme une antenne unique), point de cirres tentaculaires; pieds similaires, pourvus d'un seul cirre foliacé et composés de deux rames sétifères garnies chacune d'un lobe lamelleux; point de branchies proprement dites.

Aonia foliacea. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 402. p. 18. fig. 9-13. E.

*contractile, majusculum, column
nulli.*

OBSERVATIONS. — La bouche d
en oreille d'âne ou en grand cuill
pour n'avoir point fait distinguer
Lombrics. D'ailleurs, la plupart d
nus, sans épines ou soies courtes
trois rangées à leur extrémité poste
deux épines en crochets sous le c
courtes, et ont le brillant de l'or
postérieure.

ESPEC

1. Thalassème échiure. *Thalas*

Lumbricus echiurus. Pall. Miscell.

Lumbricus echiurus. Gmel. p. 30

Thalassema. Cuv. Règne anim. 2.

• *Thalassema echinus*. Bosc. Hist

• *Thalassema aquatica*. Leach. F

• *Thalassema vulgaris*. Savigny.

• *Thalassima echiurus*. Blainville.

Habite l'Océan d'Europe, les côtes
neux. Les pêcheurs s'en servent

avec les Thalassèmes. Le corps est peu allongé, obtus et arrondi en arrière, et terminé en avant par une partie étroite, subannelée et proboscidiforme, à la base de laquelle se trouvent en dessus deux petits tubercules semi-lunaires poreux. Au dessous de cette partie est une paire de plaques réunies en manière de bouclier ovalaire, garnies tout autour de soies raides. Vers le tiers postérieur, on voit également en dessous une paire de mamelons perforés, et autour de l'extrémité postérieure se trouvent de chaque côté trois rangées de soies raides. Enfin l'an us est terminal, ainsi que la bouche.

On n'en connaît qu'une seule espèce, savoir le :

STERNAPSE THALASSÉMOÏDE (*Mentula Cucurbitacea Marina* Plancus append. 2. chap. 20. p. 110. pl. 5. fig. D et E. — *Echinorhynchus scutatus*. Renieri Catal. — *Thalassema scutatum* Ranzan Memorie. — *Sternapsis Thalassemoïdes*. Mém. de l'acad. des Curieux de la Nat. de Bonn. t. 10. pl. 50. — Blainville. Dict. des Scienc. nat. t. 57. p. 501. pl. 26. fig. 1. — Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 245. E.

CIRRATULE. (Cirratulus.)

Corps allongé, cylindrique, annelé, garni, sur les côtés du dos, d'une rangée de cirres sétacés très longs, étendus, presque dorsaux. et de deux rangées d'épines courtes situées au-dessous. Deux faisceaux opposés de cirres aussi très longs, avancés, sont insérés au-dessous du segment antérieur.

Bouche sous l'extrémité antérieure, avec un opercule arrondi (*ou plutôt tubercule céphalique) : des yeux aux extrémités d'une ligne en croissant situé sur le segment capitiforme.

Corpus elongatum, teres, annulatum; cirris ad latera setaceis longissimis expansis subdorsalibus, et subtus aculeis brevibus biserialibus. Cirrorum longissimorum fasciculi duo oppositi, porrecti, infra segmentum anticum.

Os sub extremitate antica, cum operculo retundato. Oculi ad extremitates laterales hinc et supra segmentum caput referens.

OBSERVATIONS. — Je crois devoir présenter, comme un genre particulier, l'animal singulier que je nomme *Cirratule*, et que l'on a rangé parmi les *Lombrics*. Ses caractères me paraissent, sinon l'éloigner des *Lombrics*, du moins l'en distinguer suffisamment.

Cet animal, long de deux à trois pouces, et de la grosseur d'un *Lombric* terrestre médiocre, est remarquable par ses cirres latéraux, sétacés, très longs, et par les deux paquets antérieurs d'autres cirres, aussi très longs, qui s'avancent comme deux faisceaux de tentacules. Au-dessus des cirres latéraux, deux rangées d'épines courtes [quatre sur chaque anneau] les distinguent aussi éminemment. Les segments des extrémités sont sans cirres et sans épines; celui qui est postérieur est terminé par un anus.

ESPÈCE.

1. *Cirratule* boréal. *Cirratulus borealis*.

Lombricus cirratus. O. Fab. Fauna Groenland. p. 281. f. 5.
Encycl. pl.

Stroem, *Acta nide*. 4. p. 427. t. 14. f. 7.

* Blainville. Dict. des Sc. nat. vers. pl. 25. fig. 4.

Habite les mers du nord, dans le sable, sous et entre les pierres des rivages. Si les longs cirres sont des branchies, alors le *cirratule* devra être reporté parmi les annélides dorsibranches ou antennoées (1); mais O. Fabricius ne nous dit point que les épines courtes soient rétractiles. Le *Terebella tentaculata* de Montagu, Act. de la Soc. linnéenne, vol. 9. p. 110. t. 6. f. 2, semble avoir des rapports avec ce genre.

Ajoutez *Cirrhatus Lamarkii*, Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 410. et t. 27. pl. 15. fig. 1-4.

Etc.

(1) Ces appendices remplissent en effet les fonctions de branchies.

[Le genre *Cirrhinère* de M. de Blainville ne paraît pas différer beaucoup du précédent. Suivant ce naturaliste, il s'en distinguerait par l'absence d'appendices filiformes sur le dos et n'aurait que des cirres. Voy. le Dict. des Scienc. nat. t. 57. p. 488.]

E.

[Le genre OPHÉLIE (*Ophelia*) établi par M. Savigny, mais mal caractérisé par ce savant, doit prendre place auprès des Cirratules, dont cependant il se distingue ainsi que de tous les autres Annelides par les caractères suivans. La tête est conique, peu distincte, dépourvue d'antennes et garnie de deux points oculiformes; les pieds sont très courts et divisés en deux rames dont la ventrale est dépourvue de cirre, et dont la dorsale porte dans la partie moyenne du corps un long cirre filiforme; il n'y a point de branchies proprement dites. Enfin, l'extrémité postérieure du corps que M. Savigny avait pris pour la tête, est entourée d'appendices tentaculiformes.

(Voyez Savigny. Syst. des Annelides. p. 38; Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 479; — Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 406. pl. 17. fig. 7-9; — Saars. Annales des Sciences naturelles. 2. série, t. 7. p.

E.

ORDRE SECOND.

ANNELIDES ANTENNÉES.

Une tête antennifère, munie d'yeux. Une trompe protractile, souvent armée de mâchoires. Des mamelons sétifères, pédiformes et rétractiles. Point de soies à crochet.

Les branchies, lorsqu'elles sont connues, disposées dans la longueur du corps.

Les annelides antennées sont fort nombreuses, et pa-

raissent les plus perfectionnées de la classe, puisqu'elles ont une tête distincte, des antennes qui manquent rarement, et qu'elles sont munies d'yeux. Ce sont les *néréidés* de M. Savigny, et il les place en tête de sa distribution. Comme nous suivons un ordre inverse dans toutes nos classes, nous eussions dû terminer celle-ci par ces annélides. Mais persuadé que les branchies de nos Annelides apodes sont intérieures et disposées dans la longueur du corps, quoiqu'elles ne soient encore que peu ou point connues, nous avons préféré placer après les apodes, les Annelides dont il s'agit ici, parce que leurs branchies sont disposées dans la longueur du corps.

Toutes ces Annelides ont une tête constituée par un petit renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux. Leurs antennes au nombre de cinq; mais elles n'existent pas toujours toutes les cinq simultanément. Les pieds ou mammelons pédifères sont rétractiles, sétifères, disposés par rangées latérales. Chaque pied se divise en deux rames : une dorsale, et l'autre ventrale. Chaque rame est munie d'un faisceau de soies subulées et d'un cirre. Très souvent elle porte en outre un acicule, quelquefois plusieurs; mais dans quelques genres les acicules manquent. Les yeux sont au nombre de deux ou de quatre. La bouche est une trompe exsertile, ordinairement retirée dans le corps quand l'animal n'en fait pas usage. Elle est assez souvent armée de mâchoires.

Les *annelides antennées* sont fort nombreuses en races diverses, toutes marines, et la plupart ont, en quelque sorte, l'aspect, soit de Scolopendres, soit de Chenilles hérissées, souvent brillantes par leurs soies. M. Savigny les divise en quatre familles nommées et disposées de la manière suivante.

DIVISION DES ANNELIDES ANTENNÉES.

Branchies, soit en petites crêtes, petites lames simples ou languettes, soit en filets pectinés d'un seul côté: quelquefois peu apparentes. — Des acicules.

- (a) Branchies et cirres supérieurs alternant, dans leur position, jusqu'à la vingt-troisième ou la vingt-cinquième paire de mamelons pédiformes.

Les Aphrodites.

- (b) Branchies, lorsqu'elles sont distinctes, et cirres supérieurs existant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes. — Deux mâchoires ou aucune.

Les Néréidées.

- (c) Branchies, lorsqu'elles sont distinctes, et cirres supérieurs existant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes. — Mâchoires nombreuses; celles du côté droit moins que celles du côté gauche. — Première paire de mamelons pédiformes nulle.

Les Eunices.

- (d) Branchies et cirres supérieurs existant à toutes les paires de mamelons pédiformes. — Point de mâchoires.

Les Amphinomes.

[Depuis la publication du travail de M. Savigny, on a découvert de nouvelles espèces d'*Annelides* antennées qui ont nécessité l'établissement d'un plus grand nombre de divisions. (Voy. page 514.) E.]

LES APHRODITES. (Aphrodite.)

Branchies et cirres supérieurs alternant, dans leur position, jusqu'à la vingt-troisième ou la vingt-cinquième paire de mamelons pédiformes. — Quatre mâchoires.

Les *Aphrodites* constituent la première famille des Néréidées de M. Savigny, la première aussi de nos *Annelides*

antennées. Ces Annelides sont en général le corps plus court, quelquefois plus large et plus comprimé que celui des autres animaux de cette classe. Elles sont quelquefois très hérissées de soies fines qui ont des couleurs variées et métalliques très brillantes, et leurs branchies, quoiqu'externes, sont ordinairement cachées sous deux rangées d'écaillés dorsales, caduques. Dans quelques espèces, ces écaillés sont elles-mêmes cachées sous un fentre qui les couvrent et les contient.

Mais ce qui caractérise particulièrement les animaux de cette famille, selon M. Savigny, c'est d'avoir leurs branchies alternant dans leur position, jusqu'à la vingt-troisième ou la vingt-quatrième paire de mamelons pédiformes. Ces branchies et cirres supérieurs sont nuls à la seconde paire, à la quatrième et à la cinquième paire de mamelons; ensuite nuls encore à la septième, la neuvième, la onzième et ainsi de suite jusqu'à la vingt-troisième ou la vingt-cinquième paire inclusivement. Leur trompe est armée de quatre mâchoires, soit cartilagineuses, soit cornées. M. Savigny y rapporte les trois genres qui suivent.

[Cette tribu est très naturelle, mais la découverte de nouvelles espèces qui doivent nécessairement y prendre place nous a obligé d'en modifier la définition. On peut y assigner pour caractères d'avoir une tête bien distincte et garnie d'antennes; une trompe en général armée de 4 mâchoires réunies par paires; pieds très développés, et portant des appendices dermoïdes (tels que des élytres et des cirres dorsaux) qui paraissent et disparaissent alternativement de segment en segment dans une certaine étendue du corps; dos en général garni d'élytres; branchies rudimentaires. Dans toutes les espèces dont on a examiné le sang, on a trouvé ce liquide incolore ou légèrement jaunâtre. Les genres dont cette division se compose sont:

Les Palmyres.

Les Aphrodites ou Halithées.

Les Polynoés.

Les Acoètes.

Les Polyodontes.

et les Sigalions.

E.

PALMYRE. (Palmyra.)

Point de tentacules à l'orifice de la trompe. Mâchoires demi cartilagineuses. Antennes extérieures plus grandes que les trois autres. Deux yeux. Point d'écaillés dorsales.

Tentacula ad orificium proboscidis nulla. Maxillæ semicartilagineæ. Antennæ exteriores aliis tribus majores. Oculi duo. Squamæ dorsales nullæ.

OBSERVATIONS. — Le corps des *Palmyres* est oblong, composé d'anneaux peu nombreux, et manque d'écaillés, ce qui nous paraît le caractériser singulièrement. Les branchies sont peu visibles, et cessent d'alterner après la vingt-cinquième paire de mamelons pédiformes. Leur genre est encore caractérisé par le défaut de tentacules à l'orifice de la trompe. L'antenne impaire, quoique plus courte que les extérieures, est un peu plus longue que les deux mitoyennes.

ESPÈCE.

1. *Palmyre aurifère. Palmyra aurifera.*

Palmyra aurifera. Sav. Mss. (*Syst. des Annel. p. 16.)

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 463.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. p. 445. pl. 10. fig. 1.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 206.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annelides pl. 18. fig. 1.

Habite à l'Ile-de-France, envoyée par M. Mathieu. Belle espèce, brillant de l'éclat d'or par les faisceaux supérieurs de ses rames dorsales, qui offrent des soies, s'élargissant en palmes obtuses à leur sommet, comme imbriquées, voûtées, très éclatantes. Son corps est obtus aux deux bouts, et n'a que trente segmens. Point de branchies ni de cirres supérieurs à la vingt-huitième paire de mamelons pédiformes.

HALITHÉE. (*Halithæa*.)

Tentacules divisés, subrameux, couronnant l'orifice de la trompe, et en houppe. Mâchoires cartilagineuses, à peine visibles. Antenne impaire subulée, petite; les moyennes comme nulles; les extérieures plus grandes. Deux yeux distincts. Des écailles couchées sur le dos.

Tentacula divisa, subramosa, proboscidis orificium coronantia, penicillata. Maxillæ cartilagineæ, vix conspicuæ. Antennâ impari parvâ, subulatâ; intermediis subnullis; exterioribus majoribus. Oculi duo distincti. Squamæ dorso incumbentes.

OBSERVATIONS. — Les *Halithées* sont bien distinctes des *Palmyres*, puisqu'elles ont des tentacules à l'orifice de la trompe, et des écailles couchées sur le dos. Leur corps est ovale ou elliptique, formé d'anneaux peu nombreux. Il se termine antérieurement par une tête convexe en dessus, à front comprimé et saillant, sous forme de feuillet, entre les antennes. Celles-ci ne paraissent qu'au nombre de trois. Les branchies, facilement visibles, cessent d'alterner après la vingt-cinquième paire de mamelons pédiformes.

ESPÈCES.

Écailles dorsales couvertes par une voûte de soies feutrées.

1. *Halithée hérissée, Halithæa aculeata.*

H. ovato oblonga, hirtuta, aculeata, nitidissima; squamis dorsalibus, fusco-punctulatis.

Aphrodita aculeata. Lin. Brug. Diet. n° 1.

Pall. Miscell. Zool. p. 77. tab. 7. f. 1-13.

Encycl. pl. 61. fig. 6. 14.

* *Physalus*. Swammerdam. Biblia naturæ, tab. 10. fig. 8.

* *Histrix marina*. Redi opuscula. t. 3, pl. 35.

* *Eruca marina*. Seba, t. 3, pl. 4. fig. 7 et 8.

* *Aphrodita aculeata*. Fæstet. opus. suba. tab. 11. pl. 6. fig. 1-4.

- * Pennant. Brit. zool. vol. 4. pl. 23. fig. 25.
 - * Herbst, Vers. t. 1. pl. 11.
 - * Cuvier. Dict. des Scienc. nat. t. II. p. 282. et Règne anim. t. 3. p. 206.
 - * *Halithea aculeata*. Savigny. Syst. des Annelides. p. 19.
 - * *Aphrodita aculeata*. Blainville. Dict. des Sc. nat. art. Vers. pl. 9. fig. 1 et 2.
 - * Treviranus. Zeitschrift fur physiologie. t. 3.
 - * Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. p. 402. pl. 8. fig. 7.
 - * Dellechiaje. Anim. senza verteb. pl. 68. fig. 10.
- Habite l'Océan européen. C'est la plus grande et la plus brillante du genre. On la nomme vulg. la *Chenille de mer*.

2. Halithée soyeuse. *Halithea sericea*.

H. ovalis, supra virescens, nitida sericea; squamis dorsalibus immaculatis.

Halithea sericea. Sav. Mss. (* Syst. des Annel. p. 19.)

* Audouin et Edw. loc. cit. p. 404.

Habite... Collect. du Mus. Celle-ci est presque de deux tiers plus petite que la précédente.

Écailles dorsales découvertes.

3. Halithée hispide. *Halithea hystrix*.

☞ *H. oblonga, depressa, luteo-fucescens; squamis dorsalibus nudis, cinereo-ferrugineis.*

Halithea hystrix. Sav. Mss.

* *Hermione hystrix*. De Blainville. loc. cit. p. 457 (pas la figure).

* *Aphrodita hystrix*. Audouin et Edwards. loc. cit. p. 406. pl. 7. fig. 1-9.

Habite les mers d'Europe.

POLYNOE. (Polynoe.)

Tentacules simples, coniques, couronnant l'orifice de la trompe. Mâchoires cornées. Cinq antennes dont l'impair manque quelquefois. Quatre yeux. Des écailles dorsales, (ou élytres au nombre de 12 paires ou davantage fixé sur des pieds qui ne portent ni cirres supérieurs ni bran-

chies, et qui alternent régulièrement jusqu'au 23^e anneau avec des pieds dépourvus d'élytres, mais garnis d'un cirre dorsal et de branchies; les élytres suivantes lorsqu'il en existe paraissent et disparaissent dans un ordre différent.

Tentacula simplicia, conica, proboscidis orificium coronantia. Maxillæ corneæ. Antennæ quinque; interdum impari nullâ. Oculi quatuor. Squamæ dorsales.

Les *Polynoés* tiennent aux *Halithées*, surtout à la seconde division de ces dernières, par beaucoup de rapports; mais leur tentacules sont simples et disposés en cercle à l'orifice de la trompe; leurs mâchoires sont cornées, facilement visibles, dentées au côté interne, et leurs yeux au nombre de quatre. Leurs branchies, faciles à voir, cessent d'alterner après la vingt-troisième paire de mamelons pédiformes. Quant à leur corps, il varie dans sa forme générale, car il est ovale dans les uns, allongé et presque linéaire dans les autres. La tête est déprimée, un peu convexe en dessus, carenée par dessous en avant de la bouche.

ESPÈCES.

Antenne impaire nulle. Points de filets ou cirres allongés près de l'anüs.

1. *Polynoe* épineuse. *Polynoe muricata.*

P. ovalis, depressa; squamis dorsalibus incumbentibus fuscis, reticulatis, lineâ longitudinali nigrescente notatis: postici spinosæ.

Polynoe muricata. Sav. Mus. et fig. . . (*Syst. des Annélides. p. 21, et Descript. de l'Égypte. pl. 3. fig. 1.)

* *Eumolpe muricata.* De Blainville. art. Vers. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 459. pl. XI. fig. 1.

Habite les mers de l'Île-de-France. M. Mathieu. Mus. n°.

Antenne impaire distincte. Deux filets près de l'anüs.

2. *Polynoe* écailleuse. *Polynoe squamata.*

P. oblongo-linearis, depressa, extremitatibus obtusa; squamis dorsalibus duodecim paribus, subasperis, non imbricatis.

Aphrodita squamata. Pall. Miscell. Zool. p. 91. t. 7. f. 14.

* Baster Opuscul. Subsc. t. 2. lib. 11. pl. 6. fig. V. A. C.

Polinoe squamata. Sav. Mss. * Syst. des Annelides. p. 22.

* *Eumolpe squamata*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 458
[pl. 9. fig. 2.

Polynoe squammata. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27.
p. 416. pl. 7. fig. 10-16.

Habite les mers d'Europe. Bruguière l'a confondue avec une autre
dans son *Aphrodite*, n° 4.

3. Polynoé houppeuse. *Polynoe floccosa*.

P. oblonga, posticè angustato-acuta, cinereo-violascens; fasciculorum superiorum setis tomentosis.

Polynoe floccosa. Sav. Mss. (* Syst. des Ann. p. 23.)

* *Eumolpe floccosa*. De Blainville. op. cit.

* *Polynoe floccosa*. Aud. et Edw. loc. cit. p. 424.

Habite... les côtes de France?

4. Polynoé feuillée. *Polynoe foliosa*.

P. oblongo-linearis, subdepressa; squamis glabris medium dorsi non occupantibus.

Polynoe foliosa. Sav. Mss. (* Syst. p. 23.)

* *Eumolpe imbricata*. De Blainville. loc. cit. p. 459.

* *Polynoe foliosa*. Aud. et Edw. loc. cit. p. 425.

Habite les côtes de Nice. Aurait-elle des rapports avec l'*Aphrodita clava*? Montag. Act. Soc. linn. 9. p. 108. t. 7. fol. 3.

5. Polynoé vésiculeuse. *Polynoe impatiens*.

P. oblonga, albo cærulescens; squamis dorsalibus mollibus, fornicatis, subvesiculosus, duodecim paribus.

Polynoe impatiens. Sav. Mss et fig. (* Syst. p. 24. et Descript. de l'Égypte. Annel. pl. 3. fig. 2.)

* *Eumolpe impatiens*. De Blainv. op. cit. pl. 10. fig. 1.

Habite le golfe de Suez.

6. Polynoé très soyeuse. *Polynoe setosissima*.

P. oblonga, posticè angustior; capite lateribus turgido; setis longis, albo-auratis.]

Polynoe setosissima. Sav. Mss. (* Syst. p. 25.)

* *Eumolpe setosissima*. De Blainv. op. cit. p. 459.

* *Polynoe setosissima*. Aud. et Edw. op. cit. p. 426.

Habite... Sa couleur générale est d'un gris fauve avec des reflets de nacre.

trémité, et souvent garnie de points saillans ou de petits tentacules. Dans les unes, les mâchoires sont au nombre de deux seulement, et dans les autres elles sont tout-à-fait nulles. On les divise en six genres, auxquels j'ajoute les *Spios* en appendice.

(a) Des mâchoires. Antennes courtes, de deux articles : l'impair nulle.

Lycoris.

Nephtys.

(b) Point de mâchoires. Antennes courtes, de deux articles : l'impair nulle.

Glycère.

Hésione.

Phyllodoce.

(c) Point de mâchoires. Antennes longues, composées de beaucoup d'articles. Une impaire.

Syllis.

(d) Appendice.

Il faut aussi ranger dans cette tribu les genres *Lysidice*, *Atciope*, *Myriane*, et *Goniade*. E.

LYCORIS. (Licoris.)

Trompe épaisse à la base, divisée en deux articles, chargée en dehors de points saillans et durs, sans tentacules à son orifice. Deux mâchoires cornées, dentelées, arquées en faux, avancées. Antennes extérieures plus grandes, plus épaisses : l'impair nulle. Les deux premières paires de manelons pédiformes changées en cirres tentaculaires.

Proboscis basi crassa, articulis binis divisa; extus punctis prominulis duris; orificio tentaculis nullis. Maxillæ duæ

corneæ, denticulatæ, falcatae, porrectæ. Antennæ exteriores majores, crassiores: impari nullâ. Mamillarum pediformium par primum secundumque in cirros tentaculares mutata.

OBSERVATIONS. — Les *Lycoris*, ainsi que les *Nephtys*, sont distinguées des autres Néréidées, parce qu'elles ont des mâchoires; et on ne peut confondre entre eux ces deux genres, les *Lycoris* n'ayant point de tentacules à l'orifice de la trompe, comme les *Nephtys*, et ayant quatre paires de cirres tentaculaires, dont les *Nephtys* sont dépourvues. Les yeux des *Lycoris* sont très distincts, latéraux; au nombre de quatre : deux de chaque côté. Trois languettes branchiales à chaque pied ou mamelon (1). La queue se termine par deux filets dans presque toutes. Ce genre est nombreux en espèces. Voici la citation de celles que M. de Savigny a observées.

[La plupart des auteurs ont conservé à ce genre le nom de *Néréide*. E.]

ESPÈCES.

1. *Lycoris lobulée. Lycoris lobulatâ.*

L. pallidè grisea; aciculis maxillisque nigris.

Lycoris lobulata, Sav. Mss. (* Syst. des Annelides. p. 30.)

* *Nereis lobulata*, De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 44. p. 430, et t. 57. p. 469.

* Audouin et Edwards. Ann. des Scienc. nat. t. 29. p. 213. pl. 15. fig. 7 et 8.

Habite les côtes de Nice. Le corps a 105-107 segments, selon l'âge et la taille des individus. Languettes branchiales égales en longueur.

2. *Lycoris podophylle. Lycoris podophyllâ.*

L. pallidè fulva; maxillis fuscis subdentatis; ligulis branchialibus inæqualibus: superiore longiore.

(1) Nous pensons que c'est à tort que M. Savigny considère ces appendices comme étant des branchies, car ils ne reçoivent que fort peu de vaisseaux sanguins, et c'est un lacis vasculaire situé vers la base des pieds qui nous paraît être le siège principal de la respiration. E.

ficio tentaculis biordinatis instructis. Maxilla inclausa, parva, cornuta, curva, parvulus. Antenna biarticulata, parva: impari nulla. Oculi vis distincti.

OSSEAVARIUM. — Les *Nephtys* n'ont point de cirres tentaculaires bien saillans, comme les *Etebrus*; ils en sont d'ailleurs bien distingués par la forme de leur trompe, et surtout parce que son orifice est muni de tentacules. N'ayant point d'antenne impaire, ils n'offrent que quatre antennes, les deux moyennes et les deux extérieures qui sont paires et à-peu-près égales. Les trois premières paires de pieds ou mammelons n'ont point de branchies; les autres en présentent, mais ces branchies ne consistent qu'en une seule languette attachée au sommet de chaque rame dorsale. Ces *Néptidées* ont la tête rétrécie, libre, le corps linéaire, à segments très nombreux.

ESPECE.

1. *Nephtys* de Homberg. *Nephtys Hombergii*.

Nephtys Hombergii. Sav. Mus. (Syst. des Annel. p. 34.)

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 203.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 483.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 257. pl. 17. fig. 1-6.

Habite les côtes de France, au Havre de Grèce. *Homberg*.

Corps trétraédre, formé de 125-131 segments, sillonnés des deux côtés en dessus. Soies jaunes, longues et fines; acicules noirs.

Une bandelette longitudinale et brillante sous le ventre.

GLYCERE. (*Glycera*.)

Trompe longue, cylindrique, subclaviforme; sans tentacules à son orifice. Point de mâchoires (1). Antenne im-

(1) Dans la plupart des espèces que nous avons cru devoir ranger dans ce genre, la trompe est armée de quatre mâchoires crochues, situées à égales distances entre elles. E.

paire nulle: les mitoyennes et les extérieures fort petites, divergentes, biarticulées (1). Point de cirres tentaculaires.

Proboscis longa, cylindrica, subclavata; orificio tentaculis destituto. Maxillæ nullæ. Antennæ impar nulla: intermediis externisque minimis, divaricatis, biarticulatis. Cirri tentaculares nulli.

OBSERVATIONS. — Les *Glycères*, ainsi que les *Néréidées* des trois genres qui suivent, n'ont point de mâchoires, ce qui les distingue des *Lycoris* et des *Nephtys*. Ce sont les seules de ces *Néréidées* sans mâchoires qui soient privées de cirres tentaculaires. Leurs yeux sont peu distincts. Leurs branchies consistent, pour chaque mamelon pédiforme, en deux languettes charnues, finement annelées, réunies par leur base (2). La trompe est d'un seul anneau.

ESPÈCE.

1. *Glycère* unicolore. *Glycera unicornis*.

Glycera unicornis. Sav. Mss. (* Syst. p. 37.)

Nephtys unisornis. Cuv. collect.

Habite.... Tête élevée en cône pointu. Corps cylindrique, linéaire, un peu renflé vers sa partie antérieure, à segments très nombreux et serrés. Couleur fauve-bronzée.

* Ajoutez : *Glycera Meckelii*. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. pl. 14. fig. 1-4. etc.

[Le genre *GONIADÉ* ressemble aux *Glycères* par la conformation générale du corps, mais s'en distingue par la structure des pieds et par quelques autres caractères. La tête est conique et porte à son sommet quatre antennes

(1) Rudimentaires et réunis en manière d'étoile, au sommet du cône formé par la tête; suivant M. de Blainville, elles manqueraient quelquefois. E.

(2) Ces appendices manquent quelquefois dans le *Glycère de Roux*, par exemple, voy. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 264, et t. 27. pl. 14. fig. 5-10. E.

rudimentaires ; la trompe est extrêmement longue et garnie près de sa base de deux plaques cornées, denticulées à son extrémité ; il existe aussi quelquefois deux petites mâchoires cornées. Il n'y a point de cirres tentaculaires. Enfin, les pieds sont composés de deux rames bien distinctes, qui sont d'autant plus éloignées entre elles, qu'on les examine plus loin de la tête ; tandis que chez les Glycères, ces organes sont uniramés.

Exemple :

Goniada véronaise. *Goniada emrita*.
Audouin et Edwards, Ann. des Sc. nat. 1. 39. p. 268. pl. 18.
fig. 1-4. H.

HÉSIONE. (Hésione.)

Trompe grosse, subconique, à deux anneaux ; ayant l'orifice circulaire dépourvu de tentacules. Point de mâchoires. Antenne impaire nulle : les moyennes et les extérieures égales. Huit paires de cirres tentaculaires. Tous les cirres longs, filiformes, rétractiles : les inférieurs néanmoins plus courts (* pieds uniramés ; point de branchies).

Proboscis crassa, subconica, annulis binis divisa ; orificio circulari tentaculis destituto. Maxillæ nullæ. Antenna impar nulla : intermediis externisque æqualibus. Cirri tentaculares paribus octo. Cirri omnes prælongi, filiformes, retractiles : inferioribus tamen brevioribus.

OBSERVATIONS. — Les Hésiones sont remarquables par leurs cirres longs, filiformes et rétractiles. Ceux qui constituent leurs cirres tentaculaires résultent des soies des quatre premières paires de mamelons pédiformes converties en longs cirres. Ces mamelons ne sont point propres à la locomotion. Le corps des Hésiones est plutôt oblong que linéaire, à segments peu nombreux, à tête rétuse, comme divisée par un sillon longitudinal. Les branchies ne sont point saillantes.

ESPÈCES.

1. Hésione éclatante. *Hesione splendida*.

H. cinereo-margaritacea, nitore varia; mamillarum setis apice lamellâ cultriformi mobilique auctis.

Hesione splendida. Sav. Mss. et fig. (* Syst. p. 40. Atlas. Annel. pl. 3. fig. 3.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 482. pl. 17. fig. 1.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 235. pl. 15. fig. 1-3.

Habite la Mer Rouge, M. Savigny, et se trouve à l'Ile-de-France, M. Mathieu. Corps un peu rétréci vers son extrémité antérieure, à environ 18 segmens apparens.

2. Hésione parée. *Hesione festiva*.

A. proboscide conica; mamillarum setis apice nudis subtruncatis.

Hesione festiva. Sav. Mss. (Syst. p. 40.)

Habite le golfe de Nice. M. Risso. Le corps a un peu moins de reflets que celui du précédent, et ses anneaux sont un peu plus allongés.

† Genre **ALCIOPE**. *Alciopa*.

Corps court, étroit et un peu aplati; tête très large, portant de chaque côté un renflement garni d'un point oculiforme; quatre antennes très courtes; point de mâchoires; quatre paires de cirres tentaculaires insérés près de la bouche; pieds uniramés, formés d'un gros tubercule sétifère, portant, en dessus et en dessous de grands cirres foliacés, et plus en dedans, en dessous comme en dessus un appendice branchial vésiculeux.

ALCIOPE DE REYNAUD. *Alciopa Reynaudii*.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 238. pl. 15. fig. 6-10. E.

PHYLLODOCÉE. (Phyllodoce.)

Trompe grosse, claviforme, ayant à son orifice une rangée de petits tentacules. Point de mâchoires. Antenne

impaire nulle (1); les moyennes et les extérieures courtes, subbiarticulées. Huit paires de cirres tentaculaires allongés, subulés, inégaux. Les autres cirres comprimés, veineux, foliiformes, non rétractiles (* pieds uniques; point de branchies.)

Proboscis crassa, claviformis; orificio tentaculis parvis, ordine unico. Maxilla nulla. Antenna impar nulla: intermediis vixternisque brevibus, subbiarticulatis. Cirri tentaculares elongati, subulati, inaequales: paribus octo. Cirri alii compressi, venosi, foliiformes, non retractiles.

OBSERVATIONS. — Les *Phyllodoce* sont singulières par les cirres de leur corps qui sont aplatis, minces, veines, semblables à des feuilles, et qui paraissent branchifères. Leurs yeux sont latéraux, mais les postérieurs sont peu apparents. Ces Néréidées ont le corps linéaire, à segmens très nombreux. Un seul acicule à chaque mamelon pédiforme.

Chez ces animaux, le sang n'est pas rouge comme chez les Annelides ordinaires, mais jaunâtre.

ESPECE.

1. *Phyllodoce lamelleuse. Phyllodoce laminosa.*

Phyllodoce laminosa. Sav. mss. (*Syst. p. 43.)

* *Nereiphylla laminosa.* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 466.

* *Phyllodoce lamellosa.* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 244. pl. 16. fig. 1-8.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 202.

Habite les côtes de Nice. Corps très long, presque cylindrique, de 325-338 segmens, brun avec des reflets pourpres et violets.

Ajoutez :

* *Nereiphylla Paretti.* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 466. pl. 13. fig. 1.

* *Phyllodoce clavigera.* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 248. pl. 16. fig. 9-13.

Etc.

(1) Ou très petite et placée sur le sommet de la tête.

[Le genre MYRIANE de M. Savigny (ou *Nereimyra* de M. de Blainville) paraît être très voisin des Phyllodocés, mais s'en distingue par la disposition des cirres qui sont filiformes à la rame ventrale et en lanières élargies vers le bout à la rame dorsale (Voyez Savigny, *Système*, p. 41; — De Blainville, *Dict. des Sc. nat.* t. 57, p. 468; — Audouin et Edwards, *Ann. des Sc. nat.* t. 29, p. 238.)

SYLLIS. (Syllis.)

Trompe médiocre, divisée en deux anneaux, à orifice sans tentacules, mais qui soutient une petite corne solide, avancée. Point de mâchoire. Trois antennes multiarticulées, moniliformes : les moyennes nulles. Deux paires de cirres tentaculaires et moniliformes. Les autres cirres ayant le supérieur moniliforme, plus long, et l'inférieur inarticulé, conique.

Proboscis mediocris, annulis binis divisa; orificio tentaculis privato corniculum solidum porrectum sustinente. Maxillæ nullæ. Antennæ tres, multiarticulatæ, moniliformes: intermediis nullis. Cirri tentaculares moniliformes paribus duobus. Aliorum cirrorum superiore longiore moniliformi; inferiore inarticulato, conico.

OBSERVATIONS. — Ce qu'il y a de bien remarquable dans les *Syllis*, c'est de voir tant de parties diverses moniliformes, puisque les trois antennes, les cirres tentaculaires, et, parmi les autres cirres du corps, le supérieur de chaque paire offrent tous une forme semblable. Le corps de ces Néréidées est composé de segmens très nombreux, à mamelons simples, n'ayant qu'un seul faisceau de soies, et qu'un seul acicule. Les yeux sont apparens, mais les branchies ne le sont point.

ESPÈCE.

1. *Syllis monilaire. Syllis monilaris.*

Syllis monilaris, Sav. Mus. et égypt. Zool. (Annal. pl. 4. fig. 3):

rangs, et qu'en outre le nombre de ces mâchoires est plus grand d'un côté que de l'autre. La trompe de ces annélides antennées est très courte, fendue longitudinalement, très ouverte, et n'a point de tentacules à son orifice. Les mâchoires qu'elle renferme sont calcaires ou cornées, articulées les unes au-dessus des autres, et ne sont ni en nombre égal des deux côtés, ni tout-à-fait semblables entre elles. Les deux rangées de ces mâchoires se rapprochent inférieurement, et dans chacune; les mâchoires diminuent de taille à mesure qu'elles sont plus voisines du sommet de la rangée. Une lèvre inférieure calcaire ou cornée et composée de deux pièces allongées et réunies, vient se joindre au support double des deux mâchoires les plus inférieures. Les yeux de ces animaux tantôt sont indistincts, et tantôt sont bien apparens, mais seulement au nombre de deux. Les branchies, lorsqu'elles se montrent, ne consistent qu'en un simple filet pectiné tout au plus d'un côté, et attaché à la base supérieure des rames dorsales. M. *Savigny* partage les Eunices en quatre genres, que l'on pourrait réduire à deux pour plus de simplicité. J'en vais néanmoins faire une exposition succincte, les divisant en deux tribus distinctes.

(1) Ceux qui ont sept mâchoires, et la tête libre, tout-à-fait découverte.

Léodice.

Lysidice.

(2) Ceux qui ont neuf mâchoires, et la tête cachée sous le premier segment.

Aglaure.

Ænone.

[Cette tribu est devenue plus nombreuse qu'elle ne l'était lors de la publication de l'ouvrage de Lamarck, et a été subdivisée en un plus grand nombre de genres, qu'on peut répartir en deux groupes de la manière suivante :

Eunicoides branchifères.

Antennes généralement très développées; des branchies pectinées.

Léodice ou Eunice.

Onuphis.

Diopatre.

Eunicoides abanches.

Point de branchies; antennes rudimentaires ou nulles.

Lysidice.

Lombrinière.

Aglaure.

Ænone.

[E.]

LÉODICE: (Leodice.)

Sept mâchoires : trois du côté droit, et quatre du côté gauche; les inférieures très simples. Cinq antennes filiformes, plus longues que la tête, inégales. La tête tout-à-fait découverte. Deux yeux très distincts.

Maxillæ septem : tres in ordine dextro, quatuor in sinistro; inferioribus simplicissimis. Antennæ quinque filiformes, inæquales, capite longiores. Caput penitus detectum. Oculi duo valde distincti.

OBSERVATIONS.—Les *Léodices* (ou *Eunices* proprement dites) ont la tête plus large que longue, libre, découverte, divisée par devant en deux ou quatre lobes. Leur corps est long, linéaire, presque cylindrique; à segmens courts et nombreux. Leurs branchies sont filiformes, pectinées d'un côté. Les yeux sont grands; l'antenne impaire est plus grande que les autres; les deux extérieures sont les moins longues. Ce genre paraît nombreux en espèces, et il y en a d'une longueur extraordinaire.

ESPÈCES.**1. Léodice gigantesque. *Leodice gigantea*.**

L. longissima, tereti-depressa; cirris tentacularibus duobus segmento primo brevioribus; capite quadrilobo.

* *Nereis aphroditois*. Pallas. Nov. Act. Petrop. t. 11. p. 229. pl. 5. fig. 1-7.

TOME V.

An terebella aphroditois? Gmel. p. 3114.

Eunice. Cuv. Règne anim. 2. p. 825.

Leodice gigantea. Sav. Mus. (* Syst. p. 49.)

* *Nereis gigantea*, Malmgren. Ditt. d'Hist. nat. t. 47. p. 426.

* *Nereidonta aphroditois*. Ephem. op. cit. t. 57. p. 476.

* *Eunice gigantea*. Cuv. Règne anim. t. 3. p. 200.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. Annélides. pl. 12. fig. 1.

Habite la mer des Indes. Longueur de quatre à six pieds et plus, formé de 448 segments. Cinq antennes, non articulées, de double plus longues que la tête. Branchies nulles aux quatre premières paires de mamelons, pectinées à toutes les autres, ayant des filets serrés et nombreux : elles se simplifient vers la queue. Couleur gris-rouge avec des reflets d'opale.

2. Léodice antennée. *Leodice antennata*.

L. Macrochaeta; aliois capta; corpore aliois nigro, aliois albo;

Leodice antennata. Sav. Mus. et Egypt. Zool. (* pl. 5. fig. 2.)

* *Nereidonta antennata*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 476. pl. 15. fig. 1.

* *Leodice antennata*. Audouin. Dict. Class. d'Hist. nat. pl. 74.

* *Eunice antennata*. Cuv. Règne anim. t. 3. p. 200.

* Guérin. Iconog. Annel. pl. 5. fig. 1.

Habite le golfe de Suez. Ses antennes sont articulées. Le corps jusqu'à 119 segments, dont celui de la queue se termine par deux filets articulés. Les branchies sont pectinées d'un côté, n'ont que trois à sept filets ou dents, et se simplifient vers la queue. Elles manquent aux cinq à six premières paires de mamelons.

3. Léodice française. *Leodice gallica*.

L. grisea, margaritacea; antennae inarticulatis; branchiis anticis simplicibus, aliis bifidis, ad segmenta posteriora nullis.

Leodice gallica. Sav. Mus. (* Syst. p. 50.)

Habite les côtes de France. Corps formé de 71 segments, dont les cinq premiers, ni les dix-huit derniers n'ont point de branchies.

4. Léodice norvégienne. *Leodice norvegica*.

L. convexa, sublatra; antennae inarticulatis, branchiis pectinatis; cirris superioribus branchiis multo longioribus.

Nereis pennata. Moll. Zool. dan. 1. p. 30. tab. 29. fig. 1-3.

Nereis norvegica. Gmel. p. 3116. Encycl. pl. 56 fol. 5-7.

Leodice norvegica. Sav. Mus. (* Syst. p. 51.)

* *Nereidonta norvegica*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 476.

* *Eunice norvegica*. Audouin et Edwards. op. cit.

Habite les mers du nord. Son corps a 126 segments, et se termine par deux filets.

5. Léodice pinnée. *Leodice pinnata*.

L. convexa, rufa; antennis articulatis; branchiis pectinatis brevibus; cirris superioribus prælongis.

Nereis pinnata. Mull. Zool. Dan. 1. p. 31. tab. 29. fig. 4-7.

Encycl. pl. 56. fig. 1-4.

Leodice pinnata. Sav. Mss. (* Syst. p. 51.)

* *Nereidonta pinnata*. De Blainville. loc. cit.

* *Eunice pinnata*. Audouin et Edwards. loc. cit.

Habite les mers du Nord. Les deux filets de la queue sont courts et épais.

6. Léodice espagnole. *Leodice hispanica*.

L. gracilis, griseo-rubella; antennis inarticulatis; branchiis bi sensu trifidis; cirro superiore brevioribus.

Leodice hispanica. Sav. Mss. (* Syst. p. 51.)

* *Nereidonta Parreto?* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 476.

Habite les côtes d'Espagne.

7. Léodice opaline. *Leodice opalina*.

L. cinereo-cærulescens, nitore varia; antennis inarticulatis; branchiis anterioribus posticisque simplicibus: alius bifidis, trifidis e quadrifidis.

Leodice opalina. Sav. Mss. (* Syst. p. 51.)

Habite... celle-ci n'a point de cirres tentaculaires sur le côté, les précédentes en sont munies. Son corps un peu renflé près de la tête, a jusqu'à 285 segments. (* Cette espèce ne doit pas être distinguée de la suivante.)

8. Léodice sanguine. *Leodice sanguinea*.

L. branchiis pectinatis, versus medium corporis longioribus; segmentis posticis subnudis; caudâ bisetâ.

Nereis sanguinea. Act. Soc. Lin. vol. xi. p. 20. t. 3. fig. 1-3.

* *Nereidonta sanguinea*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 477. pl. 15. fig. 2.

* *Eunice sanguinea*. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 220.

Habite...

* Ajoutez :

Eunice Hersii. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 215 et t. 27. pl. 1. fig. 5, 6, 7, etc.

Eunice Bellii. Audouin et Edwards. op. cit. t. 28. p. 223 et t. 27. pl. 10. fig. 1-4.

Etc.

+ Genre **ONUPHIS**. *Onuphis*.

Corps grêle; tête petite, portant quatre antennes, dont deux moyennes très petites et deux externes longues et grosses; trois cirres tentaculaires antenniformes recouvrant la tête; mâchoires, pieds et branchies conformés de la même manière que dans le genre précédent.

Ces Annelides, qu'on croirait au premier abord pourvues de cinq grosses antennes annelées, vivent dans des tubes de consistance cornée et ont probablement été confondus avec les Spios.

ONUPHIS HERMITE. *Onuphis eremita*.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 226. pl. 10. fig. 1-5.

Etc.

+ Genre **DIOPATRE**. *Diopatra*.

Branchies formées par une frange contournée en spirale et simulant un pinceau très touffu. Appendices antenniformes au nombre de neuf, dont quatre assez courtes et cinq très grosses et très longues; mâchoires comme dans les genres précédents.

DIOPATRE D'AMBOINE. *Diopatra amboinensis*.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 229 et pl. 8. fig. 6-8.
E.

LYSIDICE. (Lysidice.)

Sept mâchoires : trois du côté droit et quatre du côté gauche; les inférieures très simples. Trois antennes cour-

tes, inégales, inarticulées : les deux extérieures nulles. Tête tout-à-fait découverte, à front arrondi. Deux yeux distincts. Point de cirres tentaculaires. Branchies inconnues.

Maxillæ septem : tres in ordine dextro ; quatuor in sinistro ; inferioribus simplicissimis. Antennæ tres breves, inæquales, inarticulatæ : exterioribus duabus nullis. Caput penitus detectum, fronte rotundatâ. Oculi duo distincti. Cirri tentaculares semper nulli. Branchiæ ignotæ.

OBSERVATIONS. — Ce n'est guère que par le nombre des antennes et par leurs branchies inconnues que les *Lysidices* sont distinguées des Léodices. Les unes et les autres ont le corps linéaire, cylindréc, à segmens très nombreux, et la tête libre, plus large que longue.

ESPÈCES.

1. *Lysidice valentine. Lysidice^e valentina.*

L. gracilis, margaritacea ; antennis subulatis ; oculis nigris.

Lysidice valentina. Sav. Mss. (Syst. p. 53.)

* *Nereidice valentina.* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 475.

* *Lysidice valentina.* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 236.

Habite les côtes de l'Espagne.

2. *Lysidice olympienne. Lysidice olympia.*

L. griseo-albida ; antennis subulatis ; corporis parte posticâ in caudam conicam et subnudam attenuatâ.

Lysidice olympia. Sav. Mss. (* Syst. p. 53.)

Habite les côtes de France. Un petit mamelon conique, derrière l'antenne impaire. Les 12 derniers anneaux du corps forment une queue conique, ciliée par deux rangs de pieds presque imperceptibles, et terminée par deux filets courts. Avant cette queue, l'on compte 55 segmens.

3. *Lysidice galathine. Lysidice galathina.*

L. lactea ; segmentis tribus primis aureo-rufis ; antennis brevissimis ovalibus.

* *Lysidice galathina.* Sav. Mss. (* Syst. p. 54.)

Habite les côtes de France. Corps plus épais que dans la précédente.
Un large mamelon derrière l'antenne impaire.

Ajoutez :

* *Lysidice Ninetia*. Audouin et Edwards. loc. cit. t. 28. p. 235, et t. 27. pl. 12. fig. 1-8.

* *Lysidice parthasapeia*. Dellechiaie Mem. sulla storia e geografia degli animali senza vertebre di Napoli. t. 3. p. 175. pl. 44. fig. 2-11.

+ Genre LOMBRINÈRE. *Lombrineria*.

Tête à découvert et en forme de mamelon unilobé. Huit mâchoires portées sur une double tige très courte; antennes nulles ou rudimentaires, et ayant la forme de deux petits tubercules. Pieds très petits; cirres gros et très courts. Point de branchies.

Ce genre établi par M. De Blainville, mais caractérisé par ce savant d'une manière qui ne nous paraît pas exacte, établit le passage entre les Lysidices et les Lombrics. La disposition des mâchoires est essentiellement la même que dans les genres précédens, seulement la mâchoire impaire manque. La lèvre cornée calcaire est également conformée de la même manière que chez les Lysidices.

LOMBRINÈRE D'ORBIGNY. *Lombrineria Orbignyi*.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. pl. 12 fig. 9-12, et t. 28. p. 240.

LOMBRINÈRE SCOLOPENDRE. *Lombrineria scolopendra*.

De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 5. p. 486. pl. 20 fig. 2.

Audouin et Edwards. loc. cit. p. 243.

Etc.

E.

AGLAURE. (*Aglaure*.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit et cinq du côté gauche; les inférieures fortement dentées. Trois antennes courtes, couvertes : les deux extérieures nulles. Tête cachée sous le premier segment; à front bilobé. Les yeux peu distincts. Branchies inconnues.

Maxillæ novem : quatuor in ordine dextro, quinque in sinistro, inferioribus exquisitè dentatis. Antennæ tres breves, obtectæ : exterioribus duabus nullis. Caput segmento antico occultatum : fronte bilobâ. Oculi vix distincti. Branchiæ ignotæ.

OBSERVATIONS. — L'*Aglaure*, ainsi que l'*OEnone*, est bien distinguée des annélides des deux genres précédens, parce qu'elle a neuf mâchoires, et que sa tête est cachée sous le premier segment du corps. Sauf les deux mâchoires terminales qui sont petites et en Y, toutes les autres mâchoires de l'*Aglaure* sont fortement dentées en scie au côté intérieur, et terminées par un crochet. Point de cirres tentaculaires.

ESPÈCE.

1. *Aglaure éclatante. Aglaura fulgida.*

Sav. Mss. et Eg. Zool. Annel. pl. 5 fig. 2.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 481.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 201.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28 p. 245.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Corps très long, convexe, composé de 253 segmens, et d'une couleur cendrée bleuâtre, à reflets d'opale, éclatans.

OENONE. (OEnone.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit, et cinq du côté gauche; les inférieures fortement dentées. Point d'antennes en saillie. Tête cachée et sous le premier segment, qui est grand et arrondi par devant. Les yeux peu distincts. Les branchies inconnues.

Maxillæ novem : quatuor in ordine dextro; quinque in sinistro; inferioribus valdè dentatis. Antennæ prominulæ nullæ. Caput segmento primo magno anticè rotundata occultatum. Oculi parùm distincti. Branchiæ ignotæ,

mitoyennes rapprochées, insérées sous l'antenne impaire; les deux extrêmes écartées. Branchies en forme de feuilles tripinnatifides, écartées de la base des rames supérieures. Un cirre surnuméraire aux rames supérieures des quatre ou cinq premières paires de pieds. Deux yeux distincts.

Proboscis...., antennae quinque subulatae, biarticulatae: intermediis infra antennam impariorem insertis; exterioribus duabus remotis. Branchiae folia tripinnatifida similes, à basi ramorum superiorum distantes. Cirrus ultra numerum ad ramos superiores pariorum primorum quatuor seu quinque pedum. Oculi duo distincti.

OBSERVATIONS. — Les *Chloés* se distinguent des *Pléiones* par la forme et la position de leurs branchies, et parce qu'elles ont aux rames supérieures des quatre ou cinq premières paires de pieds, un cirre surnuméraire petit, inséré sur l'extrémité de chaque rame dorsale. Les deux autres cirres sont longs. Les branchies sont sur les côtés du dos, près de la base supérieure des rames dorsales. Les deux filets de la queue sont cylindriques, épais, courts.

ESPÈCE.

1. *Chloe* chevelue. *Chloeia capillata*.

Aphrodita flava. Pall. Miscell. Zool. p. 98. tab. 8. fig. 7-11.

Amphinome capillata. Brug. Dict. n° 1.

Encyclop. pl. 60. fig. 1-5.

Cuvier. Règne anim. 2. p. 527.

* *Terebella flava*. Gmel. p. 3114.

* *Amphinome flava*. Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 71.

* *Chloeia capillata*. Savigny. Syst. p. 58.

* *Chloeia flava*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 452. pl. 7. fig. 1.

dans son intérieur une grosse masse charnue, presque foliacée, qui en occupe la moitié inférieure, et qui a été considérée par M. Savigny comme une langue ou une sorte de palais. E.

- * *Amphinome flava*. Ejusd. loc. cit. pl. 7. fig. 1.
 - * *Chloeia capillata*. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 194. pl. 9. fig. 11 et 12.
 - * Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annel. pl. 9. fig. 1.
- Habite la mer de l'Inde. Mus. n° . Belle et assez grande espèce, remarquable par ses longs faisceaux de soies d'un jaune brillant, et par ses branchies pourpres, tripinnatifides. Son corps, long d'environ quatre pouces, est aplati en dessous, un peu convexe sur le dos, d'une forme oblongue, se rétrécissant vers sa partie postérieure, et a 42 segmens.

PLÉIONE. (Pleione.)

Trompe pourvue d'un double palais saillant, ayant des plis dentelés. Cinq antennes biarticulées, subulées; les moyennes rapprochées et insérées sous l'impaire; les extérieures écartées. Branchies rameuses, subfasciculées, entourant la base supérieure des rames dorsales. Point de cirres surnuméraires. Quatre yeux; les deux postérieurs peu distincts.

Probosci palato duplici prominulo instructa; pliois serrulatis. Antennae quinque biarticulatae, subulatae; intermediis approximatis, infra imparem insertis; exterioribus remotis. Branchiae ramosae, subfasciculatae, remorum dorsaliunt basin superam cingentes. Cirri ultra numerum nulli. Oculi quatuor; posticis parum distinctis.

OBSERVATIONS. — Peut-être que, par son palais double ou bifide, la trompe des *Pléiones* est différente de celle de la *Chloë*; mais les *Pléiones* s'en distinguent au moins par la position et la forme de leurs branchies, et parce qu'elles n'ont point de cirres surnuméraires. Leurs cirres d'ailleurs sont inégaux, tandis que ceux de la *Chloë* sont presque semblables.

[La plupart des auteurs conservent à ce genre le nom d'*Amphinomes*. E.]

ESPÈCES.

1. Pléione tétraèdre. *Pleione tetraedra*.

Pl. elongata, quadrangularis, posticè attenuata; branchiis densi fasciculatis.

Aphrodita rostrata. Pall. Miscel. Zool. p. 106. tab. 8. fig. 14-18.

Amphinome tetraedra. Brug. Dict. n° 4.

Encyclop. pl. 61. fig. 1-5.

Terebella rostrata. Gmel.

* *Pleione tetraedra*. Savigny. Syst. des Annel. p. 60.

* *Amphinome tetraedra*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 45a.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 197.

Habite la mer des Indes. Mus. n°. Son corps a jusqu'à un pied de longueur; il est formé de 55 à 60 anneaux. Chaque pied a deux faisceaux de soies très inégaux.

2. Pléione caronculée. *Pleione carunculata*.

Pl. depresso-quadrangularis; pedum fasciculis gemellis subaequalibus; carunculâ lamellis divisâ.

* *Millepeda marina amboinensis*. Seba. Thés. t. 1. pl. 81. fig. 7.

Aphrodita carunculata. Pall. Miscel. Zool. p. 102. tab. 8. fig. 12-13.

Amphinome carunculata. Brug. Dict. n° 2.

Encycl. pl. 60. fig. 6-7.

Terebella carunculata. Gmel.

Pleione carunculata. Savigny. (*Syst. p. 61.)

Habite la mer des Indes.

3. Pléione éolienne. *Pleione eolides*.

Pl. depresso-quadrangularis; pedum fasciculis inaequalibus; carunculâ indivisâ.

Pleione eolides. Sav. Mss. (*Syst. p. 62.)

Habite.... Mus. n°. Elle est plus aplatie que la précédente. Sa caroncule est ovale-oblongue, lisse.

4. Pléione alcyonienne. *Pleione alcyonea*.

Pl. linearis, depressa, caeruleo-violacea; antennâ impari aliis brevior; carunculâ ovatâ.

Pleione alcyonea. Sav. Mss. et Egypte. Zool. (*Ann. pl. 2. fig. 3.)

* *Amphinome alcyonea*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. vers. pl. 7. fig. 2.

Habite le golfe de Suez. Petite espèce. Corps formé de soixante-sept segmens plus larges que longs. Faisceaux de soies de chaque pied inégaux.

5. Pléione aplatie. *Pleione complanata*.

Pl. compressa, utrinque attenuata.

Aphrodita complanata. Pall. Miscel. Zool. p. 109. tab. 8. fig. 19-26.

Amphinome complanata. Brug. Dict. n° 3.

Encycl. pl. 60. fig. 8-15.

Terebella complanata. Gmel.

* *Pleione complanata*. Savigny. Syst. p. 62.

Habite la mer des Antilles. Le *Nereis* de Brown (Jam. Hist. p. 395. tab. 39. fig. 1.) nous paraît différent de l'espèce décrite par Pallas.

* Ajoutez : *Pleione vagans*. Sav. Syst. p. 60; *Amphinome vagans*. Audouin et Edwards. Ann. t. 28. p. 196.

Etc.

EUPHROSINE. (Euphrosine.)

Trompe sans palais saillant et sans plis dentelés. Antennes extérieures et mitoyennes nulles; l'impair subulée. Branchies divisées en sept arbuscules rameux, situés derrière les pieds et s'étendant d'une rame à l'autre. Un cirre surnuméraire à toutes les rames supérieures. Deux yeux.

Proboscis palato prominulo plicisque denticulatis orbata. Antennæ exteriores intermediæque nullæ : impari subulatâ. Branchiæ in arbusculas septem ramosas divisæ, ponè pedes insertæ, spatium inter remos occupantes. Cirrus ultra numerum ad remos superiores. Oculi duo.

OBSERVATIONS. — Les *Euphrosines* constituent un genre éminemment caractérisé par les branchies de ces animaux : elles occupent un assez grand espace, s'étendent derrière les pieds d'une rame à l'autre, et consistent en sept arbuscules rameux, séparés, et alignés depuis les rames dorsales jusqu'aux rames ventrales. Ce genre est en outre remarquable en ce que l'animal n'a qu'une antenne, qui est l'impair; les deux mitoyennes et les deux extérieures manquant tout-à-fait. La tête des *Euphrosines* est étroite, rejetée en arrière, et garnie par dessus

d'une coronule déprimée, qui se prolonge jusqu'au quatrième ou cinquième segment. Le corps est oblong ou ovale-oblong, obtus aux deux bouts.

ESPECES.

1. Euphrosine laurifère. *Euphrosine laurcata*.

E. rubro-violaceo, ovato-oblonga, depressa; branchiis setis longioribus, ramosissimis, apice foliiferis.

Euphrosine laurcata. Sav. Mus. et Eg. Zool. Ann. pl. 2. fig. 1.

* De Blauville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 453. pl. 8. fig. 1.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 199.

* Guérin. Iconogr. Annel. pl. 4 bis. fig. 2.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 201.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Le corps est formé de 41 segments.

La coronule qui est au-dessus de la tête est ovale, et relevée sur son milieu d'une petite crête longitudinale.

2. Euphrosine myrtifère. *Euphrosine myrtosa*.

E. intense violacea, oblonga; branchiis setis brevioribus, parvis ramosis, foliiferis.

Euphrosine myrtosa. Sav. Mus. et Eg. Zool. Ann. pl. 1. fig. 1.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Espèce plus petite et à corps plus étroit que la précédente. Ce corps a 36 segments.

* Ajoutez :

Euphrosyna foliosa. Audouin et Edwards. loc. cit. t. 28. p. 202. pl. 9. fig. 1-4.

+ Genre HIPPONOE. *Hipponoa*.

Corps court; tête petite sans caroncule; cinq antennes. Pieds uniramés et pourvus seulement d'un cirre ventral. Branchies insérées derrière les pieds, et ayant la forme de houppes rameuses.

HIPPONOE DE GAUDICHAUD. *Hipponoa Gaudichaudii*.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 186. pl. 3. fig. 1-5, et t. 28. p. 202. — Guérin. Iconogr. Annel. pl. 4 bis. fig. 3.

E.

Les Annelidés dont on a formé les genres Périplate et Camptie doivent prendre place dans l'ordre que nous venons de passer en revue ; mais ne peuvent rentrer dans aucune des tribus adoptées par notre auteur.

† Genre **PERIPATE**. (*Peripates*.)

Corps presque cylindrique et composé d'un petit nombre d'anneaux, qui à leur tour sont subdivisés en plusieurs segments. Tête bien distincte, portant deux grosses antennes et une petite trompe armée de deux mâchoires ; pieds très gros, coniques, armés au sommet de quelques soies et dépourvus de cirres et d'autres appendices dermoïdes.

L'animal, d'après lequel ce genre a été établi par M. Lansdown-Guilding, a d'abord été pris pour un mollusque et a été considéré récemment comme appartenant à la classe des myriapodes, mais nous paraît devoir prendre place dans l'ordre des Annelidés mésobranches. A la base de chaque pied on voit une petite ouverture qui est probablement un orifice aquifère. Mais pour lever tous les doutes relatifs aux affinités naturelles des Périplates, il faudrait étudier anatomiquement leur structure intérieure.

On ne connaît qu'une seule espèce, le :

PERIPATE JULIFORME. *Peripatis juliformis*.

Lansdown-Guilding. Zoological journal. vol. 2. pl. 14. fig. 1. et Isis. t. 21. pl. 2. — Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 30. p. 413. pl. 22. fig. 5.

† Genre **CAMPTIE**. (*Camptia*.)

Corps cylindrique et composé d'un petit nombre d'articles. Tête bien distincte portant quatre yeux, deux antennes et deux mâchoires cornées. Deux gros tubercules pédiformes, rétractiles et garnis de grosses soies : trochets

épars, fixés sur le premier anneau postcéphalique : pénultième anneau, garni en dessus de deux faisceaux divergens de soies subulées ; dernier anneau portant deux gros tubercules pédiformes, garnis chacun d'un cercle de crochets.

Ce singulier animal a été découvert sur les côtes de l'Angleterre, par M. Johnston, et ne serait suivant M. Mac Leay qu'une larve de quelque insecte diptère, mais ayant eu l'occasion de l'observer à l'état vivant, dans la rade de Toulon, nous ne croyons pas devoir adopter cette opinion, et nous sommes portés à considérer ce genre comme établissant le passage entre les Néréidiens et certains Helminthes. L'espèce unique observée jusqu'ici a reçu le nom de

Campeptis cruciformis. Johnston. London's Magazine of natural history. vol. 8. p. 179. E.

ORDRE TROISIÈME.

ANNÉLIDES SÉDENTAIRES.

L'animal habite toujours dans un tube d'où il ne sort jamais entièrement, et n'a point d'yeux.

Branchies toujours à l'une des extrémités du corps ou près d'elle, à moins que le tube de l'animal ne soit ouvert d'un côté dans toute sa longueur.

Les *Annelides sédentaires* constituent un ordre remarquable et qui nous paraît naturel, parce que toutes sont constamment renfermées dans des tubes ou des tuyaux dont elles ne sortent point, qu'elles n'ont jamais d'yeux, et que toutes celles dont les tubes ne sont point ouverts longitudinalement d'un côté, ont toujours leurs branchies

à l'une des extrémités du corps , en général à l'antérieure. Ces animaux vivant continuellement dans des fourreaux ou dans des tubes d'où ils ne sortent point, et qui sont presque toujours fermés sur les côtés, il leur eût été fort difficile de respirer, si leurs branchies eussent été disposées dans la longueur de leur corps, comme dans presque toutes les Annelides vagantes, ou sur la partie moyenne de leur dos, comme dans l'*Arénicole*. Il a donc été nécessaire que les branchies des Annelides sédentaires fussent disposées, soit à la partie antérieure de leur corps, lorsque leur tube n'est ouvert qu'en cet endroit, ou qu'elles pussent l'être, au moins à leur partie postérieure lorsque leur tube est ouvert aux deux bouts. Aussi, cette nécessité cesse, lorsque le tuyau qui contient l'animal est ouvert d'un côté dans toute sa longueur, ce dont un seul genre offre l'exemple. Ceux qui étudient la nature, concevront que c'est la nécessité même dont je parle, qui a ici donné lieu à la disposition des branchies, et non un plan prémédité.

Les tubes ou tuyaux des *Annelides sédentaires*, presque toujours fixés sur les corps marins sont, les uns membraneux ou cornés, plus ou moins incrustés au dehors de grains de sable et de fragmens de coquilles, les autres solides, calcaires et homogènes. Leurs habitans sont des animaux allongés, vermiformes, à corps garni, sur les côtés, de faisceaux de soies subulées, en général fort courts, qui manquent aux premiers et derniers anneaux, et en outre de soies à crochets, qui servent à l'animal pour se mouvoir dans son tube, auquel il n'est point attaché.

[Cette division se compose non-seulement d'*Annelides* qui n'ont entre elles que fort peu de ressemblance, mais aussi de plusieurs genres qui n'appartiennent pas à cette classe, et qui doivent rentrer dans l'embranchement

M. Savigny place ce genre parmi ses Annélides serpulées ; il assure que l'animal a des soies à crochets ; et qu'il habite dans un tube. S'il en est ainsi, l'animal sort donc habituellement et souvent de son tube pour respirer ; ou bien, son tube est soit perméable à l'eau, soit fendu d'un côté comme celui de la Siliguaire.

[Ces Annélides, comme leur nom l'indique, vivent enfoncées dans le sable du rivage de la mer ; elles y creusent des cavités cylindriques très profondes qui communiquent ordinairement au dehors par les deux extrémités, et qui sont tapissées d'une légère couche de matière glissante, sécrétée par le corps de l'animal. La tête des Arénicoles n'est pas bien distincte, et ils n'ont ni antennes, ni yeux ni mâchoires, mais au-dessus de l'extrémité céphalique, on voit un petit caroncule rétractile qui paraît représenter la tête, et la bouche est garnie d'une petite trompe charnue dont la surface est hérissée de tubercules coniques. Enfin, les pieds sont formés de deux rames bien distinctes, dont l'inférieure est garnie de soies à crochets.]

E.

ESPECE.

1. Arénicole du pêcheur. *Arenicola piscatorum*.

Lumbricus marinus. Lin.

Nereis lumbricoides. Pall. Nov. act. Petrop. 2. t. 1. fig. 19-29.

Encycl. pl. 34. fig. 16.

Arenicola carbonaria, Leach.

* *Arenicola piscatorum*. Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 473, et Règne anim. t. 3. p. 198.

* Savigny. Syst. p. 96.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 447. pl. 6. fig. 1.

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 30. p. 420. pl. 22 fig. 8-12.

Habite en Europe, dans le sable des bords de la mer. Les pêcheurs en font des provisions, et s'en servent, comme d'appât, pour prendre le poisson.

† Genre CHÆTOPTÈRE. (*Chætopterus*.)

Point de tête distincte ; corps grêle et terminé antérieurement par une espèce de disque, portant en dessous une

bouche dépourvue de trompe et de mâchoires; deux appendices tentaculaires plus ou moins développés. Pieds de quatre sortes; ceux de la partie antérieure du corps fixés sur l'écusson céphalique et composés seulement d'une rame dorsale, ayant l'aspect d'un cornet membraneux au fond duquel sortirait un faisceau de soies; ceux de la seconde sorte ayant une rame dorsale assez analogue aux précédentes, mais pourvue aussi d'une rame ventrale, composée d'un lobe charnu qui souvent se confond avec celui du côté opposé, de façon à former à la face inférieure du corps, un tubercule ou bourrelet transversal impair. La rame dorsale de l'une de ces paires de pieds extrêmement développée, et formant de chaque côté du corps des espèces d'ailes. Pieds de la troisième sorte placés à la suite des précédents, ayant la rame ventrale disposée de même, mais ayant la rame dorsale remplacée par une grande membrane branchiale, froncée et réunie à son congénère, de façon à constituer sur le dos une espèce de sac vésiculaire impair; enfin, les pieds de la quatrième sorte, qui occupent toute la partie postérieure du corps, composés d'une rame dorsale semblable à celle des pieds de la première et de la seconde espèces, et d'une rame ventrale composée de deux tubercules charnus.

CHÉTOPTÈRE À PARCHMIN. *Chætopterus pergamentaceus*.

Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 208. — Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 30. p. 417. pl. 22. fig. 1-4. — Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annel. pl. 20. fig. 2.

CHÉTOPTÈRE NORWÉGIEUX. *Chætopterus norvegicus*.

Sars Beskrivelser og Jagttagelser. p. 54. pl. 11. fig. 29.

SILICUAIRE. (Siliquaria.)

Corps tubicolaire, inconnu.

Test tubuleux, irrégulièrement contourné, atténué

particulière; quelquefois en spirale à rebours, et souvent à tort en spirale intérieure payant plusieurs longitudes subarticulées, qui règne dans toute sa longueur.

Corpus tubicolare, ignotum.

Testa tubulosa, irregulariter contorta; posticè attenuata; ad basim interdum spirata, apice perola; fissurâ longitudinâli, subarticulâtâ, per totam longitudinem turrente.

OBSERVATIONS. — Les *Siliquaires* avaient été confondues avec les *Serpules* par Linné; ce fut Bruguière qui, le premier, les en sépara avec raison. Quoique l'on ne connaisse pas encore l'organisation de l'animal des *Siliquaires*, on ne saurait donc qu'il appartienne à la classe des *Annelides*, et qu'il soit sédentaire dans son tube. Mais peut-être aussi, les branches respiratoires, et le diaphragme, placés sur l'animal, dans son intérieur, comme l'animal paraît ne point quitter son tube, il a donc fallu que ce tube fût ouvert latéralement par une fente courante, pour qu'il pût respirer. Par la disposition de ses branchies, il appartient à l'ordre des *Annelides vagantes*; mais, d'après l'habitude que nous lui attribuons d'être sédentaire, nous le plaçons ici provisoirement. L'animal se déplaçant dans son tube, on y trouve quelquefois des cloisons transverses. Dans certaines espèces, la fente latérale est peu apparente, et laisse le genre presque indéterminé.

Les *Siliquaires*, distingués d'abord par Guettard, sous le nom de *Ténagode*, et considérés jusqu'à ces dernières années comme étant des *Annelides* fort voisins des *Serpules*, appartiennent à la classe des *Mollusques*, et doivent prendre place auprès des *Vermets*. D'après la conformation de leur coquille tubiforme, M. Savigny avait déjà émis des doutes sur la justesse de l'opinion généralement reçue à leur égard, et M. de Blainville a été plus loin, car il a reconnu que ces animaux devaient appartenir à la classe des *Mollusques gastéropodes*, détermination que les découvertes ultérieures ont pleinement confirmée. En effet, M. Audouin ayant eu l'occasion d'observer un de ces animaux, a constaté que leur mode d'organisation se rapproche beaucoup de celle propre aux *Vermets*. Le corps est de forme allongée et contournée en spirale sans qu'on puisse l'étendre en ligne droite;

antérieurement on voit un opercule très épais formé par l'empilement de lamelles cornées et fixé sur un pied musculaire qui présente supérieurement une sorte d'appendice très comprimé en arrière duquel s'élève une tête distincte, munie de deux petits tentacules légèrement renflés au sommet, et pourvus chacun à leur base d'un œil assez saillant. Immédiatement après la tête, on observe le manteau qui est fendu supérieurement dans toute sa longueur, jusqu'à la base du tortillon qui est bien distinct, et termine le corps. Le lobe droit du manteau est réduit à une frange très étroite, qui est bordée en dedans par un petit sillon étendu de la tête à la naissance du tortillon; le lobe gauche est beaucoup plus large dans toute son étendue. Les branchies n'existent que d'un seul côté, et consistent en filaments simples, fixés à la face interne du lobe gauche du manteau dans toute sa longueur. Enfin, le tortillon est assez court, et renferme le foie et les organes générateurs, lesquels se terminent à une petite échancrure qui se remarque sur le lobe gauche du manteau.

La coquille des Siliquaires diffère principalement du tube des Serpules par la fente qui se voit sur le bord de son ouverture, et qui se prolonge postérieurement en une gouttière percée de trous à travers lesquels l'eau nécessaire à la respiration arrive aux branchies situées au-dessous. La coupe transversale de cette coquille est parfaitement circulaire, et elle est contournée en spirale lâche et irrégulière, si ce n'est au sommet, où son enroulement est en général assez régulier. Enfin, dans l'état frais, on y trouve à l'extérieur une sorte d'épiderme, et ses parois sont fixés aux corps étrangers avec bien moins de force que chez la plupart des Serpules. (V. De Blainville Manuel de Malacologie. p. 432 et 653; et Dict. des Sc. nat. t. 49, p. 210; Audouin. Ann. des Sciences nat. 1829. Revue, p. 31, et Dict. classique d'hist. nat. t. 15. p. 428.) E.

ESPECES.

1. Siliquaire anguine. *Siliquaria anguina*.

Subtesta testis; testis, transversè striatè, longitudinalliter sulcatè; anfractibus baseos subcontiguis, spiram formantibus.

*S. testâ tubulosâ contortâ irregu
squamis fornicatis seriatim mu
Serpula muricata. Born. Mus. p.
Rumph. Mus. tab. 41. fig. H.*

* De Blainville, loc. cit.

* Deshayes, op. cit. t. 3. p. 952.

(B) *Var. violacea; costis pluribus
mis. Mus. n°*

Habite la mer des Indes. Son tuyau
spirale régulière : il est d'un blan
d'un violet rosé.

3. Siliquaire lisse. *Siliquaria lævi*,

S. testâ tereti, obsolete costatâ, laxâ

An Martin. Conch. 1. tab. 2. fig. 13

* De Blainville, op. cit. t. 49. p. 213.

* Desmarest, loc. cit.

Habite... Mus. n° . Tuyau blanc

† a. 3. Siliquaire australe. *Siliqua*

S. testâ rectâ regulariter spirali, sub

longitudinaliter tenuissime sulcatâ

Quoy et Gaimard, Voyage de l'*Astro*

Habite la Nouvelle-Hollande.

4. Siliquaire tire-bouchon. *Siliqua*

S. testâ tereti, lævi, spiratâ - - -

* *Testâ -*

Mus. n°

Habite.... la mer de l'Inde? Voyage de Péron.

6. Siliquaire lisse. *Siliquaria lima*.

S. testâ tereti, per longitudinem multistriatâ, laxè contortâ; striis squamulis asperatis.

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 215.

* Deshayes. op. cit. p. 952.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet.

7. Siliquaire épineuse. *Siliquaria spinosa*.

S. testâ tereti, subcontortâ, echinatâ; costis longitudinalibus, squamato-spinosis.

Faujas. Géologie. vol. 1. pl. 3. fig. 6.

* Deshayes. cit.

* *Agatirre furoelle*. Denis de Montfort. Conch. Syst. p. 399.

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 216.

Mus. n°

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. Par sa fente latérale souvent peu apparente, on la confond avec la Serpule hérissée. Elle est plus ou moins cloisonnée à l'intérieur.

* Ajoutez :

* *S. squammata*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 213.

* *S. polygona*. Ejuds. loc. cit.

* *S. rosea*. Ejusd. loc. cit.

* *S. florina*. DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 216. Fossile du Calcaire grossier de Néhou, département de la Manche.

Etc.

LES MALDANIES.

Branchies indéterminées, supposées à la partie postérieure du corps. Le tube de l'animal ouvert aux deux bouts.

M. Savigny ne rapporte qu'un genre à sa division des *Maldanies*, celui de la Clymène, et j'y en ajoute un autre, celui des Dentaies, quoique l'animal en soit moins connu. Les *Maldanies* ne sont pas moins singulières que les *Dorsalées*; mais elles le sont sous d'autres rapports. En effet,

comme dans la plupart des Annelides sédentaires, les branchies sont situées à la partie antérieure du corps de l'animal; on les y a cherchées en vain dans les Clymènes, et M. Savigny en a conclu qu'elles n'en avaient point. En réfléchissant à cette singularité de la Clymène, je portai aussi mon attention sur une autre, savoir : que le tube ou fourreau qui contient l'animal est ouvert aux deux bouts; et bientôt je compris que la situation des branchies devait en être la cause. Alors, quoique l'animal de la Clymène ne me soit pas directement connu, et qu'à l'égard de celui des Dentales, mes notions soient encore vagues, je ne balançai pas à les rapprocher sous la considération de leur tube et sous celle de la disposition supposée de leurs branchies à l'extrémité postérieure de leur corps. Ce rapprochement paraîtra tout aussi singulier, qu'il en paraît celui des Siliquaires et de l'Arénicole.

[Ce rapprochement est en effet tout aussi peu fondé, car les Clymènes sont des Annelides qui établissent le passage entre les Arénicoles et les Lombrics, tandis que les Dentales sont des Mollusques.

CLYMÈNE. (Climene.)

Corps tubiculaire, grêle, cylindrique, ayant de chaque côté une rangée de mamelons sétifères.

Extrémité antérieure rétuse, oblique, ayant un rebord demi-circulaire qui s'avance au-dessus de la bouche. Celle-ci traverse, plissée, bilabée; à lèvre inférieure très renflée. Point de tentacules.

Extrémité postérieure dilatée, formant un entonnoir, à limbe découpé formant plusieurs petites dents égales et pointues; à intérieur muni de rayons élevés (les branchies?) qui se prolongent jusqu'à l'anus. Celui-ci situé au fond de l'entonnoir et entouré de papilles charnues.

Tube grêle, ouvert aux deux bouts, et incrusté au dehors de grains de sable et de fragmens de coquilles.

Corpus tubicolare, gracile, cylindricum; utroque latere mamillis setiferis universalibus.

Extremitas anterior retusa, obliqua; margine semi-circulari os obumbrante. Os transversum, plicatum, bilabiatum: labio inferiore turgidissimo. Tentaculata nulla.

Posterior extremitas dilatata, orbiculata expansa, infundibulum simulans: limbo dentibus pluribus aequalibus acutisque fesso; intus radiis (branchiae?) elevatis ad anum usque porrectis. Anus fundum infundibuli occupans, papillis carnosus circumvallatus.

Tubulus gracilis, utroque extremitate pervius, extus arenulis fragmentisque conchyliorum incrustatus.

OBSERVATIONS. — En nous faisant connaître le genre singulier des *Clymènes*, M. Savigny nous a éclairé sur un mode particulier auquel on ne pouvait point à l'égard des Annelides. J'aperçois maintenant ce que peut, ce que doit être l'animal des Dentales. M. Savigny ayant cherché sans succès des branchies à l'extrémité antérieure des *Clymènes*, en a conclu qu'elles en manquaient, comme si cela était possible. Si nous ne connaissions point les *Doris*, peut-être aurions-nous quelque peine à croire que les branchies puissent être transportées autour de l'anus. Dans les Annelides toujours renfermées dans un tube qui n'est ouvert qu'à l'extrémité antérieure, il fallait bien que les branchies de l'animal fussent placées à cette extrémité de son corps ou auprès; mais ce n'est assurément pas sans raison que le tube des *Clymènes* est ouvert aux deux bouts, et l'appareil de l'entonnoir qui environne l'anus, indique assez que c'est là que sont situées les branchies.

Le corps des *Clymènes* a les segmens de sa partie moyenne plus longs que ceux qui sont vers ses extrémités. Ses mamelons latéraux sont transverses, portant chacun un petit faisceau de poils: les, et après les trois paires antérieures, ils ont en outre des soies à trachète.

LIMBES.

1. Clymène amphistome. *Clymens amphistoma*.

Sav. Mém. Mus. (* Syst. des Annel. p. 93. et Atlas de l'ouv. sur l'Égypte. Annel. pl. 1. fig. 1.)

* De Blainville. Dict. des sc. nat. t. 57. p. 445. pl. 6. fig. 2.

* Cuv. Règne anim. t. 3. p. 212.

Habite sur les côtes de la mer Rouge, dans les crevasses des rochers. Les petits tubes qu'elle se forme sont caducés, et ouverts aux deux bouts pour le passage de l'extrémité antérieure et pour celui de l'entonoir.

* Etc.

DENTALE (Dentidium)

Corps tubiculaire, très confusément connu, ayant son extrémité antérieure exsertile en un bouton conique, entouré d'une membrane en anneau. Bouche terminale.

Extrémité postérieure dilatée, évasée orbiculairement : à limbe divisé en cinq lobes égaux.

Tube testacé, presque régulier, légèrement arqué, atténué insensiblement vers son extrémité postérieure, et ouvert aux deux bouts.

Corpus tubicolare, obscure notum : extremitate antica in gammam conicam exsertili, membranâ annulari circumdatâ. Os terminale, nudum.

Extremitas posterior dilatata, orbiculatim patula : limbo lobis quinque æqualibus diviso.

Tubus testaceus, subregularis, leviter arcuatus, versùs extremitatem posticam sensim attenuatus, utràque extremitate pervius.

OBSERVATIONS. — D'Argenville ne nous a donné que des notions très imparfaites de l'animal des *Dentales*, dont il figure les extrémités dans sa Zoomorphose. Selon les observations communiquées par M. Fleuriau de Belle-Vue, l'animal des

Déntales approche beaucoup, par sa forme, des Amphitrites et des Sabellaires; il a, de chaque côté du corps, une rangée de petits faisceaux à deux soies; mais il n'a point les panaches branchiaux des Amphitrites, ni les paillettes en peigne des Sabellaires. Si l'on s'en rapporte à l'épanouissement en rosette de la partie postérieure de l'animal des Déntales, selon D'Argenville, cette rosette est un entonnoir fort analogue à celui des Clymènes de M. Savigny. Ce serait au fond de cet entonnoir que se trouverait l'anús, et probablement les branchies l'entoureraient. En attendant que cet animal soit mieux connu, nous continuerons de le rapporter aux Annelides; nous croyons même qu'il doit avoisiner les Clymènes par ses rapports.

Les Déntales sont assez nombreuses en espèces, d'après les différens tubes de ces animaux que l'on voit dans les collections, on en connaît aussi plusieurs dans l'état fossile.

[Tant que l'on ne connaissait que le tube calcaire des Déntales, on ne pouvait déterminer avec précision la place qu'elles doivent occuper dans une méthode naturelle, et la plupart des auteurs les rapprochaient des Serpules, tandis que quelques autres les plaçaient auprès des Patelles; mais aujourd'hui que l'animal lui-même a été décrit avec soin, tant sous le rapport des formes extérieures que relativement à son organisation intérieure, il ne peut rester aucun doute concernant les affinités naturelles de ces êtres, et on voit que ce ne sont pas des Annelides, mais bien des Mollusques gastéropodes, ainsi que l'a démontré M. Deshayes dans une Monographie du genre Dentale, publiée il y a quelques années dans le 2^e volume des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, et reproduite en majeure partie dans l'Encyclopédie méthodique. (vers. t. 2.)

Ces animaux ont le corps allongé, conique, tronqué antérieurement, et enveloppé d'un manteau terminé antérieurement par un bourrelet sphinctéroïde, frangé ou plissé; le pied, antérieur, proboscidiforme, terminé par un appendice conique reçu dans une sorte de calice à bords festonnés; la tête distincte et pédiculée; les lèvres munies de tentacules; point d'yeux ni de tentacules oculifères; les branchies cirreuses disposées en deux paquets cervicaux, symétriques; une paire de mâchoires latérales cornées, ovales, fendues; l'anús terminal, médian et logé

dans une sorte de pavillon infundibuliforme postérieur, pouvant sortir de la coquille.

Suivant MM. Deshayes et de Blainville, les Dentales doivent prendre place auprès des Nucleobranches, et ce dernier naturaliste a établi, pour les recevoir, un ordre particulier dans la sous-classe des Paracéphalophores hermaphrodites, division qu'il désigne sous le nom de *Cirrhobranches*. (Voy. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 286, et Manuel de Malacologie.)

ESPECES.

(a) *Faber à bords de coque longitudinaux*

2. *Dentale éléphantine* *Dentalium elephantiuum*

D. testé décomposé, subquadré, strié.

Linn. Syst. nat. p. 1262. Gmel. p. 3738.

D'Argenv. Conch. t. 3. fig. II, et Zoomorph. t. 2. fig. II.

Martin. Conch. 1. t. 1. f. 4 A. et 5 A.

(b) *Idem ? testé fossile, subduodécim costé; costis sex majoribus.*

Habite les mers de l'Inde et l'Europe. C'est l'une des plus grandes de genre; elle est verdâtre, nuancée de brun, l'éclatant vers point tronquée. On la trouve fossile en Italie.

* Suivant M. Deshayes on aurait confondu ici deux espèces bien distinctes, savoir :

1° Le *D. elephantiuum*. (Testé duodécim costé, anguleux, subrecté, albid; costé minore unico inter alias.)

D. elaph. Linné. Gmel. Syst. nat. p. 3730, et *D. recan.* Gmel. p. 3738.

Lister. Synopsis. Conchyl. pl. 547. fig. 1.

D'Argenville. Lithol. pl. 3. fig. h. h. et Zoomorph. tab. 1. fig. h.

Bononi. Mus. Kriker. 1^{re} part. fig. 8.

Gualtieri. Index. test. tab. 10. fig. h.

Scilla Vasa Specul. tab. 18. fig. 6. (fossile.)

Brucchi. Conchil. Subap. p. 260. n° 1. ? (foss.)

Mercati. Metalle. vet. p. 302. fig. sup. (foss.)

Aldrovande. De Testacis. p. 283. n° 1.

Martini. Conchil. Cabin. t. 2. pl. 1. fig. 40.

Guettard. Mém. sur les arts et m. t. 2. pl. 69. fig. 7.

Petiver. Amboin. tab. 16. fig. 33.

Knorr. Diction des yeux. 1^{re} p. tab. 19. fig. 3.

Deshayes. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. t. 2. p. 347. pl. 17.
fig. 7.

2° Le *D. arcuatum* (testa albo-virescente, tereti, arcuata, decem costata, costis inferioribus, majoribus; striâ unicâ inter costas.

Linné. Gm. p. 3738. n. 16.

D. elephantium. Lamarck. n. 1.

Sowerby. Genera. n. 15. fig. 1.

Gualtieri. Ind. test. tab. 10 fig. G. 1.

Rumph. Mus. tab. 41. fig. 1.

Martini. Conchil. cab. tab. 1. fig. 5. A.

Deshayes. op. cit. p. 349. pl. 18. fig. 3, 4, 7 et 8.

2. Dentale corne de bouc. *Dentalium aprinum*.

D. testa subsulcata, decem duodecimque costata; striis transversis subnullis.

Martin. Conch. 1. tab. 1. fig. 5 B.

Lin. Conch. t. 647. f. 1. inferior.

An dentalium aprinum? Lin. Syst. nat. p. 1263. Gmel. n° 2.

* Brocchi. Conchil. Subap. p. 264. n° 10.

* Deshayes. op. cit. p. 351. pl. 16. fig. 18, 19.

(b) *Idem, testa albida*. Martin. Ibid. f. 4. B.

Habite la mer de l'Inde. Mus. n°. Elle est plus grêle, plus subulée que l'espèce n° 1. La var. B. se trouve fossile au Piémont.

* M. Deshayes considère le *D. striatulum* de Linné. (Syst. nat. p. 3738. n. 13) comme étant une variété de cette espèce.)

3. Dentale sillonnée. *Dentalium sulcatum*.

D. testa costis longitudinalibus subaequalibus duodecim ad quindecim sulcata.

* Deshayes. op. cit. p. 354. pl. 18. fig. 15.

Mus. n°.

Habite... Fossile de Grignon.

4. Dentale fasciée. *Dentalium fasciatum*.

D. testa griseâ seu fusco-cærulescente, obscurius fasciatâ; antica parte læviusculâ, posticâ, costatâ.

Dentalium fasciatum. Gmel. n° 10. Martin. Conch. 1. t. 1. f. 3. B.

Habite la mer de Sicile. Mus. n°. (* M. Deshayes a constaté que cette Dentale ne diffère pas spécifiquement de la *D. novemcostatum*, décrite ci-dessous n. 7.)

5. Dentale octogone. *Dentalium octogonum*.

D. testa albida subarcuatâ octogonâ: costis octonis.

* Deshayes. op. cit. p. 352. pl. 16. fig. 5 et 6.

Mon. n°.

Habite la mer de la Chine. Elle varie à intervalles des côtes adjacentes. Mon cabinet.

† 5. *a.* Dentale raccourcie. *Dentalium abbreviatum*.

D. testâ minutâ, abbreviatâ, subrectâ, extremitatibus recurvâ, apicibus angulatâ, crassâ; apertura rotundâ, rectâ, imperforatâ.

Deshayes. op. cit. p. 352. pl. 18. fig. 21 et 22.

Fossile des sables des environs de Sélestat.

† 5. *b.* Dentale variable. *Dentalium variabile*.

D. testâ tereti, subcylindricâ, albida, densâ; quinque ad octo costâ; striis obliquis interruptis.

* Deshayes. op. cit. p. 352. pl. 18. fig. 23.

Habite les mers de l'Inde ?

6. Dentale difforme. *Dentalium deformis*.

D. testâ transverse inaequaliter, subrectâ, costâ quinque subobliquis.

Mon cabinet.

Habite. . . Fossile des environs de la Sarthe. M. Minard. * M. Deshayes pense que ce fossile appartient au genre Serpule.

7. Dentale à neuf côtes. *Dentalium novemcostatum*

D. testâ parvâ, albido-viridâ, novem costâ, striis transversis subdecussatâ.

* Deshayes. op. cit. p. 356. pl. 16. fig. 11 et 12.

Mon cabinet.

Habite aux environs de la Rochelle. M. Flourien de Belle-Vue. L'animal a, de chaque côté, une rangée de sautoirs à deux anneaux courtes. (* Si cette observation est exacte, l'animal en question n'est pas une Dentale, mais une Annelide.)

8. Dentale sexangulaire. *Dentalium sexangulare*.

D. testâ duodecim costâ; costis sex eminentioribus; striis transversis minimis.

An *Dentalium sexangulum* ? Gmel. p. 3739.

Broc. foss. 2. p. 262 ?

* Knorr. Pétrif. t. 1. 2^e part. pl. J. a. fig. 5 F.

* *Dentalium elephantium*. Sowerby. Genera. n. 16. fig. 2.

* Deshayes. op. cit. p. 350. pl. 17. fig. 4. 5. 6.

Habite. . . Fossile d'Italie, du Plaisantin. Minard.

† 8. *a.* Dentale fossile. *Dentalium fossile*.

D. testâ vix arcuatâ, longitudinaliter striatâ; crebris striis regularibus, obtusis aequalibus.

Lin. Gm. p. 3738.

Brocchi. Conchil. Subap. p. 261.

Deshayes. op. cit. p. 355. pl. 17. fig. 12.

An *D. costatum*. Sowerby. Miner. Conchil. pl. 70. fig. 8.

Fossile des terrains subapennins des environs de Sienne.

† 8. *b.* Dentale de Boué. *Dentalium Bouei*.

D. testâ tereti subarcuatâ longitudinaliter tenuissimè striatâ, striis transversalibus decussatâ.

Deshayes. op. cit. p. 355. pl. 18. fig. 8.

An *D. interruptum*? Lin. Gmel. p. 3739.

An *D. decussatum*? Sowerby. Min. Conch. pl. 7 a. fig. 5.

Fossile des argiles bleues de Bade, près Vienne, en Autriche.

† 8. *c.* Dentale de Lesson. *Dentalium Lessoni*,

D. testâ subrectâ, tereti, albido-griseâ, octo ad decem costatâ, costis obtusis, depressis, ad aperturam evanescentibus.

Deshayes. op. cit. p. 357. pl. 16. fig. 13.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée.

† 8. *d.* Dentale à côtes aiguës. *Dentalium acuticosta*.

D. testâ tereti, subarcuatâ, subulatâ, duodecim ad sexdecim costatâ; costis tenuibus angustis, acutis, ad aperturam evanescentibus.

Deshayes. op. cit. p. 357. pl. 18. fig. 3.

D. striatum. Sowerby. Min. Conch. pl. 70. fig. 4.

Fossile de l'argile de Londres.

† 8. *e.* Dentale pseudo - sexagone. *Dentalium pseudo-sexagonum*.

D. testâ tereti, subulatâ, subarcuatâ, grisea, tenuè striatâ, extremitate posticâ sex angulatâ.

Deshayes. op. cit. p. 358. pl. 16. fig. 14, 15 et 16.

Patrie?

† 8. *f.* Dentale à stries nombreuses. *Dentalium multistriatum*.

D. testâ tereti, subrectâ, albidd, multistriatâ; striis tenuibus, confertissimis, aliquantisper seriatim submaculatis.

Deshayes. op. cit. p. 358. pl. 18. fig. 11.

An *D. fasciatum*? Lin. Gm. p. 3737.

Habite les mers de l'Inde?

... op. cit. p. 364.]
Habite. . . . Fossile d'Italie, d
M. Ménard. On la trouve vi
plus grande et à stries plus
D. striatum avec l'espèce suiv

† 9. a. Dentale grande taille. *D.*

*D. testa magnâ, tereti subarcuata,
fistis tenuibus; fissura postical.*
Deshayes. op. cit. p. 365. pl. 17. 1
Fossile de Grignon, confondue par

† 9. b. Dentale courte fente. *D.*

D. testâ tereti, subrectâ, posticâ obo-
decim ad undecim, obtusâ, an-
gustâ abbreviatâ.

Deshayes. op. cit. p. 366. pl. 17. fig
Fossile des environs d'Angers et des l

† 9. c. Dentale substriée. *Dentali.*

D. testâ tereti subrectâ, antice levigatâ
minutissimâ; rimâ abbreviatâ sub-

Deshayes. op. cit. p. 366. pl. 18. fig. 1
Dentalium fissura. Sowerby. Genera. n
Fossile des environs de Paris.

† 9. d. Dentale demi-triée. *Dentali.*

† 9. *c. Dentale coupée. Dentalium sectum.*

D. testá tereti, angustá, subrectá, albidá, subtranslucidá, postice tenuissimè striatá, obliquè sectá, rimá angustá in sectione.

Deshayes. op. cit. p. 367. pl. 18. fig. 12, 13, 14.

Paraît habiter les mers d'Asie.

10. *Dentale à petites côtes. Dentalium dentalis.*

D. testá tereti, subarcuatá, costellatá; costellis octodenis aut viginti alternis minoribus.

Dentalium dentalis. Linn. Born. Mus. t. 18. f. 13.

* Olivi Zoologia adriatica. p. 192. n. 3.

* Von Born. Mus. Cass. Vind. tab. 18. fig. 13.

* Deshayes. op. cit. p. 353. pl. 16. fig. 9 et 10.

(E) *Id?* costis majoribus planulatis.

* *Dent. attenuatum.* Say. Journ. of the Acad. of sc. of Philadelphia t. 4, p. 154. pl. 8. fig. 3.

Habite la Méditerranée. Mus. n°. La variété B. est fossile, et se trouve en Piémont, près d'Annone. (* Et dans le Maryland, aux Etats-Unis d'Amérique.)

11. *Dentale fausse-antale. Dentalium pseudo-antalis.*

D. testá tereti subarcuatá; anticè lævi; posticè costellis sulcatá.

* Deshayes. op. cit. p. 358. pl. 17. fig. 21.

Mus. n°.

Habite... Fossile de Grignon *des Faluns de la Touraine et de Bordeaux.

12. *Dentale radicule. Dentalium radicula.*

D. testá tereti, undatá, subarcuatá; striis longitudinalibus, crebris granulatis.

An dentalium radula? Gmel. n° 18.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. *(Suivant M. Deshayes ce fossile appartiendrait au genre Serpule. Voy. Mém. de la Soc. d'hist. nat. t. 2. p. 338.)

(b) *Tubes n'ayant ni côtés, ni stries longitudinales.*

13. *Dentale lisse. Dentalium entalis.*

D. testá tereti, subarcuatá, continuá, lævi.

Dentalium entalis. Lin. Syst. nat. 1263.

Bonap. rec. 1. f. 9.

D'Argenv. Conch. t. 3. fig. KK.

Gualt. Conch. t. 10. fig. E.

- * Olivi. Zool. Adriat. p. 191.
 - * Pennant. Brit. Zool. t. 5, pl. 9. fig. 154.
 - * Martini. Conchil. Cab. tab. 1. fig. 1.
 - * Brocchi. Conchil. Subap. p. 263.
 - * Scilla Vana Specul. tab. 15. et pl. 18. fig. 7-8.
 - * Sowerby. Miner. Conch. tab. 70. fig. 37.
 - * Burtin. Oryctol. des env. de Bruxelles. pl. 8. fig. T. fig. 5. et pl. 17. fig. O?
 - * Deshayes. op. cit. p. 359. pl. 15. fig. 7, et pl. 16. fig. 2.
 - (b) *Id.* ? *testâ fossili, maximâ*. Mus. n°.
- Habite l'Océan d'Europe et celui de l'Inde. La variété fossile se trouve à Dax et à Grignon, mais moins grande.

14. Dentale de Tarente. *Dentalium tarentinum*.

- D. testâ tereti, subarcuatâ, laevi; basi rubescente.*
 (B) *Id. testâ basi subtilissimè striatâ.*
 * *D. tarentinum*. Sowerby. Zool. journ. n. 4. p. 197.
 Habite le golfe de Tarente. Mon cabinet.
 * M. Deshayes a constaté que cette Dentale est une variété de l'espèce précédente.

15. Dentale cornée. *Dentalium corneum*.

- D. testâ tereti, subarcuatâ, cinerea, interruptâ, opacâ; aperturâ coarctatâ; tubi margine antico inflexo.*
Dentalium corneum. Lin. Gmel. n° 6.
 Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 523. t. 6. f. 6.
 * *D. incrassatum*. Sowerby. Min. Conch. pl. 79. fig. 3. 4.
 * *D. strangulatum*. Deshayes. op. cit. p. 372. pl. 16. fig. 28.
 Habite les mers d'Afrique. Mus. n°.

† 15. a. Dentale épaisse. *Dentalium crassum*.

- D. testâ arcuatâ, abbreviatâ, crassâ, septem costatâ; aperturâ, coarctatâ.*
 Deshayes. op. cit. p. 373. pl. 18. fig. 20.
 Fossile de la craie des environs de Mons.

16. Dentale noire. *Dentalium nigrum*.

- D. testâ tereti, subulatâ, regulariter arcuatâ, opacâ, nigricante; aperturâ patulâ; tubi margine antico recto.*
 Mus. n°.
 Habite... Du voyage de Péron. Très distincte de la précédente.
 * M. Deshayes pense que ce tube est un état de quelque larve de *Frigana*.

17. Dentale polie. *Dentalium politum*.

D. testá tereti, subarcuatá, continuá; striis annularibus confertissimis, tenuissimis.

Dentalium politum. Lin.

Gualt. tab. 10. fig. F.

Martini. Conch. t. 1. f. 3. A.

* Olivi. Zool. adriat. p. 192.

* Rumph. Mus. pl. 41. fig. 5.

* Deshayes. op. cit. p. 361. pl. 16. fig. 17.

Habite la mer de l'Inde. Mus. n^o. Voyage de Péron.

+ 17. a. Dentale de Dufresne. *Dentalium Dufresnii*.

D. testá tereti, arcuatá, lævigatá, continuá, acuminatá.

Deshayes. op. cit. p. 361. pl. 17. fig. 18.

Fossile de Marcigny en Bourgogne.

+ 17. b. Dentale translucide. *Dentalium translucidum*.

D. testá tereti subrectá, translucidá, hyaliná, glaberrimá, nitidá, subviridulá.

Deshayes. op. cit. p. 362. pl. 16. fig. 26.

Patrie inconnue.

+ 17. c. Dentale lactée. *Dentalium lacteum*.

D. testá tereti, subarcuatá, lævigatissimá, nitidissimá, albidá, lacted, subtranslucidá.

Deshayes. op. cit. p. 362. pl. 16. fig. 28.

Habite l'Inde.

+ 17. d. Dentale incertaine. *Dentalium incertum*.

D. testá tereti, angustá, subarcuatá; apice acutissimá, lævigatá nitidá.

Deshayes. op. cit. p. 362. pl. 17. fig. 17.

An *D. nitens*? Sowerby. Min. Conch. pl. 70. fig. 1, 2.

Fossile des environs de Bordeaux et de Paris.

+ 17. e. Dentale rougeâtre. *Dentalium rubescens*.

D. testá tereti; subarcuatá, translucidá, rubescente, lævigatá, acuminatá; extremitate intus sulco dorsali.

Deshayes. op. cit. p. 363. pl. 16. fig. 23 et 24.

Paraît habiter la Méditerranée,

LES AMPHITRITÉES.

Branchies connues, non séparées ni recouvertes par un opercule, et disposées à la partie antérieure du corps ou auprès.

Tube membraneux ou corné, plus ou moins arénacé.

Parmi les Annelides sédentaires, les *Amphitritées* constituent une famille déjà assez nombreuse en objets observés qui s'y rapportent. Linné n'en connut que quelques espèces dont il fit des *Sabella*, et Gmelin réunit celles dont il eut connaissance, dans son genre *Amphitrite*, en reproduisant quelques-unes des mêmes parmi ses *Sabella*.

Ces Annelides vivent toutes dans des tubes non solides, membraneux ou coriaces, plus ou moins incrustés à l'extérieur, de grains de sable et de fragmens de coquilles, et qui ne sont ouverts qu'à l'extrémité antérieure. Elles n'en sortent point entièrement, quoiqu'elles n'y soient pas attachées; leur extrémité postérieure étant très atténuée, il leur serait difficile d'y rentrer si elles en sortaient.

Les *Amphitritées* ont les branchies disposées à leur extrémité antérieure ou après, tantôt grandes et fort en saillie au-dessus de la bouche, tantôt courtes, dans le voisinage de la bouche, ou sur les côtés et plus bas qu'elle. Plusieurs ont des tentacules; aucune n'a d'yeux, ni de trompe, ni de mâchoires. Toutes les races sont munies sur les côtés de mamelons pédiformes, rétractiles, qui offrent des faisceaux de soies subulées; en outre elles ont des soies à crochets, qui sont aussi rétractiles: nous les divisons de la manière suivante:

(1) Branchies courtes, jamais avancées. Les tentacules, soit courts, soit nuls.

Pectinaire.

Sabellaire.

(1) Des branchies ou des tentacules d'une assez grande taille, s'avancant antérieurement, soit en aigrette, soit en panache flabelliforme.

Térébelle.

Amphitrite.

[Les Amphitritées et les Serpulées de Lamarck constituent la presque totalité de l'ordre des Tubicoles ou Annelides céphalobranches, dont les caractères sont indiqués page 512. E.]

PECTINAIRE. (Pectinaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atténué postérieurement, ayant de chaque côté une rangée de mamelons sétifères : les soies courtes, fasciculées.

Partie antérieure large, rétuse, oblique, offrant deux peignes de paillettes dorées, très brillantes, transverses. Bouche allongée, bilabiée, entourée de tentacules courts et nombreux. Quatre branchies en peigne, situées en dehors sur le second et le troisième segment du corps.

Le tube en cône renversé, membraneux ou papyracé, arénacé, non fixé.

Corpus tubicolare, subcylindricum, posticè attenuatum; papillis setiferis serie unicâ utrinque dispositis: setis fasciculatis brevibus.

Extremitas anterior lata, retusa, obliqua; pectinibus duobus paleaceis auratis, nitidissimis, transversis. Os elongatum, bilabiatum, tentaculis brevibus numerosis obvallatum. Branchiæ quatuor pectinatæ, ad corporis segmentum secundum tertiumque extant.

Tubus obversè conicus membranaceus aut chartaceus, arenosus, non affixus.

OBSERVATIONS. — Sous ce nom, j'ai établi dans mes leçons et cité dans l'extrait de mon Cours [p. 96] un genre particulier avec des animaux dont Pallas faisait des Néréides, Gmelin des

Sabellus, et *Müller* des *Amphitrites*; ces animaux offrent des caractères tout-à-fait singuliers, qui les séparent des genres que je viens de citer. (1)

Les *Pectinaires* ne sont sédentaires que parce que, comme les autres annélides de cet ordre, elles ne sortent point de leur fourreau; mais ce fourreau n'est point fixé, et si l'animal ne le déplace pas lui-même, il peut être déplacé par le mouvement des eaux. Il est incrusté de petits cailloux ou de grains de sable et quelquefois comme papyracé, mince et transparent.

Le corps des *Pectinaires* est allongé en cône inverse, et régulier comme le tube qu'il habite. Il est extrêmement remarquable par les deux peignes raides à paillettes dorées et très brillantes qui terminent son extrémité antérieure; une membrane demi circulaire, et en demi-voûte, s'avance au-dessus de la bouche. Plus bas, et en dehors, sont deux filets, un de chaque côté. Au-dessous, deux paires de branchies petites, pectinées, et un peu pendantes, sont attachées aux segmens antérieurs du corps. Outre les faisceaux de soies subulées qui sont sur les côtés du corps, il y a aussi des soies à crochets, disposées sur des lames transversales. (2)

ESPECES.

1. Pectinaire d'Europe. *Pectinaria belgica*.

P. tubo inversè conico, membranaceo, ex arenulis contexta, subterminali.

Nereis cyl. Belgica. Pall. Miscell. 9. p. 122. tab. 9. f. 3-8.

* *Ver à tuyau conique.* Dictionn. Journ. de phys. 1779. pl. 1. fig. 1-12.

Sabella granulata. Linn. Syst. nat. éd. 12. t. 1. p. 261. p. 1768.

Amphitrite auricoma. Mull. Zool. dan. p. 26. tab. 26.

(1) Ce genre a été nommé plus tard *Chrysodon* par M. Oken, *Cistena* par Leach, *Amphictène* par M. Savigny, et *Amphitrite*, par Cuvier, qui le réunit à tort au genre suivant.

(2) La rame ventrale de tous les pieds est garnie de ces soies à crochets.

Amphitrite n. 4. Brug. Dict. encycl. pl. 58. f. 10-25.

* Othon Fabricius, Fauna Gronl. p. 289.

* Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 521, et Règne animal, t. 3, p. 195.

* *Cistena Pallasii*. Leach, Euryc. brit. Sup. 1. p. 45a. pl. 26. fig. 8.

* *Amphictena auricoma*. Savigny. Syst. p. 89.

* *Pectinaria auricoma*. De Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 436.

* *Amphitrite auricoma*. Delle Chiaje. op. cit. t. 3. p. 88. fig. 5-7.

Habite les mers d'Europe.

2. Pectinaire de l'Inde. *Pectinaria capensis*.

P. tubo subcylindrico, tenui, diaphano, quinaunciali.

Nereis cyl. Capensis. Pall. Miscell. g. p. 118. tab. 9. f. 2. 2.

Amphitrite n. 5. Brug. Dict. encycl. pl. 58. f. 1-9.

* *Amphitrite capensis*. Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 76, et Règ. anim. t. 3. p. 195.

* *Amphictene capensis*. Savigny. Syst. p. 91.

* *Pectinaria capensis*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 437. pl. 342.

Habite les mers des grandes Indes.

Etc. M. Savigny en a observé une autre espèce dans la mer Rouge.

(**Amphictene aegyptiaca*. Sav. Syst. p. 90. Atlas de l'Egypte. Ann. pl. 1. fig. 4.).

SABELLAIRE. (Sabellaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atténué postérieurement, ayant de chaque côté des faisceaux de soies subulées, sur un seul rang, et en outre des soies spatulées, et des lames transverses bordées de soies à crochets.

Extrémité antérieure tronquée obliquement, elliptique, couronnée par six rangées de paillettes très brillantes, trois de chaque côté; les extérieures très ouvertes; les intérieures relevées, presque conniventes. Bouche en fente allongée, bilabée, située sur les paillettes intérieures. Branchies très petites, composées de plusieurs rangées de lamelles, dans le voisinage de la bouche.

Tubes nombreux, réunis en une masse commune, alvéolaire en dessus, et composée de grains de sable et de fragments de coquilles: à orifices des tubes évasés en godets.

Corpus tubicolare, subcylindricum, posticè attenuatum. utroque latere setis subulatis fasciculatis, serie unicâ ; præterea setis spatulatis lamellisque transversis, setis hamatis margine armatis.

Extremitas anterior obliquè truncata, elliptica, palcarum nitidissimarum seriebus senis coronata ; utrinque tribus ; externis patentissimis, internis erectis subconniventibus. Os in fissuram elongatum, bilabiatum, infra palcos interiores. Branchiæ minimæ propè os, lacinularum seriebus pluribus compositæ. Tentacula nulla.

Tubuli numerosi in massam communem supernè favosam aggregati, ex arenulis conchyliorumque fragmentis agglutinatis compositi : orificiis cyathi formibus.

OBSERVATIONS. — Trouvant ici des caractères très particuliers, non-seulement dans les masses sablonneuses qui résultent de la réunion des tubes de ces annélides, mais encore dans la couronne singulière de paillettes brillantes qui termine l'extrémité antérieure de ces animaux, j'en ai formé un genre particulier, sous le nom de *Sabellaire*, l'exposant chaque année dans mes leçons (*Extrait du Cours*, page 96). Dans un de ses Mémoires sur les Annelides, M. Savigny vient de présenter ce même genre, sous le nom d'*Amymona*, avec des détails intéressans sur l'animal. (1)

Les *Sabellaires* tiennent d'assez près aux pectinaires ; mais elles en sont bien distinguées par leur défaut de tentacules, par la forme et la position de leurs branchies, par leur couronne terminale plus composée et qui brille aussi de l'éclat de l'or, et parce que ces Annelides vivent en troupe, logée et fixée dans une masse de sable et de fragmens de coquilles agglutinés, le dessus de cette masse offrant presque l'apparence d'un gâteau d'abeilles. Par les exemplaires différens que je possède de ces tubes réunis, je vois qu'il en existe plusieurs espèces dont je ne citerai cependant que les deux suivantes.

(1) M. Savigny a substitué à ce nom celui de *Hermelle*.

ESPECES.

1. Sabellaire alvéolée. *Sabellaria alveolata*.

S. tubis angustis in massam depressam variè immersis remotiusculis ; orificiis cyathiformibus.

Tubularia arenosa anglica. Ellis. cor. '90. tab. 36.

Sabella alveolata. Lin. Syst. nat. 2. p. 1268.

Vers à tuyau. Réaum. Mém. de l'Acad., année 1711. p. 165.

Psamatote. Guettard. Mém. vol. 3. p. 69. pl. 69. f. 2.

• *Amphitrite alveolata.* Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 521, et Règne anim. t. 3. p. 195.

* *Hermella alveolata.* Savigny. Syst. p. 82.

* *Sabellaria alveolata.* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 435. pl. 4. fig. 1.

Habite l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

2. Sabellaire grands tubes. *Sabellaria crassissima*.

S. tubis longis crassis subparallelis contiguis : orificiis obsolete patulis.

Pennant. Zool. Brit. 4. pl. 92. f. 162.

Habite près de la Rochelle. Fleuriau de Belle-Vue. Mon cabinet.

Elle forme des masses plus épaisses et moins aplaties en dessus que la précédente.

Etc.

[Le genre SIPHONOSTOME de M. Otto, (*Siphostoma* Cuv. Blainv. etc.) se rapproche un peu des Sabellaires ou Her-
melles, et paraît établir un passage entre ces Annelides et
les Terricules. Le corps est garni de quatre rangées de
testicules pédiformes, peu saillans et ornés de soies sim-
ples, ou bien d'une seule soie à crochet; autrement il se
termine par deux lames garnies de soies, et par un paquet
de borbillons tentaculaires. Enfin de chaque côté de la
bouche se trouve un gros appendice qui paraît devoir être
considéré comme une branchie.

Le type de ce genre est le :

Siphonostome diplochaise, *Siphonostom adiplochaitus.* Otto. Méth. de

Habite les côtes de la Caroline.

* Ajoutez *Terebella medusa*. Savigny. Syst. p. 85. Atlas. pl. 1. fig. 3, et plusieurs espèces décrites par Montagu, dans le volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres.

[Le genre **TÉRÉBELLIDE** de M. Sars, se compose d'Annelides qui, avec l'organisation générale de Térébelles ordinaires, ont quatre branchies pectinées. Il a pour type le

Térébellides stroomii. Sars. Beskrivelse og iagttagelser. p. 48. pl. 11. fig. 31.

L'Annelide décrite par le même naturaliste sous le nom de *Sabella octocirrata* (op. cit. p. 51. pl. 13. fig. 32), me paraît devoir constituer un genre particulier intermédiaire entre les Térébelles et les Sabelles, qu'on pourrait appeler *Sabellide*; de même que chez les Sabelles, l'extrémité antérieure du corps est couronnée d'appendices garnis de barbillons; et un peu plus en arrière, il existe aussi quatre paires de branchies tentaculiformes. E.

AMPHITRITE. (Amphitrite.)

Corps tubiculaire, allongé; cylindracé, atténué postérieurement, à segmens nombreux, ayant une rangée de mamelons sétifères : des soies subulées en faisceaux, et des soies à crochets sur le bord d'une lame.

Deux branchies terminales, fort remarquables, partagées en digitations très grêles, disposées en éventail, formant quelquefois l'entonnoir ou s'étalant en disque. Deux filets courts, subulés, insérés à la base interne des branchies. Bouche subterminale, entre les branchies.

Tube allongé, cylindracé, s'amincissant vers sa base, membraneux ou coriace, nu en dehors dans la plupart.

Corpus tubicolare, elongatum, cylindraceum, posticè attenuatum, segmentis multis annulatum; utrinque millarum sectiferarum serie unicâ: setis subulatis in fasciculos digestis; aliis uncinatis ad marginem lamellæ.

Branchiæ duæ terminales, valdè spectabiles, digitationibus gracilissimis partitæ, flabellatæ, interdum infundibuliformes, aut in discum expansæ. Filamenta duo brevia, ad basim internam branchiarum affixa. Os subterminale, intrâ branchias.

Tubus elongatus, cylindraceus, posticè attenuatus membranaceus vel coriaceus, extûs in plurimis nudus.

OBSERVATIONS. — Il s'agit ici de véritables *Amphitrites*, de ces Annelides qui avoisinent les Serpules par leurs rapports, et qui sont si remarquables par les beaux panaches que leurs branchies, colorées et souvent plumeuses, forment à la partie antérieure de l'animal. Ces branchies sont amples, forment un double panache, dont les deux parties sont tantôt très distinctes et tantôt partiellement réunies ou connées. Elles servent à-la-fois pour la respiration et pour saisir les alimens.

Les *Amphitrites*, quoique non attachées dans leur tube, y sont sédentaires, s'y déplacent facilement, replient la partie postérieure de leur corps vers l'orifice du tube pour évacuer leurs excréments, et il est probable qu'elles n'en sortent pas entièrement, car il leur serait difficile d'y rentrer. Leur genre paraît nombreux en espèces, et même la plupart sont grandes et fort remarquables. On a donné récemment à ce beau genre, un nom qui me paraît inconvenable, celui de *Sabella*. Ces animaux n'ont rien de commun avec les caractères que Linné donne de son genre *Sabella*. Outre la nature de leur tube, ils diffèrent des Serpules en ce qu'ils n'ont point d'opercule entre les branchies.

[Dans les genres précédens les rames ventrales sont d'une seule sorte, et portent toutes des soies à crochets, tandis que chez ces Annelides, de même que chez les Serpules, ces rames sont de deux sortes; celles de la partie antérieure du corps sont garnies de soies à crochets, tandis que les suivantes ont des soies subulées, et que la rame dorsale de ces mêmes pieds (qui suivent la

huitième ou neuvième paire) ont des soies à crochets à la rame dorsale.

MM. Cuvier, Savigny, désignent ce genre sous le nom de **SABELLE**.

ESPÈCES.

1. Amphitrite éventail. *Amphitrite ventilabrum*.

A. stylis branchiarum tenuissimis; branchiis plumosis flabellatis; corpore subdepresso.

Corallina tubularia melitensis. Ellis. Corall. 92. tab. 34.

Bast. op. subs. 2. p. 77. tab. 9, fig. 1. A, B.

Sabella penicillus. Lin. Syst. nat. p. 1269.

Amphitrite pinceau. Brug. Dict. et Encycl. pl. 59.

* *Sabella ventilabrum*. Savigny. Syst. p. 81.

* Amphitrite Ventilabrum. De Blainville. Dict. des Sc. nat. vers. pl. 2. fig. 2.

Habite la Méditerranée.

2. Amphitrite pinceau. *Amphitrite penicillus*.

A. stylis branchiarum setaceis; branchiis pectinatis flabellatim radiatis; corpore teretiusculo.

Tubularia penicillus. Mull. Zool. dan. 3. p. 13. tab. 89. f. 1—2.

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. 438.

Amphitrite réniforme. Brug. Dict. no 7.

* *Sabella pavonia*. Savigny. Syst. p. 79.

Habite les mers du nord de l'Europe. Ses branchies s'épanouissent en queues de paon et paraissent panachées de blanc et de rouge.

3. Amphitrite splendide. *Amphitrite magnifica*.

A. stylis branchiarum brevibus crassis; branchiis orbiculatim expansis: cirris numerosissimis nudis albo rubroque variis.

Tubularia magnifica. Transact. Soc. Lin. 5. p. 228. tab. 9. f. 1.

Shaw. Miscell. vol. 12. tab. 450.

* *Sabella magnifica*. Savigny. Syst. p. 78.

Habite les îles de l'Amérique sur les côtes, dans les creux des rochers, à la Jamaïque. Très belle espèce, à corps presque nu, à tube cylindrique, onduleux, glabre.

4. Amphitrite vésiculeuse. *Amphitrite vesiculosa*.

A. branchiis pectinatis, crispis, subpatentibus; tubo squarroso.

Amphitrite vesiculosa. Transact. Soc. linn. XI. p. 19. tab. 5. f. 1.

Habite les côtes de l'Angleterre. Des débris de coquilles rendent le tube très raboteux.

5. Amphitrite spiribranche. *Amphitrite volutacornis*.

A. branchiis in rachide singulâ spiraliter convolutis, fimbriatis.

Amphitrite volutacornis. (* Montagu.) Act. Soc. lin. 7. p. 80. tab. 7. f. 10.

Habite l'Océan d'Europe, les côtes d'Angleterre.

6. Amphitrite entonnoir. *Amphitrite infundibulum*.

A. branchiis infundibulum margine radiatum formantibus; singulis in membranam semi-circularem limbo fimbriatam coadunatis; corpore tereti, subnudo.

Amphitrite infundibulum. Montag. Act. Soc. linn. IX. p. 109. tab. 8.

Habite les mers d'Angleterre.

* Ajoutez plusieurs espèces décrites par M. Savigny dans son *Système des Annelides*.

[M. De Blainville a établi, sous le nom de FABRICIE (*Fabriria*), une nouvelle division générique pour un petit Annelide imparfaitement connu par la description et la figure qu'en a donné Othon Fabricius. Cet animal a le corps composé d'une douzaine d'anneaux garnis de faisceaux de soies rétractiles, et sa tête, assez distincte, porte six appendices pinnés, disposés comme ceux des Amphitrites, et paraissent constituer les branchies.

ESP. FABRICIE STELLAIRE. *Tubularia fabricia*. Othon Fabricius, Fauna Groenlandica. p. 440. — *Fabricia stellaria*. Blainville. Diet. des Sc. nat. t. 37. p. 439. E.

LES SERPULÉES.

Branchies séparées ou recouvertes par un opercule.

Tube solide et calcaire.

Les *Serpulées* avoisinent sans doute les *Amphitritées* par leurs rapports; néanmoins, elles constituent une famille particulière très distincte. Elles ont aussi les branchies disposées à la partie antérieure de leur corps, formant le plus souvent de beaux panaches en avant et saillans au-

dessus de la bouche; mais ces panaches, divisés en deux corps, sont séparés par un opercule pédiculé, membraneux, se terminant en massue ou en entonnoir; ou, dans un genre particulier dont les animaux paraissent avoir des branchies plus courtes, la partie antérieure du corps est recouverte par un opercule solide qui cache ses parties, lorsque l'animal est retiré dans son tube.

Ces Annelides n'ont point de tentacules, point d'yeux, point de mâchoires; leur corps est garni sur les côtés de mamelons pédiformes, sétifères, et de soies à crochets rétractiles, comme toutes celles qui sont sédentaires. Le tube qu'elles habitent est toujours solide, calcaire, ouvert à son extrémité antérieure, et fixé sur les corps marins. Il est ordinairement irrégulièrement contourné, plus atténué vers sa base, et offre souvent quelques cloisons qui divisent postérieurement sa cavité intérieure, en quelques loges inégales. Nous rapportons à cette famille les genres *Spirorbe*, *Serpule*, *Vermilie*, *Galéolaire* et *Magile*.

[Les Magiles sont des Mollusques, et quant aux divisions qu'il convient d'établir parmi les véritables Serpulées, on ne sait presque rien de positif; car la structure de ces Annelides a été peu étudiée, et les caractères tirés de la forme de leur tube sont tout-à-fait insuffisants pour la distinction des genres. Dans bien des cas, il est même difficile de distinguer les espèces d'après ces derniers caractères, et il est probable que dans le nombre de celles décrites par les auteurs, il existe un grand nombre de doubles emplois. E.

SPIRORBE (Spirorbis.)

Corps tubiculaire, subcylindrique, atténué postérieurement. Six branchies pinnées, rétractiles, disposées en rayons à l'extrémité antérieure. Un opercule pédicellé, en plateau à son sommet, situé entre les branchies.

Tube testacé, contourné en spirale orbiculaire, discoïde, aplati et fixé en dessous.

Corpus tubicolare, subcylindricum, posticè attenuatum. Branchiæ sex pinnatæ, retractiles, radiatim expansæ ad extremitatem anticam. Operculum pedicellatum, apice pelatum, intrà branchias.

Tubus testaceus, in spiram orbicularem discoideam convolutus : infernâ superficie planulatâ et affixâ.

OBSERVATIONS. — Les *Spirorbes* sont sans doute très voisines des *Serpules* par leurs rapports ; mais, outre que les branchies de ces animaux présentent quelques particularités distinctives, leur tube formant constamment une spirale orbiculaire, discoïde comme celle des *Planorbes*, nous avons cru devoir les distinguer comme constituant un genre particulier.

Presque toutes les *Spirorbes* sont des *Annelides* extrêmement petites, que l'on trouve fixées sur les fucus, les coquillages et autres corps marins, souvent en grand nombre sur le même corps, mais toujours isolées. L'ouverture de leur tube est terminale, arrondie, quelquefois trigone. L'animal qui les habite est d'un rouge de sang.

[Les zoologistes s'accordent assez généralement à ne pas séparer génériquement ces *Annelides* des *Serpules*. Elles nous paraissent cependant devoir en être distinguées, car à en juger par le *S. nautiloïde*, la disposition et le nombre de leurs appendices tentaculiformes seraient très différentes de ce qui se voit chez les *Serpules* proprement dites. E.

ESPÈCES.

1. *Spirorbe nautiloïde. Spirorbis nautiloides.*

S. testâ discoideâ, subumbilicatâ; anfractibus suprâ rotundatis, levibus, subrugosis.

Serpula spirorbis. Lin. Syst. nat. p. 1265.

Mull. Zool. dan. 3. p. 8. tab. 86. f. 1-6.

List. Conch. p. 553. f. 5.

* *Serpula spirorbis.* Savigny. Syst. p. 74.

* *Spirorbis borealis.* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 50. p. 301. pl. 2. fig. 2.

Habite l'Océan, sur les fucus, etc. Mon cabinet.

2. Spirorbe transparente. *Spirorbis spirillum*.

S. testâ discoidéâ, pellucidâ; anfractibus brevibus nitidis laeviusculis.

Serpula spirillum. Lin. Syst. nat. p. 1264.

* Blainv. loc. cit.

Mus. n°.

Habite l'Océan, sur des sertulaires, etc.

3. Spirorbe carénée. *Spirorbis carinata*.

S. testâ discoidéâ; centro concavo; anfractibus carinatis.

Mus. n°.

* Blainv. loc. cit.

Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l'île King. Péron.

4. Spirorbe lamelleuse. *Spirorbis lamellosa*.

S. testâ discoidéâ, subumbilicatâ; anfractibus costis longitudinalibus lamellosis denticulatis, ad interstitia striatis.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l'île King. Péron.

5. Spirorbe tricostale. *Spirorbis tricostalis*.

S. testâ anfractibus subdiscoidéis; costis tribus rotundatis; aperturâ subrotundâ.

* Blainv. op. cit. p. 302.

Mus. n°.

Habite la Nouvelle-Hollande, au port du roi Georges. On en trouve une presque semblable, dans la Manche, près du Croisic. M. Mé-nard.

6. Spirorbe conoïde. *Spirorbis conoidea*.

S. testâ in discum conoideum contortâ; anfractibus contiguis: ultimo anticè disjuncto.

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 50. p. 303.

Habite... Fossile de Grignon. Mus. n°.

Etc. Voyez le *Spirorbis transversus*. Daud. rec. p. 48. f. 26. 27.

7. Spirorbe cornicule. *Spirorba corniculum*.

S. testâ exiguâ, in discum umbilicatum convolutâ, anfractibus tribus subrugosis.

Serpula corniculum, Goldfuss. op. cit. p. 242. pl. 71. f. 14.

Spirorbis spirilliformis. Munster. ap. Goldfuss. loc. cit.

Fossile du calcaire grossier des environs de Paris et des environs de Cassel.

Il me paraît assez probable que cette espèce n'est pas distincte de la précédente.

† 8. Spirorbe umbiliciforme. *Spirorba umbiliciformis*.

S. testâ sinistrorsum in discum umbilicatum regularem convolutâ, affixâ carinatâ; carinâ acutâ, orificio orbiculari.

Spirillum umbiliciforme. Munster. ap. Goldfuss.

Serpula umbiliciformis. Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. f. 7.

Fossile du Calcaire tertiaire de la Westphalie.

† 9. Spirorbe sinueux. *Spirorbis anfracta*.

S. testâ compressâ levi, in spiram planam convolutâ, anfractibus quinque vel sex.

Serpula anfracta. Goldfuss. op. cit. p. 242. pl. 71. fig. 13.

Fossile du grès vert de la Bavière orientale.

† 10. Spirorbe planorbiforme. *Spirorbis planorbiformis*.

S. testâ tetragonâ leviusculâ, in discum planum convolutâ, anfractibus contiguis, ultimo basi valde expanso, orificio disjuncto erecto.

Serpula planorbiformis. Goldfuss. op. cit. p. 231. pl. 68. fig. 12.

Fossile du calcaire jurassique de Streitberg.

† 11. Spirorbe aplatie. *Spirorbis complanata*.

S. testâ tenuissimâ levi in discum planum contortâ, anfractibus crebris omnibus contiguis.

Serpula complanata. Goldf. loc. cit. p. 227. pl. 67. fig. 10.

Spirorbis complanata. Munster. ap. Goldf. loc. cit.

Fossile du Lias des montagnes de Baireuth.

12. Spirorbe rotule. *Spirorbis rotula*.

S. testâ compressâ, postice sessili et in discum regularem planam convolutâ, anfractibus carinatis basi contiguis in latere sulcatis.

Serpula rotula. Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70. fig. 7.

Fossile du sable vert des environs de Ratisbonne.

13. Spirorbe subcarinée. *Spirorbis subcarinata*.

S. testâ subcompressâ levi convexâ subcarinatâ, in discum regularem umbilicatum convolutâ, anfractibus quibus.

Serpula subcarinata. Goldfuss. op. cit. p. 241. pl. 71. f. 9.

Fossile du terrain tertiaire de la Bavière orientale.

† 14. Spirorbe ammonie. *Spirorbis amonia*.

S. testâ tereti spiratâ, anfractibus tribus contiguâ sensim incrassatis; costis crassis distantibus.

Serpula ammonia. Goldf. op. cit. p. 225. pl. 67. fig. 2.

Fossile du calcaire de transition de l'Esfel.

† 15. Spirorbe omphalode. *Spirorbis omphalodes*.

S. testâ subcompressâ, spiratâ lævi, anfractibus tribus repente incrassatis, orificio recto ovali.

Serpula omphalodes. Goldfuss. loc. cit. pl. 67. fig. 3.

Même gisement.

† 16. Spirorbe valvulée. *Spirorbis valvata*.

S. testâ tereti spiratâ lævi; anfractibus binis repente incrassatis, orificio obliquo.

Serpula valvata. Goldfuss. op. cit. t. 1. p. 226. pl. 67. fig. 4.

Spirorb valvata. Munster. op. Goldfuss. loc. cit.

Fossile du calcaire concyléen des environs de Baireuth.

* M. DeFrance a décrit aussi d'une manière succincte plusieurs espèces fossiles, appartenant aux terrains tertiaires des environs de Paris; mais il n'en a pas donné de figures (Voyez le Dict. des Sc. nat. t. 50. p. 303).

SERPULE. (*Serpula*.)

Corps tubiculaire, allongé, un peu déprimé, atténué postérieurement; à segmens nombreux et étroits. De petits faisceaux de soies subulées sur un seul rang de chaque côté, et des soies à crochets.

Deux branchies terminales, en éventail, fendues profondément chacune en digitations très menues, pennacées ou plumeuses. (1) Bouche terminale, située entre les bran-

(1) Les barbules de ces filamens branchiaux sont garnis de cils vibratiles. E.

chies, et surmontée d'un opercule pédicellé, infundibuliforme ou en massue.

Tubes solides, calcaires, irrégulièrement contournés, groupés ou solitaires, fixés; à ouverture terminale, arrondie, très simple.

Corpus tubicolare; elongatum, depressiusculum, posticè attenuatum: segmentis numerosis angustis. Setarum subulatarum fasciculi perparvi serie unicâ utrinque præstant setisque uncinatis.

Branchiæ duæ terminales, flabellatæ digitationibus tenuissimis pennaceis aut plumosis profundè fissæ. Os intrâ branchias terminale, operculo pedicellato infundibuliformi aut clavato superatum.

Tubuli solidi, calcarii, irregulariter contorti, aggregati vel solitarii, affixi; aperturâ terminali rotundatâ, simplicissimâ.

OBSERVATIONS. — Linné et presque tous les naturalistes plaçaient les *Serpules* parmi les Mollusques testacés, parce que alors on attachait moins d'importance à l'organisation des animaux que nous ne le faisons actuellement, et que le véritable caractère des Mollusques n'était pas encore complètement déterminé.

Maintenant que l'animal des *Serpules* est bien connu, nous savons que c'est une véritable Annelide; que cette Annelide est même très voisine des *Amphitrites* par ses rapports, et qu'elle n'en diffère guère que parce que l'un des deux filets qui s'insèrent à la base interne des branchies se trouve ici transformé en un opercule, que l'animal emploie à fermer son tube lorsqu'il y fait rentrer toutes ses parties antérieures. Cet opercule, par conséquent, n'est point calcaire.

Les *Serpules* constituent un genre très nombreux et varié en espèces, dont la plupart sont abondantes dans les mers, même celles de l'Europe. Les tuyaux ou tubes de ces Annelides sont toujours solides, homogènes, calcaires, fixés sur les corps marins, tantôt seulement par leur extrémité postérieure, et tantôt semblent ramper sur ces corps, y étant attachés plus ou moins complètement par un de leurs côtés. Ces tuyaux, onvés ou tor-

tureux, sont toujours irrégulièrement contournés, ne forment jamais une spirale partout régulière, et on en voit souvent qui sont groupés, diversement mélangés ou entortillés ensemble; ils ne sont ouverts qu'à leur extrémité antérieure, et leur ouverture est toujours simple.

L'animal des Serpules est très contractile, a le sang rouge, et se nourrit d'animalcules aquatiques, qu'il saisit à l'aide de ses branchies. Son corps a une espèce de corselet, et des segments fort nombreux. Comme il se déplace dans son tube, sans en sortir entièrement, il y forme quelquefois des cloisons peu nombreuses et inégalement espacées. Les espèces sont difficiles à indiquer, parce qu'on n'a que très peu de figures passables. Outre cet embarras, n'observant que des tubes dans les collections, on est exposé à rapporter aux *Serpules* des animaux qui appartiennent à d'autres genres : les races à tube rampant, qui ont un opercule calcaire, sont dans ce cas.

[On ne sait presque rien sur la coïncidence qui existe probablement entre la forme des tubes construits par les Serpules et les différences spécifiques que ces animaux présentent; aussi plusieurs des espèces vivantes mentionnées ci-dessous et toutes les espèces fossiles décrites par les auteurs sont-elles caractérisées d'une manière très douteuse, et on trouvera certainement parmi elles un grand nombre de doubles emplois.

E.

ESPÈCES.

1. Serpule vermiculaire. *Serpula vermicularis*.

S. testis repente, tereti-subulata, curvata, non spirali, interdum subcarinata.

Serpula vermicularis. Lin. Syst. nat. p. 1267.

Tubus vermicularis. Ell. Corall. tab. 38, f. 2.

(b) *Serpula vermicularis*. Mull. Zool. dan. tab. 86, f. 7-9.

* Savigny. Syst. des Annelides. p. 73.

* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 48, p. 553. pl. 1. fig. 1.

Habite l'Océan d'Europe. Mus. n°. Mon cabinet.

2. Serpule fasciculaire. *Serpula fascicularis*.

S. testis teretibus, undato-erectis, in massam caespitosam fasciculatim aggregatis, transversè rugosis.

* De Blainville. op. cit. p. 554.

Mus. n°.

Habite... Les tubes sont assez longs, blancs, un peu teints de rose.

3. Serpule intestin. *Serpula intestinum*.

S. testis tereti, longâ, undato-tortâ, leviusculâ, modo serpente, modo ascendente.

* De Blainville. loc. cit.

Mus. n°.

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet.

4. Serpule boyau-de-mer. *Serpula contortuplicata*.

S. testis teretibus, transversim rugoso-striatis, repando-inflexis et contortuplicatis; carinis obsoletis.

Serpula contortuplicata. Lin.

Argenv. t. 4. fig. D.

Martin. Conch. 1. tab. 3. fig. 24. A.

* Ellis. Corall. p. 117. pl. 38. fig. 2.

* Savigny. Syst. p. 73.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. 553.

Habite la Méditerranée et l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

5. Serpule plicaire. *Serpula plicaria*.

S. testis teretibus, variè contortis, implicitè aggregatis; plicis transversis inæqualibus.

* De Blainville. op. cit. p. 554.

Mus. n°.

Habite l'Océan Indien. Sur le *Mytilus margaritiferus*. Lin. La Pin-tadine.

6. Serpule glomérulée. *Serpula glomerata*.

S. testis teretibus, decussato rugosis, contortis, glomeratis anticè leviusculis

Serpula glomerata. Lin. Syst. nat. p. 1266.

Gualt. Conch. tab. 10. fig. T.

Favann. Conch. pl. 6. fig. F. 1.

Martin. Conch. 1. tab. 3. fig. 23.

Bonan. recr. 1. tab. 1. fig. E.

* De Blainville. loc. cit.

(b) *Eadem testis subsolitarius, basi in spiram attenuatam desinentibus, anticè elongato-porrectis.*

Habite l'Océan Asiatique, à l'Île de France. Mus. n°. Elle offre beaucoup de variétés. La Serpule B doit peut-être constituer une espèce. Mon cab. (*Suivant M. de Blainville on confondrait sous ce nom deux espèces, et la variété b serait un tube de Vermet.

7. Serpule treillissée. *Serpula decussata*.

S. testâ decussatim striatâ longitudinaliter subrugosâ, contortâ, circulis pluribus obliquè incumbentibus; latere infero planulato.

Gualt. Conch. tab. 10. fig. Z.

Serpula decussata. Gmel. List. Conch. t. 547. fig. 4.

* De Blainville. op. cit. p. 555.

Habite l'Océan des Antilles. Mus. n°. Elle est d'un rouge-brun.

* M. de Blainville pense que cette espèce pourrait bien ne pas différer du *Fermetus gorceensis* d'Adanson.

8. Serpule étendue. *Serpula protensa*.

S. testâ tereti, solidâ, rectâ aut subflexuosâ, rugis transversis subplicatâ, versûs finem parim attenuatâ.

Rumph. Mus. t. 41. f. 3.

Martin. Conch. 1. t. 2. f. 12. A.

* De Blainv. loc. cit.

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 28. p. 567.

Habite les mers de l'Inde, de l'Amérique et dans la Méditerranée. On la trouve fossile en Italie. (* Plusieurs espèces paraissent avoir été confondues sous ce nom, et M. de Blainville s'est assuré que la figure de Rumph appartient à un Vermet.)

9. Serpule entonnoir. *Serpula infundibulum*.

S. testâ tereti, transversim striatâ, subcarinatâ, undato-repente vel in gyros contortâ, ex infundibulis pluribus sese recipientibus conflata.

Serpula infundibulum. Gmel. p. 3745.

(b) *Eadem? Minor; carinis subquinis exiguis interruptis.*

* De Blainville. loc. cit.

Habite la mer de l'Inde. Mon cab. La variété (b) vient de l'île King. Péron.

10. Serpule annelée. *Serpula annulata*.

S. testis teretibus, gracilibus, annulatim plicatis, porrecto-flexuosis, glomeratis.

* De Blainville. op. cit. p. 556.

Mus. n°.

Habite... Elle est blanche, et sa masse ressemble à un paquet de petits intestins allongés.

11. Serpule pain-de bougie. *Serpula cereolus*.

S. testâ tereti, multoties contortâ, gracillimâ; striis transversis minimis, punctato-asperulis.

Serpula cereolus. Gmel. Davila catal. 1. t. 4. fig. F.

Favan. Conch. tab. 6. fig. D.

* De Blainville. loc. cit.

Habite les côtes de l'Amérique. Mus. n°. Mon cab.

† 11. a. Serpule tournoyant. *Serpula circinnalis*.

S. testâ tereti læviusculâ, antice disjunctâ flexuosâ, postice in spiram planam discoideam contortâ, anfractibus multis.

Goldf. op. cit. p. 227. pl. 67. fig. 9.

Fossile du Lias des montagnes de Bamberg.

† 11. b. Serpule spirofinite. *Serpula spirolinites*.

S. testâ lævi, antice in arcum flexâ, postice in spiram planam contiguous convolutâ, lateribus planis, carinâ æquali continuâ.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de Baireuth.

† 11. c. Serpule spirographe. *Serpula spirographis*.

S. testâ lævi, postice in spiram discoideam convolutâ, antice elongatâ capitatâ.

Goldfuss. op. cit. p. 239. pl. 70. f. 17.

Fossile du sable-vert de la Westphalie.

† 11. d. Serpule rampant. *Serpula humulus*.

S. testâ subtetragonâ, transversim rugose substriatâ, postice in discum planum convolutâ anfractibus contiguis, antice disjunctâ flexuosâ.

Goldfuss. op. cit. p. 241. pl. 71. f. 10.

Fossile du terrain tertiaire de la Westphalie.

12. Serpule filograne. *Serpula filograna*.

S. testis capillaribus, fasciculatis : fasciculis glomeratis, cancellato-ramosis.

Serpula filograna. Lin. Syst. nat. p. 1265.

Planc. Conch. app. t. 19. fig. A. B.

Seba mus. 3. tab. 100. f. 8.

(b) *Glomi cæspitiformes; fasciculis tenuibus, apice divaricatis.*

* De Blainville. loc. cit.

Habite la Méditerranée. Mus. n°. La variété (b) vient des mers de la Nouv. Hollande, port du roi Georges. Péron.

* M. Berkley a formé avec cette espèce un genre particulier, qu'il désigne sous le nom de *Filogana*, et qu'il caractérise principale-

13. Serpule vermicelle.

*S. testis filiformibus, testis
sam crassam conge.*

Lipse. Adans Seneg. p.
Fav. t. 6. fig. B.

* *Parvulus vermicella.*

324.

(b) *Eadem ? Testis brevior*

* De Blainville. loc. cit.

Habite l'Océan Africain, à
t-il distinguer la serpul

14. Serpule filaire. *Serpul.*

*S. testis tenuissimis, filiformi-
bus transversis distantibus.*

* De Blainville. Dict. des Sa

Mus. no.

Habite les mers de la Nouv.

qu'elle couvre. Léron et L.

* Goldfuss a décrit sous le nom

" Fossilite de Gräfenberg, qu

celle dont il vient d'être qu

suivante :

S. testis filiformi laevi, postice in

flexuosa elongata sensim. in

pl. 80. 60

15. Serpule transparente. *Serpula pellucida*.

S. testá tereti, rugosá, pellucidá; in spiram irregularem contortá; anticè extremitate sursùm porrectá.

Mus. n°.

(b) *Eadem testá læviore; anfractibus irregulariter glomeratis.*

An serpula vitrea? Fabr. Faun. Groenl. p. 382.

* De Blainv. loc. cit.

Habite. . . . du voyage de Péron. La var. b. vient des mers de la Chine. L'ouverture est ronde, à bord non épaissi.

16. Serpule entortillée. *Serpula intorta*.

S. testá tereti-angulatá, subcostatá, in spiram deformem contortá, subglomeratá; plicis transversis crebris.

Mus. n°.

Habite. . . Fossile des environs de Plaisance. M. Cuvier, et se trouve en France, près de Dax. (* Paraît appartenir au genre Vermet.)

22. Serpule à crête. *Serpula cristata*.

S. testá tereti; costellis plurimis denticulatis; extremitate anticá subporrectá; posticá in spiram discoideam contortá.

(b) Var. *Costellis rarioribus, muticis.*

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. 564.

Habite. . . Fossile de Grignon. Mon cabinet.

23. Serpule spirulée. *Serpula spirulæa*.

S. testá compressá, læviusculá, subinæquali, in spiram discoideam margine acutam contortá; anticá extremitate disjunctá.

An Dautin? Adams: Seneg. p. 165. t. 11. f. 4. a. b.

* Goldfuss. Pétrif. t. 1. p. 241. pl. 71. fig. 8.

Habite. . . Fossile des environs de Bayonne et de Montbart. Mus. n°.
Mon cabinet.

* Devra probablement être rapportée au genre Vermet.

† 24. Serpule quadricarénée. *Serpula quadricarinata*.

S. testá quadrangulari transversim striatá, in spiram umbilicatam vertice affixam convolutá, antice disjunctá.

Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70. f. 8.

Fossile du sable vert de Ratisbonne.

† Serpule tétragone. *Serpula tetragona*.

S. testá serpentiná elongatá, quadrangulari; angulis præminentibus.

Sowerby. Mineral conchology. vol. 6. p. 203. pl. 599. fig. 2.

Fossile du calcaire du Bedfordshire, en Angleterre.

† 25. Serpule vertébrale. *Serpula vertebralis*.

S. testâ obtuse quadrangulâri, subtilissimè transversim striatâ, postice reflexâ antice libèrè rectâ angulisque nodosis; nodis verticillatis plus minusve crebris et regularibus.

Goldfuss, op. cit. p. 231. pl. 68. fig. 10.

Sowerby Mineral conchology, t. 6, p. 204. pl. 599. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace.

La *Serpula articulata* de Sowerby (loc. cit. pl. 399. fig. 4) est un fossile du sable vert supérieur, qui a la plus grande ressemblance avec l'espèce dont il vient d'être question.

† 26. Serpule à cinq crêtes. *Serpula quinque cristata*.

S. testâ acutè quinquangulâri antice disjunctâ, angulis cristosis crispis, lateribus binis planis cæteris canaliculatis, per intervalla dense transversim striatis.

Goldfuss, loc. cit. pl. 67. fig. 7.

Fossile du lias du Bamberg.

† 27. Serpule à cinq sillons. *Serpula quinque sulcata*.

S. testâ obtuse quinquangulâri lævi subtorquatâ antice disjunctâ.

Goldfuss, loc. cit. pl. 67. fig. 8.

Fossile du même terrain.

† 28. Serpule sexangulaire. *Serpula sexangularis*.

S. testâ sexangulâri, postice uncinatâ affixâ striis transversis confertis undulatis subtilissimis.

Goldfuss, op. cit. p. 238. pl. 71. fig. 12.

Fossile de la formation crétacée des environs de Munster.

† 29. Serpule subtorquatienne. *Serpula subtorquata*.

S. testâ obtuse quinquangulâri subtortili transversim et in longitudinem subtilissimè striatâ postice affixâ, antice non rectè disjunctâ subrectâ.

Goldfuss, op. cit. p. 238. pl. 71. fig. 11.

Même gisement.

30. Serpule quadrangulaire. *Serpula quadrangularis*.

S. testâ subcompressâ, quadrangulâri, basi spiratâ; anticâ extremitate rectiusculâ.

Cabinet de M. Ménerd.

* DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. 48.

Habite... Fossile des environs du Mans et de ceux du Pèze, en Normandie.

20. Serpule très petite. *Serpula minima*.

S. testis capillaribus, minimis, intricatis, in massam simplicem glomeratis.

An serpula intricata? Lin.

(b) *Eadem fossilis; massa exigua.*

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. 557.

Habite la Méditerranée, près de Civita Vecchia. M. Ménard.

La var. b. se trouve à Grignon.

21. Serpule hérissée. *Serpula echinata*.

S. testâ subtereti, repente, flexuosâ; costellis pluribus sulcatâ: dorsali eminentiore aculeato-muricatâ.

Serpula echinata. Gmel. Gualt. t. 10, fig. R.

Martin. Conch. 1. t. 2. f. 8.

* De Blainville. loc. cit.

(b) Var. *costellis crebris minimis subspinosis.*

(c) Var. *costellis distantibus.* Brocc. Conch. 2. t. 15. f. 24.

Habite la Méditerranée. Les variétés b. et c. sont fossiles. Une troisième variété, non fossile, se trouve au port d'Ancône. M. Ménard.

22. Serpule sillonnée. *Serpula sulcata*.

S. testâ tereti, infernè contortâ, subglomeratâ, anticè porrectâ; costellis longitudinalibus numerosis, subdentatis.

An Dofan? Adans. Seneg. p. 164. pl. 11. f. 3.

* De Blainville. loc. cit.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, etc. Se trouve fossile dans la Touraine.

23. Serpule costale. *Serpula costalis*.

S. testâ angulatâ, laxè contortâ, basi subspiratâ; costellis striisque longitudinalibus, inæqualibus, muticis.

* De Blainville. loc. cit.

Mus. n°.

Habite... Tubes solitaires.

24. Serpule dentifère. *Serpula dentifera*.

S. testâ tereti, contortâ; costellis longitudinalibus duabus tribusve dentiferis.

Mus. n°.

* *Vermis dentiferus.* Quoy et Gaim. Voyage de l'*Astr.* t. 3. p. 291. pl. 67. fig. 27 et 28.

TOME V.

(b) *Eadem testis majoribus, subulatis, Mus. n.*

(c) *Eadem, spiculis, testis obliquis, cancellatis.*

An serpula polythalamia? Broch.

(d) *Eadem? testis subangulatis, glomeratis. Mon. cabinet.*

Habite les mers de l'Asie australe. La variété (c) se trouve en Italie.

Cette espèce devient grande (*et appartient au genre *Magile*.)

25. Serpule niphon. *Serpula nipho.*

S. testis tereti, longis, undato-ventris, varicibus obsolete cancellatis; spiris bassis congestis, subis planulatis.

An Gualt. Conch. t. 10. fig. L?

Dargenv. Conch. t. 4. fig. H.

Masier. Adans. Seneg. pl. Yr. T. 3.

Habite l'Océan des Indes, à l'Inde. Mus. n. Elle varie beaucoup, et néanmoins je la crois distincte de la suivante.

26. Serpule grand-tube. *Serpula arenaria.*

S. testis anticis tereti, rectiusculis; posticis subangulatis, contorto-spiratis, subis planulatis.

Serpula arenaria. Lin. Syst. nat. p. 1266.

Gualt. Conch. t. 10. fig. N?

Bonan. Recr. 1. t. 20. fig. C.

Martin. Conch. 1. t. 3. fig. 19. B. C.

* *Formetus arenarius. Quoy et Gaimard. Voyage de l'Astrol. t. 3. p. 289. pl. 67. fig. 8-10.*

Habite la mer des Indes. Mus. n°. Elle offre aussi différentes variétés.

Etc. Voy. le *Terebella madroperarum*. Shaw. Miscell. 8. pl. 139, et le *Serpula gigantea* de Pallas, qui est peut-être un *Magile*. (* Cette dernière espèce observée par M. Savigny (Syst. p. 74) est une *Serpule* de la division des Cymospires, groupe que M. de Blainville élève au rang de genre. (Voyez Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 431.)

† 27. Serpule flasque. *Serpula flaccida.*

Serpula testis elongata filiformi laevi flaccida flexuosa.

Goldfuss. Petrefacta. p. 234. pl. 69. fig. 6.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace, de la Suisse, etc.

† 28. Serpule lisse. *Serpula laevis.*

S. testis subtereti reflexa, cristâ caudali angustissima.

Goldfuss. op. cit. p. 236. pl. 70. fig. 3.

Fossile du sable vert de la Westphalie.

† 29. Serpule amphisbène. *Serpula amphisbæna.*

S. testis laevi elongata ampla undato-serpentina, varicibus obsolete annulata.

Goldfuss. op. cit. p. 239. pl. 70. f. 16.

Fossile du sable vert de la Westphalie, etc., et de la marne crayeuse de Maestricht.

† 30. Serpule fouet. *Serpula flagellum*.

S. testâ posticè attenuatâ flexuosâ læviscula, antice subadscendente, varicibus lamellosis persolatis.

Goldfuss. op. cit. p. 233. pl. 69. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique des environs de Streuberg.

31. Serpule substriée. *Serpula substriata*.

S. testâ serpentinâ, sulcis tribus longitudinalibus strisque transversalibus subtilissimis confertis insculpta.

Goldfuss. op. cit. p. 234. pl. 69. fig. 6

Même gisement.

† 32. Serpule de Noggerath. *Serpula Noggerathii*.

S. testâ transversim subtilissimè striatâ, postice in spiram affixam convolutâ, antice disjunctâ elongatâ subrectâ cingulatâ, cingulis elatis æqualibus.

Goldfuss. op. cit. p. 238. p. 70. fig. 14.

Fossile de la craie des environs de Munster.

La *Serpula ampulacea* de Sowerby (mineral Conchyology. t. 6. p. 194. pl. 597. fig. 1-5.) ne paraît pas devoir être séparée spécifiquement de la précédente.

† 33. Serpule draconocéphale. *Serpula draconocephala*.

S. testâ lævi subcarinatâ, in spiram simplicem affixam convolutâ, antice adscendente costisque arcuatis supra aperturam notatâ.

Goldfuss. op. cit. p. 236. p. 70. fig. 5.

Fossile de la craie de Maestricht.

† 34. Serpule de Deshayes. *Serpula Deshayesi*.

S. testâ subtereti rugosâ subrecta; postice affixâ curvatâ, sulcis tribus vel quinque et crista plicata evanescente.

Goldfuss. op. cit. p. 232. pl. 68. fig. 18.

Fossile du calcaire jurassique de Streilberg.

† 35. Serpule grande. *Serpula grandis*.

S. testâ arcuatim flexuosâ, anticè rotundatâ adscendente, postice basi effusâ, cristâ dorsali obtusâ vel plicata, lateribus convexis sulco notatis.

Goldfuss. op. cit. p. 227. pl. 67. fig. 11.

Fossile du calcaire jurassique de Wurttemberg et de la Haute-Saône.

† 36. Serpule limace. *Serpula limax*.

S. testâ serpentind, antico lateri transversim striatâ, postice triquetra, carinâ rectâ, lateribus subconvexis.

Goldf. loc. cit. pl. 67. fig. 12.

Fossile du calcaire jurassique de Daireuth.

† 37. Serpule conforme. *Serpula conformis.*

S. testâ serpentind vel flexâ conformi, curinâ continuâ equali, lateribus subangulatis.

Goldfuss. op. cit. p. 228. pl. 67. fig. 13.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace.

38. Serpule à trois crêtes. *Serpula tricristata.*

S. subpentagonâ, antice subrectâ, postice flexâ, costis acutis remotis, cristis tribus dorsalibus mediâ rectâ lateralibus plicatis.

Goldfuss. op. cit. p. 228. pl. 67. fig. 6.

Fossile du lias des montagnes de Bamberg.

† 39. Serpule en arc. *Serpula arcuata.*

S. testâ pentagonâ arcuatâ, postice affixâ, transversim rugoso-striatâ, carinis lateralibus obtusis, dorsal. acutior.

Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70. fig. 10.

Fossile du sable vert de Ratisbonne.

† 40. Serpule anguleuse. *Serpula angulata.*

S. testâ reflexâ basi expansâ lateribus planis, cristâ dorsali clatâ plicatâ utrinque sulco exiguo circumscriptâ.

Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. f. 5.

Fossile du terrain tertiaire de la Westphalie.

† 41. Serpule bicanaliculée. *Serpula bicanaliculata.*

S. testâ reflexâ, lateribus convexiusculis, cristâ dorsali equali utrinque canaliculo antico evanescente circumscriptâ.

Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. f. 6.

Fossile du calcaire tertiaire de la Westphalie.

† 42. Serpule limée. *Serpula limata.*

S. testâ serpentind, striis transversalibus undulatis subtilissime scabra, lateribus convexis, costis arcuatis remotis acutis, carina continuo tenui.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 1.

Fossile du calcaire jurassique des environs de Sreitberg.

† 43. Serpule pliable. *Serpula plicatilis.*

S. testâ laxâ vel curvatâ, lateribus subconvexis laeviusculis, costis arcuatis per paria approximatis, carinâ continuâ rectâ.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 2.

Fossile de l'oolite de Grufenberg et de Streitberg.

Cette serpule ne diffère que fort peu de la précédente et pourrait bien ne pas en être distincte spécifiquement.

† 44. Serpule noduleuse. *Serpula nodulosa*.

S. testâ laxâ lævi subcompressâ, lateribus planis, costis obliquis nodulosis, carinâ integrâ acutâ.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 4.

Fossile du calcaire jurassique de Streitberg. Ne diffère que fort peu des deux espèces précédentes.

† 45. Serpule lophiode. *Serpula lophioda*.

S. testâ substriatâ convexâ postice uncinatâ, carinâ dorsali æquali tenuissima.

Goldfuss. op. cit. p. 236. pl. 70. fig. 2.

Fossile du sable vert de Westphalie.

† 46. Serpule bossue. *Serpula gibbosa*.

S. testâ uncinatâ, lateribus subcanaliculatis, costis gibbosis regularibus, cristâ continuâ acutâ.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 3.

Fossile du calcaire jurassique de Muggendorf.

† 47. Serpule quinquangulaire. *Serpula quinquangularis*.

S. testâ lævi quinquangulari uncinatâ repente incrassatâ transversim sulcatâ vel lamellosâ, carinis lateralibus obtusis, cristâ dorsali plicatâ.

Goldfuss. op. cit. p. 230. pl. 68. fig. 8.

Fossile du Kimmeridge clay de Langres, etc.

† 48. Serpule à quatre lignes. *Serpula quadrilatera*.

S. testâ acute quadrangulari, subtilissime transversim striatâ, postice subflexâ carinaque dorsali tenui instructâ.

Goldfuss. op. cit. p. 230. pl. 68. fig. 10.

Fossile de l'oolite de Baireuth.

† 49. Serpule triangulaire. *Serpula triangularis*.

S. testâ serpentinâ convexâ, lateribus sulco longitudinali obsoleto striisque transversalibus undulatis notatis, cristâ dorsali plicatâ.

Goldfuss. op. cit. p. 236. pl. 70. fig. 4.

† 50. Serpule tricarénée. *Serpula tricarinata*.

S. testâ serpentinâ lævi quinquetra, carinis approximatis æqualibus acutis.

Goldfuss. op. cit. p. 230. pl. 68. fig. 8.

Fossile de l'oolite de l'Alsace, etc.

† 51. *Serpule quadricanaliculée. Serpula quadricanaliculata.*

S. testâ reflexâ quadricarinatâ, canaliculis lateralibus nodulosis, lateralibus basi concinne plicatis, orificio laevi ascendente.

Goldfuss. op. cit. p. 241. pl. 71. f. 11.

Fossile du calcaire tertiaire de la Westphalie.

† 52. *Serpule pentagonale. Serpula pentagona.*

S. testâ flexâ vel uncinatâ pentagonâ laevi, carinis remotis, media acutâ, lateralibus obtusis.

Goldfuss. op. cit. p. 230. pl. 68. fig. 7.

Calcaire jurassique de Streitherg.

† 53. *Serpule froncée. Serpula corrugata.*

S. testâ subtereti rugosâ subcarinatâ elongatâ serpentinâ vel in spiras convolutâ, carinâ obsolete nodulosâ rugis lateralibus confertis.

Goldfuss. op. cit. p. 241. pl. 71. fig. 12.

Fossile du terrain tertiaire de la Westphalie.

† 54. *Serpule trachine. Serpula trachinus.*

S. testâ laevi, postice uncinatâ lateribus, convexâ, cristâ antè crispâ, antica in sulcum dorsalem desinente.

Goldfuss. op. cit. p. 235. pl. 70. fig. 1.

Fossile du sable vert de la Westphalie.

† 55. *Serpule déprimée. Serpula depressa.*

S. testâ depressâ laevi convexâ, postice in discum irregularem convolutâ, antica serpentinâ, ore porrecto contortâ, carinâ dorsali aequali.

Goldfuss. op. cit. p. 236. pl. 70. fig. 6.

Fossile du terrain tertiaire de la Westphalie.

† 56. *Serpule gordiale. Serpula gordialis.*

S. testâ elongatâ laevi filiformi serpentinâ vel in glomerulum seu spiram convolutâ.

Goldfuss. op. cit. p. 234. pl. 69. fig. 8.

Fossile du calcaire jurassique du Wurtemberg, de l'Alsace, etc.

Var. serpentina : testâ serpentinâ, gyris numerosis conduplicatis.

Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. fig. 4.

Fossile de la formation crétacée de la Westphalie, de la Bavière et de la Saxe.

Je doute beaucoup que cette espèce, ainsi que les quatre suivantes, appartiennent bien réellement au genre *Serpule*; elles ont beaucoup d'analogie avec des coquilles tubuleuses provenant de mollusques d'un genre nouveau, que M. Deshayes distingue des *Vermetes* et se propose de décrire dans la suite de cet ouvrage.

† 57. *Serpule interrompue. Serpula intercepta.*

S. testâ lævi tenui moniliformi-intercepta in glomerulum convoluta.
Goldfuss. op. cit. p. 234. pl. 69. fig. 9.
Fossile du calcaire jurassique de Streitberg.

† 58. *Serpule Ilion. Serpula Ilium.*

S. testâ filiformi gracili lævi, in spiram irregularem elongatam interruptam vel in glomerulum convolutâ.
Goldfuss. op. cit. p. 234. pl. 69. fig. 10.
Calcaire jurassique de Streitberg.

† 59. *Serpule parvule. Serpula parvula.*

S. testâ exigua, in spiram conico-elongatam deformem convolutâ, anfractibus irregularibus contiguâ creberrimis.
Goldfuss. op. cit. p. 239. pl. 71. f. 18.
Fossile du sable vert de la Westphalie.

† 60. *Serpule flagellée. Serpula vibricata.*

Serpula testâ glomeratâ variè convolutâ, rugis transversis annularibus divisivæ.
Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. fig. 3.
Même gisement.
Fossile de la formation crayeuse de la Westphalie.

* Ajoutez le *Serpula carinella* de Sowerby (Min. Conch. t. 6. p. 201. pl. 598. fig. 2.), espèce fossile des Sables vert; le *Serpula antiquata* du même (loc. cit. p. 202. pl. 598. fig. 4.); quelques espèces décrites par M. DeFrance, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles. t. 6. p. 564, etc.

Les fossiles décrits par M. Goldfuss sous les noms de : *Serpula lituiformis* (Petrefacta pl. 67 fig. 15); *Serpula delphinula* (op. cit. pl. 67. fig. 16); *Serpula convoluta* (pl. 67. fig. 14); *Serpula trochleata* (pl. 68. fig. 13); *Serpula macrocephala* (pl. 68. fig. 14); *Serpula helicoformis* (pl. 68. fig. 15); *Serpula canaliculata* (pl. 69. fig. 1); *Serpula volubilis* (pl. 69. fig. 2); *Serpula spiralis* (pl. 69. fig. 3); *Serpula murexoides* (pl. 71. fig. 1); *Serpula eretato-striata*

(pl. 71. fig. 2); *Serpula erecta* (pl. 70. fig. 15), paraissent devoir être considérés comme des Vermets plutôt que des Serpules; il en est de même du *Serpula granifera* de Say (Jour. of the Acad. of Philad. vol. 4. p. 154. pl. 8. fig. 4). Je doute aussi beaucoup que le *Serpula cingulata* (Goldfuss op. cit. pl. 69. fig. 4), et le *Serpula erecta* pl. 70. fig. 15) du même auteur, appartiennent à ce genre; son *Serpula epithemia* est probablement le tube de quelques Annelides de la famille des antennaires.

Enfin, le fossile décrit par M. Goldfuss sous le nom de *Serpula colubrina* (Petref. t. 1. p. 226. pl. 77. fig. 5) n'est certainement pas un tube de Serpule, et me paraît être une agglomération d'œufs de Mollusques, semblable à celles qu'on trouve souvent sur nos côtes.

VERMILIES. (Vermilia.

Corps tubiculaire, allongé, atténué vers sa partie postérieure, muni extérieurement d'un opercule testacé, orbiculaire, très simple.

Tube testacé, cylindracé, insensiblement atténué vers sa partie postérieure, plus ou moins contourné, et fixé par le côté sur les corps marins. Ouverture ronde, à bord souvent muni d'une à trois dents.

Corpus tubicolare, elongatum, posticè sensim attenuatum, operculo testaceo, orbiculato simplicique anticè instructum.

Tubus testaceus, cylindraceus, posticè sensim attenuatus, plus minusvè contortus, repens, corporibus marinis latere affixus. Apertura rotunda; margine dento unico vel dentibus duobus tribusve sæpè armato.

OBSERVATIONS.—Les Serpulées, auxquelles nous donnons maintenant le nom de *Vermilies*, étaient confondus parmi les serpules. Ce fut Daudin qui, le premier, s'aperçut que ces Annelides, toujours rampantes, étaient munies d'un opercule calcaire. Il les sépara des Serpules et en fit des Vermets, ne considérant pas que le *Vermet* d'Adanson est réellement un mollusque et non une An-

nelide. Ayant vu moi-même, dans quelques espèces, l'opercule calcaire de ces Serpulées, je les ai réunies d'abord avec la Galéolaire, qui est pareillement operculée; mais depuis, considérant que ces animaux n'ont ni le port, ni l'opercule de la Galéolaire, j'ai cru devoir les en séparer pour en former un genre particulier. L'opercule des Vermilies est orbiculaire à sa base, à dos convexe, le plus souvent conique.

[Ce genre n'est encore qu'imparfaitement connu et n'a pas été adopté par M. Savigny, mais a été admis par M. de Blainville, qui le caractérise de la manière suivante :

« Corps, tête, thorax, bouche et anus comme dans les Serpules. Branchies flabelliformes, composées de cirrhes garnies d'un seul rang de barbes. Deux tentacules, dont un seul se développe en une masse proboscidiiforme, recouverte à sa partie supérieure par une pièce calcaire conoïde et simple. Tube calcaire, solide, épais, triquètre, adhérant par toute l'étendue d'une de ses faces aplaties à des corps marins. »

Si par la suite ce genre vient à être définitivement adopté, il faudra probablement y rapporter plus des fossiles rangés ci-dessus parmi les Serpules. E.

ESPÈCES.

1. Vermilie à bec. *Vermilia rostrata*.

V. testâ tereti, levigatâ, madreporibus incrustatâ; aperturâ dentacuto rostriformi.

* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 329.

Mus. n.º

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, dans l'épaisseur d'une Porrite. Son tube est assez gros, rouge, et paraissait vide.

2. Vermilie triquètre. *Vermilia triquetra*.

V. testâ repente, flexuosâ, triquetrâ; dorso carinâ simplici.

Serpula triquetra. Lin. Gmel. p. 3740.

Born. Mus. p. 436 tabl. 18. f. 14.

* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 329 et p. 430. pl. 1. fig. 3.

(b) *Var. testâ lineâ rubrâ utroque latere carinâ.*

Habite l'Océan Européen et la Méditerranée. Mus. n.º Elle rampe et serpente sur les corps marins, y étant fixée dans toute ou presque toute sa longueur. Son opercule est conique.

La variété b se trouve sur un Peigne des mers australes.

3. Vermilie bicarinée. *Vermilia bicarinata*.

V. testis repente, flexuosus, subtriquetrus, ruber; dorso bicarinato; aperturæ labii bicornis.

Mus. n.º

* De Blainville. op. cit. t. 57. p. 329.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, sur les fucus. Elle est d'assez petite taille, à carènes ondules, subdentées.

4. Vermilie chenille. *Vermilia crux*.

V. testis repente, tereti-angulatus, transversè rugosus, albidus; fasciis binis rufis dorsalibus.

* De Blainville. loc. cit.

Mus. n.º.

Habite les mers australes. Elle n'est lisse sur aucun point de son tube; ses rides transverses sont les termes de ses divers accroissemens.

5. Vermilie subcrépelée. *Vermilia subcrenata*.

V. testis repente, flexuosus, albidus; carinæ dorsalis carinæque lateralis nonnullæ ex tuberculatis; operculo brevissimè conico.

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habite l'Océan Indien, sur le Spondyle mutique. Elle se creuse un lit sur la coquille.

6. Vermilie plicifère. *Vermilia plicifera*.

V. testis repente, flexuosus, cylindricus; carinæ dorsalis minimæ; lateribus plicis creberrimis tenuissimis arcuatis.

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habite la Méditerranée, sur un Peigne; tube d'un blanc rougeâtre.

7. Vermilie scabre. *Vermilia scabra*.

V. testis repente, tereti, gracili, flexuosus; dorso carinis subquinis, minimis, denticulatis.

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habite dans la Manche, près la Rochelle, sur un Peigne. Elle est différente du *Permetus 5-costatus* de Daudin.

8. Vermilie rubanée. *Vermilia tæniata*.

V. testis repente, contortus, subtriquetrus, albus; fasciis duabus dorsalibus rubro-violaceis.

* De Blainville, loc. cit.

Mus. n.°

Habite sur une Monodonta des mers australes, à la terre de Diémen.

Etc. Voyez les Vermets de Daudin, recueil de Mém. p. 44.

* *Fermilia? alberta*. DeFrance. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 330.

Fossile des Vaches-Noires, près de Honfleur.

* *Fermilia? punctata*, ejusd. loc. cit.

Basilé de la même localité.

* *Fermilia? murena*, ejusd. loc. cit.

Fossile du calcareopolypore des environs de Gênes.

[Le genre *SPIRAMELLE* de M. de Blainville correspond à la division des *Serpules spiramelhens* de M. Savigny, et se compose d'une espèce dont les branchies conformes en peigne à un seul rang, se contournent en vis à plusieurs tours de spire; dont la division imberbe de ces organes est également courte et pointue de chaque côté, et dont l'écusson membraneux du thorax est peu rétréci en arrière et présente les sept premières paires de pieds, disposées sur deux lignes parallèles.

Spiramelle bispirale.

Urtica marina singularis sebathe, t. 1. p. 45. pl. 29. fig. 1 et 2.

— *Serpula bispiralis*, Savigny. Syn. p. 75. — *Spiramilla bispiralis*, De Blainville, Dict. des Sc. nat. t. 57. pl. 32. E.

GALÉOLAIRES (*Galeolaria*.)

Corps tubicolaire... muni antérieurement d'un opercule testacé, composé.

Tubes testacés, très nombreux, cylindracés, subanguleux, droits, ondes, serrés en touffes, fixés par leur base, ouverts à leur sommet. Ouverture orbiculaire, à bord se terminant d'un côté par une languette spatulée. Opercule

orbiculaire, galéiforme, armé en dessus de pièces testacées diverses, au nombre de cinq à neuf, dont une au milieu est linéaire tronquée, et toutes attachées à son bord d'un seul côté.

Corpus tubicolare.... anticè operculo testaceo composito instructum.

Tubuli testacei, numerosissimi, cylindraceo-angulati, erecto-undati, conferti, cæspitosi, basi affixi, extremitate superiore pervii. Apertura orbicularis; margine in lingulam spatulatam hinc terminato. Operculum orbiculare, galeiforme, valvis testaceis variis supernè armatum. Valvæ quinque ad novem, operculi margine hinc affixæ: unicâ medianâ lineari-truncatâ aliis majore.

OBSERVATIONS. — La *Galéolaire* tient sans doute de très près aux *Vermilies*; aussi d'abord je les réunissais toutes dans le même genre. Cependant la considération de leur port tout-à-fait particulier, celle de la languette de leur ouverture, et surtout celle de leur singulier opercule, m'ont décidé à les distinguer comme genre, étant persuadé que l'animal doit offrir dans ses caractères des particularités qui autoriseront cette distinction. La pièce orbiculaire de leur opercule n'est point conique, mais squamiforme; elle supporte neuf petites pièces testacées, quatre de chaque côté et une au milieu. Celle-ci est dentelée à la troncature de son sommet; les autres le sont un peu sur leur bord interne.

ESPÈCES.

1. *Galéolaire en touffe. Galeolaria cæspitosa.*

G. testis angulosis, breviusculis, in cæspitem latam confertis; apertura ligulâ posticè canaliculatâ.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 431. pl. 1. fig. 4.

Mus. n.º

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur.

Mon cabinet. Les touffes sont un peu diffuses.

2. Galéolaire allongée. *Galeolaria elongata*.

G. testis elongatis, tereti-angulatis, in massam crassam coactis; aperturâ ligulâ posticè planulatâ.

Mus. no.^o

Habite... les mers de la Nouvelle-Hollande? Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente; mais elle est très remarquable.

Ses tubes sont trois fois plus longs que ceux de l'autre.

+ 3. Galéolaire prolifère. *Galeolaria prolifera*.

G. testâ obtuse quadrangulari, posticè curvâ affixâ, antice recta liberâ, ore et suturis tri-vel quadridentatis.

Serpula prolifera. Goldfuss. op. cit. p. 231. pl. 68. fig. 2.

Fossile du calcaire jurassique du Baireuth.

* Ajoutez *Galeolaria decumbens*. Sowerby. Genera.

[Le genre *Ditrupa* de M. Berkeley ne paraît pas différer essentiellement des Serpules par la structure des animaux, mais s'en distingue par la conformation des tubes, qui est libre, conique, un peu arquée, ouverte aux deux extrémités et toutefois semblable à celle de quelques Onuphis. Le type de ce genre a été pendant long-temps confondu avec les Dentales, sous le nom de *D. subulatum* (Desh. Mém. de la Sc. d'Hist. nat. t. 2. p. 373. pl. 16. fig. 29. — *Ditrupa subulata*. Berk. Zool. journ. vol. 5. p. 424. pl. 19. fig. 2.). Le *Serpula libera* de M. Sars (op. cit. p. 32. pl. 12. fig. 33) présente les mêmes caractères. E.

MAGILE (Magilus.)

Test ayant sa base contournée en une spirale courte, ovale, héliciforme; à quatre tours contigus, convexes, dont le dernier est plus grand et se prolonge en tube dirigé en ligne droite ondée. Le tube convexe en dessus, cariné en dessous, un peu déprimé et plissé sur les côtés: à plis lamelleux, serrés, ondés, verticaux, plus épais d'un côté que de l'autre.

Animal inconnu.

Testa basi in spiram brevem ovatam heliciformem convoluta; anfractibus quatuor contiguis convexis : ultimo majore, in tubum elongatum undato rectum porrigente. Tubus supra convexus, infernè carinatus, ad latera subdepressus plicatus; plicis lamellosis confertis undatis verticalibus, in altero tubi latere crassioribus.

Animal ignotum.

OBSERVATIONS. — Le singulier test du *magile* offre, à sa base, une spirale héliciforme, ordinairement encastrée dans l'épaisseur d'un corps madréporique. Le dernier tour de cette spirale s'allonge progressivement en un tube de la forme ci-dessus indiquée, et qui acquiert quelquefois une longueur considérable. Il paraît que l'animal est contourné en spirale dans ses premiers développemens, et qu'ensuite il s'allonge en ligne droite ondulée, s'enveloppant d'un tube, s'y déplaçant successivement, et remplissant de matière testacée l'espace qu'il abandonne à mesure qu'il se déplace. Il en résulte qu'au lieu de former derrière lui quelques cloisons séparées, comme dans plusieurs serpules, cet animal remplit d'abord la spirale qu'il a quittée, remplit après la portion du tube qu'il n'occupe plus, et se trouve toujours contenu dans la cavité restante de son tube. Cette cavité est arrondie, très lisse en ses parois, et offre inférieurement une gouttière qui correspond à la carène du tube. Au rapport de M. Mathieu, on observe assez souvent ce corps testacé à l'Ile-de-France, et quelquefois son tube a jusqu'à trois pieds de longueur.

En considérant la description que Pallas donne de son *Serpula gigantea* (Miscell. Zool. p. 139. t. 10. f. 2-10.), il me paraît hors de doute que cette Serpule est une espèce du genre *Magile*. S'il en est ainsi, l'animal des *Magiles* serait connu dans ses caractères principaux, celui de Pallas étant déjà distinct des Serpules, par ses branchies spirales resserrées en massue, et par les petites cornes de son opercule.

[On connaît aujourd'hui l'animal du *Magile* qui, de même que le Vermet, est un mollusque gastéropode. M. Carus vient d'en donner une description anatomique dans le second volume du *Museum Senckenbergianum*. E.]

ESPÈCE.

1. Magile antique. *Magilus antiquus*.

Campulote. Guett. Mém. vol. 3. p. 540 pl. 71. f. 6.

Magilus antiquus. Montfort. Conch. 2. p. 43. *figura mala*.

* Ruppell. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Strasbourg. t. 1. n° 25. pl.

* Deshayes. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Mollus. pl. 62. fig. 4.

* Carus. Museum Senckenbergianum. t. 2. pl.

Mus. n.° Mon cabinet.

Habite.... Je crois que c'est celle de l'Île-de-France. Les exemplaires du Muséum ne sont point fossiles.

Nota. MM. Peron et Lesueur ont rapporté la spirale seulement d'un Magile jeune, renfermé dans l'épaisseur d'une Astrée. Cette spirale est à test mince, finement lamelleux, et n'a pas encore de tube. Je crois qu'elle appartient à une espèce particulière que je nommerai provisoirement, Magile de Péron, *Magilus Peronii*.

CLASSE DIXIÈME.

LES CIRRIPIÈDES (Cirripeda.)

Animaux mollasses, sans tête et sans yeux, testacés, fixés. Le corps comme renversé, inarticulé, muni d'un manteau, ayant en dessus des bras tentaculaires, cirreux, multiarticulés.

Bouche presque inférieure, non saillante; à mâchoires transversales, dentées, disposées par paires. Les bras en nombre variable, inégaux, disposés sur deux rangs, et composés chacun de deux cirres sétacés, multiarticulés, oilés, à peau cornée, portés sur un pédicule commun. L'anus terminant un tube en forme de trompe.

Une moelle longitudinale noueuse; des branchies externes, quelquefois cachées; circulation par un cœur et des vaisseaux.

... 17
nus dentatis per paria di-
mæqualia, biordinata : sin-
multiarticulatis, ciliatis, t-
culo impositis. Anus tubum

Medulla longitudinalis nu-
terdum abscondita; circula


Testa vel sessilis vel pea-
valvis pluribus modò mobilit-
menti appendice intus vestitis

OBSERVATIONS.—Des animaux
noueuse, des bras ou cirres arti-
paires de mâchoires qui se mon-
assurément pas des *Mollusques* ;
à l'extérieur, enveloppé d'un ma-
offrir d'anneaux transverses, ni
raient être des *Annelides*; enfin de
tête, point d'yeux, et dont le c-
trouve enfermé dans une véritable
plus des *Crustacés*. Les animaux
donc à une classe particulière, puis-
convenablement à aucune de celles
des *cirripèdes* dont j'ai effectivement
que, qui me paraît d-

Sans doute ces mêmes animaux ont des rapports avec ceux des mollusques que nous appelons *Conchifères*, puisque leur corps est pareillement muni d'un manteau, quoique différent par sa forme et son usage; et on les a crus voisins des *Brachiopodes*. Mais ils ont des rapports fort remarquables avec des animaux d'autres classes; et dans ce cas, il nous semble qu'on doit peser la valeur de ces rapports. Si, par exemple, l'on considère ceux de leurs caractères que fournissent les plus importants de leurs organes, on trouvera sans contredit que c'est des crustacés que les *Cirrhipèdes* s'approchent le plus; car ils en ont le système nerveux; ils ont même des mâchoires analogues à celle des crustacés, et leurs bras tentaculaires semblent tenir des antennes des astaciens : ce sont aussi des filets sétacés, à peau cornée, partagés en une multitude d'articulations.

Les *Cirrhipèdes* complètent et terminent l'énorme branche des animaux articulés (1). Si leur corps n'offre plus d'articulations ni de peau solide, leurs bras en présentent encore; or, c'est uniquement parmi les animaux articulés que l'on trouve une moelle longitudinale noueuse ou ganglionnée dans toute sa longueur. Ils ne se lient donc pas réellement avec les animaux de la classe suivante.

(1) Notre auteur avait des vues très justes relatives aux affinités naturelles des *Cirrhipèdes* et les découvertes récentes sont venues confirmer le rapprochement qu'il fait entre ces animaux et les crustacés. Dans la classification de M. Cuvier les *Cirrhopodes* (nom que Lamarck a changé en *Cirrhipèdes*) sont rangés dans l'embranchement des mollusques comme y formant une classe distincte à la suite des *Brachiopodes*. M. de Blainville les désigne sous le nom de *Nematopodes* et les réunit aux *Oscabrions* pour en former un sous-type particulier celui des *Malentozoaires* ou des *Molluscarticulés* qui établirait le passage entre les mollusques proprement dit et les animaux articulés. Mais aujourd'hui il ne peut guère y avoir de doute que ce ne soit dans la série des animaux articulés comme le voulait Lamarck et entre les *Annelides* et les *Crustacés* que les *Cirrhipèdes* trouvent leur place naturelle. M. Burmeister voudrait même les réunir aux crustacés; mais cette marche ne nous paraît pas devoir être adoptée. E.




... un prolongement inf
par sa base, lui permet
gué du corps qui contient
Ainsi, tous les *Cirripèdes*
sur des corps étrangers et
adhère immédiatement à
fixée; tandis que, dans les
toujours distinctes, mobiles
plètement le corps, se trou
onle tubuleux, tendineux, so
tile, et qui est fixé par sa bas
faculté de changer son attach
ailleurs. (1)

(1) Cela est très vrai pour
tain que, dans le jeune âge, le
sont de la faculté de la locomoti
ce qu'ils deviennent plus tard
certains crustacés. La découverte
M. Thompson, naturaliste irlandais,
observations sur des Balanes, e
de l'œuf, ces animaux ont le c
valbe comme celui des Nébulos
fices; car ayant placé

Dans les uns, la tunique qui constitue le manteau de ces Cirrhipèdes n'enveloppe qu'une grande portion du corps, et fournit le tégument externe du pédicule de ceux qui ne sont pas sessiles; dans les autres, comme dans les *Otions* et les *Cinéras*, la tunique enveloppe tout le corps et ne laisse qu'une ouverture antérieure pour la sortie des bras; dans aucun, cette tunique

d'adhérence s'élargit d'abord, puis s'élève en un cône tronqué qui se revêt de six lames calcaires et qui laisse voir à son sommet tronqué les deux valves tégumentaires primitives. Enfin suivant M. Thompson la petite *Balane* n'aurait encore à cette période de son existence que deux articulations à chacune de ses six paires de bras bifides; mais par les mues successives le nombre des articles dont ces appendices se composent s'augmenterait peu-à-peu. Depuis la publication de ces premières observations le même naturaliste a étudié le développement des *Anatifes*, des *Cinéras* et des *Otions*, et a confirmé ainsi ses premiers résultats, car il a vu que les œufs pondus par ces animaux donnaient naissance à des êtres ayant la plus grande ressemblance avec certains crustacés inférieurs. Enfin des recherches faites à Paris par M. Audouin, et en Allemagne par M. Wagner, et par M. Burmeister viennent encore à l'appui des opinions de M. Thompson, et prouvent jusqu'à l'évidence que, dans le jeune âge, les Cirrhipèdes éprouvent des métamorphoses. Les recherches de M. Burmeister sont les plus complètes bien qu'elles paraissent avoir été faites principalement sur des *Anatifes* conservés dans l'alcool. Il distingue dans le développement de ces animaux cinq périodes. La première période est celle pendant laquelle ils sont à l'état d'œuf. La deuxième période est celle pendant laquelle le jeune nouvellement né jouit de la faculté locomotrice. Par sa conformation extérieure, le jeune *Anatife* ressemble alors beaucoup aux larves des *Cylopes*, des *Daphnies* et des *Lernées*; il est pourvu de deux longues antennes et de trois paires de pattes sétifères, dont les deux paires postérieures sont biramées; enfin son corps se termine par un abdomen bifidé et sétifère à son extrémité; M. Burmeister n'a pu distinguer des yeux; mais il croit cependant que ces organes existent. La troisième période est celle pendant laquelle l'animal se fixe et s'at-



...coquille, n
minal subit d'autres cha
mière forme à celle que
en soit, à cette époque
porte sur le dos un test c
consistance du cuir; une
cule, et se sont les ante
lequel il adhère. En arri
deux yeux très volumine
de pattes (ou bras) qui so
que dans la première périod
distinctes; enfin l'abdomen et
et se trouve renfermé com
test. Pendant la *quatrième p*
qu'ils doivent conserver. P
une mue, et en changeant d
leurs yeux et leurs anten
remplit une grande partie de
l'espèce de poche occale du
doncule. Il existe à cette épe
à trois articles, et l'abdomen se
appendice bi-articulé. Enfin le
à constituer la coquille, com
cinquième période, l'animal au
s'allongeant...

longs, inégaux, articulés, ciliés ; à peau cornée et disposés par paires. Les plus longs se trouvent au sommet du corps. Ils diminuent ensuite graduellement de longueur, de manière que les plus courts sont près de la bouche. Les uns et les autres se roulent en spirale, lorsque l'animal cesse de les étendre et n'en fait point usage. Ces bras n'ont aucune analogie avec les tentacules des mollusques, ni même avec ceux des céphalopodes, dont le propre est d'être sans articulation. Ils seraient plutôt des espèces d'antennes, étant analogues à celles des crustacés macroures ; mais l'animal n'ayant point de tête, je les considère comme des bras. (1)

Le propre de la coquille des *Cirrhipèdes* est d'être plurivalve. Néanmoins, dans le plus grand nombre de celles qui sont fixées immédiatement, la coquille paraît univalve, parce que ses pièces, qui nous semblent au nombre de quatre à six, sont ordinairement soudées ensemble par les côtés. Cette coquille est conique ou tubuleuse, fixée par sa base, tronquée et ouverte à son sommet. Dans l'ouverture, qui est terminale, on aperçoit deux ou quatre valves mobiles que l'animal écarte et ouvre à son gré, lorsqu'il veut étendre ses bras, qu'il resserre et referme dans le cas contraire, et qui constituent ce qu'on nomme l'*opercule* de la coquille. Mais dans les *Cirrhipèdes* qui ne sont fixés que par l'intermède d'un pédicale tubuleux qui soutient le corps et sa coquille, alors cette coquille est constamment plurivalve. Son caractère est toujours fort différent de celui de la coquille immédiatement fixée. En effet, cette coquille plurivalve consiste, dans le plus grand nombre, en un assemblage de cinq pièces testacées, inégales et qui forment, lorsque la coquille n'est pas ouverte, un cône comprimé sur les côtés. Dans certaines espèces,

(1) Les bras des *Cirrhipèdes* sont évidemment les analogues des pattes des crustacés ; ils sont au nombre de six paires, et sont composés chacun de deux appendices multi-articulés. Pendant la vie de l'animal ils sortent et rentrent continuellement, et servent ainsi à amener vers la bouche les animalcules dont les *Cirrhipèdes* se nourrissent et à diriger vers les branchies l'eau nécessaire à la respiration.

Le corps tout-à-fait
offre une ouverture antérieure
séparée, n'a pas besoin de
l'animal.

Cirri

Otio

[Ces deux divisions, so-
ment on les désigne par des
pèdes sessiles de Lamarck
sata, dans les écrits de L.
mer, par Cuvier, et *Balani*
que les *Cirrhipèdes* pédon-
Anatifes de Cuvier, les
Lépadiens de M. de Blain-
de Lépadiens nous paraisse

ORDRE .

CIRRHIPÈDE

des animaux de cet ordre est fort analogue à celle des Cirrhipèdes pédonculés, à peine oserait-on les ranger tous dans la même classe, tant, à l'extérieur, les deux sortes de coquillages qu'ils présentent sont différentes.

En effet, la coquille des *Cirrhipèdes sessiles* n'est jamais comprimée sur les côtés, paraît en général d'une seule pièce, ressemble à un cône ou à un tube tronqué au sommet, et offre constamment à l'intérieur un opercule formé de deux ou quatre pièces mobiles que l'animal écarte lorsqu'il veut faire sortir ses bras tentaculaires. Cette coquille, solide et calcaire, ainsi que les pièces de son opercule, est toujours fixée sans intermède sur les corps, et ne saurait se déplacer. Par ces différens caractères, elle diffère considérablement de celle des Cirrhipèdes pédonculés. Néanmoins les rapports entre les Cirrhipèdes, sessiles et pédonculés, sont si grands, que Linné les réunissait tous dans un seul genre celui de *Lepas*. Mais Bruguières, sentant la nécessité de diviser le genre *Lepas*, au moins en deux genres particuliers, établit à ses dépens ses *Balanus* et ses *Antifa*, qui forment actuellement nos deux ordres. Nous rapportons, au premier de ces ordres, les six genres qui suivent.

TUBICINELLE. (Tubinicella.)

Corps renfermé dans une coquille, et faisant saillir supérieurement des bras petits, sétacés, cirreux, inégaux.

Coquille univalve, operculée, tubuleuse, droite un peu atténuée vers sa base, entourée de bourrelets en anneaux, tronquée aux deux bouts, ouverte au sommet, et fermée à la base par une membrane. Opercule à quatre valves obtuses.

Corpus in testâ inclusum, supernè brachia, parva, setacea, cirrata inæqualiaque exerens.

Testa univalvis, operculata, cylindraceo-tubulosa, recta, versus basin subattenuata, costis transversis annulatis cincta, utrinque truncata, apice parva, membranacea, postice clausa. Operculum quadrivalve, valvulis obtusis.

Observations. — En attendant que les particularités de l'animal de la *Tubicinelle* soient plus connues, nous savons que sa coquille est fort différente de toutes celles des autres cirrhipèdes; qu'elle présente un tube droit, testacé, cylindracé, un peu atténué vers sa base, tronqué aux deux bouts, et muni de bourrelets transverses, en anneaux, qui sont les indices de ses divers accroissemens, chaque bourrelet ayant été d'abord le bord même de l'ouverture de la coquille. Cette coquille semble ouverte aux deux bouts; mais sa troncature inférieure est pendant la vie de l'animal, bouchée par une membrane que l'on aperçoit à l'extérieur. Cette même coquille est si fragile que les baleines, s'y enfoncent partiellement à mesure qu'elle grandit, pénétrant à travers la peau, jusque dans l'épaisseur de la graisse de ces cétacés. Son ouverture est orbiculaire. Les valves de son opercule sont trapézoïdes, obtuses, mobiles, et insérées dans la partie supérieure de la paroi interne de la coquille. La *Tubicinelle* a évidemment de grands rapports avec les *Coronules*, et néanmoins sa coquille est très différente de la leur.

ESPÈCE.

1. *Tubicinelle* des baleines. *Tubicinella balænarum*.

Annales du Mus. vol. 1. p. 461. tab. 30-f, 1.

Mus. vormianum. p. 281.

Tubicinella Lamarchii, Leach. Cirrip. acampt. f. 1.1

* *Tubicinella undata*. Reuss. Mém. d'Hist. nat. p. 34.

* *Tubicinella tracheata*. Gray. Ann. of Philosophy. vol. 10. p. 205.

* *Coronula tubicinella*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 380. et t. 58. p. 15. Atlas. pl. 117. fig. 5.

* *Tubicinella balænarum*. Sowerby. Genera. pl.

* Guérin, Iconographie du Règne anim. Mollus. pl. 38. fig. 14.

Habite sur les baleines des mers de l'Amérique méridionale.

CORONULE. (Coronula.)

Corps sessile, enveloppé dans une coquille, faisant saillir supérieurement des bras petits, sétacés et cirrux.

Coquille sessile, paraissant univalve, suborbiculaire, conoïde ou en cône rétus, tronquée aux extrémités, à parois très épaisses, intérieurement creusées en cellules rayonnantes. Opercule de quatre valves obtuses.

Corpus sessile, testâ operculatâ involutum, superius brachia parva, setacea cirrataque exserta.

Testa sessilis, suborbicularis, valvâ indivisâ simulans conoidæ, aut conico-retusæ, extremitatibus truncatâ; parietibus crassissimis, intus cellulis radiantibus excavatâ. Operculum quadrivalve : valvis obtusis.

OBSERVATIONS. — Ici, le bord de l'ouverture n'étant jamais renflé en bourrelet, la coquille n'est point cerclée transversalement par des bourrelets en anneaux, comme dans la Tubicinelle. Son ouverture est toujours régulière, arrondie, elliptique, légèrement hexagone, et les valves de l'opercule, qui tiennent plutôt à l'animal qu'à sa coquille, ont leur insertion voisine de la base de la paroi interne. La lame testacée qui tapisse la paroi interne de la coquille, s'étend jusqu'en bas dans les *Coronules*, et ne s'arrête pas à moitié, comme dans les Balanes. L'épaisseur de la coquille va en s'agrandissant inférieurement, et se trouve divisée dans son intérieur en quantité de cellules rayonnantes, grandes ou petites, qui montrent que cette coquille a une structure très particulière. Sa troncation inférieure n'a point de lame calcaire pour clore cette extrémité; mais une membrane que fournit l'animal y supplée. Les *Coronules* vivent sur le corps de certains animaux marins, comme les baleines, les cachalots, les tortues de mer, s'enfonçant en partie par leur base dans l'épaisseur de ces corps, lorsque leur tégument n'a pas trop de dureté. On en trouve néanmoins qui vivent sur des corps durs, comme des coquilles, etc.

[M. de Blainville réunit les Tubicinelles et les *Coronules* dans un même genre auquel il conserva ce dernier nom, mais d'au-

tres naturalistes ont cru devoir suivre une marche contraire et ont porté les divisions même plus loin que ne l'avait fait Lamarck. Ainsi M. Ranzani forme un genre *Diadema* des espèces dont la partie tubuleuse de la coquille est presque globuleuse, à aires presque égales, à parois très épaisses inférieurement et à orifice très grand, subcirculaire, ou plutôt hexagonal, et à lames internes rayonnantes, enfin dont l'opercule est bivalve. Ce genre, qui correspond aux Coronules proprement dites de M. Leach, a été adopté par Cuvier, mais il n'en est pas de même du genre *Cetopirus* de Ranzani, division qui comprend les espèces dont la coquille est conique, déprimée, à aires proéminentes, subégales, à ouverture presque circulaire et dont l'opercule est garni de quatre valves à sommets obtus. M. Ranzani réserve le nom de *Coronula* aux espèces dont l'ouverture est ovale et l'opercule à quatre valves. M. Leach a donné le nom générique de *Chelonobia* aux espèces dont la coquille est déprimée et conique et dont l'opercule est garni de quatre grandes valves égales. Enfin M. Gray a proposé le nom de *Platylepas* pour la plupart des Chélonobies de Leach et pour les autres Coronules dont le corps est déprimé, la bouche ovale, les valves bilobées extérieurement, et médio-carénées à l'intérieur, et l'opercule garni de valves subégales. Ces subdivisions nous paraissent peu importantes.

Quant à la structure intérieure des Coronules, elle vient d'être étudiée avec beaucoup de soin par M. Burmeister, qui a donné dans le mémoire sur les Cirrhipèdes déjà cité, une description anatomique de la Coronule diadème. E.

ESPÈCES.

1. Coronule diadème. *Coronula diadema*.

C. testâ ventricoso-cylindraceâ, truncatâ; angulis sex, quadricostatis: costis longitudinalibus transversâ striatis.

Lepas diadema, Lin. Boro. Mus. p. 10. t. 1. f. 5. 6.

Chemn. Conch. 8. p. 319. t. 99. f. 843. 844.

Balanus diadema, Brug. Dict. n° 18. Encycl. pl. 165. f. 13. 14.

* *Coronula diadema*, Leach. Encyclop. Britannica^{re} Supplém. t. 3. p. 171.

* Deshayes. Dict. élim. d'hist. nat. t. 4. p. 567.

- * De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 10. p. 499. et t. 32. p. 380. pl. 117. fig. 4.
 - * Sowerby. Genera. pl. fig. 1.
 - * Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 179.
 - * Burmeister. Beitrage zur Naturgeschichte der Rankenfüsse. p. 34. pl. 2. fig. 1-14.
 - * *Polylepas diadema*. Gray. Ann. of Phil. 10. 105.
 - * *Diadema vulgaris*. Schumacher. Nouv. syst. de vers. p. 91.
 - * Genre *Diadema*. Ranzani. Memorie di Storia naturale. p. 52.
 - * Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 179.
- Habite sur les baleines, etc.

2. Coronule rayonnée. *Coronula balænaris*.

C. testâ orbiculato-convexa; radiis sex angustis transversè striatis; interstitiis sulcatis : sulcis radiantibus.

Lepas balænaris. Gmel.

Pediculus balænaris. Chemn. Conch. 8. t. 99. f. 845. 846.

Annales du Mus. vol. 1. p. 468. tab. 30. f. 2. 3. 4.

- * *Cetopirus balænaris*. Ranzani. op. cit. p. 52.
 - * *Polylepas vulgaris*. Gray. op. cit. p. 105.
 - * *Coronula balænaris*. Deshayes. Dict. class. d'hist. nat. t. 4. p. 507.
 - * De Blainville. loc. cit. pl. 117. fig. 3.
 - * Sowerby. loc. cit. fig. 2.
 - * Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 38. fig. 13.
- Habite sur les baleines. Encycl. pl. 165. f. 17. 18.

3. Coronule des tortues. *Coronula testudinaria*.

C. testâ elliptico-convexa; radiis sex angustis transversè striatis; interstitiis lævibus.

Lepas testudinarius. Lin. Gualt. Conch. t. 106. fig. m. n. o.

Chemn. Conch. 8. t. 99. f. 847. 848.

Balanite des tortues. Brug. Dict. n° 19.

Encycl. pl. 165. f. 15. 16.

- * Poli. t. 1. p. 26. pl. 5. fig. 8.
- * Tilesius Jahrbuch. p. 343.
- * Ranzani. op. cit. p. 50.
- * Deshayes. Dict. class. d'hist. nat. t. 4. p. 508.
- * De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 380. pl. 117. fig. 2.
- * Sowerby. loc. cit. fig. 3.
- * *Astrolepas testudinaria*. Gray. op. cit. p. 105. (1)

(1) Le genre *Astrolepas* de M. Gray est caractérisé de la ma-

striatus (Ranzani).

Ellis. Phil. Trans. t. 50. fig.

Gaultieri. Ind. Test. tab. 106

Ranzani. Mém. de Sten. nat.

Habite les mers d'Amérique.

(Le genre **CHTHAMALE** (**C**
et adopté par MM. de Blain
Balanides, dont la base est 1
Coronules et les Tubicinell
rieur des aires saillantes pre
ture tétragonale, dont la lan
dont l'opercule composé de
pyramidal et fixé par une me

ESP. 1. **CHTHAMALE ÉTOILÉ** (

fig. 18-20. — *Chthamalus* et

fig. 18-20. — De Blainville

2. **CHTHAMALE DÉPRIMÉ**. (*Leq*

pl. 5. fig. 12-17. — *Chtham*

BALANE.

Corps sessile, enfermé da

Bras nombreux, sur deux rangs, inégaux, articulés, ciliés, composés chacun de deux cirres soutenus par un pédicule, et exsertiles hors de l'opercule. Bouche sans saillie, ayant quatre mâchoires transverses, dentées, et en outre quatre appendices velus, ressemblant à des palpes.

Coquille sessile, fixée, univalve, conique, tronquée au sommet, fermée au fond par une lame testacée adhérente. Ouverture subtriangulaire ou elliptique. Opercule intérieur, quadrivalve: les valves mobiles, insérées près de la base interne de la coquille.

Corpus sessile, testâ operculatâ inclusum. Brachia numerosa, biordinata, inaequalia, articulata, ciliata, cirris gemellis pedunculo impositis composita, extra operculum exsertilia. Os non prominulum: maxillis quatuor transversis dentatis; præterea appendicibus quatuor hirsutis pulpos simulantibus.

Testa sessilis, affixa, univalvis, conica, apice truncata: fundo lamellâ testaceâ adhærente clauso. Apertura subtriangula aut elliptica. Operculum internum, quadrivalve: valvis mobilibus, propè basim internam testæ insertis.

OBSERVATIONS. — Ce n'est point de toutes les Balanites de Bruguières dont il s'agit ici, mais seulement de celles dont la coquille est tout-à-fait univalve par la soudure de ses pièces, fermée inférieurement par une lame testacée, et qui a un opercule quadrivalve. Nos *Balanés* embrassent une grande partie de ces coquillages marins que l'on trouve fixés sur les rochers, les coraux, les coquilles diverses, et qu'on nomme vulgairement *glands de mer*. Comme ceux-ci sont très nombreux et fort diversifiés dans les mers, il nous a paru qu'ils constituaient plutôt un ordre qu'un seul genre; et en effet, nous avons déjà distingué parmi eux plusieurs genres particuliers qui facilitent leur étude.

La coquille des *Balanés* est immobile dans toutes ses parties externes; c'est un cône en général court, quelquefois allongé, fixé sans intermède sur les corps marins, et qui paraît univalve, les pièces qui le composent étant bien soudées ensemble. Ce cône

... la partie supérieure et int
tapisse la partie supérieure et int
cend point jusqu'en bas.

Dans les *Corripèdes* du second
dite n'existe plus, selon nous, ma
tient lieu et que la nature a varié
tion des pièces, suivant les genres.

Le test des *Balaner* est médiocr
de ses parois, et comme la paroi
n'est pas probable qu'aucune des
mal pénètre dans ces pores. Il n'
nules, dont le fond de la coquille
testacée, et dont les chambres n
sont ouvertes inférieurement.

On aperçoit sur le cône des *Bal*
semens en hauteur, et sur la lame
croissemens en largeur. Probablem
semens, l'animal désunit les pièce
soude entre elles de nouveau. Les
au nombre de six (1), à quoi s'jou
en offre sept.

Les valves réunies se recouvren
bords latéraux, s'enchâssent mêm

vent entre elles, sur leurs côtés, des espaces allongés, verticaux, plus enfoncés que le test, et qui s'élargissent supérieurement; c'est à ces espaces particuliers que Bruguières a donné le nom de rayons.

ESPÈCES.

1. Balane anguleuse. *Balanus angulosus*.

B. testâ albidâ, conicâ, longitudinaliter costatâ; costis subacutis inæqualibus; radiis transversè striatis.

Mus. n°.

Habite les mers d'Europe, sur le *Cancer pagurus*. Elle est multangulaire et se rapproche de la suivante.

2. Balane sillonnée. *Balanus sulcatus*.

B. testâ albidâ, conicâ, longitudinaliter sulcatâ, sulcis obtusis, radiis transversè striatis.

Lepas balantis? Lin. Syst. nat. p. 1107.

Poli. Test. 1. t. 4. f. 5.

Lepas balanus. Born. Mus. p. 8. t. 1. f. 4.

Chemn. Conch. 8. p. 301. t. 97. f. 820.

Balanus sulcatus. Brug. Dict. n° 1. Encycl. pl. 164. f. 1.

* Duvernoy. Dict. des Sc. nat. t. 3. p. 410.

* Ranzani. Memorie di Storia naturale. p. 38.

(B) *Var. foss. ex Italia*.

Habite les mers d'Europe. Mus. n°. Elle tient à la Balane-tulipe, et conserve quelquefois une teinte rougeâtre. La base de la coquille est comme plissée. La variété fossile se trouve en Piémont et dans le Plaisantin. M. Ménard.

3. Balane tulipe. *Balanus tintinnabulum*.

B. testâ purpurascens, conica, subventricosâ, longitudinaliter lineatâ; radiis transversè striatis; operculo postice rostrato.

Lepas tintinnabulum. Lin. S. nat. p. 1108.

(a) *Testâ conicâ, basi latâ.*

Gualt. Conch. 1. 106. fig. H.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 830.

(b) *testâ conicâ, ventricosâ, obliquatâ.*

Rumph. Mus. 1. 41. fig. A.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 829. (* Ranzani pense que cette figure se rapporte plutôt au *B. gigas*.)

(c) *testâ elongato-conicâ, vix ventricosa.*

D'Argenv. Conch. t. 30. fig. A.

Knorr. Vergn. 5. t. 30. f. 1.

Chemn. Conch. 8. t. 97. t. 828.

Encycl. pl. 164. f. 5.

* Tilesius. Jahrbuch der naturgeschichte. p. 334.

* Schumacker. Essai d'un nouveau système des Vers testacés. p. 90.

* Ranzani. op. cit. p. 33. pl. 2. fig. 2, 3, 4.

* Gray. Ann. of Philos. v. 10. p. 104.

* Sowerby. Genera. pl. fig. 1.

Habite l'Océan d'Europe, d'Amérique et de l'Inde. Mm. n°. Espèce commune dans les collections, assez grande et qui varie beaucoup. On la trouve fossile en Italie.

† 3^a. Balane tulipoïde. *Balanus tulipa*.

B. tubo conico parum obliquo, areis prominentibus stipulis horistellis, interdum in longum striatis, transverse striatis. Operculo foveæ externæ transverse striato, valvarum posteriorum apicibus ad anticam recurvatis non unguiculatis, plus minueræ acutis.

Ranzani. op. cit. p. 35.

Var. a. *Lepas Balanus*. Poli. Test. Sicil. t. 1. pl. 4. fig. 5.

Ellis. Phil. Trans. t. 50. pl. 37. fig. 20.

Var. b. *Lepas tulipa*. Poli. op. cit. pl. 5. fig. 1.

Ellis. loc. cit. pl. 37. fig. 10-17.

Var c. *Lepas fistulosa*. Poli. op. cit. pl. 6. fig. 1.

Var. d. *Lepas spongites*. Poli. op. cit. pl. 6. fig. 3-6.

Lepas perforata. Renier. Tavola alfabetica delle conchiglie adriatiche. n° 10.

• Habite la Méditerranée.

† 3^b. Balane géante. *Balanus gigas*.

B. tubo conico, obliquo, ad latera compresso, aperturâ mediocri; areis prominentibus in longum sulcatis, sulcis confertis, profundis; areis depressis transversim profunde striatis. Operculi valvis omnibus transversim lamellatis, lamellis undulatis, spatiis intermediis lævibus, posterioribus tantum, apice unguiculatis, unguibus ad anticam recurvatis.

? Chemnitz. t. 8. pl. 97. fig. 829.

Ranzani. op. cit. p. 31. pl. 2. fig. 5, 6, 7.

Habite la Nouvelle-Hollande.

4. Balane noirâtre. *Balanus nigrescens*.

B. testâ violaceo-nigrâ, subconicâ, elongata; sulcis profundis lon-

gitudinalibus; radiis transversè striatis; operculo postice rostrato.

Mus. n^o.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Voyage de Péron.

5. Balane cylindracée. *Balanus cylindraceus*.

B. testâ basi angustiore, elongatâ, subventricosa, albidâ vel purpurascente radiis transversè striatis.

List. Conch. tab. 443. f. 285.

Knorr. Vergn. 2. t. 2. f. 6.

(b) *Var. testâ cylindracê, longissimâ.*

Gualt. Conch. tab. 106. fig. E.

(c) *Var. foss. testis aggregatis.*

Habite l'Océan d'Europe et d'Amérique. Mus. n^o. Quoique voisine de la Balane-tulipe, sa coquille n'est point conique; sa base est moins large qu'ailleurs. La variété (b) a quelquefois jusqu'à quatre pouces de longueur. La variété (c) se trouve près de Turin.

+ 5. Balane cylindrique. *alanus cylindricus*.

B. tubo conico-cylindrico, obliquo incurvato; apertura laterali magna, angulo posteriore non admodum acuto; areis prominentibus irregulariter et raro in longum striatis; areis depressis vix transverse striatis; operculi valvis anterioribus externe transversim lamellatis, spatiis intermediis lævibus; valvis posterioribus externe transversim striatis, in apice unguiculatis, unguibus subulatis ad anticam recurvatis.

Lepus cylindrica. Lin. Gm.

Ellis. Phil. Tr. 50. pl. 34. fig. 14.

B. cylindricus. Ranzani. op. cit. p. 427.

Habite la côte d'Afrique.

6. Balane caliculaire. *Balanus calycularis*.

B. testâ ovatâ, ventricosâ, basi coarctatâ; radiis lævibus; valvis superne distinctis, subdisjunctis.

Mon cabinet.

Habite les mers d'Amérique, sur des racines. Opercule obliquement pyramidal, à peine rostré, à valves antérieures longues, très sillonnées.

7. Balane rose. *Balanus roseus*.

B. testâ obliquè conicâ, ventricosâ, roseo-purpurascens; radiis non striatis.

Mus. n°.

Habite l'Océan de la Nouvelle-Hollande. à l'île Saint-Pierre, Saint-François. Voyage de Péron

8. Balane œuvée. *Balanus ovalaris*.

B. testa gregali, cylindræco-ventricosâ, truncatâ, albâ, lævi; apertura dilatatâ; radius lævibus; operculi valvis subacutis.

An lepas balanoides? Liu. Syst. nat. p. 1108.

(a) *Testa breviuscula; altitudine apertura latitudinem paululum superans.*

(b) *Testa oblonga; altitudine apertura latitudinem duplo superans.*

* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollusques. pl. 38. fig. 1.

Bonap. Recr. 2. f. 14. pessima.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 824.

(c) *Testa majuscula, subventricosa.*

Habite les mers d'Europe, sur les corps marins. Les individus nombreux et serrés les uns à côté des autres, ont l'aspect d'œufs rassemblés et très blancs. Les valves de l'opercule ne sont point sillonnées. Mus. n°.

9. Balane chétive. *Balanus miser*.

B. testa gregali, brevi, truncatâ; valvis rectis, dorso levibus aut longitudinaliter divisis; apertura dilatatâ; operculi valvis acutis.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 821. Encycl. pl. 64. f. 2.

(b) *Eadem paulò longior, cylindrica, dorso infernè 2. seu 3 sulcata.*

Habite les mers de l'Europe. Mus. n°. On l'a confondue avec le *Lepas balanoides*, dont elle diffère beaucoup. La var. b. habite dans la Manche, et se trouve fossile en Italie.

10. Balane amphimorphe. *Balanus amphimorphus*.

B. testa gregali, purpurascente, ovalâ, subventricosâ; radius parvis; apertura subdilatatâ.

Mus. n°.

Habite... Celle-ci n'est peut-être qu'une variété de la B. tulipe; mais elle tient de très près à la suivante, sauf son ouverture peu resserrée. Elle varie à la couleur blanche; les individus ne viennent point les uns sur les autres. On la trouve fossile en Italie.

11. Balane perforée. *Balanus perforatus*.

B. testa gregali, purpuro-violaceâ, ovato-conicâ; radius albis angustis; apertura coarctatâ.

(c) *Testa conica substriata*. Mon cabinet.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 822. Encycl. pl. 164. f. 2.

(b) *Testa ventricosa-conica*. Mus. n°.

Bonan. Recr. 1. f. 15.

Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. Encycl. pl. 164. f. 12. in-f.

Balanus perforatus. Brug. Dict. n° 9.

Habite la Méditerranée, les côtes de Barbarie, celles du Sénégal, etc.

12. Balane lisse. *Balanus lævis*.

B. testâ conicâ, lævi; aperturâ coarctatâ; radiis angustis insculptis.

* Ranzani. op. cit. p. 44.

* *Creusia lævis*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 378.

* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollusq. pl. 38. fig. 5.

Balanus lævis. Brug. Dict. n° 2.

(b) *Var. testâ tenui, striis longitudinalibus crebris minimis.*

Habite l'Océan atlantique austral, les côtes du Brésil. Taille petite ou médiocre. Coquille mince, blanche, en cône oblique.

13. Balane épineuse. *Balanus spinosus*.

B. testâ albo-rubescente, ovato-conicâ, spinis tubulosis echinatâ; radiis transversè striatis.

Lepas spinosa. Gmel. p. 3213.

Chemn. Conch. 8. p. 317. tab. 98. f. 840 et t. 99. f. 841.

Balanus spinosus. Brug. n° 8. Encycl. pl. 164. f. 10.

* Ranzani. op. cit. p. 40.

* Sowerby. Genera. pl. fig. 2.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 376. pl. 116. fig. 1.

Habite l'Océan atlantique austral. Mus. n°. Et mon cabinet.

14. Balane radiée. *Balanus radiatus*.

B. testâ conicâ, lineis violaceis pictâ; radiis lævibus.

Chemn. Conch. 8. p. 319. t. 99. f. 842.

Encycl. pl. 164. f. 15. *Balanus radiatus*. Brug. n° 12.

* Ranzani. op. cit. p. 39.

* *Tetraclita radiata*. Gray. Ann. of Philos. vol. 10. p. 104.

* *Conia radiata*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 378. Atlas. pl. 116. fig. 7. (1)

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet.

(1) Le genre *Conia*, établi par Leach se rapproche des *Creusies*

15. Balane palmée. *Balanus palmatus*.

B. testâ depresso-conicâ, lœvi; valvis infernè fissis, digitato-palmatis.

An balanus striatus? Brug. Dict. n° 3. *Lepas palmipes?* Gmel.

Habite les mers d'Europe, sur des moules. Mon cabinet. Coquille petite, blanche. J'en possède une variété à côtes, dont la circonférence inférieure est à peine divisée.

16. Balane stalactifère. *Balanus stalactiferus*.

B. testâ conoidâ, obliquâ, infernè crassiore, cellulosa; extûs sulcis filiformibus creberrimis, adpressis; radiis nullis; apertura coarctatâ.

et se compose de Balanides, dont la base se moule sur le corps auquel elle adhère et dont le cône est quadripartite, à valves égales et l'opercule bipartite. M. de Blainville y fait entrer le genre *Asemus* de Ranzani, et y assigne les caractères suivans. «Animal comme dans les Balanes ordinaires. Coquille conique, déprimée; la partie coronaire formée de quatre pièces seulement plus ou moins distinctes, presque égales et ordinairement situées de la base au sommet, avec ou sans aires distinctes; support plat, fort mince ou membraneux; opercule articulé, pyramidal, composé comme dans les Balanes de deux pièces de chaque côté, mobiles ou soudées l'une à l'autre.» Ce groupe ainsi étendu, correspond au genre *Tetraclita* de Schumacker et de M. Gray.

Les *Asemes* de M. Ranzani n'ont pas les valves distinctes à l'extérieur et n'offrent pas d'aires déprimées comme les *Conies* de Leach.

Enfin le genre *Elminius* de Leach se rapproche aussi beaucoup des précédens; de même que chez les *Conies* la portion pariétale de l'enveloppe testacée se compose de quatre valves seulement, mais celles-ci au lieu d'être épaissies et poreuses sont minces et compactes; enfin il n'existe pas de lame basilaire et l'opercule est quadrivalvulaire (Voy. l'*Elminius Leachii*. King. Zool. journ. vol. 5. p. 334; Sowerby. Genera. pl.). Du reste, ces distinctions ne paraissent reposer que sur des caractères d'une importance très secondaires.

E.

Balanus squamosus. Brug. n° 17.

Encycl. pl. 165. f. 9-10.

An balanus cranchii? Leach. Cirrip. pl.

* *Asemus porosus*. Ranzani. op. cit. p. 29. pl. 2. fig. 32. 33.

• * *Conia porosa*. Sowerby. Genera. pl. fig. 42 et 43.

* *Tetracilita stalactifera*. Gray. op. cit. p. 104.

* *Conia stalactifera*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 376.

(b) *Var. sulcis granulosis*.

Habite les mers de Saint-Domingue. *Pages*. Elle vit aussi dans les mers des grandes Indes. Elle tient à la suivante et à la B. crêpue par ses rapports. Sa coquille est d'un gris bleuâtre; ses sillons ressemblent à des stalactites filiformes, inégales, serrées.

17. Balane plissée. *Balanus plicatus*.

B. testâ depresso-conicâ, plicis inæqualibus longitudinalibusque radiatâ; aperturâ tetragonâ; radiis quatuor transversè rugosis.

[a] *Testa valdè depressa, stelliformis.*

[b] *Testa conica.*

[c] *Testa conica scaberrima; plicis tuberculato-granosis.*

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. *Péron et Lesneur*. Mus. n°. Son test est épais et très poreux dans l'épaisseur de sa base. Le fond de la coquille paraît dépourvu de lame testacée. Les valves de l'opercule ont leur bord supérieur ondulé, sublobé.

18. Balane double-cône. *Balanus duploconus*.

B. testæ parte supremâ univalvi, indivisâ, convexâ; inferiore turbinatâ, non clausâ; aperturâ ellipticâ.

Balanus duploconus. *Péron*.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, port de l'Ouest, sur un madrépore. L'exemplaire est sans opercule et incomplet.

19. Balane patellaire. *Balanus patellaris*.

B. testâ depresso-conicâ, rudi, cinereo-violascente; plicis inæqualibus radiantibus; aperturâ ellipticâ.

Cabinet de M. *Ménard*. *Lepas stellata?* *Poli*. Test. 1. t. 5. f. 18.

Habite la rade de Villefranche, près de Nice, sous les rochers submergés. Petite espèce qui tient de la B. plissée. Son bord inférieur est festonné, mince, sans cellulose distincte.

20. Balane demi-plissée. *Balanus semiplicatus*.

B. testâ ovato-conicâ; valvis supernè sulcato-plicatis; radiis transversè striatis.

Habite l'Océan atlantique méridional. Taille petite ou médiocre; individus groupés, nombreux. Mon cabinet. Elle varie à plus prolongés jusqu'au bas.

21. Balane des gorgones. *Balanus galeatus*.

B. testâ ovato-obliquatâ, subconicâ; aperturâ obliquâ, trigonâ. Lepas galeata. L. Mant. 2. p. 544. Gmel. p. 3209.

Schroel. Einl. in die Conch. 3. p. 518. t. 9. f. 20.

Balanus galeatus. Brug. Dict. n° 16. Encycl. pl. 165. f. 7. 8.

* Sowerby. Genera. pl. fig. 6, 7 et 8.

* *Conoplea elongata*. Say. (1)

* Groy. Ann. of Phil. t. 10. p. 103.

Habite l'Océan asiatique, sur des Gorgones qui l'encroûtent. Son ouverture n'est point latérale; mais la position de la coquille sur la Gorgone lui donne cette apparence.

22. Balane subimbriquée. *Balanus subimbricatus*.

B. testâ conoïdâ; costis crassis carinato-umbratis; operculi valvis sinuato-lobatis.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, baie des Chiens marins. Péron et Lesueur.

23. Balane ridée. *Balanus rugosus*.

B. testâ albo-rubescens, conoïdâ, longitudinaliter rugosâ; aperturâ minimâ.

Mus. n°.

Habite: . . . Du voyage de Péron, sur une pointe d'Oursin. Ce n'est point le *Lepas rugosa*. Mont. Act. soc. lin. 8. p. 25. t. 1. f. 5, qui ne m'est pas connu.

24. Balane plancienne. *Balanus plancianus*.

B. testâ albâ, conicâ, brevî, lævigatâ; aperturâ dilatâ; operculo compresso: valvis obtusissimis.

Plancus. Conch. p. 29. tab. 5. f. 12.

* *Lepas balanoides*. Poli. op. cit. t. 1. p. 23. pl. 5. fig. 2.

* *Balanus balanoides*. Ranzani. op. cit. p. 43.

(1) Le genre *Conoplea* de Say diffère principalement des Balanes par l'existence d'une portion basilaire, allongée et carénée.
E.

Habite la mer Adriatique. Collect. de M. *Ménard*. Cette espèce nous paraît différente de notre Balane œuvée, n° 8.

* M. DeFrance mentionne sous le nom de *Balanus virgatus* une espèce fossile du terrain tertiaire de Docée, qui, dit-il, a la plus grande analogie avec le *B. Balanoïde*. (Dict. des Sc. nat. t. 3. Sup. p. 166.)

25. Balane pustulaire. *Balanus pustularis*.

B. testâ brevi, subconicâ; valvis lævibus; radiis sex: duobus solitariis; aliis per paria remota geminatis.

Habite.... Fossile d'Andona en Piémont. Cabinet M. *Ménard*.

26. Balane crépue. *Balanus crispatus*.

B. testâ conicâ, truncatâ; radiis quinque; valvulis apice nudis, infernè muricata-crispatis.

Lepas crispata. Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 534. t. 9. f. 21.

Balanus crispatus. Brug. Dict. n° 7.

Encycl. pl. 164. f. 11.

* Ranzani. op. cit. p. 40.

Habite.... On la trouve fossile en Italie (* Voy. DeFrance. Dict. de Sc. nat. t. 3. p. 169). Cette espèce a l'aspect du *B. conoïdeus*, n° 16; mais elle a des rayons bien apparens.

27. Balane ponctuée. *Balanus punctatus*.

B. testâ conicâ, transversè striatâ, albo punctatâ; radiis lævibus; operculo posticè bicorni. Br.

Balanus punctatus. Brug. n° 11. Encycl. pl. 164. f. 14.

* Ranzani. op. cit. p. 40.

Chemn. Conch. 8. tab. 97. f. 827.

Habite l'Océan des Indes.

28. Balane fistuleuse. *Balanus fistulosus*.

B. testâ tubulosâ, elongatâ, striatâ; valvulis supernè dehiscentibus; aperturâ patulâ.

Lepas elongata. Chemn. Conch. 8. tab. 98. f. 838.

Balanus fistulosus. Brug. n° 6. Encycl. pl. 164. f. 7. 8.

Habite l'Océan boréal.

29. Balane large. *Balanus latus*.

B. testâ brevi, conicâ, truncatâ; basi latâ, lobatâ; valvis sub tabulâ externâ decidua sulcatissimis.

Balanus major, latus. List. Conch. tab. 442. f. 284.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet.

Etc. Ajoutez le *Balanus patelliformis* de Bruguières. n° 14. et d'autres encore.

† 30. Balane discordant. *Balanus discors*.

B. tubo conico, superne coarctato; valva prominente anteriore in longum, lateralibus et posteriore oblique sulcatis, omnibus squamosis; valvis depressis angustis, viz transverse striatis, omnibus squamosis; operculi valvis anterioribus externe bifoveolatis, posterioribus in apice acutis, non unguiculatis, utrisque transverse striatis.

Ranzani. op. cit. p. 41. pl. 3. fig. 9-13.

† 31. Balane du Dauphiné. *Balanus Delphinus*.

B. testâ longitudinaliter substriata, radiis transverse striatis.

Knorr. Vol. 2. tab. K.

Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 3. Supplém. p. 166.

Fossile de Saint-Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné.

† 32. Balane écailleux. *Balanus squamosus*.

B. striis transversalibus squamosis diversis.

Defrance. loc. cit.

Fossile du terrain subappennin de l'Italie.

† 33. Balane en dent. *Balanus dentiformis*.

B. testâ gregali; aperturâ ovali; basi dentiformi longitudinaliter striatâ.

Defrance. loc. cit.

Knorr. t. 2. pl. K. 1. fig. 4.

Fossile des environs de Marseille.

† 34. Balane cannelé. *Balanus striatus*.

B. testâ longitudinaliter striatâ; aperturâ dentatâ; operculi valvis duobus subtriangularibus, et aliis striis undulatis.

Defrance. op. cit. p. 167.

Fossile des environs de Plaisance.

† 35. Balane cerclé. *Balanus circinatus*.

B. testâ a summo ad imum lineis griseis cincta, radius longitudinaliter striatis.

Defrance. loc. cit.

Sowerby. Genera pl. fig. 3.

Fossile des Falunières de Hauteville, département de la Manche.

† 36. Balane commune. *Balanus communis*.

B. testâ ad basin sulcatâ; apertura magnâ; operculi valvis substriatis.

Defrance. loc. cit.

Fossile des terrains tertiaires de Paris.

† 37. Balane pustule. *Balanus pustula*.

B. testá parvá, levi extrinsecus, intus ad basim longitudinaliter striatá.

Defrance. op. cit. p. 168.

Fossile.....

† 38. Balane marqueté. *Balanus tessellatus*.

B. testá obliquè conicá, tenui, valvis levibus subcostatis; radiis tessellatis; aperturá ovali.

Sowerby. Mineral Conch. vol. 1. pl. 84. fig. 1.

Fossile du Crag de Norfolk.

† 39. Balane épais. *Balanus crassus*.

B. testá crassá, obliquè conicá; valvis subcostatis; aperturá triangulari.

Sowerby. op. cit. pl. 84. fig. 1.

Fossile des environs d'Ipswich.

† Ajoutez plusieurs espèces fossiles décrites par Schlotheim sous le nom de *Lépodites* (Petrifactenkunde. p. 170, etc.)

ACASTE. (Acasta.)

Animal

Coquille sessile, ovale, subconique, composée de pièces séparables. Cône formé de six valves latérales, inégales, réunies; ayant pour fond une lame orbiculaire, concave au côté interne, et ressemblant à une patelle ou à un go-belet. Opercule quadrivalve.

Animal.

Testa sessilis, ovata, subconica, partibus separabilibus composita. Conus ex valvis senis lateralibus coadunatis; fundo lamellá seu valva orbiculatá, latere interno concava, patellam vel pocillum simulante. Operculum quadrivalve.

OBSERVATIONS. — Les *Acastes* ne sont point fixées sur des corps solides ou durs, et paraissent vivre toutes dans des Éponges.

Dans une espèce que j'avais observée, j'apercevais des motifs de distinction pour un genre particulier, et j'attendais la confirmation de ce genre dans l'observation de quelque autre espèce offrant les mêmes caractères. M. Leach vient d'établir ce genre sous le nom d'*Acasta*, que je m'empresse d'adopter.

Les valves des *Acastes* ont peu d'adhérence entre elles, surtout celles du fond; et comme elles sont inégales, l'ouverture de la coquille est irrégulière. Cette coquille posée ne peut se tenir debout, la valve de sa base étant convexe en dehors, quelquefois conoïde.

[M. Sowerby et M. de Blainville n'admettent pas ce groupe comme genre, mais ce dernier auteur en fait une subdivision des Balanes. En effet la conformation de la base de l'enveloppe tégumentaire de ces animaux varie extrêmement, suivant les circonstances dans lesquelles ils se sont développés, et les différences de cette nature ne sont pas assez important pour motiver des distinctions génériques. E.]

ESPÈCES.

1. Acaste de Montagu. *Acasta Montagu*.

A. testâ valvis acutis, transversè striatis, extus spinulis ascendentibus muricatis.

Acasta montagu. Leach. Cirrip. Acamp. pl. f. (* Encyclop. britan. Suppl. t. 3. p. 171. pl. 57.)

* *Balanus Montagu*. Sowerby. Genera. pl. fig. 4 et 5.

* Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 38. fig. 4.

Habite.... Valve inférieure patelliforme.

2. Acaste gland. *Acasta glans*.

A. ovalis; testâ supernè spinulosâ, transversim substriatâ; valvâ basos cyathiformi, margine sex-dentatâ.

Mus. n°.

Habite à la Nouvelle-Hollande, à l'île King, dans des Éponges. Péron.

Elle est rougeâtre, peu épineuse, et les six dents de sa valve inférieure sont inégalement espacées : quatre sont par paires écartées; les deux autres sont solitaires.

3. Acaste sillonnée. *Acasta sulcata*.

A. testâ oblongâ, longitudinaliter sulcatâ; intus scabrinusculis; valvâ basos plicatâ, margine crenulatâ.

Mus. no.

Habite la baie des Chiens marins, à la Nouvelle-Hollande, dans les Éponges. Péron. Petite, blanche, presque transparente.

Etc. Ajoutez le *lepas spongites*. (*A. spongites*). Poli. Test. 1. p. 25. tab. 6. f. 5.

* *Acasta spinulosa*. Desh. Guérin. Iconographie du Règne animal. Mollusques. pl. 58. fig. 4.

[M. Sowerby a établi sous le nom d'OCTOMÈRE (*octomeris*) un genre nouveau pour une Balanide; dont la portion tubulaire se compose de huit valves inégales, et dont l'opercule offre comme chez les Balanes 2 pièces de chaque côté.

Esp. *O. angulos* Sowerby. Genera. pl. . fig. 1-11.

O. Stuchburii. Gray. Ann. of Philos. V. 10. p. 194.

Le genre CATOPHRAGMUS du même auteur se rapproche beaucoup du précédent, tant par la forme générale que par le nombre des pièces testacées principales, car l'opercule présente quatre valves et le cone huit; mais en dehors de ces derniers se trouvent un grand nombre de petites pièces testacées, disposées par rangées transversales, dont le nombre paraît augmenter avec l'âge. L'espèce remarquable qui a servi à l'établissement de ce genre, a reçu le nom de *Catophragmus imbricatus*. Sowerby (loc. cit. pl. fig. 1-6.)

CREUSIE. (Creusia.)

Corps sessile, subglobuleux, enfermé dans une coquille operculée. Trois ou quatre paires de bras tentaculiformes. Bouche sans saillie, à la partie antérieure et supérieure du corps.

Coquille sessile, fixée, orbiculaire; convexe-conique, composée de quatre valves: les valves inégales, réunies, distinctes par leurs sutures. Opercule intérieur, bivalve.(1)

(1) M. Gray a constaté que dans les échantillons, décrits par Leach, il existe deux valves de chaque côté de l'opercule. E.

veux en dessus, percée au sommet. Ouverture petite, elliptique. Opercule bivalve.

Animal. . . .

*Testa sessilis, univalve, globoso-ventricosa, superi-
convexa, apice forata. Apertura parva, elliptica. Opercu-
lum bivalve.*

OBSERVATIONS. — M. Savigny est le premier qui ait reconnu, distingué et nommé ce genre, et probablement il nous éclairera sur l'animal, lorsqu'il en publiera la description.

Le *Pyrgome* diffère fortement des *Circusies*, au moins par sa coquille qui paraît entièrement univalve, subglobuleuse, et dont le paroi intérieure est sillonnée longitudinalement. Le dos convexe de cette coquille offre un espace elliptique, circonstrit par un bord crénelé, et c'est presque au milieu de cet espace que se trouve l'ouverture. La coquille est enfoncée dans l'épaisseur d'un polypier pierreux, de notre genre *Astron*.

ESPECE.

1. *Pyrgome rayonnante. Pyrgoma cancellata.*

* *P. testâ longitudinaliter costatâ.*

Pyrgoma cancellata. Leach. Cirrip. * Encyclop. brit. Suppl. t. 3. p. 171. pl. 57.

* Gray. Ann. of Philos. t. 20. p. 102.

Pyrgoma. Sav. Mus.

Habite... la mer Rouge? De l'ouverture au bord de l'espace dorsal, partent des sillons convexes et en rayons. C'est la substance du polypier qui les rend échinés.

† 2. *Pyrgome lobe. Pyrgoma lobata.*

P. testâ transverse striatâ. Gray, loc. cit.

Habite.

* Ajoutez [*Pyrgoma crenatum.* Sowerby. Genera. pl. fig. 1-6; et *Pyrgoma anglicum.* Eusd. loc. cit. fig. 7.]

ORDRE SECOND.

CIRRHIPÈDES PÉDONCULÉS.

Leur corps est soutenu par un pédoncule tubuleux, coriace, mobile, dont la base est fixée sur les corps marins. La bouche est presque inférieure.

Sauf ce qui constitue l'essentiel de l'organisation intérieure, les *Cirrhipèdes pédonculés* sont si différens de ceux de notre premier ordre, qu'il est étonnant que Linné les ait réunis les uns et les autres dans le même genre. Malgré son autorité, *Bruguères* a distingué ceux dont il s'agit ici, et en a formé son genre *Anatife*.

Il semble d'abord que ce soit surtout par la coquille que les *Cirrhipèdes* de cet ordre sont si différens des *Cirrhipèdes* sessiles; mais si l'on considère que le tube qui soutient cette coquille est réellement une partie même de l'animal, on sentira que les différences entre les animaux des deux ordres, embrassent différens rapports. Dans ma manière de juger les choses, la coquille, analogue ou correspondante à celle des *Cirrhipèdes* sessiles, n'existe plus ici; son opercule seul subsiste après avoir changé de forme et de composition. C'est donc lui seul qui protège maintenant les parties essentielles de l'animal; et comme il est composé de plusieurs pièces inégales, mobiles, susceptibles de s'ouvrir pour les besoins de l'animal qu'il recouvre, nous le verrons lui-même s'atténuer peu-à-peu et presque disparaître, en parcourant les genres qu'il a paru nécessaire d'établir.

Les *Cirrhipèdes pédonculés* vivent tous dans la mer.

sure.

[Voyez pour plus
animaux, le mémoire
St.-Auge.

TESTA

Corps recouvert d'un
doncule tubuleux et ten-
breux, longs, inégaux, au
sous le sommet du corps.

Coquille comprimée su-
valves contiguës, inégales,
les plus grandes.

*Corpus testâ oblectum, et
impositum. Brachia tentacu-
qualia, articulata, ciliati
exercitilia.*

*Testa lateribus compres-
contiguis, inequalibus; lat-*

OBSERVATIONS. — Quoique ce
je rédais ici le nom.

nos Cirrhipèdes. Ce fut Bruguières qui, le premier, commença les nouvelles distinctions que les progrès de la science rendaient indispensables (1). Il distingua tous les Glands de mer sous le nom de *Balanus*, et donna à tous les Cirrhipèdes qui ont un pédoncule tubuleux, le nom d'*Anatifa*. C'est d'une partie de ces Anatifes dont il s'agit ici.

La coquille de nos *Anatifes* est composée de cinq valves, deux de chaque côté, et la cinquième sur le bord dorsal. Celle-ci est plus longue et plus étroite que les autres. Ces valves sont réunies les unes aux autres par une membrane qui les borde et les maintient dans leur situation. Dans la coquille fermée, ces mêmes valves sont rapprochées en un cône aplati, qui est soutenu sur un pédicule tubuleux, tendineux, flexible, susceptible de s'allonger et de se contracter pendant la vie de l'animal et dont la base est fixée sur quelques corps marins. Les mouvemens divers que l'animal fait exécuter au tube qui le soutient, le mettent à portée de se procurer plus aisément les alimens qui lui conviennent.

L'animal de l'Anatife lisse (*Lepas anatifera*, Linn.) est décrit et figuré dans l'histoire des testacés de Poli; il a douze paires de bras, et sa bouche est armée de deux paires de mâchoires dentelées et transverses, ainsi que de deux autres paires mutiques, molles et velues, que Poli considère comme des palpes.

Les branchies des Anatifes, selon G. Cuvier, sont des appendices en pyramides allongées, adhérentes à la base extérieure des cirres, auxquels nous donnons le nom de bras. Ce caractère des branchies fournit un nouveau rapport entre ces Cirrhipèdes et les Crustacés brachyures.

ESPÈCE.

. Anatife lisse. *Anatifa lævis*.

A. testâ compressâ, lævi; tubo pedunculiformi longo, transversè rugoso.

Lepas anatifera. Lin. Syst. p. 1109.

Chemn. Conch. 8. p. 340. t. 100. f. 853.

(1) Lister avait déjà employé cette division.

Pennant. Zool. brit. 4. pl. 38. f. 9.

Seba. Mus. 3. tab. 16. f. 1.

Anatife. n° 2. Brug. Dict.

Encycl. pl. 166. f. 1.

* *Lepas anatifera*. Tilesius. Jahrbuch. p. 198.

* *Anatifa laevis*. Schumacher. Essai d'un nouv. syst. des habitations des Vers testacés. p. 97.

* *Anatifa vulgaris*. Gray. Annal. of Philosophy. vol. 10. p. 100.

* *Pentalasmis anatifera*. Leach. Encyclop. brit. Suppl. t. 3. p. 170. (1)

* Sowerby. Genera. pl. fig. 1 et 2.

* *Pentalepas laevis*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 374 pl. 115. fig. 3.

* *Lepas anatifera*. Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 176.

* *Pollicipes laevis*. Guérin. Iconogr. Moll. pl. 37. fig. 1.

Habite les mers d'Europe et ailleurs. Espèce commune, vulgairement appelée *Conque anatifère* ou *Bernache*. Son pédicule a jusqu'à 9 pouces de longueur.

2. Anatife velue. *Anatifa villosa*.

A. testâ compressâ, laevi; tubo pedunculiformi villosa.

Anatifa villosa. Brug. Dict. n° 1.

* *Pollicipes villosus*. Sowerby. Genera. fig. 3.

Habite la Méditerranée.

3. Anatife dentelée. *Anatifa dentata*.

A. testâ compressâ, laevi; valvula dorsali carinato-dentatâ.

Concha anatifera margine muricata. List. Conch. t. 439. f. 282.

Anatifa dentata. Brug. Dict. n° 3.

Habite la Méditerranée. Voyez Sloan. Jam. hist. t. tab. X.

4. Anatife striée. *Anatifa striata*.

A. testâ parvâ triangulari subcompressâ; valvis argute striatis.

-
- (1) Le genre *Pentalasmis* de Leach correspond à-peu-près au genre *Anatifa* de Lamarck et a pour caractère : « Polypédiens ayant la partie supérieure du corps garnie de cinq écailles dont l'inférieure très grande, la supérieure allongée, et acuminée en arrière; les postérieures linéaires et courbes; pédoncule nu. » M. de Blainville n'adopte ni ce genre ni celui des Anatifes, et réunit les Pentalasmes de Leach avec certains Pouce-pieds de Lamarck sous le nom générique de *Pentalepas* (*Pentalepas*). E

Gualt. Conch. tab. 106. f. 2. 3.

List. Conch. tab. 440. f. 283.

Anatifa striata. Brug. Dict. n° 4.

Encycl. pl. 166. f. 2.

Lepas anserifera. Lin. Syst. nat. p. 1109.

Pentalasmis striata. Leach. Cirrhip. campyl. pl. f.

Habite l'océan Atlantique et Américain.

5. Anatife vitrée. *Anatifa vitrea*.

A. testâ subventricosâ, lævi tenuissimâ; pellucidâ; valvâ dorsali medio angulatâ, basi latiore, rotundatâ.

Mon cabinet.

Habite les côtes de la Manche, près de Noirmoutiers. Communiquée par M. Latreille. Cette espèce est très différente de l'Anatife lisse. Sa coquille est courte, enflée, trigone comme celle de l'Anatife striée, mince, transparente, à valve dorsale coudée et anguleuse dans son milieu, dilatée et arrondie à son extrémité inférieure. Le *Lepas fascicularis* de Montagu, communiqué par M. Leach, ne me paraît qu'une variété de cette espèce.

+ 6. Anatife sillonnée. *Anatifa sulcata*.

A. crassa, subtriangularis, profunde sulcata, albido-cærulescens; basi tribus seriebus granosis; pedunculo lævi, brevissimo.

Quoy et Gaimard. Voy. de l'*Astrol.* p. 538. pl. 93. fig. 18-20.

Habite la Méditerranée.

+ 7. Anatife tricolore. *Anatifa tricolor*.

A. testâ maxime compressâ, ovali, lævi, cærulescente, nigro et rubro variegatâ; pedunculo nigro.

Quoy et Gaimard. Annales des S. nat. 1^{re} série. t. 10. pl. 7. fig. 7. et Voyage de l'*Astrol.* t. 3. p. 631. pl. 93. fig. 4.

Habite la Méditerranée.

+ 8. Anatife allongée. *Anatifa elongata*.

A. testâ compressâ, elongato-ovali, postice subtruncatâ, cinereo-cærulescente, margine lutea; pedunculo mediocri, tuberculato.

Quoy et Gaimard. op. cit. p. 635. pl. 93. fig. 6.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

+ 9. Anatife sessile. *Anatifa sessilis*.

A. testâ triangulari vel mitratâ subacutâ; tenuissime radiatâ albido-cærulescente; dorso rubro; pedunculo brevissimo, rubente.

Quoy et Gaimard. Voy. de l'*Astrol.* t. 3. p. 632. pl. 93. fig. 11.

Habite les parages de la Nouvelle-Guinée.

† 10. Anatife pélagienne. *Anatifa pelagica*.

A. subcartilaginea griseo-cerulea, crassa, subtriangularis; valvis undulatis, radiatim striatis, dorsali valde incurvata basi patula, pediculo brevis et levi simili suo juncto.

Quoy et Gaimard. Voy. de l'*Astrol.* t. 3. p. 633. pl. 93. fig. 21.

Trouvée en pleine mer entre les îles Mariannes et Sandwich.

POUCE-PIED. (*Pollicipes*.)

Corps recouvert d'une coquille, et soutenu par un pédoncule tubuleux et tendineux. Plusieurs bras tentaculaires, comme dans les Anatifes.

Coquille comprimée sur les côtés et multivalve : les valves presque contiguës, inégales, au nombre de treize ou davantage; les inférieures des côtés étant les plus petites.

Corpus testâ obtectum, pedunculo tubuloso tendineoque impositum. Brachia plura tentacularia, ut in Anatifis.

Testa lateribus compressa, multivalvis : valvis subcontiguïs, inæqualibus, tredecim aut ultra; laterum inferioribus minoribus.

OBSERVATIONS. — Les Pouce-pieds ont un aspect assez particulier, qui les rend facilement reconnaissables. Les pièces inférieures des côtés aplatis de leur coquille, sont toujours plus petites que les supérieures et quelquefois sont très nombreuses. Le pédicule qui soutient le corps et sa coquille est le plus souvent fort court et en général chagriné, écailleux même, ridé, assez raide. M. *Leach* a le premier établi ce genre, dont néanmoins il distingue le *Lepas scalpellum*.

ESPÈCES. *

1. Pouce-pied groupé. *Pollicipes cornucopia*.

P. congesta; pedunculo brevi, coriaceo, squamoso; testa valvis numerosa, levibus, inæqualibus.

Lepas pollicipes. Gmel. p. 3213.

D'Argenv. Conch. t. 26. fig. 12.

List. Conch. t. 439. f. 281.

Chemn. Conch. 8. tab. 100. f. 851. 852.

* Tilesius. op. cit. p. 284.

Anatifa pollicipes. Brug. Dict. n° 6.

EjUSD. Encyclop. pl. 166. f. 10. 11.

* *Romphidione vulgaris*. Schumacher. op. cit. p. 97.

Pollicipes cornucopia. Leach. Cirrhip. pl. f. campyl.

* EjUSD. Encyclop. brit. Suppl. t. 3.

* *Pentalepas pollicipes*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 374.
pl. 115. fig. 3.

* Gray. Ann. of Philos. Vol. 20. p. 101.

* Sowerby. Genera. pl. fig. 1.

* *Pollicipes cornucopia*. Guérin. Iconog. Mollus. pl. 37. fig. 2.]

Habite les côtes de la Manche, la Méditerranée. Mus. n°.

2. Pouce-pied couronne. *Pollicipes mitella*:

*P. pedunculo squamoso; testâ multistriatâ compressâ : valvis trans-
versè striatis.*

Lepas mitella. Lin. Syst. nat. p. 1208.

Rumph. Mus. tab. 47. fig. M. 1

Chemn. Conch. 8. tab. 100. f. 849. 850.

Anatifa mitella. Brug. Dict. n° 7.

Encyclop. pl. 166. f. 9.

* *Polydora mitella*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 375.

* *Capitulum mitella*. Gray. op. cit. p. 101.

* *Pollicipes mitella*. Sowerby. Genera. pl. fig. 2.

* *Polliceps mitella*. Guérin. Iconog. Mollus. pl. 37. fig. 3.

Habite les mers de l'Inde. Mus. n°.

3. Pouce-pied scalpel. *Pollicipes scalpellum*.

P. pedunculo squamoso, inferius attenuato; testâ compressâ, tredecimstriatâ leviusculâ.

Lepas scalpellum. Lin. p. 1209. Gmel. p. 3210.

Mull. Zool. dan. 3. p. 23. t. 94. f. 1. 2.

Chemn. Conch. 8. vign. p. 294. f. a. A. et p. 338.

Anatifa scalbellum. Brug. Dict. n° 5.

Encyclop. pl. 166. f. 7. 8.

* *Lepas scalbellum*. Tilesius. Jahrbuch der Naturgeschichte. p. 273.

Scalpellum vulgare. Leach. cirrhip. * Encyclop. britan. Supplém. t. 3
p. 170. pl. 87. (1)

(1) Le genre *Scalpellum* de Leach comprend les *Pollicipédiens*

- Gray, op. cit. p. 100.
- Sowerby, Genera. fig.
- *Polylepas vulgaris*. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 375. pl. 115. fig. 4.

Habite les mers du nord de l'Europe.

Etc. Ajoutez le *Pollicipes villosus*, Leach. Cirrhip.

†4. Pouce-pied épineux. *Pollicipes spinosa*.

A. testâ compressâ, triangulari; valvis ovalibus senis albidis; bas plurimis spinosis cinctis; pedunculo, crasso, squamoso.

Anatife spinosa. Quoy et Gaimard, op. cit. p. 629. pl. 93. fig. 17.

Habite la Nouvelle-Zélande.

†5. Pouce-pied oblique. *Pollicipes obliqua*.

A. testâ valde compressâ, subquadrata, apice oblique truncatâ; valvis tredecim luteis; pedunculo crasso, conico levi.

Anatifa obliqua. Quoy et Gaimard, Voyage de l'*Astrolabe*. t. 3. p. 628. pl. 93. fig. 16.

Habite la Nouvelle-Hollande.

ayant la partie supérieure du corps garnie de treize écailles dont la postérieure linéaire. Les supérieures semi-circulaires et les cinq inférieures de chaque côté petites; et ayant le pédoncule garni de rides cornées, dans les interstices desquelles les tegumens sont poilus. M. de Blainville n'adopte pas ce genre, mais le fait rentrer dans son genre Polylèpe (*Polylepas*) qui est caractérisé de la manière suivante :

«Corps à-peu-près de même forme que dans le genre Pentalèpe, enveloppé dans un manteau entièrement couvert par treize pièces ou valves, dont six principales, une dorsale, une ventrale et deux paires de latérales; le pédoncule plus ou moins allongé et également squameux.»

Enfin le genre *Smilium* de M. Gray ne diffère aussi que fort peu du précédent comme on pourra en juger par la caractéristique suivante donnée par ce naturaliste: «*Smilium-Lanienæ testacea 13; quarum paria 5, laterales subtriangulares, anteriores 2, dorsalis ventralisque triangulares, incurvæ; posterior dorsalis linearis, geniculatus; omnes glabræ: pedunculus pilosus.*» L'espèce qui a servi à l'établissement de ce genre a reçu le nom de *Smilium peronii*. Gray. spicilegia Zoologica. p. 7. pl. 3. fig. 11. E.

6. Pouce-pied polymère. *Pollicipes polymerus*.

P. testâ obtusè subtrigond; valvis laevibus, substriatis, superioribus quatuor majoribus convexis, subtrapeziformibus, apice postice acuminato, basi subtruncato, reliquis plurimis plerumque subtrigonis; pedunculo squamulis minimis resupinatis obtecto.

Sowerby. Proceedings of the zoological. Soc. Part. 1. 1833. p. 74.

Habite les côtes de la Californie.

†7. Pouce-pied rouge. *Pollicipes ruber*.

P. testâ irregulariter subtrigond, rubrâ, antice subtusque pallidiore; valvis superioribus majoribus, planulatis, subtrapeziformibus, superne acuminatis; dorsali magna, sagittato; dorso rotundato-carinato; pedunculo squamulis minimis obtecto.

Sowerby. loc. cit.

Habite les côtes du Pérou.

†8. Pouce-pied sillonné. *Pollicipes sulcatus*.

P. valvis longitudinaliter striatis.

Sowerby. Mineral Conchology. vol. 6. tab. 606. fig. 1. 2 et 7.

Fossile de la craie d'Angleterre.

†9. Pouce-pied très grand. *Pollicipes maximus*.

P. valvis terminalibus rhomboïdalibus, sublevis medio-carinatis; valvo posteriore recurvato lanceolato, elongato.

Sowerby. Min. Conch. vol. 6. tab. 606. fig. 3-6.

Fossile du même terrain.

†10. Pouce-pied recourbé. *Pollicipes reflexus*.

P. valvis lateralibus laevibus, subplanis; valvo posteriore lanceolato.

Sowerby. loc. cit. pl. 606. fig. 8.

Fossile de l'île de Wight.

M. Gray a établi sous le nom d'IBLA, un genre particulier, comprenant des Lépadieus, dont le corps est garni de quatre valves, savoir : deux lames dorsales allongées et légèrement courbées, et deux lames ventrales courtes et triangulaires, et dont le pédoncule est cylindrique et pili-fère. Cette division avait déjà été indiquée par Cuvier (Règne anim. 1^{re} édit. t. 2. p. 507), et a été plus tard dé-

signée par ce dernier naturaliste, sous le nom de *Tetralasmis*.

L'espèce qui doit avoir servi de type à ce genre est le :

Lepas quadrivalvis. Cuvier. Mém. pour servir à l'histoire des Mollusques. Anatifa. p. 13. fig. 14. — *Tetralasmis hirsutus ejusdem*. Règne anim. 2^e édit. t. 3. p. 217. — Guérin. Iconog. Mollusques. pl. 37. fig. 7. — *Anatifa hirsuta*. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 639. pl. 93. fig. 7-10.

L'*Ibla cuvieriana* de M. Gray. (Ann. of Philos. t. 10. p. 201., et Spicilogia zoologica. p. 7. pl. 5. fig. 10.) ne paraît pas différer de l'espèce précédente.

Le genre *CONCHOTRYA* de M. Gray est aussi bien distinct et mérite d'être généralement adopté comme tendant à établir le passage entre les Lépadiens et les Balanides. Il se compose de Lépadiens à pédoncule court et rugueux, dont le corps est garni de cinq valves, disposées sur un seul rang, à-peu-près comme chez les Balanes.

Espr. *Conchotrya Valentia*. Gray. Ann. of Philos. t. 10. p. 201.

L'*Anatifa truncata* de MM. Quoy et Gaimard. (Voyage de l'Astrol. t. 3. p. 636. pl. 93. fig. 12-15.) appartient aussi à ce genre.

Le genre *BRISMA* du même auteur est caractérisé par des valves disposées, comme chez les précédents, sur un seul rang, mais au nombre de sept; le corps est cylindrico-conique; enfin on ne connaît pas la conformation du pédoncule.

Espr. *Brisma rhodiopus*. Gray. Ann. of Philos. t. 10. p. 202, et Spicil. zool. p. 7. pl. 6. fig. 17.

Enfin il donne le nom générique d'*OCTALASMIS* à des Lépadiens, ayant le corps subcomprimé et garni de huit petites lames testacées; savoir trois paires latérales, dont les intermédiaires triangulaires et les supérieures formant par leur réunion un angle central, une dorsale unique, ovulaire et étroite, et une ventrale linéaire.

Espr. *Octalasmis Warwickii*. Gray. loc. cit. pl. 6. fig. 16.

Le genre *LITHOTRIA* (*Lithotria*) de Sowerby ou *Litho-*

lepe de M. de Blainville, se compose d'un Lépadien qui habite dans des trous de rochers et a été caractérisé de la manière suivante : « Animal comprimé. Coquille irrégulièrement subpyramidale, comprimée, portée à l'extrémité d'un pédicule tubuleux, tendineux, ayant à sa base un appendice testacé, ressemblant à une potelle renversée, formée de huit valves contiguës, inégales : six latérales dont les inférieures très petites, une dorsale grande, ligulée, et une ventrale également très petite. » Quelques naturalistes et notamment M. Sander-Rang pensent que cet animal n'est qu'une véritable Anatife, qui se serait fixée sur une valve de Vénérupé, dans le fond d'une des cavités que celles-ci creusent ordinairement dans les rochers. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'observer.

ESP. LITHOTRÉE DORSALE. *Lithotria dorsalis*. Sowerby. Genera. pl.

Litholipas du mont Serrat. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32.

p. pl. 115. fig. 6.

CINÉRAS. (Cineras.)

Corps pédonculé, tout-à-fait enveloppé dans une tunique membraneuse; la tunique enflée supérieurement, ayant antérieurement une ouverture au-dessous de son sommet. Plusieurs bras menus, articulés, ciliés, sortant par l'ouverture antérieure.

Coquille : cinq valves testacées, oblongues, séparées, ne couvrant pas entièrement le corps; dont deux aux côtés de l'ouverture, et les autres dorsales.

Corpus pedunculatum, tunicâ membranacea penitus involutum : tunica supernè turgida, infra apicem anticè apertura hiante. Brachia plura tenuia, articulata ciliata, per aperturam anticam exsertilia.

Testa : valvæ testaceæ quinquæ, oblongæ, separatæ, corpus non penitus tegentes : duabus ad latera aperturæ : alteris dorsalibus.

* **OBSERVATIONS.**—Le genre *Cinéras*, établi par M. Leach, partagé avec le suivant (les Otions) ce caractère remarquable, d'avoir des valves testacées, étroites et tellement séparées, qu'elles ne peuvent recouvrir entièrement le corps de l'animal. On voit même que ce corps, de part et d'autre, est tout-à-fait enveloppé d'une membrane qui, par un prolongement, revêt le pédoncule, puisqu'il offre une ouverture antérieure pour la sortie des bras. Les Cinéras se distinguent des Otions, parce qu'ils ont cinq valves testacées, et qu'ils ne présentent point à leur sommet les deux cornes tubuleuses et tronqués des Otions de ces derniers.

[M. De Blainville réunit les Otions et les Cinéras dans un même genre auquel il donne le nom de *Gymnolepas*.

ESPECE.

1. *Cinéras flambé. Cinéras vittata.*

Lepas coriacea. Poli. Test. 1. tab. 6. fig. 30.

* *Senoclista fasciata*, Schumacher. op. cit. p. 98.

* *Lepas membranacea*. Montagu. Trans. of the Linn. Soc. vol. 11. p. 182. pl. 12. fig. 2.

Cinéras vittata. Leach. *cirrip. campylosomata*, pl. f. * *Encyclop. Britan. Supplém.* vol. 3. p. 170. pl. 57.

* Sowerby. *Genera*. pl.

* *Senoclista fasciata*. Gray. *Ann. of Philos.* 1. 10. p. 100.

Habite ... L'Océan Britannique? Communiqué par M. Leach.

OTION. (Otion.)

Corps pédonculé, tout-à-fait enveloppé d'une tunique membraneuse, ventrue supérieurement. Deux tubes en forme de cornes, dirigés en arrière, tronqués, ouverts à leur extrémité, et disposés au sommet de la tunique. Une ouverture latérale, un peu grande. Plusieurs bras articulés, ciliés, sortant par l'ouverture latérale.

Coquille: deux valves testacées, petites, semi-lunaires, séparées, et adhérentes près de l'ouverture latérale.

Corpus pedunculatum, tunicâ membranaceâ supernè ventricosa obvolutum. Tubi duo, corniformes, retrorsum versi,

truncati, extremitate pervii, ad apicem tunicae. Apertura lateralis, majuscula. Brachia plura, articulata, ciliata, per aperturam lateralem exsertilia.

Testa : valvae duae, testaceae, parvulae, semilunatae, separatae, propè aperturam lateralem adhærentes.

OBSERVATIONS.—BRUGUIÈRES avait déjà remarqué que l'organisation du *Lepas aurita* de Linné s'éloignait beaucoup de celle de ses Anatifes; qu'il y avait même erreur de ce qu'il disait de sa coquille, et qu'il fallait distinguer ce Cirrhipède comme un genre particulier. C'est ce qu'a fait M. *Leach*, en établissant ce genre sous le nom d'*Otion*.

Effectivement les *Otions* sont les plus singuliers des Cirrhipèdes, ceux qui ont la coquille la plus réduite, puisqu'elle ne consiste qu'en deux valves oblongues, presque en croissant et séparées, une de chaque côté de l'ouverture qui donne issue aux bras. Quant aux deux cornes tubuleuses et tronquées qui se trouvent au sommet de la tunique, elles sont plus singulières encore, et il semblerait que les branchies de l'animal reçoivent l'eau par les ouvertures de ces cornes, qui font partie de l'enveloppe particulière du corps.

ESPÈCE.

1. *Otion sans taches. Otion Cuvieri.*

O. corpore cornibusque immaculatis.

Lepas aurita. Lin. Syst. nat. p. 1110.

Ellis. Act. angl. 1758. t. 34. f. 1.*

* Tilesius Jahrbuch der naturgeschichte. p. 253.

Lepas leporina. Poli. Test. 1. 6. f. 21.

Seba. Mus. 3. tab. 16. f. 5.

Martin. Conch. 8. p. 345. tab. 100. f. 857. 858.

Lepas aurita. Brug. Dict. p. 66.

Otion Cuvieri. Leach. Cirrhip. campyl. pl. f. (* Encycl. brit. Suppl. f. 3. p. 170. pl. 57.

* *Malacotta bivalvis.* Schumacher. op. cit. p. 38.

* Gray. Ann. of Philosophy. V. 10. p. 100.

* *Otion Cuvierii.* Sowerby. Genera. pl. fig. 1-4.

Habite l'Océan septentrional.

2. *Otion tacheté. Otion Blainvillii.*

O. corpore coralloïdique maculatis.

* *Lepas cornuta*. Montagu. *Trans. of the Linn. Soc.* vol. 12. p. 179. pl. 12. fig. 1.

Otion Blainvillii. Leach. *Cirrhip. ibid.* pl. 1. (* *Encyclop. brit. Supp.* vol. 3. p. 178. pl. 57.

Caechoderna. Olfert. *Magaz. de Berlin.* 1814.

Habite la mer de Norvège. Cette espèce est plus grêle dans toutes ses parties que la précédente.

Nota. M. de Blainville a décrit ce genre dans le *Dict. des Sciences naturelles*, sous le nom d'*Aurifera*.

† 3. *Otion dépressée. Otion depressa.*

Corpus ad basin depressum, affusum. Processus perforati: valvulae majores sub-rhomboides; apices elevatae, infra excavatae; valvulae superiores dimores; posterior oralis, minutissima.

Coates. *Journal of the academy of nat. Sc. of Philadelphia.* vol. 6. p. 132.

Habite les côtes de la Chine.

† 4. *Otion sacutifère. Otion sacutifera.*

Corpus inflatum. Processus barniformes imperforati. Valvulae majores subtriangulares, infra acuminatae, in medio crenatae; superiores minutae, subtriangulares; posterior minutissima.

Coates. *op. cit.* p. 134.

Trouve près du Cap de Bonne-Espérance.

[Le genre *PAMINA* de M. Gray diffère du précédent par l'existence d'un seul appendice charnu situé entre les plaques postérieures Esp. *P. trilineata*. Gray. *Ann. of Philos.* t. 10. p. 100.

M. Sander-Rang a établi sous le nom d'*ALEPE* (*Alepas*) un genre nouveau pour recevoir les Lépadiens complètement dépourvus de pièces testacées. Il le caractérise de la manière suivante. «Animal ovale, comprimé, falciforme, arrondi près du pédicule; celui-ci médiocrement allongé; cirres un peu courts, se recourbant à peine à leur sommet et composés d'environ dix à douze articles hispides à leur base. Coquille remplacée par une enveloppe d'une

seule pièce, épaisse, subgélatineuse et un peu diaphane, sans autre ouverture que celle qui sert de passage aux cirres, se continuant avec le pédicule et ne présentant aucune trace de pièces testacées. » Ces Léjadiens paraissent être les *Tritons* de Linné ; il serait possible que l'absence de pièces testacées ne soit dépendante que du jeune âge des individus observés.

1. Alèpe parasite. *Alepa parasita*.

Anatifa univalve. Quoy et Gaimard. *Annales des Sciences naturelles*. t. 10. pl. 7. fig. 8. — *Alepa parasita*. Rang. *Manuel de l'Histoire naturelle des Mollusques*. p. 364. pl. 8. fig. 5. — *Anatifa parasita*. Quoy et Gaimard. *Voyage de l'Astrolabe*. t. 3. p. 641. pl. 93. fig. 1-3.

Trouvée sur une Méduse, près du détroit de Gibraltar.

2. Alèpe tubulé. *Alepa tubulosa*.

Anatifa tubulosa. Quoy et Gaimard. *Voy. de l'Astrolabe*. t. 3. p. 643. pl. 93. fig. 5.

Trouvée sur les côtes de la Nouvelle-Zélande.

R.

TABLE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

ARACHNIDES.	1
ARACHNIDES ANTENNÉES-TRACHÉALES.	16
ARACHNIDES CRUSTACÉENNES.	17
THYSANOURES.	18
Synymbure.	19
Podure.	20
Orcheselle.	22
Achorute.	<i>ibid.</i>
Machule.	<i>ibid.</i>
Pterobius.	24
Forbicine.	25
MYRIAPODES.	26
SCOLOPENDRACÉES.	28
Scutigere.	29
Lillobie.	31
Scolopendre.	32
<i>Cryptops.</i>	35
<i>Geophile.</i>	<i>ibid.</i>
ILLACÉES.	36
Polyxene.	37
Iule.	38
Glomeris.	44
ARACHNIDES ACARIDIENNES.	48

TABLE DES MATIÈRES.

689

Pou.	49
Ricin.	51
ARACHNIDES BRANTENNÉS-TRACHÉALES.	54
ACARIDES.	54
Astome.	61
Lépte.	62
Caris.	63
Ixode.	64
Argas.	66
Ptéropé.	67
Uropode.	ibid.
Smaris.	68
Bdelle.	70
Mite.	71
Hypope.	74
Chélyète.	ibid.
Gamase.	75
Dermanysse.	78
Oribate.	ibid.
Erythrée.	79
Thrombadion.	81
Raphignathe.	83
Mégamère.	84
Pachygnathe.	ibid.
ANESTOMES.	85
Hydrochne.	ibid.
Flais.	87
Limnocharis.	88
Atacs.	90
Diplodonte.	91
Arrénure.	ibid.
PHALANGIQUES.	92
Trogule.	93
Cocule.	94
Ciron.	ibid.
Fuscheur.	95
Ganolepte.	96
Geniosome.	97
Cocnète.	ibid.
Discosome.	99
Ostracide.	ibid.
Entarce.	ibid.

TOME V.

<i>Cygne.</i>	224
PSEPHOGONIDES.	229
<i>Nymphon.</i>	231
<i>Phoxichile.</i>	233
<i>Pseudogonon.</i>	235
FAUX-SCORPIONS.	237
<i>Galéode.</i>	239
<i>Place.</i>	241
ARACHNIDES EXANTHÉMATO-SCORPIONIDES.	243
<i>Phidipalpes.</i>	245
<i>Scorpion.</i>	247
<i>Cyclophthalmus.</i>	249
<i>Thelyphone.</i>	251
<i>Phryné.</i>	253
ARACHNIDES.	255
<i>Aragnée.</i>	257
<i>Atype.</i>	259
<i>Pilistate.</i>	261
<i>Mygale.</i>	263
<i>Aviculaire.</i>	265
<i>Sphodros.</i>	267
CRUSTACÉS	269
CRUSTACÉS BRANCHIOPODES.	271
BRANCHIOPODES FRANGÉS.	273
<i>Cypris.</i>	275
<i>Cytherine.</i>	277
<i>Cypridines.</i>	279
<i>Baphnie.</i>	281
<i>Lyncée.</i>	283
<i>Sida.</i>	285
<i>Latone.</i>	287
<i>Limnadié.</i>	289
<i>Cyzique.</i>	291
<i>Cyclope.</i>	293
<i>Katypterus.</i>	295
<i>Sapphirina.</i>	297
<i>Céphalocle.</i>	299
<i>Loé.</i>	301
BRANCHIOPODES LAMELLIPODES.	303
<i>Branchippe.</i>	305
<i>Artemis.</i>	307
<i>Salimène.</i>	309

TABLE DES MATIÈRES.

691

BRANCHIOPODES PARASITES.	200
<i>Dithélesion.</i>	201
<i>Lamproglène.</i>	203
<i>Nicolthoe.</i>	204
<i>Cétrope.</i>	205
<i>Argule.</i>	206
<i>Oalige.</i>	207
<i>Negagus.</i>	211
<i>Lepsoptheirus.</i>	212
<i>Chalimus.</i>	ibid.
<i>Bomolocus.</i>	ibid.
<i>Ergasilus.</i>	ibid.
BRANCHIOPODES GÉANTS.	213
<i>Limule.</i>	ibid.
<i>Polyphème.</i>	216
TRILORITES.	220
TRILOBITES PROPREMENT DITS.	223
<i>Calymène.</i>	224
<i>Trimerus.</i>	229
<i>Asaph.</i>	237
<i>Ceraurus.</i>	239
<i>Dupleura.</i>	ibid.
<i>Strophyr.</i>	240
<i>Conocéphale.</i>	241
<i>Ogygie.</i>	242
<i>Starion.</i>	244
<i>Cryptolithus.</i>	ibid.
<i>Paradozide.</i>	245
<i>Elleipsocephalus.</i>	250
TRILOBITES ANORMAUX.	251
<i>Agnoste.</i>	ibid.
LEPODES.	252
CLEPORTIDES.	257
<i>Armadille.</i>	258
<i>Cloporte.</i>	259
<i>Phlosie.</i>	262
<i>Ligie.</i>	ibid.
<i>Tylos.</i>	264
<i>Doto.</i>	265
ASCELLIDES.	ibid.
<i>Aselle.</i>	266
<i>Idotée.</i>	268

<i>Anthure.</i>	270
<i>Arcture.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Sphérom.</i>	271
<i>Néside.</i>	275
<i>Pierolar.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Limuarie.</i>	276
<i>Gymatboa.</i>	279
<i>Livocene.</i>	279
<i>Néloc re.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Olonceire.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anilocre.</i>	280
<i>Canolire.</i>	<i>ibid.</i>
<i>OEga.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Conilère.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Rocinelle.</i>	281
<i>Nélocire.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Eurydice.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Sérole.</i>	283
<i>Ropyre.</i>	284
LOXELLES.	285
<i>Typhis.</i>	286
<i>Anrée.</i>	288
<i>Pranize.</i>	289
<i>Apscude.</i>	291
<i>Rhoe.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tenais.</i>	292
<i>Ione.</i>	293
CAPRELLINES.	294
<i>Leptomère.</i>	295
<i>Chevraille.</i>	297
<i>Cyame.</i>	299
AMPHIRODUS.	301
<i>Phronime.</i>	303
<i>Hypérie.</i>	304
<i>Phorcus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lestrigon.</i>	305
<i>Thomsto.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Dactylocère.</i>	306
<i>Hieraconyx.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Primno.</i>	307
<i>Anchylomere.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pronos.</i>	

TABLE DES MATIÈRES.

693

<i>Oxycephale.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Fibilia.</i>	308
Crevette.	<i>ibid.</i>
<i>Isa.</i>	313
<i>Lysianasse.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Phlias.</i>	<i>ibid.</i>
Talitre.	<i>ibid.</i>
Corophie.	315
Juss.	317
Podocère.	<i>ibid.</i>
<i>Unicata.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Cœropoda.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Erichthonis.</i>	<i>ibid.</i>
STOMATOPODES.	318
Squille.	322
Ezechthe.	324
<i>Squillerichthes.</i>	326
<i>Aline.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Phyllosome.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Caridioides.</i>	330
CRUSTACÉS HOMOBANCHES.	332
HOMOBANCHES MACROURES.	337
FISSIPES.	343
Nébalie.	344
Mysis.	345
<i>Cynthia.</i>	347
<i>Thysanopode.</i>	347
<i>Podopsis.</i>	348
<i>Leucifer.</i>	<i>ibid.</i>
SALICOQUES.	<i>ibid.</i>
Crangon.	349
<i>Atyc.</i>	351
Kika.	352
Pandala.	353
Alphée.	354
<i>Pontonia.</i>	356
<i>Antennée.</i>	357
<i>Caridine.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Hymenocère.</i>	358
Gnatophylle.	<i>ibid.</i>
Pente.	349
<i>Sicyonis.</i>	360

<i>Solope.</i>	386
<i>Pariphe.</i>	386
<i>Sergeste.</i>	386
<i>Acete.</i>	386
<i>Optophore.</i>	386
<i>Aphyre.</i>	386
<i>Euphème.</i>	386
<i>Palémon.</i>	386
<i>Lysmate.</i>	386
<i>Athanasie.</i>	386
<i>ANTACIENS.</i>	386
<i>Langoustie.</i>	386
<i>Glyphea.</i>	386
<i>Pomphix.</i>	386
<i>Scyllare.</i>	386
<i>Eryon.</i>	386
<i>Galathée.</i>	386
<i>Grimothée.</i>	386
<i>Ecrevisse.</i>	386
<i>Thalassine.</i>	386
<i>Gébie.</i>	386
<i>Azie.</i>	386
<i>Callianasse.</i>	386
<i>Glaucothoe.</i>	386
<i>Callianide.</i>	386
<i>Isca.</i>	386
<i>PAGURIENS.</i>	386
<i>Hermite.</i>	386
<i>Cancelle.</i>	386
<i>Hippe.</i>	386
<i>Remipède.</i>	386
<i>Albuncé.</i>	386
<i>Amine.</i>	386
<i>Ranille.</i>	386
<i>HOMOBANCHES BRACHYURAS.</i>	386
<i>ORNICULIS.</i>	386
<i>Porcellane.</i>	386
<i>Hymenosoma.</i>	386
<i>Elamène.</i>	386
<i>Myctiro.</i>	386
<i>Doto.</i>	386
<i>Plumothère.</i>	386

TABLE DES MATIÈRES.

695

<i>Lanceolie.</i>	415
<i>Orcéophore.</i>	416
<i>Coryste.</i>	417
<i>Pseudocoryste.</i>	418
<i>Ocidia.</i>	ibid.
<i>Polydact.</i>	419
<i>Tutconis.</i>	420
<i>Leptope.</i>	ibid.
<i>Dodée.</i>	421
<i>Libinie.</i>	423
<i>Stororhynque.</i>	ibid.
<i>Aché.</i>	425
<i>Camposcie.</i>	426
<i>Latreillie.</i>	ibid.
<i>Inachus.</i>	427
<i>Amathie.</i>	ibid.
<i>Eurypode.</i>	428
<i>Parthenope.</i>	ibid.
<i>Eurynome.</i>	431
<i>Eumedon.</i>	ibid.
<i>Lithode.</i>	431
<i>Maia.</i>	433
<i>Herbstie.</i>	437
<i>Thod.</i>	ibid.
<i>Rhodie.</i>	ibid.
<i>Piss.</i>	438
<i>Péle.</i>	ibid.
<i>Lissa.</i>	ibid.
<i>Hyade.</i>	ibid.
<i>Naxie.</i>	439
<i>Chorine.</i>	ibid.
<i>Mithrax.</i>	ibid.
<i>Paramithrax.</i>	440
<i>Micippe.</i>	ibid.
<i>Criocarcin.</i>	ibid.
<i>Paramicippe.</i>	441
<i>Othonie.</i>	ibid.
<i>Stenocinops.</i>	ibid.
<i>Tyche.</i>	ibid.
<i>Péricère.</i>	ibid.
<i>Ménathie.</i>	44
<i>Halime.</i>	ibid

<i>Acanthonyx.</i>	421
<i>Epiatic.</i>	421
<i>Leucippe.</i>	433
PLAQUETTES.	434
<i>Doripe.</i>	445
<i>Cymopolie.</i>	448
<i>Caphyre.</i>	450
<i>Plagusie.</i>	451
<i>Grapæ.</i>	452
<i>Nautilograpæ.</i>	455
<i>Sésarme.</i>	456
<i>Cyclograpæ.</i>	457
<i>Farune.</i>	458
<i>Tourlourou.</i>	461
<i>Ocypode.</i>	462
<i>Rhombille.</i>	464
<i>Macrophthalme.</i>	466
<i>Cleistotome.</i>	468
<i>Pseudorhombille.</i>	469
NAGEURS.	470
<i>Podophthalme.</i>	472
<i>Portune.</i>	477
<i>Orithye.</i>	478
<i>Matule.</i>	479
CANCÉRIDES.	480
<i>Dromie.</i>	481
<i>Dromilite.</i>	482
<i>Dynamène.</i>	483
<i>Ogydromite.</i>	484
<i>Æthre.</i>	485
<i>Calappe.</i>	486
<i>Mursie.</i>	487
<i>Platymère.</i>	488
<i>Hepate.</i>	489
<i>Crabe.</i>	498
<i>Thie.</i>	499
ANNELIDES.	505
ANNELIDES APODES.	515
HIRUDINIENS.	517
SANGUES.	519
<i>Bdelle.</i>	520
<i>Trochetie.</i>	521

TABLE DES MATIÈRES.

697

Pontobdelle.	524
Pisicole.	525
Phylline.	526
Erpobdelle.	527
Branchiobdelle.	529
Branchiullion.	<i>ibid.</i>
ECUIVÉES.	530
Lombric.	531
Thalassème.	533
Sternopse.	534
Cirrature.	535
Ophélie.	537
ANNÉLIDES ANTENNAÏES.	<i>ibid.</i>
APRÉODITES.	539
Palmyre.	541
Halibée.	542
Polynoé.	543
Acoète.	546
Sigalon.	<i>ibid.</i>
Néanésides.	547
Lycoris.	548
Lycastis.	551
Nephtys.	<i>ibid.</i>
Glycère.	55
Goniade.	553
Hésione.	554
Alciopé.	555
Phyllodoce.	<i>ibid.</i>
Myriane.	556
Syllis.	<i>ibid.</i>
Spio.	558
ENCÉES.	559
Léodice.	561
Onuphis.	564
Diopatre.	<i>ibid.</i>
Lysidice.	<i>ibid.</i>
Lombrinère.	566
Aglaure.	<i>ibid.</i>
OELOPE.	567
AMPHIPODES.	568
Chloé.	567
Pétione.	571

Euphrosine.	578
Hippone.	576
Péripate.	575
Composita.	ibid.
AMÉLIDES SÉDENTAIRES.	577
Dorsaltes.	578
Arénicole.	579
Chétopète.	580
Siliquaie.	581
MALDAVIES.	585
Clymène.	586
Dentale.	588
Amputitrans.	600
Pectinaire.	601
Sabellaie.	603
Siphonostome.	605
Pheruse.	608
Térébelle.	ibid.
Térébellide.	608
Amphitrite.	ibid.
Fabricie.	611
Serpulées.	ibid.
Spirorbe.	612
Serpule.	661
Vermiè.	632
Spiramelle.	635
Caléolaie.	ibid.
Ditrupe.	637
Magile.	ibid.
CIRRHIÈRES.	539
CIRRHIÈRES SENSILES.	648
Tubicinelle.	649
Coronulle.	651
Balane.	654
Acaste.	667
Octomère.	669
Catophragmus.	ibid.
Creusie.	ibid.
Pyrgome.	671
CIRRHIÈRES PÉDONCULÉS.	673
Anatife.	674
Pouce-Pied.	678

TABLE DES MATIÈRES.

699

Ibia.

681

Conchotrya.

682

Brisneus.

ibid.

Octolasmis.

ibid.

Lithotrie.

ibid.

Cinéras.

683

Otion.


684

Alèpe.

686

FIN DE LA TABLE.

Vertical text on the left margin, likely a page number or chapter indicator.







Stanford University Libraries



3 6105 004 605 767

123678

